

KARL FRIEDRICH BURDACH,

Doctor der Philosophie, Medicin und Chirurgie, Königlich Preussischer Hofrath, ordentlicher Professor der Anatomie und Medicinalrath zu Königsberg, d. Z. Director der Königl. deutschen Gesellschaft und der physikalisch-medizinischen Gesellschaft, wie auch ordentliches Mitglied der Königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft daselbst, correspondirendes Mitglied der Königl. Kaiserlichen Josephinischen medicinisch-chirurgischen Akademie zu Wien, der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und der Kaiserlichen päthologischen Gesellschaft zu St. Petersburg, ordentliches Mitglied der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau und der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, Ehrenmitglied der Königl. Sächsischen ökonomischen Gesellschaft, correspondirendes Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft zu Bonn,

V O N

B a u e u n d L e b e n des G e h i r n s.



D r i t t e r B a n d.

Mit einem Kupfer.

Leipzig, 1826.

In der Dyk'schen Buchhandlung.



KARL FRIEDRICH BURDACH.

VON

B a n d I u n d I I

des

G e h i r n s

Mit einem Kupfer

Leipzig 1826

I n h a l t.

Erster Theil. Vom Hirnleben überhaupt.

Erste Abtheilung. Von den Erscheinungen des Hirnlebens. §. 220. 221.

A. Pflanzliches Hirnleben. §. 222.

I. Selbstbildung.

1. Normalität. a) Bildung. §. 223. b) Erhaltung. §. 224—236.
2. Abnormitäten. §. 237—263.

II. Verkehr mit dem Leibesleben. §. 264.

1. Einfluß des Leibeslebens auf das Hirnleben. §. 265—281.
2. Einfluß des Hirnlebens auf das Leibesleben. §. 282—351.

B. Psychisches Hirnleben.

I. Verhältniß zwischen Gehirn und Seele.

1. Einwirkung des Gehirns auf die Seele. §. 352—383.
2. Einwirkung der Seele auf das Gehirn. §. 384—389.

II. Verhältniß zwischen Seele und Leib.

1. Einwirkung des Leibes auf die Seele. §. 390—430.
2. Einwirkung der Seele auf den Leib. §. 431—446.

Zweite Abtheilung. Von der Wesenheit des Hirnlebens. §. 447.

A. Psychisches Leben. §. 448—472.

B. Pflanzliches Hirnleben. §. 473—479.

C. Pflanzlich-psychisches Hirnleben.

I. Wesentlichkeit.

1. Uebereinstimmung. §. 480—485.
2. Unterschied. §. 486—500.

II. Form.

1. Inne Form. §. 501—508.
2. Aeußerung. §. 509—514.

III. Richtung. §. 515.

1. Beziehung zum plastischen Leben.
 - a. überhaupt. §. 516.
 - b. Rumpf. §. 533—566.
2. Leben der Seele im Leibe. §. 567. 568.
 - a. Empfindung. §. 569—590.
 - b. Bewegung. §. 591—607.



IV. Vermittlung.

1. Rückenmark. §. 608—613.
2. Rumpferve. §. 614—619.
3. Hirnnerven. §. 620—631.

Zweyter Theil. Vom Leben der Hirntheile insbesondre.

Erste Abtheilung. Präliminarien.

- A. Hilfsmittel. §. 633—643.
- B. Aufgaben. §. 644—651.
- C. Materialien. §. 652—709. Tabelle I—XXXV.

Zweyte Abtheilung. Systeme.

- A. Weiße und graue Substanz. §. 710—716.
- B. Stamm und Mantel. §. 717—727.
- C. Markstamm und Stammganglien. §. 728—733.
- D. Stammstrahlung und Belegungs-system, §. 734—741.
- E. Längen- und Quersystem. §. 742—750.
- F. Centrale und periphere Oberflächen, §. 751—768.
- G. Hellen, §. 769—779.

Dritte Abtheilung. Dimensionen.

- A. Einheit. §. 780—784.
- B. Rechts und links. §. 785—824.
- C. Vorne und hinten. §. 825—860.
- D. Oben und unten. §. 861—870.

Vierte Abtheilung. Hirntheile.

- A. Verlängertes Mark. §. 871—891.
- B. Kleines Hirn. §. 892—933.
- C. Großhirnstamm. §. 934—993.
- D. Belegungsorgane des großen Hirns. §. 994—1020.
- E. Mantel des großen Hirns. §. 1021—1051.

Schlußwort.

Erster Theil.

Vom Hirnleben überhaupt.

Erste Abtheilung.

Von den Erscheinungen des Hirnlebens.

Erster Abschnitt.

Vom pflanzlichen Hirnleben.

§. 220. Das Gehirn, ringsum in Schädelknochen eingemauert, ist das unzugänglichste aller Organe; noch verborgener ist sein innerer Bau; am dunkelsten aber ist sein Leben. Denn, selbst ein Körperliches, äussert das Gehirn keine eigenmächtige Bewegung, keine unmittelbare Bildung oder Umwandlung von Stoffen, kurz, keine materielle Thätigkeit, durch welche es in das Leben der übrigen Organe eingriffe; selbst ein Gegenstand der äussern Sinne, übt es nur eine innerliche Würksamkeit aus, die wir theils nur durch Folgerung aus sinnlichen Beobachtungen mittelbar erreichen, theils nur in unsrem Bewusstsein inne werden. Dieses Innwerden selbst aber, diese Gemeinschaft unsres Ichs mit einem körperlichen Daseyn, diese Verknüpfung des Denkenden mit einem Raumerfüllenden scheint einen Widerspruch zu enthalten, dessen Lösung vielleicht unsre Kräfte übersteigt.

§. 221. Indem wir nun es unternehmen, zu einer Erkenntniß des Hirnlebens vorzudringen, welche in organischem Zusammenhange mit unsern übrigen Naturkenntnissen steht, dürfen wir nur dann unser Ziel zu erreichen hoffen, wenn wir besonnen und planmässig zu Werke gehn, von bestimmten Grundsätzen uns leiten lassen, und behutsam, aber unverzagt vorschreiten. Nun ist alle unsre Erkenntniß entweder Empirie, oder Speculation, oder Theorie. Die Empirie ist die Kenntniß der Einzelheiten, der Erscheinungen, der Naturgegenstände und ihrer Beschaffenheit; die Speculation hingegen ist die Anschauung des Allgemeinen und Ganzen, des Grundes vom Daseyn und Wirken überhaupt. Wenn jene uns zu keiner Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen führt, so kann diese ihrerseits uns nicht über die Beschaffenheit der Dinge belehren; jene giebt uns Stoff ohne Form, diese Form ohne Stoff. Die wahrhaft gestaltende Erkenntniß aber, welche Stoff und Form in ihrer organischen Einheit, Empirie und Speculation in ihrer lebendigen Durchdringung darstellt, ist die Theorie. Wie die Natur Beydes ist, ein Gan-

zes, welches Einzelheiten umfaßt, und eine Summe von Einzelheiten, in welchen das Ganze sich offenbart, so ist auch das eigentliche Wissen von derselben, oder die Theorie, eine Kenntniß der Besonderheiten, wie sie aus dem Allgemeinen mit Nothwendigkeit sich ergeben, oder, mit einem Worte, eine Erkenntniß der Wesenheit der Dinge. Dieses Wissen setzt aber nothwendig Empirie und Speculation voraus, und ist ein bloßes Scheinwissen, wenn es nicht in beyden Gebieten gleich gegründet ist. Es ist uns nicht gegeben, Breydes mit einem Schlage zu erfassen, und das Ganze gleichzeitig mit dem Einzelnen zu erkennen: durch die Geschichte belehrt, daß alle Versuche dieser Art eitel und fruchtlos blieben, hütet sich die Naturforschung vor solcher Uebereilung; erkennend, daß sie eben ein Forschen, ein Streben nach dem Wissen, kein Darstellen eines schon Gegebenen ist, faßt sie die Dinge erst in der Besonderheit ihrer Erscheinungsweise auf, ehe sie in ihre Wesenheit einzudringen versucht, und sie erkennt, daß die empirische Seite um so reiner und schärfer gefaßt werden muß, je vielseitiger, verwickelter und dunkler ihr Gegenstand ist. Die Verfahrungsart der Empirie ist aber die des Zerlegens und Scheidens: sie muß die verschiedenen Beziehungen ihres Gegenstandes gesondert betrachten, um sowohl Verwirrung, als Unvollständigkeit und Einseitigkeit zu verhüten. In diesem Sinne haben wir die räumlichen Verhältnisse des vollendeten Gehirns, wie sie bey dem erwachsenen Menschen sich zeigen, ohne alle Seitenblicke und ohne alle fremdartige Beymischung betrachtet; und so gebn wir denn auch jetzt daran, die einzelnen Seiten des Hirnlebens, wie sie sich der Beobachtung darstellen, zu untersuchen, sobald den zuvörderst die kühliche und die psychische Seite desselben.

§. 222. Die Selbstbildung und Selbsterhaltung des Gehirns (§. 223 — 263.) und die in keiner Beziehung zur Seele stehende Wechselwirkung desselben mit dem übrigen Leibe (§. 264 — 351.), also mit einem Worte, seine seelenlose Lebensthätigkeit bezeichnen wir als pflanzliches Hirnleben, weil eben das Charakteristische der Pflanze in seelenloser Lebendigkeit besteht. Um dem Sprachgebrauche uns näher anzuschließen, würden wir es plastische, automatische, organische Thätigkeit des Gehirns nennen, wenn nicht der Begriff des Plastischen zu eng, der des Organischen zu weit, und der des Automatischen zu unpassend wäre. Denn der pflanzliche Verkehr des Gehirns mit dem Leibe bezieht sich nicht allein auf dessen Massenbildung, sondern auch auf die Energie und Qualität der Lebendigkeit überhaupt; organisch sind dagegen auch die Verhältnisse der Seele zum Leibe; automatisch aber ist entweder im ursprünglichen Sinne das ganze Leben mit Einfluß der Seele, oder in der gewöhnlichen Bedeutung bloß die leblose, scheinbar sich selbst bewegende Maschine zu nennen.

I. Selbstbildung.

1. N o r m a l l i t ä t.

§. 223. Ueber die erste Bildung des Gehirns wissen wir Folgendes: a) Am Vogeleye, welches die Beobachtung der ersten Entwicklung vorzugsweise gestattet, sieht man, daß der erste Keim des Embryo, welcher aus der während des Brütens innerhalb der Eyhäute entwickelten Feuchtigkeit sich bildet, aus einem Rückenmarke mit einem obern, breiten, runden, und einem untern, zugespitzten, lancettförmigen Ende besteht. Das obre

Ende ist des Rudiment des Gehirns: dies ist also mit dem Rückenmarke der uranfängliche Theil des Thiers. Nach Serres (*atlas tabula I. Fig. 1.*) besteht es um die 23ste Stunde des Brütens aus zwey getrennten, nach aussen gewölbten Blättern, welche um die 40ste Stunde sich vereinigt haben (*Fig. 2.*) und nun eine Blase darstellen, die an zwey Stellen eingeschnürt ist. In derselben Blasenform erscheint das Gehirn bey dem menschlichen Embryo zuerst, wie denn auch Tiedemann (*Misgeburten S. 6.*) das ähnlich gestaltete und, wie es scheint, auf dieser frühesten Bildungsstufe stehn gebliebene, kugliche Rudiment des Gehirns bey einem menschlichen Acéphalen hohl find. h) Darauf bildet sich das Herz; dann erscheint Blut an den Eyhäuten; und endlich sieht man im Anfange des dritten Tags des Brütens am Kopfe des beträchtlich gewachsenen Küchelchens deutlicher fünf durchsichtige, mit klarer Flüssigkeit gefüllte Bläschen, welche den Haupttheilungen des Gehirns entsprechen. Bey den jüngsten 4 bis 6 Linien langen menschlichen Embryonen, wo der Kopf eben so lang ist, als der Rumpf, besteht das Gehirn aus einer ähnlichen Blase, die auf dem Rückenmarke sitzt. Diese Blase kann nur aus einer Schicht Hirnsubstanz bestehen. Denn die fünf Blasen bey dem Küchelchen entsprechen dem kleinen Hirne, den Sehkugeln und den Hemisphären; in diese Abtheilungen des Gehirns geht von dessen Umgebungen nichts ein, als die Gefäßhaut: folglich müßte diese die Wandung der Blasen bilden, wenn es nicht Hirnsubstanz wäre. Nun ist die Gefäßhaut, wenigstens im menschlichen Gehirn, nichts Selbstständiges, sondern nur eine Ausbreitung durch zartes Gewebe verbundner Gefäße; diese existiren aber überhaupt noch nicht zu der Zeit, wo die Hirnblasen erscheinen: folglich kann es jetzt noch keine Gefäßhaut geben, und die Wandung der Blasen muß aus Hirnsubstanz hestehen. Die in ihnen enthaltene Flüssigkeit ist unstreitig das Eyweissstoff enthaltende, allgemeine thierische Wasser (Serum), ein Theil dessen, welches sich ursprünglich in den Eyhäuten gebildet, und aus welchem die Hirnblase selbst sich niedergeschlagen hat. c) Am vierten Tage des Brütens erscheinen Blutgefäße an den Hirnblasen, und da Letztre sich vergrößern und die in ihnen enthaltene Flüssigkeit sich vermehrt, so scheint daraus zu folgen, daß jetzt Ernährung und Absonderung aus dem in den Eyhäuten gebildeten Blute erfolgt. d) Wenn im ersten Zeitraume (a) der Keim, und im zweyten (b) der Umriss des Gehirns aus dem uranfänglichen Wasser sich bildete, und dann (c) das später gebildete Blut den Bildungshergang fortzusetzen begann, so schreitet späterbin die Entwicklung so fort, daß die Hirnsubstanz an Masse zunimmt, und in demselben Maasse das Hirnwasser sich vermindert: somit scheint denn das Gehirn aus dem theils ursprünglichen, theils nachher aus dem Blute abgesonderten thierischen Wasser anzuschießen, oder durch eine organische Krystallisation sich zu bilden, späterhin aber seinen Nahrungsstoff unmittelbar aus dem Blute zu ziehen.

§. 224. Daß ein steter Wechsel der Materie, wie er überhaupt vom Leben untrennlich ist, auch in dem schon ausgebildeten Gehirn vor sich geht, wird durch die in ihm entstehenden abnormen Bildungen bestätigt. Im Ganzen genommen scheint das plastische Leben einen mittlern Grad von Regsamkeit zu haben; es ist nicht so rasch, wie das der in ihrer Substanz blutreichern Organe, der Muskeln und plastischen Eingeweide, noch auch so träge, als das der Knochen, Knorpel und Faserhäute. Die krankhaften Bil-

denzhergänge nehmen in ihm meist einen ziemlich langsamen Verlauf; in der Unveränderlichkeit seines Volumens bey'm Stürkerwerden oder Abmagern des übrigen Körpers aber übertrifft das Gehirn selbst die Knochen.

§. 225. Was die chemische Qualität des Blutes betrifft, welches dem Gehirne als notwendige Bedingung seiner Erhaltung übergeben wird, so hat man schon längst angenommen, daß das Organ, als das höchste Erzeugniß bildender Thätigkeit, auch den vollkommensten Bildungstoff empfangen, daß also das zum Gehirne gehende Blut feiner und beweglicher, flüchtiger und leichter seyn müsse, als andres (*Nicolai in Haller diapt.* II. p. 500. *Haller elem.* II. p. 414). Soriel wissen wir, a) daß hey dem Menschen das frischeste und vollendetste Blut aus dem linken Herzen auf dem geradesten, und kürzesten Wege zum Gehirne geht, und daß heym Tode Pulsschlag und Kreislauf in den Carotiden länger bestehen, als in andern Arterien. b) Es ist erwiesen, daß das arteriöse Blut überhaupt specifisch leichter ist, als das venöse; nun ist es wohl denkbar, daß gerade derjenige Theil desselben, der am meisten arteriös, also am meisten von Kohlensäure befreyt und mit Sauerstoff geschwängert ist, vermöge seiner grössern Leichtigkeit vorzugsweise aufwärts getrichen und hey aufrechter Stellung zum Gehirne geführt werde. Einigermassen wird diese Vermuthung durch den Umstand unterstützt, daß das Blut des Gehirns zur Entwicklung von Luft geneigter zu seyn scheint, als das andrer Organe (§. 247.). c) Auch ist nicht zu übersehen, was schon *Lenwenhoek (philos. transact.* 1677. No. 136. p. 903.) bemerkte, daß die Haargefäße im Gehirne zum Theil zu fein sind, um Blutklügelchen aufnehmen zu können und doch sehr lebhaft rothes Blut enthalten. d) Taube (*de sanguinis ad cerebrum tendentis indole.* Götting. 1747. 4.) fand bey Zerlegung des Carotidenbluts, daß es weniger Faserstoff und Eyweistoff, dagegen aber mehr Serum enthält, als das in den Zweigen der absteigenden Aorta. Dies scheint auch dadurch bestätigt zu werden, daß das im Gehirne abgesonderte Serum weniger Eyweistoff enthält, als das in andern Gegenden gebildete (§. 233.).

§. 226. Es tritt verhältnißmäßig sehr viel Blut zu dem Gehirne, und doch sehr wenig in dasselbe. Zahlreiche Arterienzweige umspinnen seine periphere Oberfläche, in einem ziemlich dichten Netze, und dringen als Kanäl in seine Höhlen; die Blutmasse, welche sie führen, erscheint uns um so größer, wenn wir in Anschlag bringen, daß die Secretion und der Wechsel der gröbern Stoffe hier verhältnißmäßig gering ist. Aber die Arterien lösen sich schon an der Oberfläche in die feinsten Haargefäße auf; nur diese dringen in die Hirnsubstanz selbst ein, nehmen daselbst ohne bedeutende Verzweigungen und ohne Anastomosen einen einfachen, geraden Verlauf, und liegen nur an einigen Stellen dichter beysammen, übrigens vereinzelt und sparsam. Wir können uns diese Eigenthümlichkeit auf zweyerley Weise erklären; entweder ist nicht das ganze Blut zu Unterhaltung des Bildungsherganges innerhalb des Gehirns tauglich; sondern nur der kleinste Theil desselben, welcher, durch mechanische Verhältnisse oder durch Wahlziehung bestimmt, in die Haargefäße tritt, und um diesen Theil in der gehörigen Menge zu gewähren, ist eine bedeutende Masse Blut erforderlich; oder das Blut dient nicht hloß für den Bildungshergang, sondern auch für die Weckung, Erhaltung und Beichung der eigenthümlichen Hirnthätigkeit, und seine Menge ist nicht sowohl für das materielle Bedürfniß,

als für die Erregung des Gehirns berechnet. Die erstere Vermuthung enthält zunächst keinen Widerspruch in sich, läßt sich sbernächst durch Beweise rechtfertigen, und führt dagegen zu neuen Hypothesen, indem sie das Daseyn des Gehirns mit wenigem Blute bey niedern Thieren nur durch die Voraussetzung erklären kann, daß bey den höhern Thieren die Hirnsubstanz qualitativ verschieden sey und deshalb zu ihrer Bildung mehr Blut erfordert werde. Die zweyte, dynamische Erklärungsart ist einfacher, und wird durch Thatsachen unterstützt (§. 392—397).

§. 227. Wir bemerken mehrere Verhältnisse der Organisation, welche das stete Strömen des Bluts erleichtern und einen längern Aufenthalt oder ein Stocken desselben verhüten. Dahin gehört zunächst der Umstand, daß die Wege aus den Arterien in die Venen ziemlich frey sind, indem auch am Leichname die Injectionen leicht übergehn und bey jedem Stosse der in die Carotis eingesetzten Spritze das Blut mit großer Gewalt aus der geöffneten Drosselvene abfließt.

§. 228. Ferner wirkt darauf hin die allseitige Anastomose der Gefäße in der Oberfläche des Gehirns. Die vordern verbinden sich mit den hintern, die rechten mit den linken, die innern mit den äußern: so die rechte Carotis mit der linken durch den Quersweig der Balkenarterie; die rechte Wirbelarterie mit der linken durch die Zapfenarterie; die Venen der rechten Seite mit denen der linken durch die Siegelblutleiter; die Carotiden mit den Wirbelarterien durch die Schenkelarterien; Drosselvenen mit den Wirbelvenen; alle Blutleiter unter einander; alle Arterien in ihren Verästelungen an der Gefäßhant; die Gehirnarterien mit den äußern Carotiden durch kleinere Zweige, welche sie an den vordersten und hintersten Theil der festen Hirnhaut geben, so wie durch die Augenarterien und innern Ohrarterien; endlich die Blutleiter mit den Venen der Kopfhaut, des Gesichts, der Nase und des Rachens durch die Augenvenen und die vielfältigen Emissarien. Alles deutet auf eine freye, leichte, gleichförmige Verbreitung des Blutes hin. Daher kann man denn auch das ganze Gehirn durch einen einzelnen seiner vier Arterienstämme einsprützen. Daher lassen sich ferner die Carotiden ohne Nachtheil unterbinden, wie dies z. B. Astley Cooper und Travers bey Aneurismen gethan haben. Eben so kann die Carotis der einen Seite durch Verknöcherung unwegsam werden, ohne Störung der Hirnthätigkeit, indem eine andre Arterie, z. B. die Wirbelarterie derselben Seite sich dafür erweitert (*Willis* *op. cit.* 7. p. 36). Daher verursacht ferner die Unterbindung einer Drosselvene keine Störung der Hirnthätigkeit (*Haller anat.* p. 32). Viborg (*Reils Archiv* V. S. 413) sah bey Pferden, daß schon 24 Stunden nach Unterbindung der Drosselvenen die Wirbelvenen hinlänglich erweitert waren, um die Stelle der Kavernen vollkommen vertreten zu können, und Malacarne (*encephalotomia* p. 106. seq.) fand in zwey Fällen bedeutender Verengerung der Hinterhauptsfelsenspalte, daß die Querblutleiter durch erweiterte Löcher an der Lamdanath ihr Blut in die äußern Kopfvenen ergossen. Daher tritt endlich bey Fiebern mit Kopfleid ein kritisches Nasenbluten ein, vermittelst der Anastomose der hintern Nasenvenen mit den Zellenblutleitern und den Augenvenen, und bey Kopfverletzungen ist unter übrigens gleichen Umständen eine Blutung aus dem Rachen oder der Nase ein günstiges Zeichen, insofern dann um so weniger ein innres Extravasat zu befürchten ist.

§. 229. Vesal (II. p. 830.) schreibt den Blutleitern eine eigenmächtige Pulsation zu; Riolan (*enchirid. lib. IV. c. 2. p. 245.*) nahm mit mehreren Andern dies an, indem er meynete, daß sie dem kalten Gehirne warmes, arteriöses Blut zuführten. Selbst nach Entdeckung des Kreislaufs konnte man sich von dieser Meynung nicht sogleich losmachen. So legte noch Vieussens (c. 3. p. 19.) dem obern Sichelblutleiter eine Pulsation durch eigene Kraft bey; Willis (cer. c. 6. p. 34.) ja selbst noch Sauterini (obs. p. 50.) behauptete, der Abfluß des Bluts werde dadurch befördert, daß die Blutleiter durch die in ihnen befindlichen Querfasern zusammengezogen würden. Stewogt (*Haller dispul. II. p. 830.*) leitete von diesen Querfasern ihre Systole, und von den sich einsenkenden Arterien ihre Diastole her. Erst spät wurde erwiesen, daß die Blutleiter weder Arterien aufzuehmen, noch Irritabilität besitzen, noch überhaupt pulsiren, sondern, wenn sie geöffnet werden, ihr Blut in gleichförmigem Laufe ausströmen lassen, und nur mit dem Gehirne bewegt werden. Eine mechanische Beziehung in ihnen ist nicht zu verkennen. Sie geben durch ihre Geräumigkeit, so wie durch ihre gegenseitigen Verbindungen Behälter ab, in welchen sich mehr Blut ensammeln kann, als in derselben Zeit durch die Arterien zugeführt und durch die Drösselvenen abgeleitet wird; vermöge der Dichtigkeit ihrer Wände aber, und vermöge ihrer Anheftung am Schädel, können sie mit Blut gefüllt werden, ohne einen nachtheiligen Druck auf das Gehirn auszuüben. Sie erhalten also die gleichförmige Freyheit desselben bey den verschiedenen Veränderungen des Blutlaufs. Das Blut sammelt sich nämlich in ihnen, theils wenn es unter Beschleunigung des Pulses in zu großer Menge durch die Arterien zuströmt, und eine allgemeine Targescenz des Gehirns Statt findet, in welcher Hinsicht sie denn mit den schwammigen Körpern des Zeugungsgliedes einigermaßen zu vergleichen sind, theils wenn der Abfluß des Bluts durch die Drösselvenen erschwert und beschränkt ist, wo sie denn den sackartigen Erweiterungen der untern Hohlvenen bey Delphinen, Seehunden, Fischottern, Tauchervögeln und Schilkröten, kurz, bey Thieren, welche eine Zeitlang unter Wasser leben und das Athmen aussetzen können, analog sind. — Bey Hemmungen des Abflusses erweitern sich die Blutleiter; so sah z. B. Malacarne (*encephalot. p. 99. seqq.*) bey einer Verengung der Querblutleiter auf 3 Linien eine Erweiterung des obern Sichelblutleiters auf $2\frac{1}{2}$ Zoll, und (p. 105) bey einer Verengung der Hinterhauptfelsenspalte auf $2\frac{1}{2}$ Linien eine Erweiterung der Querblutleiter auf 9 Linien. Daß die Querfasern solcher Ausdehnung entgegen wirken (*Vieussens c. 3. p. 14.*), ist augenscheinlich; daß sie zur Mengung des Bluts (*Stewogt in Haller disp. II. p. 830.*) oder zur Mäßigung des Blutlaufs (*Willis cer. c. 6. c. 34.*) dienen sollten, hat keinen Grund. — Daß die meisten Venen in einer dem Blutstrom der Bluthälter entgegen gesetzten Richtung in diese sich einsenken, darf man wohl nicht mit Heller (*elem. IV. p. 181.*) so deuten, daß dadurch der Blutlauf in ihnen verlangsamt werde, denn man sieht aus ihnen, wenn sie geöffnet sind, daß Blut schnell hervorstreömt, und Flüssigkeiten, welche man in die Arterien spritzt, fließen schnell aus den Blutleitern wieder ab. Vielmehr scheint sich dieser Umstand darauf zu beziehen, daß, wenn das Blut aus den Drösselvenen in die Blutleiter zurückströmen muß, es mehr in diesen verharret, nicht so leicht in die Hirnvenen dringt, und also auch die Hirnthätigkeit nicht so leicht stört. Derselbe Zweck wird vielleicht noch dadurch

unterstützt, daß die Mündungen der Hirnvenen in den obern Sichelblutleiter nicht kreisförmig, sondern elliptisch sind, und daher durch das bey seinem Aufsteigen anschwellende Gehirn leichter geschlossen werden können. — Die Trennung der Blutleiter von den Arterien, durch welche nach Higinor die zu starke Affection und Erhitzung des Gehirns bey ihrer Anschwellung durch Blut, und nach Ridley (p. 29.) ihre Zusammendrückung durch die von Blut strotzenden Arterien verhütet werden sollte, scheint weniger auf einen mechanischen Zweck sich zu beziehen, als vielmehr auf dem allgemeinen Gesetze zu beruhen, daß an sensibeln Organen das Venöse nach aussen gedrängt, und mehr an die Oberfläche verwiesen ist. So beziehen sich die eigentlichen Hautvenen auch bloß auf die Haut, sofern diese ein sensibles Organ ist, denn sie kommen an den Gliedmaßen in grössern Zweigen vor, als am Rumpfe, und fehlen bey den Vögeln gänzlich. §. 230. Ein andres Moment an Beförderung des normalen Abflusses des venösen Blutes liegt in der Bewegung des Gehirns. Dies berührt nämlich bey seinem Aufsteigen den obern Sichelblutleiter und drückt ihn, so daß, wenn er geöffnet ist, das Blut in diesem Zeitpunkte stärker aus ihm abfließt. Beym Einsinken weicht das Gehirn von ihm zurück.

§. 231. Auch durch die Lage des Herzens unter dem Gehirne wird der Abfluß des Bluts erleichtert, indem ihn die Schwere unterstützt, und der aufrechte Gang des Menschen erscheint auch in dieser Hinsicht bedeutungsvoll. Das Herabhängen des Kopfs bewirkt alsbald eine Ueberfüllung des Gehirns. Eine horizontale Lage ist schädlich bey Congestion nach dem Kopfe, bey Vollblütigkeit und apoplektischer Anlage, zuträglich hingegen bey Mangel an Blut und Neigung zur Ohnmacht.

§. 232. Hippokrates (*de cruribus sect. 4. p. 114.*) erklärte das Gehirn für den Sitz des Kalten und Feuchten, und so behauptete auch Aristoteles (*hist. animal. lib. 1. c. 16. p. 477.*), es fühle sich kalt an, und (*de part. anim. lib. II. c. 7. p. 604.*) sey der kälteste Theil des Körpers. Wenn auch Galen (*de univ. part. lib. VIII. c. 2. p. 165.*) erkannte, daß das Gehirn wärmer sey, als die äussere Luft, so befestigte er doch die Lehre von der feuchten und kalten Complexion des Gehirns, welche weder durch Piccolomini (*lib. V. lect. 7. p. 275.*) Beobachtung, daß es mit dem Herzen gleiche Wärme habe, noch durch Schneiders (*lib. II. c. 4. p. 312.*) Gründe erschüttert werden konnte, vielmehr zu pathologischen und psychologischen Erklärungen vielfältig benutzt, und auch noch von Willis (*cerebr. c. 6. p. 33.*) angenommen wurde. So wenig auch diese Behauptung auf gehörige Beobachtungen sich stützen mochte, so ist sie doch nicht ganz grundlos, indem Davy (*Meckels Archiv II. S. 314.*) bemerkte, daß die Temperatur des Gehirns immer wenigstens um einen Fahrenheitschen Grad geringer sey, als die des Mastdarms.

§. 233. An der äussern, so wie an der innern Oberfläche des Gehirns wird eine seröse Feuchtigkeit secretirt, welcher wir eine eigenthümliche Bedeutung beyzulegen nicht berechtigt sind, da die gleiche Secretion auch in andern Gegenden vorkommt. Jedes Organ von höherer Kräftigkeit schließt sich nach aussen ab, und bezeichnet seine Selbstständigkeit, indem es mit einem eignen Dunstkreise sich umgibt, welcher dasselbe von andern Gebilden scheidet und den Gegensatz der Formen aufrecht hält. Solcher

Dunstkreis umgiebt das Gehirn nach aussen, und dieselben Hute, welche hier secretiren, ziehen sich auch in die Hohlen, und fullen auf gleiche Weise diese innern Raume mit einem Dunste, welcher die Gebilde des Kerns von einander scheidet und wieder in ihrer eigenthumlichen Begrenzung mit einander verknupft. Ueber das Vorkommen des Wassers in den Hohlen sind schon oben (H. Band S. 264.) die Ergebnisse der Beobachtung zusammengestellt worden, welche uns freylich noch im Dunkeln lassen in Betreff der Umstande, welche die Secretion des Dunstes und die Verdichtung desselben zu tropfbarer Flussigkeit begunstigen, da man unter ahnlichen Umstanden Verschiedenheiten in dieser Hinsicht beobachtete, und z. B. im Leichname eines jungen, gesunden Mannes, der sich selbst gemordet hatte, Wasser an der Oberflache des Gehirns, aber nicht in den Hohlen, bey einem andern hingegen viel Wasser an beyden Stellen fand (Tubinger Blatter III. S. 113). — Aus den oben (a. a. O.) angefuhrten Thatsachen ergiebt sich, da das Hirnwasser im Ganzen genommen weniger feste Stoffe enthalt, als die in andern Theilen des Korpers secretirte serose Flussigkeit. Das von einem wasserkopfigen Kinde (Nr. 343. *) abgezapfte Serum enthalt keinen Eyweistoff; nur das bey spater wiederholter Operation abgehende zeigte denselben deutlicher. Traill (*Edinburgh med. journ.* 1821.) fand; da solches Wasser eine specifische Schwere von 1,0658 hatte, wenig Eyweistoff, viel salzsaures Natrum, ein nicht vollig gesuertes Laugensalz; phosphorsaures Natrum und ein Kalksalz enthalt. Das von Prout (*Gerson I. S. 385.*) untersuchte hatte eine Schwere von 1,008, und wurde in 987,18 Wasser, 1,66 Eyweistoff, 1,65 im Weingeist, auflosliche Materie (Fett und milchsames Natrum?), 6,60 salzsaures Kali und Natrum, und 2,71 schwefelsaures Natrum mit etwas in der Hitze nicht gerinnender thierischer Materie zerlegt. Klein fand darin bey einem andern Wasserkopfe (Nr. 370.) Eyweistoff, salzsaures Kali, salzsaures und kohlensaures Natrum. Watson (*comm. Lips. XVIII. p. 403*), Ford (*Samml. auserl. Abhh. XIII. S. 373.*), Davis (*Harles neues Journ. II. 1. St. S. 152.*) und Andre konnten es weder durch Suren, noch durch Hitze zum Gerinnen bringen, und sahen es ohne Ruckstand verdunsten. Haslam (S. 53.) fand, da es beym Kochen zwar hell blieb, aber hernach beym Erkalten Eyweistoff, mit Natrum verbunden, fallen lie. Zuweilen findet man es misfarbig und brunlich, welches zum Theil auf eine qualitative Abnormalkit hindeutet, z. B. bey einem Kinde, bey welchem nach Abschneiden der Haare ein flechtenartiger Ausschlag am Kopfe plotzlich vertrocknet war (*Hufelands Annalen III. S. 67.*).

§. 234. Das Gehirn kann den Stoff zu seinem Wachstume und seiner Ernhrung nur aus dem arteriosen Blute ziehen. Gleichwohl sehen wir, bey mikroskopischer Betrachtung der gelungensten Injectionsprparate, da die feinsten capillaren Reiser der Arterien nicht uherall hinreichen, sondern einzeln, zerstreut verlaufen, und doch mu die Ernhrung, also auch der Zutritt des Bildungsstoffes sich uber die ganze Masse verbreiten und in allen Puncten gleichformig seyn: die Thtigkeit der Gefae mu sich also uber die Grenzen ihres Verlaufs hinaus erstrecken. Wir erfahren ferner bey solchen

*) Die hier und spaterhin angefuhrten „Nr.“ beziehen sich auf die am Schlusse dieses Werks zusammengestellten pathologischen Beobachtungen nach ihrer Reihenfolge.

wohl gelungenen Injectionen, daß diese Gefäße nicht mit offenen Mündungen endigen, sondern völlig geschlossen sind, und schließen daraus, daß der zur Ernährung des Gehirns bestimmte Theil des Bluts durch die Wandungen der Arterien hindurch dringen muß. Nun wissen wir, daß überall der seröse Theil des Bluts leicht durch die Gefäßwände hervordringt; wir wissen ferner, daß der ursprüngliche Bildungststoff des Gehirns Serum ist (§. 223.); wir erfahren endlich bey Schädelbrüchen, daß während der beginnenden Regeneration zerstörter Hirntheile zuweilen eine bedeutende Menge klaren Serums aus dem Boden der Hirnwunde sich ergießt und den Verband durchknist. Aus einer Hirnwunde mit Substanzverlust (Nr. 42.) floß helles Wasser 4 bis 5 Tage lang so reichlich, daß der Verband alle 2 Stunden gewechselt werden mußte; in einem andern Falle (Nr. 109.) floß 3 Wochen lang klares, durchsichtiges Wasser ab, woshalb Barlow glaubte, daß ein Knochen splitter bis in die Hirnhöhlen gedrungen sey; ein ähnlicher Abfluß fand aus einer deprimirten und erweichten Stelle des Gehirns (Nr. 823.) Statt; und aus einem Schwamme der festen Hirnhaut (Nr. 888.), der vor 8 Tagen geöffnet worden war; Neale sah von der Oberfläche eines Hirnschwammes (Nr. 1051.) Dunst aufsteigen, und aus einem andern (Nr. 1056.) so viel Wasser schwitzen, daß es ununterbrochen über die Wangen trüfelte; auch nach dem Abschneiden eines andern Aftergbildes (Nr. 1007.) stiebert viel Feuchtigkeit aus der Hirnsubstanz. Aus dem Allen schließen wir, daß ein aus den Haargefäßen der Hirnsubstanz ausgedünstetes Serum diese in ihrer ganzen Masse durchdringt, sie feucht und weich erhält und ernährt.

§. 235. Diesem Absatze neuen Stoffes bey der Ernährung muß eine Resorption der veralteten Hirnsubstanz entsprechen. Daß eine Einsaugung an der Oberfläche Statt findet, haben directe Versuche von Kees (*observationes duae de lésionibus capitis. Argentor. 1770. 4.*), Brückner (p. 16. seq.) und Bichat (über die Häute S. 266 fg.) erwiesen. Letzterer trepanirte einen Hund, verschloß die Oeffnung mit einem Kork, durch welchen eine Federspule ging, und spritzte durch diese eine gefärbte Flüssigkeit ein; als nach 8 Stunden das Thier getödtet wurde, fand sich nur noch wenig davon an der Grundfläche der Schädelhöhle. Brückner trepanirte zwey Jagdhunde, ließ das aus der Diploe auf die feste Hirnhaut ergossene und durch die zur Blutstillung gebrauchte Schwefelsäure geronnene Blut auf derselben; und nähte die äussere Wunde sogleich zu; die Hunde genasen, und als man sie tödete, fand man kein Extravasat mehr. Der Hund, welchem Kees Blut unter die feste Hirnhaut eingespritzt hatte, erholte sich am folgenden Tage, indem etwas Blut mit dem Harn abging, und hatte nach 6 Tagen, als er getödtet wurde, weder Blut, noch eine andra abnorme Flüssigkeit in der Schädelhöhle. Das mit dem Harn abgegangene Blut dürfen wir geradezu für das von den Hirnhäuten eingesogene Blut erklären, da wir aus anderweitigen Erfahrungen wissen, daß fremdes Blut, auch unmittelbar in die Blutadern gemischt, öfters durch die Nieren oder Lungen ausgestoßen wird. — Bisweilen bleiben allerdings Flüssigkeiten unaufgesogen, so fand z. B. Autenrieth (Tübinger Blätter III. S. 52.) Blut an der Oberfläche und in den Höhlen 25 Tage nach erfolgter Ergießung. In andern Fällen aber schließen wir auf eine erfolgte Resorption, wenn zuverlässige Symptome eines vorhandenen Extravasats sich verlieren und nach dem später erfolgten Tode die feste Hirnhaut rauhlich und faltig ist (Beiträge I.

S. 111. fg.) oder ausser einer neu entstandenen, mit frischem Blute gefüllten und offenbar durch dessen Ergiessung gebildeten Höhlung andre, ältere und leere oder mit seröser Feuchtigkeit gefüllte Höhlungen sich vorfinden (§. 252.). Diese Höhlungen innerhalb der Hirnsubstanz, so wie die Atrophie der Hirnorgane (§. 251.) beweisen, dass die Einsaugung nicht allein an der Oberfläche, sondern in der ganzen Masse des Gehirns vor sich geht. Gleichwohl kann man nur an den Hirnhäuten mit Bestimmtheit Saugadern wahrnehmen; Indessen vermessen wir Letztre in andern Gebilden unbeschadet des Wechsels der Stoffe, z. B. im Knorpel, ungeschet derselbe bey der Verknöcherung schwindet, der Knorpelsubstanz Raum gebend und eine Höhle für das Mark bildend. Und wenn die zur Ernährung dienende Flüssigkeit, aus den Gefässen getreten, die ganze Hirnsubstanz durchdringt (§. 234.), so kann auch die Letztre, zur flüssigen Gestalt zurückgeführt, die Masse durchdringen, die an der centralen und peripherischen Oberfläche des Gehirns liegenden Saugadern erreichen und von diesen aufgenommen werden. Diese Abtönsung des Veralteten und jene Anziehung des Frischen gehört aber zu den allgemeinsten That-sachen des organischen Lebens. Uebrigens können auch fremde Stoffe eingesogen werden; Lawrance und Coates (*Gerson VII. S. 468.*) spritzten blausaures Kali in die Hirnhöhlen und in die Hirnsubstanz, und fanden es nach kurzer Zeit im Blute des rechten Herzens wieder.

§. 236. Auch bey den niedrigsten Thieren kann das Gehirn oder der seine Stelle vertretende Ganglienring nach gänzlicher Zerstörung sich nicht wieder erzeugen: es ist nachgewiesen, dass Spallanzani dem Schnecken, welchen nach Abschneiden des Kopfs ein neuer wuchs, den Ganglienring nicht mit abgeschnitten hatte. Wohl aber ergänzt sich das Gehirn auch bey dem Menschen, wenn es einen Theil seiner Masse durch unmittelbare mechanische Verletzung, oder in Folge derselben durch Vereiterung verloren hat, sofern die bildende Lebensthätigkeit hinlänglich wirksam ist. Aus dem die Wundränder bedeckenden Eiter setzt sich in kuglichen Massen eine neue, mit Gefässen durchzogene Substanz ab, deren äussere Schicht als zartes Häutchen in Gefäshaut sich umwandelt und an den Rändern der Schädelfwunde sich anschliesst, deren tiefere Lage aber die entstandene Lücke nach und nach ausfüllt, als Ersatz der Hirnsubstanz, und dieser im Ganzen genommen ähnlich; nur mehr gelblich, locker und weich ist. So sah z. B. Fabricius von Hilden (p. 29.), nachdem 3 Wochen lang fast täglich Stücke vom Gehirne ausgestossen worden waren, aus der Gehirnwunde selbst rothe fleischige Knötchen hervorsprossen, welche allmählig zusammenwuchsen. Behrens (Samml. chir. Bemerkg. II. S. 12.) sah am 27sten Tage auf der Hirnwunde einen kleinen rothen Flock, der sich nach und nach ausbreitete, wie eine Haut die ganze Wunde überzog, und darunter aus faseriger, fleischiger Substanz bestand. Schütte (act de Berlin. 1752 p. 299.), Schmucker (I. S. 268.) und Schwarz (Beobacht. der Joseph. Akad. I.) beschrieben die neu erzeugte Substanz als ein zartes Häutchen, welches die Wunde überzieht; Tren (S. 12.) als ein hervorsprossendes Netz neuer kleiner Gefässe; Stanley (med. chir. Ztg. 1818. I. S. 227.), Nealey (Nr. 1056. 1057.) und Andre als Granulationen. Nach Arneemann (S. 188—191.) nimmt die neue, gelbliche und weiche Hirnsubstanz oft die Gestalt von Randwülsten an, und enthält zuweilen eine zähe, lederartige Substanz; die Wunde ist meist mit klaren Flüssigkeit umgeben, und darüber

bildet sich Zellgewebe. — Ist bloß eine Stelle der festen Hirnhaut zerstört, so sproßt sowohl an der freyen Fläche der Gefäßhäute, als auch an den Rändern der Wände eine Granulation hervor, welche zu einer Haut sich verbindet und mit der festen Hirnhaut ein Ganzes ausmacht; es ist ein Wortstreit, wenn Arneemann (S. 24) dies keine feste Hirnhaut nennt, und deren Regeneration leugnet. Schon Diemerbroeck (lib. III. c. 5. p. 341.) sah bey einer Kopfwunde, wie aus der Gefäßhaut Granulationen hervorwuchsen, welche die Stelle der zerstörten festen Hirnhaut einnahmen und mit denen von der Diple her kommenden verwachsen. Eben so geht die Wiedererzeugung des Schädels von der festen Hirnhaut und von den Rändern der Beinhaut des Schädels aus; letztere aber regenerirt sich besonders lebhaft in der Nähe der Suturen.

2. *Abnormitäten.*

§. 237. Wir wenden uns nun zur Nosologie und geben eine summarische Uebersicht der materiellen Abnormitäten des Gehirns, theils, um dadurch unsre Kenntniß von seinem plastischen Leben zu vervollständigen, theils, um uns den Weg zu bahnen für die Beobachtung der anderweitigen Hirnthätigkeit im abnormen Zustande. Wir betrachten also zuerst die mechanischen (§. 238—243.), dann die organischen oder auf den Bildungshergang sich beziehenden (§. 244—263.) Abnormitäten.

§. 238. Die Erschütterung bewirkt ein Zusammensinken des Gehirns. Dieser Zustand ist noch am Leichnam sichtbar, wenn die Erschütterung sehr stark war; Littre (Nr. 1.) fand in einem solchen Falle das Gehirn fest und eingesunken ohne anderweitige Verletzung; Morgagni (LI, 9.) fand bey einem Manne, der 30 Tage nach einem Falle von einer Höhe gestorben war, das Gehirn welk, und einen großen Raum zwischen ihm und dem Schädel; Schumacher (S. 392.) sah es bey einem Manne, der den Tag nach einem Falle aus bedeutender Höhe betäubt gestorben war, den Schädel unverletzt und die feste Hirnhaut gefaltet und bleich, und bey einem Andern, der aus dem vierten Stocke herabgesprungen und auf den Hals gefallen war, das Gehirn zusammengeunken. Lorry (*Mémoires présentés III. p. 365.*) tödete einen Hund durch einen Schlag vor den Kopf, und öffnete ihn sogleich, wobey er keine andre Verletzung entdeckte, als einen Collapsus des Gehirns, so daß es weniger Raum einnahm, als im Normalkustande. Auch bey lebenden Menschen ist dies beobachtet worden, wie z. B. Baumer (Nr. 3.) in einem solchen Falle das bloß liegende Gehirn eingesunken fand. Nach diesen Thatsachen können wir nicht daran zweifeln, daß die Erschütterung in einer mechanischen Veränderung der weichen Hirnsubstanz besteht, welche die Functionen derselben stört oder vernichtet. Ihr Wesen kann nicht, wie Simon (*Diss. de cerebri commotionis theoria. Berol. 1822. 8.*) meynt, auf Ueberfüllung und passiver Congestion beruhen, theils, weil man eine solche bey reiner Hirnerschütterung gar nicht findet, theils, weil sie nicht so urplötzlich eintreten und ihre Wirkungen entwickeln könnte, wie die Krankheitserscheinungen wirklich eintreten. Wir müssen vielmehr anerkennen, daß das mechanische Verhältniß eine Bedingung der Hirnfunctionen ist und diese durch seine Veränderung gestört werden. Eine solche Störung sehen wir aber, abgesehen von den dynamischen Wirkungen, auch in der plastischen Thätigkeit des Gehirns. Jede einfache Verwundung desselben, z. B.

durch einen Stich, heilt leichter und gestattet eine frühere Genesung. Die Erschütterung hingegen giebt a) vorzugsweise zu Entzündung seiner Substanz und seiner Häute Anlaß: unter den bekannten Gelegenheitsursachen der Arachnitis ist nach Parent (p. 10) eine Hirnerschütterung die häufigste. b) Diese Entzündung geht vorzüglich leicht in Eiterung, oder c) in eine gallertartige Erweichung (Schmidt obs. p. 26.) über. d) Seröse Anhäufung tritt in Folge der Entzündung ein, aber auch ohne dieselbe (z. B. No. 338.), indem, wo ein freyer Zwischenraum entsteht, die seröse Absonderung vermehrt zu werden scheint. e) Die Erschütterung giebt ferner durch Störung des Bildungsherganges zu Entstehung von Aftergebilden Anlaß, und zwar nicht bloß zu solchen an der festen Hirnhaut (Nr. 882. 888. 891.), sondern auch an der Hirnsubstanz selbst (Nr. 930. 934. 943. 953. 968. 989. 1011. 1016. 1023. 1024. 1033. 1040. 1042.), ferner zu Hydatiden (Nr. 1066. 1078.), zu Knochenzerzeugung (Nr. 1095.), und zu Verhärtungen (Nr. 840.), wie ich denn auch bey einem Manne, dem der Deckel eines eisernen Kastens auf den Kopf gefallen war, solche Verhärtung mit seröser Ergießung gefunden habe. Diese Entartungen gehen übrigens langsam vor sich, zeigen ihre Wirkungen in den Symptomen selten so gleich in ihrem Beginnen nach der Erschütterung, bisweilen erst nach Jahren.

§. 239. Wunden a) der Schenkhaut erzeugen leicht eine rothlaufartige Entzündung, welche sich zuweilen über das Pericranium und die feste Hirnhaut verbreitet. b) Wunden des Schädels versetzen die feste Hirnhaut in einen gereizten Zustand, welcher leicht in Entzündung übergeht, deren Charakter und Verlauf durch die Umstände der Verwundung, durch die Disposition, durch die Beschaffenheit der Luft u. s. w. bestimmt wird; übrigens sterben die Knochenstücke, welche sich nicht mehr ernähren können, ab, exfoliren sich, und die scharfen Ränder der gesunden Knochen glätten und runden sich durch Resorption ab. c) Wunden der festen Hirnhaut bringen nur insofern Nachtheil, als sie eine Entzündung dieser Membran nach sich ziehen, oder ein Austreten der Hirnsubstanz aus ihren Gränzen veranlassen (Beyträge I. S. 98. fg.). d) Das Zerreißen der Spinwebhaut und der Gefäßhaut (Beyträge II. S. 174. 196.) ist nur wegen der gleichzeitigen anderweitigen Verletzung gefährlich. e) Penetrierende Wunden der Hirnsubstanz erzeugen eine Entzündung, welche, wenn weder Blutergießung, noch Erschütterung und Quetschung dabey Statt findet, meist langsam sich entwickelt, durch wenig oder gar keine Krankheitserscheinungen sich zu erkennen giebt, und zuweilen sich völlig sertheilt, häufiger aber Eiterung oder Erweichung nach sich zieht. Ein Verlust an Hirnsubstanz erfolgt theils unmittelbar durch die mechanische Gewalt, theils durch Eiterung oder Erweichung und schwammiges Hervortreten als Hirnschwamm. Nach Abstoßung des Verdorbenen verheilt die Wunde. Es ist nicht gar selten, daß die Verwundeten in der Betäubung und Raserey den Verband abreißen, in ihrem eigenen Gehirne wühlen und Stücke davon herausreißen und herumwerfen (Nr. 121. 142. 166. und *Quemay in acad. de chir.* II. p. 150.).

§. 240. Fremde Körper, welche von aussen eingedrungen und im Gehirne sitzen geblieben sind, oder Splitter, welche bey Kopfverletzungen von der innern Tafel des Schädels abgesprungen und durch die Häute in das Gehirn gefahren sind, erzeugen um so mehr Entzündung, Erweichung und Eiterung, je mehr sie durch ihre mechanische Be-

schaffenheit reizen; also je größer, rauher, schärfer und spitziger sie sind; sie stören den Gang der Bildung, und machen, daß die Eiterung übelartig, unrein und juchig wird. Glatte Kugeln schaden weniger, ungeachtet ihrer Schwere. Zuweilen behauptet sich die heilende Naturkraft so, daß die fremden Körper, z. B. Schrotkugeln (Nr. 69.) durch Eiterung ausgestoßen, oder durch die Hirnbewegung aus der Tiefe nach der Oberfläche getrieben werden (Nr. 70.), anweilen so, daß die feste Hirnhaut über den Splittern, welche sie durchbohrt hatten, wieder verwächst (Nr. 98. 591.), oder die Hirnwunde über dem fremden Körper sich schließt und das äussere Hohlgeschwür heilt (Nr. 83.), oder daß auch ohne Eiterung die Kugel sitzen bleibt und die Wunde verwächst (Nr. 57. 105.). Auch scheint es, als ob eingebrungene Knochensplitter durch die plastische Thätigkeit des Gehirns einigermaßen umgewandelt werden können, da man an solchen, die mehrere Jahre lang im Gehirn gesteckt haben, eine veränderte Farbe bemerkte (Nr. 101.).

§. 241. Eine Eindrückung des Schädels übt einen Druck auf die darunter liegende Stelle des Gehirns aus, und wird entweder durch die Hirnbewegung selbst gehoben (Nr. 115. 116. 121.), zumal bey Kindern und jungen Leuten, oder sie wird durch Exfoliation der zerbrochnen Knochenstücke beseitigt (Nr. 49. 125.), oder sie bleibt, indem die zerbrochnen und eingedrückten Knochenstücke unter einander verwachsen (Nr. 111. 126. 127. und Schwarz in Beob. d. Josephin. Akad. I.), oder es entsteht Arachnitis (Nr. 708.), oder Eiterung (Nr. 504. 566. 590. 1056.), oder Erweichung (Nr. 727. 1051.), oder Brand des Gehirns (Nr. 829.), oder Caries des Schädels (Nr. 479.), in welchen Fällen es freylich sich schwer entscheiden läßt, ob nicht diese Abnormitäten, unabhängig von der Depression, durch die Gewaltthätigkeit selbst veranlaßt worden sind.

§. 242. Ein anderweitiger Druck durch fremde Körper oder Aftergebilde, oder ergoßne Feuchtigkeiten kann, wenn er von innen her wirkt, eine Ausdehnung bewirken, z. B. der festen Hirnhaut (Nr. 81.), der Schädelknochen (Nr. 83.), des Hirnmantels (Nr. 539.), des Hirnanhangs (Nr. 466.), der Zirbel (Nr. 703. 940.) u. s. w. Von aussen her wirkend kann er Vertiefungen bilden (Nr. 539.), die Hirntheile aus ihrer normalen Lage drängen (Nr. 208. 369.). Für immer verursacht ein lang anhaltender Druck Atrophie, wie z. B. in der Höhlenwassersucht sowohl an dem ausgedehnten Mantel, als an den zusammengedrückten Ganglien. Insofern er die Resorption befördert, ist er zuweilen, und schon von Pitschel (Nr. 57. fg.) von aussen her mit Glück bey der chronischen Hirnhautwassersucht angewendet worden, so wie es auch zuweilen (Nr. 295. 297.) gelingt, den angeborenen Hirnbruch durch Druck zu heilen.

§. 243. Der Hirnbruch (*Encephalocele*) entsteht durch eine Oeffnung im Schädel, durch welche das Gehirn, von seinen Häuten, der Sehnenhaube und der äussern Haut, als einem Bruchstücke umgeben, als Geschwulst hervortritt. Die Häute sind dabey oft bedeutend ausgedehnt (Beyträge I, S. 93.). Der angeborne Hirnbruch beruht auf unvollkommener Schädelbildung, so wie diese in unvollkommener Entwicklung des Gehirns begründet ist, und zeigt daher Verwandtschaft mit der Hemicephalie. In manchen Fällen (Nr. 287.) fehlt die Schädeldecke ganz; in andern (Nr. 290. 292.) ist sie auf die Grundfläche herabgedrückt, so daß das Gehirn nicht hinlänglichen Raum in der Schädelhöhle findet; in den

gewöhnlichen Fällen tritt der Bruch durch eine einzelne Lücke des Schädels, am häufigsten am Hinterhauptbeine. In den letztern Fällen läßt er sich zuweilen durch Compression heilen (No. 295. 297.). Die Basis der Geschwulst wird von Hirnsubstanz ausgefüllt; an der Spitze bildet sich öfters noch eine eigne Höhle mit Blut (Nr. 288.) oder blutigem Wasser (Nr. 293.). Nicht selten ist diese Abnormität mit Wassersucht der Hirnhäute verbunden als Hirnhautwasserbruch (*Hydroencephalocoele*) (Nr. 356—359.), wobey ebenfalls das Gehirn zuweilen unvollkommen entwickelt ist (No. 360. 361.). — Während des selbstständigen Lebens entsteht selten ein Hirnbruch, der aus einer gebrochenen oder verzerrten Stelle des Schädels hervortritt (Nr. 298—301.).

§. 244. Die Blutergießungen am Gehirne sind ziemlich häufig, da die Gefäße überhaupt zwar durch den Schädel gegen äussere Einwirkungen geschützt, die Arterien aber dünnhäutiger sind, als in andern Organen. Sie entstehen aber a) durch Ruptur der Gefäße. Dies ist besonders häufig der Fall, wenn mechanische Ursachen wirkten, wenn also die Gefäße durch eindringende Knochensplitter oder andre fremde Körper verwundet, oder durch Auseinanderweichen der Knochen oder durch Ablösung der festen Hirnhaut vom Schädel zerrißen, oder durch eine Erschütterung zum Bersten gebracht werden. Die Gefäße zerreißen um so leichter, einerseits, je zarter und dünnwandiger, oder je mürber und spröder sie sind, und andererseits, je mehr der Andrang des Bluts nach dem Kopfe verstärkt, oder die Rückkehr desselben erschwert ist. So zerriß die Arterie der Sylvischen Grube (Nr. 185.) von einer bloßen, jähnen Bewegung bey einer jungen Frau; da sie bey dem Ausgleiten mit Anstrengung sich aufrecht erhob, indem sie eben ihr Kind trug: sie litt sonst an Herzpochen und hatte sehr zarte Arterien. Eben so prädisponirt Verknöcherung der Arterien zu Zerreißen derselben. Je mehr ferner ein Mensch durch Zorn, Trunk, Bewegung erhitzt ist, um so leichter verursacht die Erschütterung ein Zerreißen der strotzenden Hirngefäße. Uebrigens ist die Blutergießung aus einem zerrißnen Gefäße meist über eine größere Fläche ausgebreitet, und tritt, namentlich wenn das Gefäß zu den größern gehört, meist schnell ein. Blutungen aus Mund, Nase und Ohr beruhen auf einer zufällig gleichzeitigen Berstung andrer Gefäße, und scheinen durch Anziehen des Bluts nach der Oberfläche die innre Blutung zu vermindern. b) In andern Fällen erfolgt die Blutung ohne Zerreißen der Gefäße: Bichat konnte durch Injectionen, welche bis in die Haargefäße drangen, bey apoplektischer Ergießung nie ein zerrißnes Gefäß ausfindig machen. Auch kann hier das Blut nicht aus den vermeintlichen Mündungen ausfließender Gefäße treten, denn es ergießt sich noch häufiger in die Substanz des Gehirns, als an den ausfließenden Oberflächen; es muß also durch die Wandungen der Haargefäße dringen, was einerseits einen schwächern Zusammenhang derselben, andererseits einen stärkern Blutandrang voraussetzt. Die Entstehung dieser Blutung, welche übrigens häufiger durch dynamische Momente, als durch äussere Gewaltthätigkeit veranlaßt wird, erfolgt also besonders leicht bey Erweichung der Hirnsubstanz, so wie bey Wallung, Congestion und Entzündung. Oft tritt sie erst spät nach Wunden ein, und ist nicht unmittelbar durch die Verletzung veranlaßt: sie kann hier darauf beruhen, daß die Gefäßwände durch Eiterung entweder an einer Stelle wirklich zerstört, oder bloß verdünnt, erweicht und erschlaft sind (Nr. 433. 478. 564. 803.). Aber öfters findet man keine Eiterung

dabey: so traten in dem einen Falle (Nr. 280.) erst 7 Wochen nach der Verletzung Symptome der Ergießung ein, und man fand nun bey der Trepanation einige Theelöffel voll frisches, warmes Blut, ein andres mal (Nr. 103.) fand man bey einem Menschen, der mehrere Jahre nach einer Schläfwunde plötzlich beym Spiele gestorben war, eine Kugel im Gehirn und dabey frisches Extravasat. Hier muß die Diapedesis von Congestion und entzündlichem Zustande bey Schwächung des Zusammenhanges durch Erschütterung oder Druck ebbhängen. — Was den Sitz der Blutergießung anlangt, so tritt sie zwischen dem Schädel und der festen Hirnhaut nie durch dynamische Veranlassung, sondern immer nur nach mechanischer Gewaltthätigkeit ein; dasselbe gilt von der Zerreißenng der Blutleiter. An der Gefäßbaut erfolgt sie von beyderley Ursachen ziemlich gleich oft; in der Hirnsubstanz hingegen häufiger auf dynamische, als mechanische Veranlassung. Sie kommt hier am häufigsten in der weichen und blutreichen Substanz der Ganglien vor, am meisten in den Streifenhügeln und Linsenkernen, dann in den Sehhügeln, aber auch in den Ciliarkörpern und den Olivenkernen. Indes breitet sie sich von da meist über die Marksubstanz aus, und kommt nicht selten auch in dieser allein vor. Hat sie in der grauen Substanz ihren Sitz, so breitet sie sich in der Regel weiter aus, und bewirkt häufiger Erweichung und Ausartung des Gehirns; in der festern Marksubstanz bleibt sie meist mehr beschränkt, und es erfolgt leichter eine Verheilung durch Vernarbung oder Balgbildung. — Das ergossne Blut scheidet sich in Blutkuchen und Blutwasser: bey hinreichender Lebensthätigkeit wird zuerst dieses wieder eingesogen, späterhin jener erst durch die seröse Secretion des Gehirns aufgelöst und dann ebenfalls resorbiert. Da nach Entfernung eines Extravasats, welches die Wunden der Gefäße einigermassen schließt, oft eine neue Blutung erfolgt, wie dies z. B. Hill (p. 71.) in einem Falle erfuhr, wo das Extravasat selbst noch flüssig war, so liefs Teeubeler (Nr. 74.) einen großen Blutklumpen in der Hirnwunde, welcher nach 3 Tagen, durch Eiterung aufgelöst, abging. — So lange keine Resorption eintritt bey einer Ergießung an der Oberfläche, senkt sich das Blutwasser nach der Grundfläche des Schädels, oder dringt aus der äussern Wunde hervor; der Blutklumpen aber haftet zuweilen so fest an den Hirnhäuten, daß er angewachsen zu seyn scheint, drückt das Gehirn, und macht, wenn er von großem Umfange ist, eine sichtbare Vertiefung in demselben. Das Blut üssert zuweilen seine auflösende Kraft an dem Schädel, nagt an ihm, und bewirkt Erosion (Nr. 192.), welche späterhin in Beinfraß übergeht (*Prochaska adnotatt. III. p. 197.*). Das in die Hirnsubstanz selbst ergossne Blut bahnt sich, indem es immer mehr sich anhäuft, einen Weg zwischen den Hirnfasern, indem es sie von einander trennt oder auch zerreißt. Zuweilen findet man nach starken Kopfverletzungen Risse, welche von der Oberfläche tief in das Gehirn sich erstrecken (Nr. 32—35.); es ist nicht wahrscheinlich, daß dieses weiche und zähe Organ durch eine Erschütterung zum Bersten gebracht werden sollte, und wir leiten wohl mit mehr Recht diese Risse von der Wirkung des sich ansammelnden Blutes ab, wie wir denn auch sehen, daß dieses die Scheidewand zerreißen kann (Nr. 186, 241. 456.). Das Blut zeigt sich endlich als ein Auflösungsmittel der Hirnsubstanz und verursacht schon binnen 3 bis 8 Tagen eine Erweichung derselben, welche bisweilen sich ziemlich weit ausbreitet, oder es erfolgt eine Art. Verheilung, wie sie Cruveilhier

(I. p. 204 — 211.) beschreibt. Nämlich nach einer durch dynamische Verhältnisse veranlaßten Blutergießung in der Hirnsubstanz findet man am zweyten oder dritten Tage einen Theil des Bluts geronnen, den andern flüssig, und die dadurch entstandne Höhlung mit unebenen, offenbar gerissenen Wänden; diese werden am vierten oder fünften Tage gelblich, wie die äußere Haut nach einer Quetschung; am neunten bis fünfzehnten Tage, wo bloß noch ein Blutklumpen vorhanden ist, sind sie roth und weich mit gelblicher Umgebung, und nun bildet sich allmählig entweder eine gelbliche Narbe durch Verwachsung der Höhlung, oder ein blättriges, infiltrirtes Gewebe durch Anschließen von Zellgewebe und Fasern im Blutklumpen, oder ein Balg, welcher die Höhlung auskleidet, aus einer feinen gelblichen oder rüthlichen Haut besteht und nach Resorption des geronnenen Blutes Serum enthält, welches wahrscheinlich von ihm, als einer Art seröser Haut secretirt wird.

§. 245. Bey der Blutunterlaufung wird die feste Hirnhaut hochroth und blanch, die Hirnsubstanz gelblichgrün, bleyfarbig, blau, braun. In manchen Fällen scheint sie unmittelbar durch die mechanische Gewalt entstanden oder eine eigentliche Quetschung zu seyn (Nr. 35. 60. 93. 276. 493. 508. 552. 568.). Andre male ist sie die Folge einer Blutung aus den Haargefäßen, welche, ohne in größern Massen sich zu sammeln, die Hirnsubstanz gleichsam eingeweicht oder voll gesogen (infiltrirt) erhält, und entweder ganz entfernt von der Stelle, auf welche die äussere Gewalt wirkte (Nr. 435.), oder bloß durch dynamische Ursachen entsteht (Nr. 805.), in welchem Falle meist auch ein blutiges Extravasat in andern Gegenden des Gehirns vorkommt (Nr. 215. 220. 224.).

§. 246. Die primäre Entzündung a) der festen Hirnhaut (Beiträge II. S. 126 — 150.) wird vorzüglich nur durch mechanische Einwirkungen, äussere Gewaltthätigkeiten und örtliche Reize veranlaßt. Der erste Zeitraum dauert 6 bis 10 Tage; die feste Hirnhaut wird trocken, gespannt, roth; die äußere Wunde behält ein gutes Aussehen und eßert gehörig. Im zweyten Zeitraume, der gewöhnlich 3 oder 4 Tage dauert, erreicht die Entzündung ihre Höhe, indem sie entweder bloß an Intensität zunimmt, oder, was häufiger der Fall ist, zugleich über eine größere Fläche sich ausbreitet; die äussere Wunde beginnt dabey anzuschwellen; wird röther, trockner und empfindlicher, und wenn keine vorhanden ist, so entsteht gewöhnlich eine nicht weit sich ausbreitende Geschwulst, indem sich das Pericranium, welches, so wie der Schädel, misfarbig wird, von diesem zu trennen und eine bräunliche Feuchtigkeit zwischen beyden sich anzusammeln pflegt. Hierauf erfolgt gewöhnlich Eiterung. b) Bichat. (von den Häuten S. 57.) lehrte zuerst, daß die Spinnewebenhaut der vorzüglichste Sitz der Hirnhautentzündung sey, und man hat in den neuesten Zeiten die Arachnitis als eine eigne Krankheitsform aufgestellt. Aber zunächst selten bemerkt man eine Röthe der Spinnewebenhaut ohne Extravasat, und man schließt auf ihre Entzündung bloß aus der Trübung und Verdickung derselben, und aus den an ihr befindlichen Ausschwitzungen, also aus Erscheinungen, die zum Theil auch ohne eigentliche Entzündung entstehen können. Dagegen hat man von den Entzündungen der Gefäßhaut gänzlich geschwiegen, ungeachtet diese Haut bey ihrem Reichthume an Blut viel häufiger der Sitz der Krankheit ist. Und wer müchte es wohl unternehmen, charakteristische Merkmale für die Entzündung der einen und der andern Haut aufzustellen? Wir wollen

daher die Entzündung Beyder als ein Gemeinschaftliches betrachten und unter dem Namen der Meningitis zusammenfassen, weil beyde Hürte gemeinschaftlich die plastische Periphrase des Gehirns bilden und so im Gegensatze stehen zur festen Hirnhaut, deren Entzündung, als wesentlich verschieden, durch Perimenigitis bezeichnet werden kann. Die Meningitis also entsteht bald durch mechanische Momente; durch äussere Gewaltthätigkeit, oder durch Aßtergebilde, Blutgerinnsel, Knochenspitzen und andre fremde Körper, bald durch dynamische Verhältnisse. Ist sie acut, so dauert sie meist 7 bis 11 Tage, bisweilen aber auch nur 4 Tage, bisweilen 5 Wochen; die chronische hat eine unbestimmte Dauer von mehreren Monaten. Wenn wir drey Hauptformen derselben anerkennen, die typhöse, hydrocephalische und psychopathische, so sprechen wir damit nur einen relativen Unterschied aus, welcher sich auf das in den einzelnen Fällen hervortretende Übergewicht des einen oder des andern Momentes bezieht, während die Krankheit im Allgemeinen alle drey Momente in sich begreift. Die typhöse Form, welche schon von frühern Beobachtern (Beiträge II. S. 261.), in den neuern Zeiten aber zuerst von Marcus und hierauf fast allgemein anerkannt worden ist, unterscheidet sich durch allgemeines Leiden des Gefäß- und Nervensystems und durch acuten Verlauf, wobey die Eregung von Serum und die Störung der Seelenthätigkeit nur als einzelne Erscheinungen auftraten. Die hydrocephalische Form charakterisirt sich durch Tendenz zur Wasserbildung, durch Wandelbarkeit und Unbestimmtheit, und ist bald acut, bald chronisch, wobey typhöses Fieber und gestörte Seelenthätigkeit mehr als begleitende oder folgende Symptome erscheinen. Bey der psychopathischen Form endlich ist die chronische Störung der Seelenthätigkeit vorherrschend, während ein typhöses Fieber ihren Anfang oder ihr Ende bezeichnet, und die seröse Ergießung während des Lebens sich wenig bemerklich macht. c) Die entzündete Hirnsubstanz ist blutreich, indem ihre Haargefäße strotzen, geröthet und dabey meist weich. Baillie (S. 251.) vermist an ihr die sonst bey Entzündungen gewöhnliche Härte, und Vetter (pathologische Anatomie S. 31.) stellte es zuerst als eine Eigenthümlichkeit des Gehirns und des Fruchthalters auf, daß sie durch die Entzündung weicher werden. Von andern Beobachtungen geleitet, haben neuerdings auch Andre, und namentlich Lallemand (l. p. 90.) die Erweichung für ein wesentliches Merkmal der Hirnentzündung erklärt. Die Erwägung der Umstände, unter welchen bey Leichenöffnungen eine besondere Weichheit des Gehirns bemerkt wird (§. 254.), bestimmt uns allerdings, dieser Meynung beizutreten, wiewohl es noch keinesweges erwiesen ist, daß schon im Anfange der Entzündung, nicht erst in ihrem spätern Verlaufe; und namentlich bey einem chronischen Gange derselben das Gehirn erweicht wird. Die Hirnentzündung (Encephalitis) entsteht selten durch äussere Gewaltthätigkeit, fast immer durch dynamische Verhältnisse, und tritt öfters zu einer Meningitis hinzu oder wird von derselben begleitet; sie nimmt ihren Sitz häufiger in der grauen Substanz, als im Marke, und dauert meist 12 bis 17 Tage, wo sie in Genußung oder in Auflösung und Eiterung der Hirnsubstanz übergeht. Chronisch und schleichend ist sie, wo sie auf eine kleine Stelle beschränkt, mehr örtlich bleibt, und weniger irritable Aufregung des Gefäßsystems sich hinzugesellt.

§. 247. Indem wir zu Betrachtung der abnormen Secretionen übergehn, müssen wir bemerken, daß Wepfer, Morgagni, Greding, Desssaers, Baader, Haslam

und Baillie entwickelte Luft gefunden haben, welche die feste Hirnhaut auftrieb, bey Durchstechung derselben gewaltsam hervorbrang und unter der Gefäßhaut oder auch im Blute einzelne Blasen bildete (Nr. 302. Beyträge I. S. 291. II. S. 236. fg. 282—285). Daß diese Entwicklung nicht von fauliger Zersetzung herrührte, erhellt daraus; daß Morgagni und Baillie keine andern Spuren von Fäulniß an den Leichnamen bemerkten. Auch fand Ollivier (p. 290. seqq.) Luft am Rückenmark ohne Fäulniß nach Peritonitis, Kolik, Aneurismen der Aorta u. s. w. Da man diese Erscheinung in andern Organen nicht so häufig antrifft, so deutet sie wohl auf ein besondres Verhältniß des Hirnblutes, und auf eine vorzügliche Schwägerung desselben mit luftförmigen Stoffen, oder auf eine höhere Zersetzbarkeit desselben hin.

§. 248. Die seröse Ergießung ist zunächst eine abnorm vermehrte Anhäufung des auch im Normalzustande abgeordneten Serums. Da diese Absonderung an den plastischen Hirnhäuten, und zwar sowohl an den einander zugewendeten Flächen der beyden Blätter der Spinnwebenhaut, wovon das eine die feste Hirnhaut auskleidet; das andre die Gefäßhaut überzieht, als auch an der die centrale Oberfläche bekleidenden Membran Statt findet, so erfolgt auch die seröse Ergießung in beyderley Räumen, und es ist kein wesentlicher Unterschied zwischen Hirnhautwassersucht und Hirnhöhlenwassersucht. Da das Gehirn in Verhältniß zu seinem Umfange eine viel größere und gefäßreichere Oberfläche hat, an welcher eine seröse Secretion theils für immer Statt findet, theils leicht eintreten kann, so ist es auch der serösen Ergießung um vieles häufiger ausgesetzt, als jedes andre Organ. Nämlich die einander zugewendeten Blätter der Spinnwebenhaut sind allerdings der eigentliche Sitz der normalen serösen Secretion. Allein diese bedarf keines besondern Apparats, sondern wird durch jedes Haargefäß vermittelt, und bewirkt dadurch die Anfeuchtung jedes organischen Punctes; daher kann denn auch eine seröse Ergießung oft über oder unter der Gefäßhaut, ja bisweilen selbst über der festen Hirnhaut (Beyträge I. S. 181—186.) entstehen. Auch findet man bey Ergießung zwischen der Spinnwebenhaut und der Gefäßhaut letztre meist von Blut strotzend (Craigie in Edinborgh Journ. XVIII. p. 492.), was uns um so weniger zweifeln läßt, daß die Secretion von dieser Membran ausgegangen ist. Die Höhlenwassersucht hat besonders in den Seitenhöhlen, selten in der dritten und vierten Höhle, ihren Sitz; die Höhlenhaut ist dabey öfters sichtbar abnorm; äusserst selten ist die Hirnhöhlenblasenwassersucht (*Hydrocephalus ventriculorum cysticus s. vesiculosus*) welchen Zacutus, Borelli, Leche und Berdot (Nr. 398.) beobachteten; häufig ist die Verbindung mit Hirnhautwassersucht. — Betrachten wir die seröse Ergießung nach ihrer nächsten Ursache oder pathologisch, so unterscheiden wir 1) eine active, welche in einer auf gesteigerter Gefäßthätigkeit beruhenden Verstärkung der Secretion besteht, und wobey man die Höhlenhaut oder die Gefäßhaut blutreich und entzündet findet, und 2) eine passive, welche die Folge darniederliegender Lebensfähigkeit ist, und wobey man zum Theil das Gehirn bleich und blutleer findet. a) Wie die Wassersucht jedes chronische Leiden der Eingeweide beschleift, indem die gesunkene Plasticität nur noch Serum zu bilden vermag, welches von den geschwächten rückführenden Gefäßen nicht überwältigt und aufgenommen werden kann, so häuft sich auch am Ende der Hirnkrankheiten Serum in den Höhlen oder an der Oberfläche des

Gehirns an. b) Wenn das Gehirn, durch Anstrengungen erschöpft, durch organische oder psychische Einflüsse geschwächt, in sich zusammensinkt, so entsteht ein leerer Raum zwischen ihm und seinen Häuten: dadurch wird theils mehr Flüssigkeit hierher gezogen und die seröse Anschwellung vermehrt, theils den Sengadern der gewohnte Druck entzogen und dadurch ihre Thätigkeit vermindert. c) Bey passiven Congestionen und erschwertem Blutlaufe scheidet sich mehr Serum ab. Wo die Blutleiter überfüllt sind; findet man meist auch eine seröse Ergießung in den Höhlen oder an der Oberfläche; so bemerkt man sie häufig bey Ersticken. d) Dafs auch Untbätigkeit oder Verletzung der Sengadern die Ursache seröser Ansammlung werden könne, ist nicht unwahrscheinlich. Man findet nicht selten dabey die Gefäßgeflechte krankhaft bleich, welk, oder mit Hydatiden und Verhärtungen besetzt. e) Endlich scheint diese Ergießung auch zuweilen auf einer eignen Entartung des Bildungsherganges zu beruhen, namentlich bey angeborenen Wasserköpfen, wo die Plastilität weniger Hirnsubstanz schafft, vielmehr in übermäßiger Wasserbildung sich erschöpft. Diese fortdauernde Secretion zeigte sich z. B. in Remmetts (Edinburger VI. S. 440.) Falle, wo durch einen Stich in die feste Hirnhaut zuerst 10; nach 2 Tagen 12, drey Tage später 14, vier Wochen drauf 12, und vier Wochen später 32 Unzen Serum abgelassen wurden, indem jedesmal die Flüssigkeit von Neuem sich anhäufte. Eben so leerte Vosse (Nr. 343.) 31 Unzen binnen 3 Monaten, Prickleton (Nr. 363.) 34 Unzen binnen 7 Wochen, Freckleton (Gerson. II. S. 115.) 65 Unzen binnen einigen Monaten; Lizzars (Nr. 362.) 76 Unzen binnen 3 Monaten aus, und Letztrer fand nach dem Tode des 4 monatlichen Kindes noch 3 Pfund Serum im Gehirn. In allen diesen Fällen wuchs nach jeder Paracentese der Kopf binnen wenigen Tagen wieder zu seiner vorigen abnormen Gröfse an. Hier beruht also die Hirnwassersucht auf habitueller, übermäßiger Wasserbildung, welche durch die Resorption nicht überwältigt werden kann. — In nosologischer Hinsicht oder in Betracht der Form und des Ganges der Krankheit theilen wir die Hirnwassersucht in die idiopathische oder selbstständige, wo diese Ergießung den Brennpunct aller Krankheitserscheinungen ausmacht, und die symptomatische; wo dieselbe, durch andre Abnormitäten bewirkt, nur ein Glied in der Kette der Krankheitserscheinungen ist. 1) Die idiopathische ist bald acut, bald chronisch. a) Die acute ist durch einen entzündlichen Zustand der Hölte bedingt. Ist die Entzündung bedeutend, so kann sie erst in ihrem spätern Zeitraume in Ergießung übergehen, während derselben aber auch noch fortanern; in andern Fällen geht sie vorüber, und man findet am Leichname keine Spur derselben. Die acute Hirnwassersucht ist meist, besonders in ihrem Anfange, activrer Natur und dauert meist 13 bis 28 Tage; doch nimmt sie nicht selten auch einen chronischen Charakter an und dauert mehrere Monate. b) Die primär chronische entwickelt sich allmählig ohne Zeichen von Entzündung und ohne einen merklich gereizten Zustand; sie verräth sich bey Kindern gewöhnlich erst durch die Anschwellung des Kopfs, und dauert eine unbestimmte Zeit, selbst bis zu 40 Jahren. Zur chronischen Form gehört auch die angeborene Hirnwassersucht, welche als ein Stehenbleiben des Gehirns auf einer niedrigen Bildungsstufe anerkannt wird (Meckel pathol. Anat. I. S. 260.). Da im Normalzustande das Fortschreiten der Entwicklung sich durch Zunahme der Hirnsubstanz und Abnahme des

Wassers äussert (S. 223.), so kann die Bildungskraft, wenn sie zu ohnmächtig ist, um die Hirnsubstanz gehörig zu erzeugen, bloß in einer um so reichlicheren Wasserbildung sich äussern. Am häufigsten findet sich diese an dem Hüften bey unvollkommen entwickeltem Gehirne (Nr. 347—361.). Wenn die ursprüngliche Hirnblase aus Hirnsubstanz besteht, so läßt es sich denken, daß, wenn sie nicht weiter fortwächst, nachdem sich an ihrer Oberfläche Hüte gebildet haben, das Serum hier sich anhäuft, und so kann man die angeborene Hirnhautwassersucht mit der Entwicklungsstufe des Gehirns bey Fischen vergleichen, welches nur den kleinsten Theil der Schädelhöhle einnimmt, während der übrige Raum von einer salzigen Feuchtigkeit ausgefüllt wird, so daß man die Fische für normale Wasserköpfe ansehen könnte. Diejenige chronische Hirnwassersucht, welche ohne äussere Veranlassung bald nach der Geburt, sich zu äussern anfängt, ist der angeborenen verwandt, und es läßt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden, ob die Abnormalität nach der Geburt erst entstanden, oder schon vor derselben, wenigstens in ihrem Keime, vorhanden gewesen ist. So entwickelt sich bemerklich die Hirnhautwassersucht zuweilen (Nr. 341.) erst 3 Monate nach der Geburt, und eine Hirnhöhlenwassersucht verräth sich theils durch Krankheitserscheinungen, theils durch Anschwellung des Kopfs im ersten (Nr. 363. 367. 368. 375. 381. 389. 392. 395.), zweyten (Nr. 370. 393.), dritten (Nr. 365. 379. 380.), vierten (Nr. 369.), sechsten (372. a.) siebenten (Nr. 374.) Monate nach der Geburt, und entwickelt sich ungleich seltner nach dem ersten Jahre. a) Zur symptomatischen Ergießung von Wasser am Gehirne gehört a) die typhöse, welche im Typhus und im letzten Zeitraume der mit Hirnaffection verbundenen Synocha eintritt, wie längst von Morgagni, Stoll, Stark, Bang, (Beyträge I. S. 252. fgg. II. S. 181. 208. fg.); ferner von Rush (ausserl. Abhh. XVII. S. 295.), Chambon (p. 53. 62. 114. 115. 171.) und Anders beobachtet worden ist; b) die apoplektische, welche das Erzeugniß eines andern krankhaften Zustandes des Gehirns ist, und besonders in Folge eines Collapsus desselben eintritt (Beyträge I. S. 246. fgg. II. S. 213. fgg.), wobey bisweilen das Gehirn von Blut strotzend gefunden wird (*Willis de morb. convuls. p. 180. Lancisi de subitan. mort. p. 41.*), indem das Zusammensinken desselben sowohl eine passive Congestion, als eine vermehrte Secretion veranlassen kann; c) die traumatische, welche bald als akut schnell verläuft, bald erst als eine späte Folge der Verletzung (Nr. 313. 314. 407. 930. 1016. 1023. 1040. 1115.) sich entwickelt; d) die colligative, welche vermöge eines allgemeinen Sinkens der Plasticität und vorherrschender Wasserbildung bey Wassersucht der Brust- oder Bauchhöhle eintritt (Beyträge I. S. 257); e) die metastatische nach Unterdrückung von gewohnten abnormen Secretionen; f) die pseudoplastische bey Aftergebilden im Gehirne, g) die psychopathische nach anhaltender Gestörtheit der Seele. — Wenn die seröse Ergießung bedeutender und von längerer Dauer ist, so findet man auch die Hirnsubstanz verändert. Diese ist öfters, namentlich bey chronischer Höhlenwassersucht, fester als gewöhnlich, mit bestimmterer, schärferer Faserung des Marks: es scheint, als ob der Eyweissstoff der Fasern stärker gewonnen, und das weichere Bindemittel, vielleicht das Hirnfett, verschwunden sey. In andern Fällen ist die benachbarte Hirnsubstanz erweicht, besonders wenn die Krankheit entzündlicher Natur war. Die feste Hirnhaut und das Perikranium mit der äussern Haut geben dem fortwährenden Drucke nach und dehnen sich

aus; die Schädelknochen weichen von einander, so daß bey der chronischen Hirnhautwassersucht der obre Theil des Kopfs halb durchsichtig wird, oder sie wuchern und verwachsen. Dabey wird entweder die Gefäßhaut aus den Furchen herausgedrängt und die Spinnwebenhaut zerrissen (Nr. 339.), oder beyde plastische Häute erscheinen verdickt und gefäßreich (Nr. 352.). Das Gehirn ist atrophisch: bey Wassersucht der Hirnhöhlen ist der Hirnstamm schwach genährt, mit unvollkommen entwickelten Ganglien, der Mantel ober blasenartig ausgedehnt, bisweilen am Scheitel nur einige Linien dick; und ohne Randwülste und Furchen, indem wahrscheinlich die Fasern der Stammstrahlung sich flächenartig umbogen haben, die Belegungsfasern ober auseinander gezogen und gestreckt sind, so daß das Ganze eine ebne Fläche bildet; bey der Hautwassersucht ist das ganze Gehirn in einen engeren Raum zusammengeedrängt mit vorengten, bisweilen fast ganz verschwundenen Höhlen. Diese Atrophie des Gehirns kann 1) die Ursache der Wassersucht seyn: wo die höhern organischen Gebilde sich nicht gehörig entwickeln oder ernähren, da wuchern die niedern Bildungen, Serum, Felt, Zellgewebe; und der leere Raum, der durch Atrophie eines organischen Theils entstanden ist, füllt sich mit Serum. 2) Sie kann auch einer durch die Hirnwassersucht bewirkten Störung der Ernährung beruhen. Denn fürs Erste wird die Ernährung durch jeden anhaltenden Druck beschränkt und vernichtet: eine weiche Geschwulst kann auf diese Weise sich in die benachbarten Knochen eingraben und dieselben durchbohren. Sodann ist mit jeder überwiegenden Tendenz zur Wasserbildung mangelhafte Ernährung und Abmagerung gegeben. Das Wesentliche dieser Atrophie liegt also theils in der Wirkung des Drucks, theils in einem Schwächezustande der bildenden Thätigkeit selbst. Denn Wassersucht und Schwindsucht sind die verschiedenen Ausdrücke einer und derselben Abnoermität: wo die Plasticität zu schwach ist, um in organischen Gestaltungen hervortreten zu können, äussert sie sich in unmäßiger Wasserbildung, und wo diese eingetreten ist, mangelt es wieder an gehöriger Ernährung. Wenn hiermit die Atrophie des Gehirns erklärt ist, so ist die Annahme, daß dasselbe vom Serum aufgelöst werde, überflüssig. Auch sprechen andre Gründe mehr gegen, als für diese Annahme, wie schon Monro (p. 41.) gezeigt hat. Denn erstlich ist das hydrocephalische Serum fast immer ganz klar, und enthält weniger Eyweißstoff, als das normale Serum andrer Höhlen; sodann ist das Wasser in den Höhlen von der Hirnsubstanz durch die dabey oft verdickte Höhlenhaut geschieden; endlich zeigt sich das Serum nicht als chemisches Auflösungsmittel des Marks, und wenn es dasselbe durch einen organischen Hergang auflösen sollte, wie bey der Resorption, so würde dies theils eine erhöhte Thätigkeit der Sanguinern voraussetzen, welche bey dieser Wassersammlung unwahrscheinlich ist, theils immer noch keine Atrophie nach sich ziehen, wenn nicht zu gleicher Zeit eine Schwächung der Nutrition Statt fände, welche für sich allein schon hinreichend den Hergang erklärt.

4. 249. Was die Eiterung betrifft, so entstehen a) in der festen Hirnhaut Geschwüre meist nur in Folge einer Kachexie, und bisweilen findet dabey Beinfraß des Schädels oder Eiterung im Gehirne Statt. Dagegen tritt die Ergießung von eiterförmigem Stoffe an der obern oder untern Fläche vorzüglich nur nach Kopfverletzungen ein. Diese Membran bekamt dabey ein mattes, bleiches, weißes, oder graues, oder gelbes Aussehen,

und verdickt sich etwas; die äussere Wunde ist dabey bleich und trocken; oder schlaff, glasartig und jauchig; das Perikranium dunkel gefärbt und noch mehr vom Schädel getrennt; dieser aber misfarbig, gelblich, weiss und trocken. Die Eiterung an der obern Fläche bleibt mehr beschränkt; die an der untern breitet sich bald weiter aus. Die acute tritt gewöhnlich um den 1ten oder zwischen dem 6ten und 17ten Tage nach der Verwundung, oder 3 bis 6 Tage nach völlig entwickelter Entzündung der festen Hirnhaut ein, und bezeichnet sich besonders durch das Nachlassen des bisherigen Entzündungsfiebers, oder wenn dieses nicht bemerklich gewesen war, durch den Eintritt eines Eiterungsfiebers. Die chronische Ergießung erfolgt zu unbestimmten Zeiten, und giebt sich zuweilen erst einige Monate nach der Kopfverletzung zu erkennen. b) Die Ergießung von eiterförmigem Stoffe an der Gefäßhaut, wobey diese sich verdickt und vom Gehirn abweicht, wird häufiger durch dynamische Verhältnisse veranlaßt, ist meist mit Affection des Gehirns, mit Congestion oder Entfärbung und Eiterung desselben verbunden, und nimmt einen noch weniger bestimmten Gang, als die Ergießung an der festen Hirnhaut. Dasselbe gilt von der Vereiterung der Gefäßhaut c) Bey der Eiterung wird die Hirnsubstanz misfarbig, schmutzig weiß, gelblich, grünlich, weich und aufgelöst; ehe sie sich völlig entwickelt und der Eiter sich ausgeschieden und in einem Herde gesammelt hat, ist sie von der Erweichung schwer zu unterscheiden. Bey Wunden sieht man, daß der Eiter meist um den 6ten, bisweilen auch schon den 4ten Tag sich zu bilden anfängt. Zuweilen nimmt aber die Eiterung, wie die Entzündung, einen chronischen Charakter an; der Verwundete scheint völlig wieder hergestellt, nach mehreren Monaten oder Jahren aber treten, ohne äussern Anlaß, Symptome der Eiterung ein, und man findet diese wirklich bey der Trepanation oder bey der Leichenöffnung, wo man denn über den Zeitpunkt ihrer Entstehung und über die Dauer ihres Verlaufs im Dunkeln bleibt. Noch weniger läßt sich etwas über den Hergang der durch dynamische Ursachen veranlaßten Hirneiterung bestimmen. Zuweilen verdichtet sich die äussere Schicht eines Geschwürs oder die nächste Umgebung desselben zu einer Membran, welche bisweilen auch Gefäße hat und den Eiter gegen das übrige Gehirn isolirt. Ein solches Balggeschwür (*abscessus cysticus, vomus encephali*) scheint sich durch ein Streben nach Regeneration bey reger Plasticität zu bilden, nachdem die Eiterung ungefähr vier Wochen gedauert hat, kann aber auch ein in Eiterung übergegangenes Atergehirne seyn, dessen Substanz vereitert und dessen Membran übrig geblieben ist. Es kann ferner vermöge seiner Isolirung die umgebende Hirnsubstanz unverletzt lassen, zuweilen aber auch dieselbe mit der Zeit in Entzündung, Erweichung und Eiterung versetzen, so daß man dann in der Mitte eines großen Geschwürs einen dickhäutigen mit Eiter gefüllten Balg findet.

§. 250. Die ursprünglichen Bildungsfehler des Gehirns bringen wir auf drey Classen zurück, nämlich die acephalische und die hemicephalische Moustrosität, und die Entwicklung des Gehirns mit partieller Unvollkommenheit. A) Die verschiedenen Arten der Acephalen stellen folgende Stufenreihe dar. An die formlosen Massen schlossen sich als das unvollkommenste Erscheinen menschlicher Gestaltung diejenigen Acephalen an, welche bloß aus einem, ein Becken enthaltenden Klumpen mit untern Gliedmaßen bestehen. Bey der zweyten Art kommt noch ein Bauch, und bey der dritten eine Brust,

womit der Körper nach oben sich endigt, hinzu. Das Rückenmark fehlt entweder, oder ist bloß in seinem untern Theile vorhanden, und endet nach oben zugespitzt, oder (jedoch nur wenn eine Brust vorhanden ist,) in ein Rudiment des Gehirns, und zwar entweder kuglich, analog der Hirnblase, oder zwey getheilt, nach Art der Hirnschenkel, indem dabey auch das Rudiment eines Kopfs entweder als eine bloße, mit Haaren bewachsene Hautwulst mit schwammiger, blutiger, salsiger, faseriger, Hydatiden enthaltender Substanz, oder als ein Ansatz knorpliger und knochiger Masse erscheint. Die Acephalen werden meist von fruchtbaren Müttern, und fast immer zugleich mit normal gebildeten Kindern geboren, mit welchen sie oft Eyhäute und Fruchtkuchen, bisweilen auch den Stamm des Nabelstrangs gemeinschaftlich haben. Sie schämen also meist dadurch an entstehen, daß die Bildungskraft vorzüglich nur dem andern Embryo sich zuwendet, weshalb sie denn auch diesem in Hinsicht der Größe der gleichnamigen Theile oft sichtbar nachstehen, und einen kürzern und dünnern Nabelstrang haben, so wie es nicht selten ist, daß auch bey qualitativ normal gebildeten Zwillingen nur der Eine vollständig entwickelt, der Andre hingegen in seiner quantitativen Ausbildung zurückgeblieben, klein und mager ist. B) Bey der Hemicephalie ist ein Kopf mit Sinnesorganen vorhanden, aber die Hirnmasse fehlt entweder ganz und ist durch andre Substanz ersetzt, oder es ist zu wenig davon vorhanden; der Kopf ist wie über den Augen abgeschnitten, indem die Schädeldecke (namentlich das ganze Scheitelbein oder ein Theil desselben, und der obere Theil des Stirn- Schläfe- und Hinterhauptsbains) gewöhnlich ganz fehlt, zuweilen aber auch bloß eingesunken und der Grundfläche genähert ist. Nach diesen Bestimmungen ist der Name: Hemicephalen, richtiger als der der unächten Acephalen, der Anencephalen und Akranien. Die Hemicephalen lassen sich eben so wenig, als irgend eine andre Classe von Naturgegenständen, nach einem einzigen Princip auf eine ihrem Wesen entsprechende Weise ordnen, sondern bilden, von verschiedenen Gesichtspuncten aus betrachtet, verschiedene Reihen. Das Rückenmark fehlt entweder gänzlich, oder ist unvollkommen, dünn, ausgeartet, oder reicht nach oben nur bis zu den Brust- oder Halswirbeln, oder ist ganz normal. Einige Hemicephalen schließen sich an die Acephalen an, indem der Hals gänzlich mangelt und der Kopf bloß das obre Ende des Rumpfs ausmacht, bey bedeutender Monstrosität an Rumpf und Gliedmaßen; bey Andern ist der Kopf vollständiger entwickelt und bloß der Scheitel mangelhaft. Das Gehirn fehlt entweder gänzlich, und die Schädelhöhle ist leer; oder es ist in dieser eine rothe, braunrothe oder röthlichgraue, gefäßeiche, weiche oder harte, schwammige oder faserige Masse, welche zuweilen die Form von Ganglien hat, zuweilen eibe oder zwey Höhlen mit unechten Vorrugungen, zuweilen eine Längenfurche, zuweilen auch eine Querfurche hat, zuweilen feste, körnige weiße Masse, und zuweilen deutliche Markklümpchen einschließt; oder es ist ein Markknöpfchen, zum Theil mit einer Höhle, mit einem Hirnanhange und mit centralen Nervenenden vorhanden; oder es ist endlich der Hirnstamm ziemlich entwickelt. Beyde Extreme kommen am seltensten, die Mittelformen am häufigsten vor. — Ueber die Entstehung der Hemicephalen hat man, abgesehen von der Annahme der Einwirkung der mütterlichen Phantasie, zwey entgegengesetzte Meynungen. 1) Das Gehirn ist vorhanden gewesen und zerstört worden 1) durch eine äussere Gewalt während der Schwangerschaft; 2) durch Wassersucht, entweder als

Krankheit, oder als Stehenbleiben auf niedriger Bildungsstufe, indem das angesammelte Serum das Gehirn aufgelöst hat, und dies nach dem Aufplatzen des Kopfs und Auslaufen des Wassers zusammengesunken ist. Dafür spricht a) die Aehnlichkeit mit dem angeborenen Wasserkopfe, indem bey diesem das Gehirn atrophisch, der Schädel unvollkommen entwickelt, auch bisweilen eine Haarscharte vorhanden, und bey Hemicephalen die Augenhöhrendecke wie nach vorne gedrückt ist; b) öftere Vorkommen von Hydatiden auf der Schädeldecke und von Wirbelspalte bey den Hemicephalen; c) daß man bisweilen Löcher in der schwammigen Masse auf der Schädelgrundfläche findet, auch selbst Wasser während des Lebens aus derselben aussiepert; d) daß bey der Geburt von Hemicephalen öfters eine sehr große Menge Fruchtwasser abgeht. Indessen lassen sich alle diese Umstände auch als Folgen einer ursprünglich gehemmten Entwicklung erklären, und es sprechen triftigere Gründe für II.) die Meynung, daß das Gehirn ursprünglich nicht anders sich gebildet hat, als wie wir es wirklich sehen, denn 1) schloßen sich die Hemicephalen an die Acephalen an, und vervollständigen ihre Reihe, indem sie das letzte Glied derselben bilden. Niemand kann behaupten, daß bey den Klumpen, die bloß aus Becken und Beinen bestehn, das Gehirn mit dem Kopfe, der Brust, den Aermen und dem Bauche durch die Gewalt des Wassers zerstört worden sey. Von diesen Acephalen geht aber eine ununterbrochne Stufenfolge bis zu den Hemicephalen, und es wäre ganz willkürlich, wenn man hier eine Gränzlinie ziehen wollte. Und warum sollte nicht das Gehirn ursprünglich fehlen können? Das Niedere, Äussere gesellt sich zum Höhern, Inneren, mehr vermöge einer prästablierten Harmonie, vermöge der Einheit des Begriffs, als daß es durch das Innere wirklich gemacht würde. Wie ein Ey entsteht ohne den Keim zu einem Embryo, so kommen auf abnorme Weise Haare ohne Haut, Zähne ohne Kiefer, Kiefer ohne Schädel, Augäpfel ohne Netzhaut, Augenhöhlen ohne Augäpfel, Gliedmaßen ohne Nerven, Nerven ohne Rückenmark vor: der Analogie nach zu urtheilen, ist die Natur auch wohl im Stande, einen Schädel ohne Gehirn zu bilden. 2) Der Gewalt des Wassers allein können wir keine zerstörende Einwirkung auf das Gehirn zugestehn (§. 248.). Es ist auch gar nicht möglich, daß sie die feste Hirnhaut bey Hemicephalen vernichtet haben könnte, da diese hier bloß bis zu den Rändern der Schädelknochen reicht, und hier glatt in die äussere Beinhaut derselben übergeht, ohne daß irgend eine Spur ihres Wölbungstheils vorhanden ist. 3) Man hat bey einigen Hemicephalen die Hirnarterien geschlossen oder blind sich endigend gefunden, was doch bloß durch ursprünglichen Bildungsfehler, nicht durch Wassersucht, bewirkt seyn kann. 4) Eine eigene Afterbildung; wie die schwammige Masse an der Stelle des Gehirns bey Hemicephalen ist, kann nicht durch Wassersucht entstehen. 5) Diese Masse ist fast durchgängig äusserst blutreich; bey dem Wasserkopfe ist ein offener Mangel an Blut. 6) Die Hemicephalen sind fast ohne Ausnahme fett, breitschulterig, mit thierischem Aussehen; bey dem angeborenen Wasserkopfe ist der Körper fast immer abgemagert und von krankhaftem, aber menschlichem Aussehen. 7) Bey den Hemicephalen fehlt der Hals oder ist ganz kurz, da für immer die Halswirbel unvollkommen entwickelt sind; bey dem Wasserkopfe ist der Hals in der Regel normal. Dies Alles bestimmt uns, bey der einfachsten und natürlichsten Ansicht stehen zu bleiben, daß die Hemicephalie ein ursprünglicher Bildungsfehler ist und auf

einer Schwäche der Bildungskraft beruht, deren Ursachen wir allerdings in den meisten Fällen nicht nachzuweisen im Stande sind. — C.) Bey der partiellen Unvollkommenheit ist die Abweichung von der Normalität sowohl in Hinsicht auf Masse, als auf Form geringer: es ist ein Gehirn mit seinen Hauptabtheilungen vorhanden, aber es ist entweder zu klein, oder seine einzelnen Gebilde sind zu wenig entwickelt.

§. 251. Die Atrophie des Gehirns überhaupt hängt vornehmlich von dynamischen Momenten ab, jedoch so, daß auch der mechanische Druck, namentlich bey der Wassersucht einen Antheil daran haben kann. Die partielle Atrophie ist umgekehrt mehr von mechanischen Verhältnissen abhängig, wiewohl auch das dynamische nicht ohne Einfluß bleibt. Aftergebilde an den Hirnhäuten verzehren schon, wenn sie von geringem Umfange sind, als so genannte Granulationen, die ihnen entsprechende Stelle der innern Tafel oder auch der Diploe des Schädels; haben sie einen größern Umfang, so durchbohren sie den Schädel und graben sich eine Vertiefung an der Oberfläche des Gehirns, wobey dies an Masse abnimmt; bey Aftergebilden in der Hirnsubstanz findet man nicht selten die darüber liegende Rinde verdünnt und die Furchen verwischt; ja eine schwammige Wucherung der Hirnsubstanz kann durch ihren Druck die Ernährung der festen Hirnhaut allmählig so sehr stören, daß diese zuletzt zerreißt (Nr. 1050.). Bey der allgemeinen Atrophie des Gehirns findet man übrigens entweder einen freyen Raum zwischen Gehirn und Schädel, und die feste Hirnhaut lose, faltig, zuweilen auch vom Schädel abgelöst, oder der Schädel verdickt, wenn dieser bey der fortschreitenden Abnahme des Gehirns um eben so viel zugenommen hat. — Bisweilen findet man die Gefäßhaut ganz lose auf dem Gehirne liegend, so daß sie sich leicht wegnehmen läßt, und die Randwülste klaffen. Dies. Apoplexia, welches man bey der Höhlenwassersucht, bey Ergießung von Serum oder Eiter an den Hirnhäuten, nach Hirnerschütterungen und in Folge anhaltender Congestionen nicht selten bemerkt, kann eine Ursache der Atrophie abgeben.

§. 252. Nicht selten findet man in der Hirnsubstanz geschlossene Höhlungen. Sie enthalten zuweilen Blut, und sind dann ohne Zweifel durch die Ergießung desselben, welche Apoplexie bewirkt, entstanden. In andern Fällen findet man sie leer, oder mit seröser oder saftiger Feuchtigkeit gefüllt: daß hier ergossenes Blut wieder eingesogen worden ist, die einmal gebildete Lücke aber vermöge einer Art Atrophie sich nicht wieder geschlossen hat, wird dadurch wahrscheinlich, daß die Zahl dieser Höhlungen bisweilen mit der Zahl der apoplektischen Anfälle, welche an dem Subjecte eingetreten sind, und auch die Lage derselben mit der Stelle, welche dabey gelähmt worden ist, in Uebereinstimmung steht. Zuweilen sind aber Zufälle vorausgegangen, welche nicht auf ein Extravasat, sondern auf Entzündung und Eiterung hindeuteten, und die Höhlungen sind von einer eignen, ziemlich dicken, selbst mit Gefäßen versehenen Membran ausgekleidet: hier sind sie wahrscheinlich die Ueberbleibsel von Balgabscessen, deren Eiter resorbirt worden ist. Endlich kommen aber auch Fälle vor, wo weder Symptome von Entzündung, noch von Ergießung bemerkt worden sind und dennoch sehr zahlreiche Höhlungen gefunden werden; einen solchen Fall beobachtete Santorini (obs. p. 54.); in einem andern Falle sah ich so viele dergleichen Höhlungen mit glatten Wänden und ohne irgend

eine Veränderung des Gewebes in der Umgebung, daß ein Theil des Mantels nach der Härtung in Weingeist fast wie eine Schlacke aussah.

§. 253. Die Hypertrophie, als die in Verhältniß zur Ernährung der übrigen Organe zu üppige Ernährung eines Einzelnen, ist immer etwas Relatives, und diese Erscheinung ist in manchen Fällen richtiger für ein abnormes Zurückbleiben der Entwicklung andrer Theile zu erklären. So besteht die Hypertrophie des Gehirns darin, daß der Schädel für das Gehirn zu klein ist, also sich nicht in demselben Verhältnisse, wie dieses, ausgebildet hat, wiewohl das Fortschreiten der Ausbildung selbst durch eine Uebereilung des Bildungsherganges gehemmt worden ist. Wenn nämlich in der Kindheit und Jugend der Schädel zu schnell verknöchert und seine Näthe, namentlich Kranznath und Pfeilnath, schon verwachsen, so treten Symptome ein, welche denen der Hirnwassersucht ähnlich sind, und bey der Leichenöffnung quillt das Gehirn, dessen Randwülste zusammengedrängt und abgeplattet sind, mit Gewalt aus der geöffneten Schädelhöhle, und klist sich nicht mehr in der wieder aufgelegten Schädeldecke fassen. — Was die partielle Hypertrophie am Gehirne anlangt, so verdickt sich die feste Hirnhaut und wird dabey zum Theil ungewöhnlich fest und knorpelähnlich durch anhaltende Congestionen; ferner in Folge eines entzündlichen Zustandes, bey öflicher Reizung durch fremde Körper oder durch Aftergebilde im Gehirne, und bey abnormer Festigkeit desselben. Die Verdickung der Gefäßhaut und Spinwebenhaut, wobey dieselben weiß, undurchsichtig und fest werden, kommt am häufigsten unter dem Scheitel vor, und ist die Folge entweder von Meningitis, oder von passiver Congestion, welche durch fremde Körper, durch Eiter, durch Aftergebilde im Gehirne, oder durch äussere Gewaltthätigkeit und Erschütterung erregt und mit Trägheit des Bildungsherganges verknüpft seyn kann.

§. 254. Das Urtheil über die Consistenz des Gehirns ist mancher Täuschung unterworfen, da sie theils nach dem Tode, besonders bey warmer Temperatur, sich ändert und daher der Befund verschieden ausfällt, je nachdem die Leichenöffnung früher oder später angestellt wird, theils man nicht immer einen sichern Maasstab für die Benurtheilung hat. Sichrer sind daher im Ganzen-genommen die Beobachtungen über Veränderungen der Consistenz in einzelnen Stellen des Gehirns. Die Erweichung scheint weniger auf reiner Schwäche des Bildungsherganges zu beruhen, als vielmehr durch einen gereizten Zustand bedingt zu seyn, dieser mag nun als eine ausgebildete, acute oder chronische Entzündung, oder bloß als eine entzündliche Diathesis erscheinen. Sie tritt nämlich ein 1) nach äussern Verletzungen des Kopfs und des Gehirns, und zwar findet man sie bisweilen schon am zweyten (Nr. 277), dritten (Nr. 820.) oder vierten Tage (Nr. 34. 286.); Arneemann (S. 55. 57.) fand sie auch bey Kaninchen, welche am 13ten bis 16ten Tage nach Verletzung des Gehirns starben; bey Schußwunden kommt sie besonders häufig vor; 2) im Umfange einer Blutergießung ist sie ganz in der Regel, und fehlt vorzüglich nur dann, wenn der Tod zu bald erfolgt ist, als daß sie sich hätte entwickeln können; 3) in der Nähe eingedrungener fremder Körper, besonders Knochen splitter; 4) im Umkreise eines Aftergebildes; 5) bey Eiterung und in der Nähe von Geschwüren; 6) bey dem Typhus mit entzündlichem Zustande des Gehirns und seiner Häute; 7) bey hydrocephalischer Meningitis.

§. 255. Eine abnorme Festigkeit des Gehirns entsteht 1) bey dem Wasserkopfe, indem hier Festes und Flüssiges sich mehr scheidet, und die Hirnsubstanz fester gerinnt und ihren faserigen Bau stärker entwickelt, wobey vielleicht auch der Druck des Wassers zu Verstärkung der Consistenz beyträgt; 2) zuweilen bey typhösen Fiebern; 3) selten in Folge einer Kopfverletzung und Erschütterung. In einer partiellen Verhärtung ist die Hirnsubstanz wie fest geronnener Eyweissstoff, laßt sich leicht in ihre Fasern zerreißen, scheint keine Gefäße mehr zu haben, und brennt am Feuer, wie Horn.

§. 256. Ein brandiges Absterben einzelner Stellen von Hirnsubstanz, wobey diese schwärzlich, breyartig erweicht und stinkend wird, ist nach Kopfverletzungen, namentlich nach starken Quetschungen des Gehirns nicht selten beobachtet worden. In solchen Fällen bemerkt man bisweilen (Schmucker I. S. 268. fgg.) eine Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas, indem die in die Hirnwunde eingebrachten silbernen Sonden schwarz anlaufen.

§. 257. Eine abnorme Verwachsung der festen Hirnhaut mit dem Schädel entsteht durch anhaltende Congestion und chronische Entzündung, also nach Kopfverletzungen, bey Beifraß des Schädels, Wassersucht der Hirnhäute oder Hirnhöhlen, Hydatiden an der Gefäßhaut, Abscessen im Gehirne u. s. w. Indem sie den Blutlauf erschwert, unterhält und vermehrt sie die Congestion, aus welcher sie entsprungen war. Die Hirnhäute verwachsen unter einander in Folge einer, oft durch äussere Gewaltthätigkeit veranlaßten Entzündung, entweder unmittelbar oder mittels einer zwischen ihnen neu gebildeten Haut. Das Serum, welches von den plastischen Häuten ausgedünstet wird, gerinnt nämlich zu einem Aftergebilde, besonders wenn durch gleichzeitigen entzündlichen Zustand der Athmungsorgane die Plasticität des Blutes erhöht ist. Anfangs erscheint es als eine dickliche Flüssigkeit oder gallertartige Masse, welche dann undurchsichtig wird und das Aussehen von geronnener Milch bekommt; allmählig wird dieses Gerinsel fester, und bekommt Gefäße, welche vielleicht aus hier erzeugtem und darauf zu rinnen anfangendem Blute sich bilden, dann aber mit denen der ursprünglichen Häute Anastomosen eingehn. — Verwachsung der Höhlenwände kommt nur selten vor, und zwar in Folge eines entzündlichen Zustandes und einer von den Umgebungen aus wirkenden Zusammendrückung. — Einigermassen gehören auch hierher die polypösen Gerinnungen in den Blutleitern, welche bisweilen nach heftigem Hirnleiden, ohne weitere Abnormität des Gehirns, so bedeutend gefunden werden (Nr. 302.), daß wir wohl berechtigt sind, ihre schon während des Lebens erfolgte Bildung anzunehmen. Callisen (Sammlg für Wundärzte II. S. 148.) öffnete bey einer Schädelwunde die Schläfenarterie und den Sichelblutleiter; das Blut aus Letzterm gah eine süße, dicke Speckhaut, das aus der Erstern nicht; nach dem Tode fand sich eine polypöse Concretion im Sichelblutleiter, die sich durch die Drosselvenen und obere Hohlvene erstreckte. Diese Polypen setzen theils eine zu starke Entwicklung von Faserstoff, theils eine Neigung zu Trennung des Blutes, welche durch Trägheit und Erschwerung des Blutlaufs unterstützt wird, voraus, und kommen besonders häufig mit einem abnormen Zustande der Gefäßhaut, als Congestion, Entzündung, seröser Ergießung, verbunden vor (Beyträge II. S. 150 — 159).

§. 258. Die Auswüchse der festen Hirnhaut entstehen, indem durch einen chronischen entzündlichen Zustand das Gewebe derselben sich auflockert und durch Gerinnung des daselbst ergossenen Serums in eine schwammige, zellige, faserige, speckige Masse ausartet. Ueber ihren ursprünglichen Sitz ist ein ziemlich unnützer Streit geführt worden. Wie überhaupt in dem Knochen und seiner Beinhaut, so ist auch in dem Schädel und der festen Hirnhaut ein gemeinsames Leben und ein gegenseitiger Verkehr, so daß dieselbe Abnormität bald von dem einen, bald vom andern Theile ausgehen kann. Zuweilen ist also die Diploe des Schädels ursprünglich krank, und die Ausartung pflanzt sich consensuell vermöge der Gefäßverbindung auf die feste Hirnhaut fort, oder diese wird durch die Knochenjauche angesteckt und durch die mechanische Reizung der Knochenzacken in einen Zustand wuchernder Afterbildung versetzt: ich habe einen solchen Fall beobachtet, wo bey einem faustgroßen Schwamme der festen Hirnhaut, der durch den Schädel hervorgetreten war, an mehreren entfernten Stellen der innern Tafel des Schädels kleine Erosionen sich fanden, während die darunter liegende feste Hirnhaut noch ganz gesund war. Aber es leuchtet von selbst ein, und wird auch eben so durch die Erfahrung nachgewiesen, daß die Afterbildung bey gehöriger Plasticität der Schädelsubstanz von der festen Hirnhaut ausgehen kann. Dies ist namentlich der Fall nach Schädelbrüchen, wo die feste Hirnhaut durch die Hirnbewegung gegen den scharfen zackigen Knochenrand getrieben wird. Wenn das Aftergebilde hier schon einige Wochen nach der Verwundung sich erzeugt, so entsteht es dagegen erst nach mehreren Monaten oder Jahren, wenn es auf einer durch die Erschütterung bewirkten Störung des Bildungsherganges beruht. Auch können verschiedene Cachexien, Syphilis, Gicht, Quecksilberkrankheit, Unterdrückung normaler Secretionen u. s. w. den Grund dazu abgeben. Indem diese Aftergebilde besonders in der äußern Fläche der festen Hirnhaut ihren Sitz haben, so wirken sie weniger auf das Gehirn, als auf den Schädel; sie durchbohren ihn allmählig, heben das Perikranium mit der Kopfhaut empor, und erweitern es zu einer Bruchsacke, der endlich berstet und eine scharfe Jauche ergießt. Werden sie aufgeschnitten, oder gekitzt, oder sonst in Eiterung gesetzt, so pflanzt sich die dadurch gesetzte Entzündung und die durch den Zutritt der Luft beförderte Entmischung auf das Gehirn fort (Beyträge II. S. 58—92.).

§. 259. Die Knötchen (Granulationen, Tuberkeln, Pacchionische Drüsen) sind davon wesentlich verschieden, da sie ihren Sitz in den plastischen Häuten, gewöhnlich in der an der festen Hirnhaut angehefteten Hälfte der Spinnwebhaut, seltner an der andern Hälfte derselben, und noch seltner in der Gefäßhaut haben. Sie sind kugelige, kleine, aber meist zahlreiche, eyweißstoffige, sehr selten in eigenen Bälgen eingeschlossene Gerinnungen, welche durch passive Congestionen und Trägheit des Bildungsherganges entstehen, anfangs weich sind, allmählig fester werden, selten verknöchern; gewöhnlich graben sie sich ein Bett in der festen Hirnhaut und im Schädel (Beyträge II. S. 165—172. 292—295.).

§. 260. Die Aftergebilde in der Hirnsubstanz entstehen 1) am häufigsten als späte Folgen von Hirnerschütterung, mehrere Monate oder Jahre nach einem Falle (Nr. 882. 891. 930. 934. 943. 953. 1042), oder Schläge (Nr. 888. 928. 989. 1016. 1022. 1023.

1033.), oder Stöße (Nr. 1024. 1040.), selten nach einer eindringenden Hirnwunde (Nr. 968); 2) dann sehr häufig bey allgemeinen Abnormitäten des Bildungsorganes, namentlich mit Neigung zu abnormen Gerinnungen, vorzüglich bey skrophulöser Diathese (Nr. 923. 941. 993. 996. 1004. 1026.), wo sie mit verhärteten Gekrösdrüsen (Nr. 944. 998.) oder Bronchialdrüsen (Nr. 1008.) vorkommen und mit denselben sogar im Aussehen übereinstimmen; selten bey Syphilis (Nr. 949.); 3) nach Unterdrückung normaler oder gewohnter Secretionen, heftiger Erkältung im Wasser (Nr. 924.), Eintauchen des Kopfs in kaltes Wasser nach Erhitzung (Nr. 1039.), Vertreibung von Hautausschlägen (Nr. 942.), Zuhellung von äussern Geschwüren am Kopfe (Nr. 1007.), Unterdrückung von Hämorrhoiden (Nr. 1002.) u. s. w. Oestern sind mehrere von der Grösse einer Erbse bis einer Haselnuss im Gehirne zerstreut; häufig kommen sie einzeln vor bis zur Grösse einer Walnuss oder eines Gänseeys. Sie sind gelblich, oder grau, oder rüthlich, oder schwarzroth, oder brüunlich. Eben so verschieden ist ihre Consistenz: bald sind sie fest, von gleichförmiger Masse, selbst knorpelähnlich, bald weich, schwammig, speckig, oder mit einer serösen, oder fettigen, oder breyigen, oder blutigen, oder eiterigen Flüssigkeit gefüllt. Man kann daher auch zwischen ihnen und den umschriebenen Verhärtungen, Erweichungen, Eiterungen und Höhlungen keine bestimmten Gränzlinien ziehen, und zwar um so weniger, da alle diese Entartungen in den Krankheitszufällen, welche sie erregen, nicht wesentlich von einander sich unterscheiden. Bald sind sie ohne Balg und offenbare Entartungen der Hirnsubstanz selbst, wo man sie Scirrhen oder Krebs zu nennen pflegt; bald haben sie einen aus einer dünnen Haut gebildeten Balg, lassen sich leicht ausschälen, und scheinen neue Bildungen, die sich zwischen den Hirnfasern erzeugt haben, zu seyn, in welchem Falle man sie Balgeschwülste, Tuberkeln, Knoten nennt. Haben sie eine gewisse Grösse erreicht, so findet man die umgebende Hirnsubstanz meist entzündet, erweicht, oder eiternd; auch gehen sie selbst in Eiterung über.

§. 261. Der Hirnschwamm besteht in zwey wesentlichen Momenten, einmahl einer wuchernden Ansartung der Hirnsubstanz, bedingt durch abnorme Congestion mit geschwächter Bildungskraft in Folge äusserer Gewaltthätigkeit; zweytens in einem Prolapsus derselben, abhängig von dem Mangel der natürlichen Begränzung durch feste Hirnhaut und Schädel, und befördert durch die aufsteigenden Bewegungen des Gehirns. Beyde Momente müssen mit einander verbunden seyn, wenn die Abnormität den Nemon des Hirnschwammes verdienen soll; aber das Zeitverhältniß der Entstehung Beyder kann verschieden seyn. Gewöhnlich ist durch die Verletzung selbst die äussere Bedingung des Prolapsus zuerst gegeben, und der Hirnschwamm tritt bisweilen schon am zweyten (Nr. 1052.) oder vierten (Nr. 26.) Tage nach der Verwundung des Schädels und der festen Hirnhaut hervor, gewöhnlich aber erst nach acht Tagen bis drey Wochen, also zu einer Zeit, wo schon eine entzündliche Erweichung der Hirnsubstanz, eine Erschlaffung der Gefäße und eine Tendenz zu regenerirender Bildung, welche wegen des Mangels der Schädeldecke ihre natürliche Beschränkung entbehrt, Statt findet. In seltenen Fällen (Nr. 1050. 1051.) entsteht die Ansartung der Hirnsubstanz in der zweyten Woche unter der unverletzten festen Hirnhaut, und bahnt sich einen Weg durch dieselbe, indem dieselbe reißt oder erweicht und dann zerissen wird. Der Hirnschwamm ist oft mit Eile-

rung in der Tiefe des Gehirns verbunden, und entsteht besonders, wenn eingedrungene Knochensplitter oder andre fremde Körper eine anhaltende Congestion oder Entzündung verursachen, wie man denn zuweilen die Gefäße in seiner Nähe ausgedehnt, sehr roth und wie gequetscht ersiehend, findet. Er wächst sehr schnell, so daß er bisweilen binnen 24 Stunden die Größe eines Hühnereys erreicht, ist graulich, gelblich, bisweilen dunkel gefärbt; meist weich, stinkend, oder ergießt eine übelriechende Flüssigkeit. Zuweilen fällt er von selbst ab, indem seine Grundfläche verflüssigt wird. Ist der Bildungshergang geregelt, unter Andern durch Entfernung des fremden Körpers, so erfolgt nach seiner Entfernung die Verheilung. Wird er abgeschnitten, ohne daß die abnorme Reizung und Congestion beseitigt ist, so wuchert er immer wieder von Neuem hervor, und die eiterige Entartung und Auflösung breitet sich immer weiter über das Gehirn aus. Aetzmittel, auf den Schwamm gebracht, erregen Hirnentzündung.

§. 262. Verknöcherungen und erdige Concretionen kommen theils im Gewebe der festen Hirnhaut, theils in dem dieselbe überziehenden, oder in dem an die Gefäßhaut gehefteten Blatte der Spinnwebenhaut vor, besonders bey alten Leuten und nach anhaltenden Congestionen; vielleicht mochten sie in dem einen Falle (Walters Museum S. 136.) durch die Gewohnheit, den Rausch durch Eintauchen des Kopfs in kaltes Wasser zu vertreiben, veranlaßt worden seyn. Diese Knochen sind bald flach, schuppenförmig, bald kuglich; bald sitzen sie gestielt auf der Spinnwebenhaut, bald liegen sie platt auf, und sind entweder angewachsen oder auch ganz frey. Am Scheitel und in der Nähe der Mittellinie kommen sie am häufigsten vor. (Beyträge II. S. 22—51. 245—249.) — Selten finden sie sich in der Hirnsubstanz selbst. Bey dem Rindvieh hat man öfters Knochenmassen in der Schädelhöhle gefunden, welche dem Gehirne nur einen kleinen Raum übrig ließen; man hielt sie vormals für Verknöcherungen der Hirnsubstanz selbst, erkennt sie aber jetzt ziemlich allgemein für Knochenanswüchse des Schädels an.

§. 263. Die Hydatiden haben ihren Sitz in den plastischen Häuten an der peripherischen Oberfläche, oder in den Hohlen, besonders an den Gefäßgeflechten, und kommen nicht selten gleichzeitig mit Hydatiden an andern serösen Häuten vor. Sie sind entweder zwischen zwey Klappen befindliche Ausdehnungen von Saugadern, oder neu gebildete Blasen, welche entweder bloß Wasser, oder auch Eutozoen (*Cysticercus*, *Anthrocephalus*, *Cornutus*, *Echinococcus*) enthalten, oder auch bloße Ausdehnungen jener Häute durch darunter ergossene Flüssigkeiten. Bisweilen scheint die Unterdrückung der Ausdünstung (Nr. 1059), eines Kopfausschlags (Nr. 1065.), oder des Podagras (Nr. 1076.), bisweilen eine äussere Gewalt (Nr. 1063. 1060. 1066.) ihre Entstehung veranlaßt zu haben.

II. Verkehr mit dem Leibesleben.

§. 264. Wir wenden uns nun zu Betrachtung des Verkehrs, in welchem das Gehirn ohne Mitwirkung der Seele zum übrigen Leibe steht, und beobachten, um auch hier die einzelnen Momente schärfer aufzufassen, zuerst den lebendigen Einfluß des Leibes auf das Gehirn, (§. 263^b—281.), dann den des Letztern auf den Ersten (§. 282—351.).

1. Einfluss des Leibeslebens auf das Hirnleben

§ 265. Bey kopflosen Misgeburten fehlt das Herz in der Regel ganz, und ist, wenn es sich vorfindet, abnorm gestaltet. Dies bezeichnet indessen bloß die weiteste Verbreitung der Abnormität bey dieser Art von Mißbildung, indem dabey zuweilen auch das Pfortadersystem, oder das ganze Venensystem, oder auch alles Blut fehlt und statt desselben bloß Serum vorhanden ist, beweiset aber keinesweges, daß das Herz die Bedingung für das Daseyn des Gehirns ist. Denn erstlich bildet sich der Keim des Gehirns früher, als das Herz (§ 223.), und sodann kann es sich auch vollständig entwickeln bey fehlendem Herzen (Brodie in Reils Archiv XII. S. 393.), wenn nur Gefäße vorhanden sind, welche ihm Blut zu seiner Ernährung zuführen. Der Mangel dieser Gefäße kommt aber allerdings mit mangelhafter Entwicklung des Gehirns gleichzeitig vor, und kann dieselbe in einzelnen Fällen wohl auch begründen. Bey manchen Hemicephalen endigt nämlich die Wirbelarterie blind (Nr. 639.) und die Basilararterie fehlt (Nr. 618.), oder es fehlt ausserdem auch die innere Carotis (Nr. 617.); so sah auch Busatière, daß beyde Arterien fehlten, und Knackstädt, daß die innere Carotis an ihrem Canale in seine Zweige sich endigte, welche zu den weichen Theilen des Halses sich verbreiteten. Uebrigens sind bey dieser Monstrosität auch die Blutleiter mannichfaltig verändert, und ihre Reste auf die Grundfläche des Schädels beschränkt, da der Wölbungstheil fehlt. — Serres (E p. LXXXIX. seqq.) hat es nachgewiesen, daß die Entwicklung jedes Hirnthells mit der Entwicklung seiner Arterien übereinstimmt. Indem wir diese Thatsache anerkennen, dürfen wir nur nicht glauben, daß dadurch die Entwicklung des Gehirns erklärt werde: diese ist durch das Daseyn von Arterien zwar bedingt, aber nicht darin gegründet. Denn 1) auf jeden Fall könnte die Gefäßvertheilung nur der nächste Grund der Hirnbildung seyn, und müßte selbst von einem höhern Grunde abhängen; wir wären also mit der Erklärung noch nicht am Ende. 2) Diesen höhern Grund könnten wir doch wohl nur in einem Vermögen und Streben des Bluts, sich in eine Mannichfaltigkeit von Theilen zu entwickeln, suchen: aber ein solches Streben können wir zwar in Beziehung auf Hirnsubstanz gegen die übrige organische Masse anerkennen, jedoch schwerlich auf die Bildung der einzelnen, in der Masse einander gleichen, bloß in der Form abweichenden Hirnthelle ausdehnen. 3) Das Gehirn bildet sich nach einem eignen Typus aus, welcher durchaus nicht, wie es bey den Drüsen und drüsigen Eingeweiden der Fall ist, der Verästelung der Gefäße entspricht. 4) Der erste Umriss des Gehirns bildet sich aus dem thierischen Urwasser (§ 223.); dieser Krystallisationskern wird sich nun durch eigene Macht in verschiedene Gegensätze entwickeln; die so entstandnen mannichfaltigen Brennpuncte werden das Blut an sich ziehen, um Stoff zu ihrer materiellen Ausbildung zu gewinnen: dadurch wird die Verbreitung der Gefäße bestimmt werden, anderseits aber auch die Bedingung für die Ausbildung der Hirnthelle abgeben.

§ 266. Im gesunden Zustande bemerkt man eine gewisse Turgescenz am Gehirn, welche auf der Blutmenge, auf der lebendigen Expansion seiner Gefäße und auf der Elasticität seines Dunstes beruht. Wenn es während des Lebens aus einer Schädelwunde hervorragt, so findet man es nach dem Tode eingesunken (Nr. 26. 1056; und Täubeler p. 15);

und Schwämme der festen Hirnhaut senken sich und werden flach, wie die Lebensthätigkeit, z. B. in Folge hitziger Fieber (Büttner's Wahrnehmungen S. 157) abnimmt. Umgekehrt sieht man, daß bey verstärktem Kreislaufe z. B. durch geistige Getränke (*anod. de chir. II* p. 150) das Gehirn anschwillt und aus der Schädelwunde stärker hervortritt. Wie das plastische Leben überhaupt an einen gewissen Rhythmus gebunden ist, so mag auch die Turgescenz des Gehirns periodisch sich verändern: daß aber diese Periodicität mit dem Monatswechsel zusammenhänge und daß das Gehirn während des Vollmonds anschwellt, wie Hippocrates, Galen, und mit ihnen Massa, Fallopi, Fernel, Highmor, Schneider und Andre behaupteten, ist ungegründet, wie schon Diemerbroeck (*Nb. III* c. 5. p. 341.), und Morgagni (*LI, 10. advers. VI, 84*) bewiesen haben. — Uebrigens kann die plötzliche Verminderung der Blutmasse durch einen Aderlaß, wie in andern Theilen, so auch im Gehirne, die Resorption ergoloner Flüssigkeit begünstigen.

§. 267. Das Blut wird durch den Herzschlag mit einer nicht unbedeutenden Gewalt gegen das Gehirn getrieben. Nach der Enthauptung sieht man das Blut aus den Kopffartien in vier Bogen einige Fuß hoch spritzen (Klein in Elvert über ärztliche Untersuchung des Gemüthszustandes S. 77). Bey heftigem Fieber wird bisweilen der Kopf bey jedem Pulschlage sichtbar bewegt, wie dies z. B. Haller (*stem. IV* p. 118.) an sich selbst erfuhr. Bey Hypertrophie des Herzens entsteht häufig Blutergießung und Erweichung im Gehirne (Bricheteau *de Journ. complet. IV* p. 23), zur Karditis tritt bisweilen Meningitis hinzu, und durch eine gleiche Congestion können Aneurismen des Herzens mit Verdickung der Aortenkammer zu Hirnentzündung disponiren (Lallemand I. p. 222), so wie auch die Störung des Blutlaufs in der rechten Hälfte des Herzens zu Blutergießungen im Gehirne Anlaß geben kann (Abercrombie S. 139. fg.). Die in solchen Fällen Statt findenden Congestionen in der Gefäßhaut sind bey Leichenöffnungen unzweydeutig erschienen (Beyträge II. S. 266 fg.).

§. 268. Das lebendige Gehirn zeigt ein rhythmisches Erheben und Sinken. Diese schon dem Hippokrates bekannte Bewegung wurde zuerst von Galen (*de usu part. Nb. VI* c. 13. p. 153.) als eine fortdauernde Lebenserschauung bestimmter anerkannt, während Plinius (*hist. nat. Nb. XI* c. 37.) behauptet hatte, daß sie zwar bey Kindern, nicht aber bey erwachsenen Menschen und Thieren vorkomme. Fallopi (p. 412. 429) konnte sie nicht sehen, und leugnete sie deshalb, und weil das Gehirn keine Muskelfasern habe. Riolan (*anat. c. 47* p. 158.) meynete, sie trete bloß im krankhaften Zustande ein, wo etwas Schädliches auszustoßen sey, bey dem Niesen, bey Epilepsie und Convulsionen. Portal (*anat. IV* p. 67.) behauptet ebenfalls, das Gehirn könne in seinem Normalzustande, dicht vom Schödel eingeschlossen, sich nicht bewegen: aber schon du Laurens (*Nb. X* c. 20. p. 547.) erkannte einigen freyen Raum zwischen den beyden Häuten der Spinwebenhaut an, und Schlichting (*mem. présentés I* p. 114.) erwieß ihn daraus, daß Luft bey dem Einathmen in die trepanirte Schädelhöhle dringt, die bey dem Ausathmen wieder in Blasen hervortritt; daß eine Sonde in diesem Raume sich leicht hin und herschieben läßt, und daß oft eine große Quantität ergoloner Blut sich hier anhäuft. Auch sah Ravina (Neckels Archiv III. S. 122) deutlich, wie das Gehirn eines Hundes bey dem Sinken so weit vom Schödel sich entfernte, daß man eine Schreibfeder dazwischen bringen konnte. — Rufus von

Ephesus und Andrei. (*Galenus de different. puls. c. 2. p. 64.*) schrieben die Bewegung bloß der festen Hirnhaut, Vesal (II. p. 830.) bloß den Gefäßen derselben zu; Bagliv und Pacchioni betrachteten diese Membran als das Herz des Gehirns, und meynten, sie drücke dasselbe durch ihre Muskelkraft zusammen, worauf es sich von selbst wieder ausdehne. Aber bey genauerer Untersuchung sah man die Bewegung des Gehirns selbst nach Entfernung der Hirnhäute (*Bartholini anat. lib. III. c. 2. p. 309.*) und Pacchioni nahm späterhin seine Meynung zurück (*Haller elem. IV. p. 179.*) — Uebrigens schätzte Eusebius Sgnari (*Comment. Lips. III. p. 611.*) die Kraft, womit das Gehirn aufsteigt, bey einem erwachsenen Menschen auf 46 Pfund. — Galen (*de usu part. lib. XIII. c. 8. p. 201.*) schrieb bloß dem Gehirn Bewegung zu; und sprach sie dem Rückenmarke ab. Bloß-hypothetisch nahm Piccolomini (p. 260.) an, daß auch das Rückenmark eine Systole und Diastole haben müsse, um die vom Gehirn empfangenen thierischen Geister in die Nerven treiben zu können. Diemerbroeck (*lib. III. c. 5. p. 346. c. 7. p. 356.*) und Vicussens (p. 141.) schlossen ebenfalls der Analogie nach; und wiewohl Haller (*elem. IV. p. 89.*) keine Bewegung am Rückenmarke bemerken konnte, hielt Peter Frank (*Sammlg. auserl. Abhgg. XV. S. 295.*) es für wahrscheinlich, daß das Athmen hier eben so wirkte, wie auf das Gehirn, da langes Anhalten des Athems eine Congestion im Rückenmarke verursache und auch eine Apoplexie desselben bewirken könne. Portal (*anat. IV. p. 66.*) hat endlich bey einem Kinde mit *Spina bifida*, so wie bey jungen Hunden und Katzen gesehen, daß die Bewegungen des Gehirns, wenn sie stärker sind und dem Athmen entsprechen, sich über den obersten Theil des Rückenmarks bis zum dritten Halswirbel erstrecken. — Nach Magendie (*Journal I. p. 200. sqq.*) soll auch der untere Theil des Rückenmarks eine dem Athmen entsprechende Bewegung zeigen. Lorry schrieb die Bewegung bloß dem großen Hirne zu; Haller (*opusc. I. p. 135. exp. 255. — 259.*) und Ravina (a. a. O. S. 129.) zeigten, daß sie auch am kleinen Hirne Statt findet. Schlichting und Ravina sahen sie auch ununterbrochen vor sich gehen, wenn sie die Rinde abgeschnitten und eine bedeutende Menge Hirnsubstanz weggenommen hatten.

§. 269. Das Aufsteigen geht von der Basis aus, und der sich erhebende Hirnstamm muß davon mehr agitiert werden und weiter in die Höhlen hereintreten, während die Decke derselben bloß eine schwache Erschütterung erfährt, da sie auch nicht so frey sich bewegen kann, sondern mehr Widerstand findet am Schädel. Indem aber das Gehirn bey seinem Erheben gegen den Schädel sich drängt, bestimmt es die Bildung desselben im Ganzen, wie es dann auch im Einzelnen den Randwülsten entsprechende Eindrücke an der innern Schädelfläche hervorbringt. Daher wirken ferner Geschwülste innerhalb der Schädelhöhle meist mehr nach aussen, als nach innen, und durchbohren oft den Schädel. Daher heben sich eingedrückte Stellen des Schädels von selbst, und zwar um so früher und vollständiger, je lebhafter die Bewegung des Gehirns und je nachgiebiger der Knochen ist; wie denn selbst die Fülle beobachtet worden sind, wo die Schädelfknochen plötzlich und mit einem vernünftlichen Geräusche aufstiegen (I. G. Oberteuffer *de enthalci cranii sponte restituta. Argentor. 1771. 4.* — Leidig in Jäger II. S. 76. fgg.). Daher schafft der Aderlaß durch Verminderung der Hirnbewegung Erleichterung, wenn an der festen Hirnhaut spitzige Knochenauswüchse sich finden, z. B. in dem von Humauld (*academie de Paris 1734.*

p. 44.) beobachteten Fälle. Daher endlich können durch heftige und anhaltende Congestion des Bluts nach dem Gehirne selbst die Suturen auseinanderweichen: dies war der Fall bey dem siebenjährigen Ramazzini (Morgagni *op. III. art. 8. 9.*) und bey Pascal (Palfyn *anat. chirurg. p. 75.*), nachdem sie an heftigen Kopfschmerzen gelitten hatten, wie denn Bonet (*med. septentr. lib. II. sect. 2. c. 10.*) van der Wiel (p. 2.), Fabrız von Hilden (p. 145.), Sennert (*lib. I. pars 1. c. 2. p. 52.*) Joubert und Andre dergleichen Fälle beobachteten, wo zum Theil nach dem Aufhören der Schmerzen auch die Suturen sich wieder vereinigten. Bauhin beobachtete, daß die nicht verknöcherte Fontanelle einer Frau bey Kopfschmerzen anschwellt.

§. 270. Die Bewegung des Gehirns sollte nach Hippokrates (*de morbo sacro sect. 8. p. 333.*) von der in die Hirnhöhlen dringenden Luft, nach Landi (p. 53.) von den aufsteigenden warmen Dünsten, und nach Riolan (*enchirid. lib. IV. c. 2. p. 250.*) von den sich entwickelnden thierischen Geistern herrühren. Galen (*de odoratus. instrumento c. 4. p. 111. c. 6. p. 112.*) glaubte, das Gehirn müsse, da es andre Organe in Bewegung setze, auch sich selbst bewegen können, und so wie andre Organe anziehende und abstoßende Kraft haben; ihm folgend nahmen denn auch Columbus (*lib. XIV. p. 258.*), Piccolomini (*lib. V. lect. 3. p. 255.*), da Laurens (*lib. X. c. 10. p. 547.*) und Andre an, daß es sich, wie das Herz, durch eigene Kraft bewege. Allein sobald man sorgfältiger zu beobachten anfang, mußte man diese Meynungen aufgeben und erkennen, daß die Bewegung des Gehirns vom Blutlaufe abhängig ist. Das Blut kann nun aber entweder von innen her durch Ausdehnung des Gehirns, oder von den am Umkreise desselben liegenden Gefäßen aus diese Bewegung bewirken. Erstes war die Meynung von Highmor (*lib. III. pars 1. c. 9. p. 224.*) und Littre (*acad. de Paris 1707. p. 168.*): allein wiewohl eine solche Turgescenz allerdings Statt finden muß, so ist sie doch schwerlich bedeutend genug, um diese lebhaft, sichtbare Bewegung bewirken zu können, indem die Hirnsubstanz nur von feinen Haargefäßen durchzogen wird, in welchem kein solcher Wechsel von Diastole und Systole vorkommt. Die peripherischen Gefäße müssen also die Hirnbewegung hervorbringen. Daß die Venen dies nicht vermögen, soll unten (§. 273.) gezeigt werden. Nur die Arterien sind es im Stande, durch Fortpflanzung des vom Herzen empfangenen Impulses: Schon zu Galens (*de differentia pulsuum c. 2. p. 64.*) Zeiten war dies von einigen Physiologen anerkannt; Marchettis (p. 118.), Willis (*cerebr. p. 118.*), Vieussens (c. 6. p. 41.) und die meisten Neuern überzeugten sich davon. Die Gründe dafür sind folgende: a) Alle andern Organe werden durch den arteriösen Blutstrom mechanisch agitiert, und entweder in eine innerliche Schwingung gebracht (Treviranus Biologie V. S. 261. fgg.) oder im Raume sichtbar bewegt, und ihre lebendige Thätigkeit wird mit durch diese Agitation bedingt (Bichat *recherches p. 188. sqq.*). Wo wesentlich gleiche Erscheinungen sind, müssen auch gleiche Ursachen zum Grunde liegen. b) Die Bewegung des Gehirns ist gleichzeitig mit dem Pulschlage; bey der Diastole der Arterien steigt es, bey der Systole derselben senkt es sich herab. Es steht also in seinen Bewegungen in geradem Verhältnisse zu den Arterien, und in umgekehrtem zum Herzen. Dies beobachtet man an den Fontanellen gesunder Kinder, z. B. (Bartholinus *lib. III. c. 2. p. 305.* Ravina a. a. O. S. 121.) an dem durch Trepanation oder anderweiligen Verlust von Schädelsubstanz bloßgelegten Gehirne

von Menschen (z. B. Ioh. Gamba präst. *Salomans de mira cranii fractura in homine per 40 annos exsuperata. Argentor.* 1718. 4. Richerand in med. Annalen 1803, S. 241, Walther in med. chirurg. Ztg. 1816. II. S. 29. Klein S. 139.) und Thieren (z. B. Lorry a. a. O. p. 301. fig. Halleri opera L. p. 131.), an Hirnschwämmen und Hirnhautschwämmen (z. B. Ravina S. 120.). c) Die Stärke der Hirnbewegung entspricht der jedesmaligen Stärke des Herzschlags und ändert sich mit dieser. Schon Diemerbroek (*lib. III. c. 5. p. 345.*) sah, daß, je nachdem der Puls klein oder groß, selten oder häufig war, auch die Hirnbewegung gleiche Verschiedenheiten zeigte. Eben so ist es schon längst beobachtet worden, daß sie bey dem Sinken der Lebenskräfte und des Pulses aufhört, und bey eintretender Besserung wieder erscheint (Bartholinus *lib. III. c. 2. p. 309.*); daß sie während einer Ohnmacht aussetzt (Schlichting a. a. O. p. 116.), und bey vermehrtem Andrang des Bluts nach dem Kopfe, z. B. bey Rausche (Hunauld *in acad. de chir. II. p. 150.*) verstärkt wird. Wenn man eine Arterie öffnet, so nimmt die Bewegung des Gehirns in dem Maasse ab, als die Quantität des anströmenden Bluts und die Energie des Herzschlags sich vermindert (Bichat *recherches* p. 175.). d) Nach Unterbindung oder Durchschneidung der Carotiden hört bisweilen die Hirnbewegung auf, und stellt sich nach Wegnahme der Unterbindung wieder ein (La Mure in *Frorieps Biblioth. für vergl. Anat. I. S. 395.* Wedel *physiologia* c. 3. p. 51.). In andern Fällen dauert sie dabey fort (La Mure a. a. O. S. 398.), wiewohl geschwächt (Richerand a. a. O.), weil die Wirbelarterien noch wirken. Unterbindet oder durchschneidet man diese ebenfalls (La Mure a. a. O. S. 400. Bichat *recherches* p. 171.), oder unterbindet man die aufsteigende Aorta (Richerand a. a. O.), so hört die Bewegung sogleich auf. e) Wenn man an einem Leichname nach Entfernung der Schädeldecke Luft oder Wasser in die Carotis spritzt, so erhebt sich das Gehirn (Haller *elem. IF. p. 176.* Richerand a. a. O.).

§. 271. Was nun den Mechanismus dieser Bewegung betrifft, so finden wir, daß a) die Arterienstämme an der Grundfläche des Gehirns, wo dasselbe aufricht, liegen, und nicht sogleich, wie in andre Organe, in die Hirnsubstanz eindringen, sondern zuvor in ein starkes Netz sich ausbreiten, welches in Flächenberührung mit dem Gehirne steht und dasselbe aufzuheben geeignet ist. b) Jedes allgemeine Gebilde nimmt in der Nähe eines besondern Organs etwas von dessen Eigenschaften an: wo nur immer das Leben zu einer eigenthümlichen Function sich steigert, eignet diese durch ihre Herrschaft sich alles Umgebende an; und drückt ihm ihr Gepräge auf. Wie demnach die Arterien in den willkührlichen Muskeln eine stärkere Faserhaut gewinnen, so verlieren sie am Gehirne ihre fibröse Natur fast gänzlich und erhalten zartere Wendungen: mithin muß der mechanische Impuls der Blutwelle auf das Gehirn stärker seyn, als auf irgend ein andres Organ. c) In der innern Carotis strömt das Blut nach hinten und oben, in der Wirbelarterie nach vorne und oben; indem Beide schon in ihren Stämmen sich unter einander verbinden, begegnen sich die entgegen gesetzten Blutströme, und ihre gemeinschaftliche Wirkung muß ihre Richtung in der Diagonale, nach oben, nehmen und das Gehirn erheben. d) Die Krümmungen der Hirnarterien sollten nach Galen (*de usu part. lib. IX. c. 4. p. 172.*) den Zweck haben, daß die Geister länger verweilen und mehr ausgearbeitet würden. Willis (*ser. c. 8 p. 39.*) schrieb ihnen die Bestimmung zu, den Blutandrang zum Gehirne zu mässigen, und diese

Meynung hat sich bis auf unsre Zeit erhalten. Allein 1) zu geschweigen; dafs, wenn die Arterien, wie man jetzt behauptet, immer gleich gefüllt blieben, die Stärke des Blutandrangs durch Krümmungen durchaus nicht vermindert werden könnte, so beweisen auch Bichats (allg. Anat. I. 2. Abtheil. S. 21. fgg.) Beobachtungen, dafs eine solche Schwächung nicht bemerklich ist: 2) Andre Beobachtungen (§. 392.) werden uns überzeugen; dafs die Natur darauf ausgeht, bey höherer Entwicklung des Gehirns auch stärkern Blutandrang und dadurch lebhaftere Bewegung und Thätigkeit dieses Organs zu bewirken: damit würde nun ein solches anhaltend und immer gleich wirkendes Moment zur Hemmung des Blutandrangs in offenbarem Widerspruche stehn. 3) Der Carotidencanal fehlt bey den Nagethieren gänzlich, und ist bey den Raubthieren kurz und gerade, ungeachtet die Hirnbewegung bey jenen äusserst gering, und hey diesen wenigstens viel schwächer ist, als bey dem Menschen. — Die innre Carotis trifft zuerst scheitelrecht auf das Felsenbein, heugt sich dann um, und verläuft in demselben wagerecht, indem sie ihren Knochen canal gänzlich ausfüllt und mit seiner Beinhaut fest verwachsen ist. Die während der Systole des Herzens verstärkte Blutwelle kann also hier die Arterie nicht erweitern, sondern muß, da sie gegen die Knochenwand prallt, eine Schwingung im Schläfebeine hervorbringen, welche sich nicht nur über den übrigen Schädel, sondern auch über das Gehirn verbreitet. Bey übermäßig verstärktem Blutandrang ist diese Wirkung sichtbar (§. 267.); im Normalzustande besteht sie wahrscheinlich in einem gelinden Erbeben und einer mechanischen Erregung des Gehirns. — Die Carotis tritt scheitelrecht aus dem Knochen canale, ohne weiter an den Schädel geknüpft zu seyn, unter die Ausspannung der festen Hirnhaut an der Seite des Sattels, läuft wagerecht nach vorne, ragt dann scheitelrecht hervor, trifft so auf das Gehirn, und beugt sich wagerecht unter ihm nach hinten. Die Wirbelarterie, die an keinen solchen Knochen canal geknüpft ist, verläuft ebenfalls gewunden. Diese Krümmungen müssen nun durch ihre Streckung theils, wenn auch nur schwach, vermittelt der Anspannung der festen Hirnhaut, theils unmittelbar das Gehirn heben. Denn bey der Diastole werden die Arterien durch die Blutwelle mit fortgetrieben, strecken sich in die Länge nach dem Organe hin, welches Blut von ihnen empfängt, und hewegen dasselbe, unter der Bedingung, dafs sie während ihrer Systole gekrümmt liegen, und deshalb bey ihrer Diastole sich stärker strecken können. Bey ihrer Systole legen sie sich wieder in ihre Krümmungen zusammen, und das Gehirn senkt sich herab, während es jetzt mehr Blut verliert, als empfängt, indem die Arterien weniger zuführen und die Venen freyer wirken. Somit sind denn die Krümmungen der Hirnarterien ein Mittel, den mechanischen Einfluß des Herzschlags zu verstärken, und geben das Hauptmoment für die Bewegung des Gehirns ab. Der Augenschein hat mich von dieser Wirksamkeit überzeugt. Ich hing einen vom Rumpfe getrennten Kopf, nachdem die Wirbelarterien unterbunden und in die Carotiden Röhren eingesetzt waren, die Schädeldecke aber in einige concentrische Ringe zersägt war, in einem schicklichen Gestelle aufrecht auf, nahm dann nach und nach die einzelnen Stücke der Schädeldecke ab, und ließ gleichzeitig in heyde Carotiden stofsweise Wasser einsprützen. Bey jedem Stofs hob sich das ganze Gehirn zuerst mit der festen Hirnhaut, dann nach Durchschneidung und Zurücklegung des Wölbungstheils derselben für sich allein; nachdem der obere Theil des großen Hirns schicht-

weise weggenommen war, sah ich bey jedem Stoße die Erhebung des Hirnstammes, und nachdem ich diesen theils weggenommen, theils auf die Seite gelegt, und die durchschnittenen Arterienzweige großentheils unterbunden hatte, sah ich die innere Carotis mit ihren Zweigen bey jedem Stoße der Sprützen sich strecken und aufrichten, bey dem Abfließen des Wassers aber in ihre Krümmungen zurückkehren. — Während nun auf solche Weise des Gehirn im Ganzen und von aussen her durch die Bluthbewegung angeregt und vom Herzen bestimmt wird, behauptet es sich in seinem Innern freyer und selbstständiger, und seine einzelnen Theile erfahren keinen solchen Andrang, da die Arterien, ehe sie in dasselbe eindringen, in Haargefäße sich auflösen, in welchen die Pulsation und die unmittelbare Herrschaft des Herzschlages aufhört.

§. 272. Was die mechanische Einwirkung des Athmens auf das Gehirn betrifft, so war sie längst bekannt, denn schon Hippokrates rüh, bey Schädelwunden einen Verband anzulegen, damit bey dem Husten und Niesen das Gehirn nicht hervordringe. Nur wurde Galen durch Hypothesen verführt, anzunehmen, das Gehirn dehne sich aus und steige auf bey dem Einathmen, entsere sich dagegen und sinke herab bey dem Ausathmen. Daß vielmehr dem Ausathmen ein Heben, dem Einathmen ein Sinken des Gehirns entspreche, lehren folgende Beobachtungen: a) Man sieht diese Bewegungen bey Menschen, wo das Gehirn durch Trepanation, oder durch Beifraß des Schädels bloßgelegt ist; an den Fontanellen der Kinder (z. B. Abererombie S. 137.); bey dem Gehirnbruche (z. B. Nr. 290.) und an trepanirten Thieren: z. B. Ravina (a. a. O. S. 125.) brachte eine Röhre mit Wasser in die Trepanöffnung, und sah dasselbe bey dem Einathmen sinken, bey dem Ausathmen steigen. b) Bey einem abnormen Zustande des Gehirns fühlen selbst die Kranken diese Bewegung zuweilen: so fühlte z. B. Denhoffer (Nr. 803.), dessen Gehirn nach einer Erschütterung in einem Zustande erhöhten Gemeingefühls sich befand, dasselbe bey dem Ausathmen gegen den Schädel sich erheben und bey dem Einathmen zurückweichen. c) Lamure (a. a. O. S. 396. fg.) sah selbst an toten Thieren, welchen er Luft einblies, das Gehirn sich heben, wie die Lungen sich ausdehnten, und mit ihnen wieder sinken. d) Der Husten vermehrt das Aufsteigen des Gehirns. Man sieht dies unmittelbar bey Schädelwunden (z. B. Klein S. 239.), wobey, wenn die feste Hirnhaut geöffnet ist, das Gehirn auch hervorgetrieben (Schlichting a. a. O. S. 118.), oder in die Schädelhöhle ergossenes Blut oder Eiter ausgestoßen wird (z. B. Nr. 481. Ravina a. a. O. S. 128.). Auf solche Weise verursacht heftiger Husten gewöhnlich Kopfschmerz, der nach geheilten Hirnwunden besonders empfindlich ist. Bey dem Keuchhusten brach in einem Falle (Nr. 301.) die Narbe von einem vor sieben Monaten erlittenen Schädelbruche wieder auf, und es drang ein beträchtlicher Theil des Gehirns heraus. e) Das Niesen wirkt eben so: Lorry (a. a. O. S. 302.) stopfte einem Kaninchen die Nase voll Taback; es erfolgte kein Niesen, aber ein unregelmäßiges Athmen, welchem auch die Bewegung des Gehirns entsprach. f) Die gleiche Wirkung des Schreyens sieht man an den Fontanellen der Kinder und an trepanirten Thieren. Hirnbrüche werden bey dem Weinen größer und gespannt (Nr. 295.). Lorry sah bey einem Kaninchen, so lange es ruhig war, die Bewegung des Gehirns ohne Uebereinstimmung mit dem Athmen vor sich gehn; nachdem das Thier einige Zeit geschrien hatte, trat diese Uebereinstimmung ein,

und dauerte selbst noch eine Zeitlang fort, da es zu schreyen aufgehört hatte: g) Er sah ferner bey dem Erbrechen unregelmäßige Anschwellungen des Gehirns, so wie Ravina (a. a. O. S. 128.) ein Hervortreten desselben aus dem trepanirten Schädel; Goldani beobachtete selbst ein Voneinanderweichen der Schädelknochen von heftigem Erbrechen, und Leny (Nr. 54.) sah davon ein Austreiben von Hirnsubstanz aus einer Schädelwunde. h) Mit dem convulsivischen Einathmen bey'm Schlucken ist nach Ravina's Beobachtung auch ein sehr schnelles Herabstinken des Gehirns verbunden. i) Klein (S. 139.) sah bey einem Kranken, daß, wenn derselbe sehr lange einathmete, das Gehirn völlig aufhörte, sich zu bewegen, indem zugleich der Puls äusserst schwach wurde; erst mit dem dritten Athemzuge fing es wieder an, sich zu heben. Umgekehrt beobachtete Ravina (a. a. O. S. 132.) bey einem Hunde, daß die Bewegung des Gehirns ebenfalls aufhörte, wenn die Lungen durch Einblasen von Luft in beständiger Ausdehnung erhalten wurden. — Die alten Chirurgen bedienten sich schon des starken Ausathmens, um Eiter aus der Schädelhöhle zu treiben, schienen aber dabey auf die Wirkung der ausgestoßenen Luft selbst mit zu rechnen, indem sie zugleich Mund und Nase zuhalten ließen (Marchetti obs. 16 van der Wiel p. 27.). — Wo die gewöhnliche, dem Herzschlage entsprechende Bewegung des Gehirns zu schwach ist, um bemerkt zu werden, da tritt sie bey stärkerem Athmen sichtbar hervor. Dadurch wurden mehrere Physiologen, von Schlichting an bis zu Portal, bestimmt, dieselbe einzig und allein vom Athmen abzuleiten, während schon Oribasius (*liber collect. p. 150.*) beyde Momente anerkannt hatte. Aber nur das starke und angestrenzte Athmen bestimmt das Gehirn. Klein (S. 139.) sah bey häufigen Versuchen an Verwundeten die Hirnbewegung immer nur dem Pulse entsprechen; Lorry (S. 300.) und Ravina (S. 121.) sahen den Einfluß des Athmens bey Thieren nur, wenn diese sich heftig bewegten und anhaltend schrienen; Slevogt (Haller Dispnt. II. p. 83.) und Leny (Nr. 154.) nur bey starkem Schreyen und Husten. Wenn die trepanirten Thiere matt werden, so hört die Hirnbewegung auf, ungeachtet das Athmen nicht unterbrochen ist (Haller *opp. III. exp. 238. p. 132.*). Dadurch wurden Einige verleitet, den Einfluß des Athmens als zweifelhaft darzustellen, wie Bartholin (*lib. III. c. 2. p. 309.*), oder ganz zu leugnen, wie Charleton (*Portal hist. III. p. 84.*). — Uebrigens hat man auch eine dem Athmen entsprechende Bewegung des Rückenmarks bey der Wirbelspalte gesehen: (*Ephem. N. C. Dec. II. ann. 6. obs. 58. Richard in Journ. de med. XXIX. p. 140.*).

f. 273. Die meisten Physiologen leiten diese Bewegungen von dem durch Verengerung und Erweiterung der Brusthöhle gesetzten Verhältnisse des Venenblutes ab: bey dem Ausathmen soll durch Verengung der Lungen der freye Eintritt des Bluts in dieselben gehemmt, und ein Rückfluß gegen das rechte Herz, so wie von da durch die Hohlvene gegen das Gehirn verursacht, dadurch aber Letzteres gehoben werden; bey'm Einathmen sollen die erweiterten Lungen mehr Blut aus dem rechten Herzen aufnehmen, folglich auch die Hohlvenen in dieses vollkommener sich entleeren, und dadurch das Gehirn sinken. Allein a) es ist eine übertriebene Schätzung des Mechanismus; wenn man meynet, die Lungen würden bey'm Ausathmen so stark zusammengezogen oder zusammengedrückt, daß das Blut durch die Lungenarterien, das rechte Herz, die Hohlvene und die Drossel-

vene mit hinlänglicher Gewalt zurückgetrieben würde, um das Gehirn heben zu können: Bichat sah bey künstlicher Entleerung der Lungen durch Ausziehen der Luft mit einer Sprütze, wo dies Organ ungleich mehr zusammenfiel, als bey dem stärksten Ausathmen, doch noch den Kreislauf dasselbst vor sich gehn. b) Auch das lange fortgesetzte Einathmen erschwert endlich den Abfluß des Blutes aus dem Kopfe zum Herzen, müßte also auch ein Aufsteigen des Gehirns bewirken, welches in dem Maße zunehmen müßte, als der Athem langegehalten würde: aber Klein (S. 139.) sah einen Kranken, der den Athem ungewöhnlich lange an sich halten konnte, daß, wenn er so lange einathmete, bis der Puls kaum noch zu fühlen war, das Gehirn eingesunken blieb; wie er aber husten mußte, und somit der Puls sich hob, stieg es wieder. c) Man sieht aber auch keine Möglichkeit ein, wie der Rückfluß des Blutes das Gehirn heben könnte. Dieser Rückfluß verbreitet sich nicht über die Blutleiter hinaus, da man durch Einspritzung nur wenig Flüssigkeit in die Hirnvenen treiben kann (Mouro p. 4.). Nun sind die Blutleiter an der untern Fläche des Gehirns theils zu klein, um dasselbe heben zu können, theils durch die gespannte feste Hirnhaut so eng an den Schädel geheftet, daß sie gar nicht mechanisch auf das Gehirn wirken können; die grössern, obern Blutleiter ober müßten bey ihrer Anfüllung das Gehirn eher zusammendrücken; als aufheben. d) Endlich zeugt auch der Ausgang der angestellten Versuche gegen diese Annahme. Lamure (a. a. S. 402.) sah den Sichelblutleiter bey dem Ausathmen sich füllen, aber erst, als das Gehirn sich bereits gehoben hatte. e) Das Einspritzen in die Drosselvenen brachte anfänglich gar keine Bewegung des Gehirns hervor, während diese nach Einspritzung in die Carotis auf der Stelle erfolgte (Richerand a. a. O. S. 533.). f) Die Bewegung des Gehirns wurde durch Unterbindung der Drosselvenen nicht aufgehoben, und durch nachmolliges Wegnehmen der Unterbindung nicht verstärkt. (Lamure S. 395. Richerand S. 534.). g) Eben so sahen Richerand und Lamure (S. 405. 407.) die Bewegung nach Oeffnung und Durchschneidung der Drossalvenen fortauern. — Wir sehen aus dem Allen, daß der Rückfluß des Blutes bey Störung des regelmäßigen Athmens zwar eine venöse Turgescentz des Gehirns, aber keine normale Erhebung desselben zu bewirken im Stande ist.

§. 274. Um eine richtigere Ansicht dieses Herganges zu gewinnen, müssen wir uns erinnern, daß der Zweck der Functionen das Wesentliche und eigentlich Bestimmende derselben ist, und daß das Leben sich seinen Mechanismus, wie überhaupt schafft, so auch dergestalt einrichtet, daß er dem Begriffe entspricht und als Mittel zu Erreichung des Zweckes dient. Betrachten wir aus diesem Gesichtspuncte A) das Einathmen, so begreifen wir, daß die Lunge dabey mehr Blut braucht, damit solcher in Wechselwirkung mit der eingesogenen Luft trete und dadurch eine höhere Entwicklungsstufe erreiche. a) Wie Brennbares und Zündendes überall einander suchen, so dürften wir vermuthen, daß das schwarze Blut und die sauerstoffige Luft einander gegenseitig anziehen: so lockt bey dem neugebornen Kinde die eingedrungene Luft das schwarze Blut alsbald zu den Lungen. b) Diese chemisch - dynamische Anziehung wird nun vorzüglich unterstützt durch die Erweiterung der Lungen und der gesammten Brusthöhle: das Blut muß stärker zufließen, da es hier einen freyern Spielraum findet. c) Das Blut stürzt also aus

dem rechten Herzen in die Lungenarterien; das aus den Hohlvenen muß folgen, und die übrigen Organe müssen mithin sich mehr entleeren, als füllen. d) Vorzüglich muß diese Entleerung das Gehirn treffen, weil dieses über dem Herzen liegt, die bey dem Einathmen erfolgende Senkung des Herzens und sämmtlicher Gefäßstämme mit dem Zwerchfelle also gerade zusammentrifft mit der Bewegung des Blutes vom Gehirn nach dem Herzen. e) Es ist ein allgemeines Gesetz, daß polarische Theile einander antagonisiren. Wenn nun heym Einathmen das rechte Herz vorwaltend thätig ist, indem es mehr Blut sowohl aus den Hohlvenen anzieht, als in die Lungenarterien anstößt, so muß zugleich das linke Herz verhältnißmäßig unthätiger seyn, weniger Blut aufnehmen und ausströmen. Fühlt man bey starkem Einathmen an das Herz, so findet man, daß sein Schlag fast unmerklich wird; namentlich kann zum Gehirn weniger Blut aufsteigen, da das Herz und die Aorta nach unten streben. Das Gehirn bekommt also einen geringern Impuls von den Arterien, und sendet mehr Blut zurück, als es empfängt, sinkt also herab. B) Bey dem Ausathmen entsteht einerseits ein Bedürfnis der Lungen, sich der mit Kohlensäure überladenen Luft zu entledigen, andrerseits ein Bedürfnis der übrigen Organe, frisches, mit Sauerstoff geschwängertes Blut in sich aufzunehmen. c) Beyden Bedürfnissen wird abgeholfen, indem Lungen und Brusthöhle sich verengern: das Blut, welches hier nicht mehr hinlänglichen Raum findet, strömt nun mit größerer Gewalt durch die Lungenvenen in das linke Herz; und von da weiter durch die Aorta, während die Hohlvenen weniger Blut in das rechte Herz führen. Daß dies mechanische Moment die Gehirnbewegung bestimmt, geht aus den Versuchen von Lamure (a. a. O. S. 398. 402.) und Haller (opp. I. p. 133. exp. 241.) hervor, nach welchen das Gehirn bey äußerlicher Zusammendrückung des Brustkastens aufsteigt, und heym Nachlassen des Druckes sinkt. b) Das von dem frisch gerötheten Blute stärker erregte linke Herz wirkt mit erhöhter Kraft. Öffnet man eine Arterie, so sieht man, daß der Blutsprung bey dem natürlichen Ausathmen, so wie auch bey äußerlicher Zusammendrückung des Brustkastens stärker wird (Magendie zu Bichat p. 313.). c) Indem auf diese Weise alle Organe ausser den Lungen mit mehr Blut gefüllt werden, so erfährt das Gehirn ausserdem noch einen mechanischen Impuls, indem sich seine Arterien aufrichten und ausstrecken, da bey dem Ausathmen das Herz mit dem Zwerchfelle aufsteigt und die Gefäße nach oben gedrängt werden. Man sieht diese Bewegung bey Vivisectionen sowohl an der untern Hohlvene (Haller opp. I. p. 136. exp. 262. p. 140. exp. 279.), als auch an den Carotiden (Perry 4. Versuch u. fgg.). d) Eine nothwendige Folge ist, daß das System der Hohlvenen, da es aus seinen Wurzeln in den mit Blut gefüllten Organen mehr empfängt (c), als es in das rechte Herz und in die Lungen (a) führen kann, mit Blut überfüllt wird. Diese Anschwellung während des Ausathmens sahen Lamure (S. 408.) und Haller (opp. I. p. 138. exp. 262. 265. 268.) an der Hohlvene, so wie schon Valsalva (Morgagni ep. XIX. art. 33.). Allerdings fließt, wie bey jeder Zusammensziehung des Hohlvenensacks, so auch bey dem Ausathmen etwas Blut aus dem Herzen in die Hohlvenen zurück. Daß aber diese Stauung des Bluts nicht die wahre Ursache jener Anfüllung der Hohlvenen ist, hat Magendie (zu Bichat p. 314. fgg.) bewiesen. Wenn nämlich die Drosselvenen unterbunden wurden, und man machte eine kleine Oeffnung oberhalb des Bandes, wohin

also nicht stauendes Blut vom Herzen, sondern bloß abfließendes vom Gehirne gelangen konnte, so floss bey starkem Ausathmen das Blut drey bis vier mal stärker aus, als sonst. Dasselbe erfolgte, wenn eine Schenkelvene unterbunden und unterhalb des Bandes gestochen wurde: also auch in diesen Venen, wo ein Rückfluß aus dem Herzen wegen der Klappen ganz unmöglich ist, häuft sich während des Ausathmens mehr Blut an. Folglich kann überhaupt diese Anhäufung nur davon herrühren, daß bey dem Ausathmen der Kreislauf in den Organen, mit Ausschluß der Lungen, verstärkt wird. — So zeigt sich also bey dem Ein- und Ausathmen ein Gegensatz zwischen den Lungen und dem übrigen Körper, mithin auch zwischen dem rechten und linken Herzen, wie bey der Bewegung des Herzens überhaupt zwischen Venensäcken und Arterienkammern. Bey dem Einathmen werden die Lungen der Brennpunct des Kreislaufs; sie erreichen das Eigenthümliche ihrer Function und concentriren das Leben des Organismus in sich: das Blut strömt von den übrigen Organen stärker zu ihnen, und das Lungenherz ist vorwölbend. Beym Ausathmen hingegen breitet sich das lebendig gewordene Blut über die andern organischen Systeme aus, und das linke oder Körperherz wirkt nun mit besondrer Stärke. Das Ausathmen und die Systole des Herzens treffen also in ihren wesentlichen Momenten zusammen, und das Gehirn steigt dabey herauf, weil es mehr Blut bekommt als frey abfließen kann, und weil die Gefäße sich gegen dasselbe erheben. Eine Stockung des Kreislaufs und eine Ueberfüllung des Gehirns und andrer Organe mit Blut entsteht aber bey jedem lange fortgesetztem Aus- oder Einathmen, weil in beyden Fällen der Wechsel der Luft und die Umwandlung des Blutes gehemmt wird. So werden z. B. durch die Anstrengung bey'm Stuhlgange die Schmerzen von Afterorganisationen im Gehirne unerträglich, so wie dadurch auch in Wunden oder eiternden Stellen in irgend einer Gegend des Körpers ein Gefühl von Hitze und Stechen hervorgebracht wird.

§. 275. Hiernach sind nun die häufigen Erscheinungen des Consensus zwischen den Athmungsorganen und dem Gehirne zu erklären. Bey Ersticken, Erwürgen, Ertrunkenen ist eine Ueberfüllung der Blutleiter, Gefäßgeflechte und übrigen Hirngefäße in der Regel. Eine solche Ueberfüllung kommt auch bey der Blausucht vor (Lentins Beyträge II. S. 73.). Aftergebilde im Gehirne findet man bisweilen gleichzeitig bey ähnlichen Ausartungen in den Lungen (Nr. 1001.), nach Brustwassersucht (Nr. 899.) und Lungensucht (Nr. 1043. 1073.). Bey der Lungenzündung, sie mag nun idiopathisch, durch dynamische Verhältnisse oder durch Verwundung errögt seyn, oder zu andern Krankheitsformen sich gesellen, kommt häufig eine Ueberfüllung der Gefäßhaut mit Blut (Beyträge II. S. 262—268.) oder Meningitis, oder eine Ergießung von Serum und Bildung einer Pseudomembran an derselben (Nr. 879. 880.) vor. Dieselben Zustände der Gefäßhaut finden sich auch öfters nach katarrhalischem und krampfhaftem Husten, Lungensucht, Halsentzündung (Störck I. p. 110. Chambon p. 217. 219. 222. 248. 268. Morgagni XLIV. 3.) u. s. w. Allerdings kann zwar auch die Entzündung andrer Organe eine allgemeine Aufregung des Gefäßsystems zur Folge haben, deren Wirkungen vorzüglich am Gehirne hervortreten. Indessen müssen wir doch eine nähere Beziehung zwischen Lungen und Gehirn anerkennen, da theils die Affection des Letztern noch viel

häufiger zu den Krankheiten der Lungen, als zu denen andrer Organe sich gesellt, theils auch die Entzündung, wenn sie nur auf eine Seite beschränkt ist, öfters dieselbe Seite des Gehirns, wie der Lungen, einnimmt (Beysätze II. S. 265.). Uebrigens könnte aus dieser letztern Umstand auf die Vermuthung bringen, daß der Consensus hier durch Nerven vermittelt werde, da diese es allein sind, wodurch die seitliche Hälfte des einen dieser Organe mit der gleichnamigen Hälfte des andern verbunden werden. Aber anderweitige Erfahrungen beweisen hinreichend, daß überhaupt die Zweige des Gefäßsystems einer und derselben Seite unter einander in einem Consensus stehn, der weder durch Nerven, noch durch ein andres besonderes Zwischenglied vermittelt ist; jene Affectionen des Gehirns werden wir also ebenfalls nur von einer allgemeinen Uebereinstimmung zwischen dem durch Gefäßthätigkeit vermittelten pflanzlichen Leben desselben und dem der Lungen ableiten können.

§. 276. Weniger merklich ist der Einfluß, welchen der Zustand der Verdauungsorgane auf das pflanzliche Hirnleben ausübt. Er zeigt sich besonders bey Kopfverletzungen und Aftergebilden im Gehirne: jene werden für immer gefährlicher, diese aber schmerzhafter, sobald die Verdauung gestört ist und gastrische Unreinigkeit oder Verstopfung eintritt, weshalb denn auch die gastrische Methode, welche die Verdauungsorgane von reizenden oder hemmenden Stoffen befreyt, und eine leichte, gelinde Erregung mit freyer Secretion in ihnen unterhält, theils als prophylaktisches, theils als palliatives Mittel in der Regel wirksam ist. Bey Erweichung (Nr. 800.), Aftergebilden (Nr. 1036.), Hydatiden (Nr. 1055.) und andern Abnormitäten des Gehirns schafft oftmals jedes Erbrechen einige Linderung der Zufälle; bisweilen werden die Zufälle von Hirnverletzungen durch Darmwürmer unterhalten und verschwinden nach deren Ausleerung (Nr. 114.). Flourens (p. 128. seq.) bemerkte, daß Thiere, welche lange kein Futter bekommen, oder auch sich eben voll gefressen hatten, nach Wegnahme des Gehirns in große Schwäche verfielen und sehr bald starben; nahm er ihnen das Futter aus dem Kropfe, so erhielten sie sich wieder. Zuweilen kommen Entzündungen in der Schleimhaut des Magens und der engen Därme gleichzeitig mit Congestionen oder Entzündungen der plastischen Hirnhäute vor (Sequitellen in Gerson V. S. 428.), und bisweilen scheint es, als ob ein krankhafter Zustand der Verdauungsorgane zu Veranlassung der acuten Hirnwassersucht mit wirkten. Morgagni (LIII, 40.) erzählt einen Fall, wo ein Stich in die Leber nach einer Stunde den Tod nach sich zog, und das Gehirn so von Blut strotzend gefunden wurde, als ob der Tod durch Hirnentzündung herbeigeführt worden wäre.

§. 277. Ueber den Einfluß der Zeugungsorgane auf das Gehirn haben wir zwar nur noch mehr einzeln stehende Thatfachen, welche jedoch denselben überhaupt darthun. Man hat beobachtet, daß während der Begattung Blutergießungen im Gehirne entstanden (Nr. 142. 147. 167.), daß nach Onanie und dadurch bewirkter Atrophie der Hoden (Nr. 429.), so wie nach Masturbation bey starker Erweiterung der Beckenarterien (Nr. 431.) Eiterung, und nach Auswurfungen. (Nr. 486.) Verhärtung im Gehirne entstand, und daß bey Aftergebilden an der festen Hirnhaut die Menstruation unregelmäßig war, und ihr jedesmaliges Eintreten Linderung hervorbrachte (Nr. 886.). — Die Zeugungsorgane stehen zunächst in Beziehung zum untersten Theile des Rückenmarks, theils

unmittelbar durch dessen Nerven, theils mittelbar durch Rumpfnerven. Sie wirken daher am stärksten auf diesen Theil des Centralorgans; so entsteht nach Ausschweifungen häufig chronische Entzündung und Atrophie des Rückenmarks; und nach Unterdrückung der Menstruation Congestion und Entzündung in demselben.

§. 278. Was den Einfluß der Hautthätigkeit auf das Gehirn betrifft, so verursacht die Erkältung des Kopfes zuweilen Meningitis und Hirnwassersucht, namentlich wo schon die Gefäßthätigkeit aufgereizt ist, z. B. im Scharlach oder bey der nach demselben eingetretenen Hautwassersucht, wenn nicht Harnabsonderung und Stuhlgang dabey vermehrt werden; auch scheint eine starke Erkältung öfters die Entstehung von Aftergebilden im Gehirne zu veranlassen (Nasse zu Abercrombie S. 24.) Von plötzlicher Unterdrückung der Kräfte, des Kopfgrünes und andrer Hautausschläge entsteht oft dergleichen Aftergebilde (ebendas. S. 23.); oder Arachnitis und Hirnwassersucht. Umgekehrt ist die anhaltende Erregung der Eiterung in der Kopfhaut durch epispastische Mittel bey dem Uebergange der Meningitis in Hirnwassersucht heilsam. So bringt auch die stärker gewordene Hautandunstung oft Erleichterung bey der Hirnwassersucht und selbst bey Blutergießungen; auch bey Kopfverletzungen treten kritische Schweiß eim (Nr. 7. 10. 54. 217.) und Abscesse unter der Haut erleichtern bisweilen (Nr. 557.), wenn sie sich öffnen, bei Eiterung im Gehirne.

§. 279. Der Gesamtzustand der bildenden Thätigkeit bestimmt auch die Qualität der Hirnsubstanz, und zwar so, daß 1) gleiche Abnormitäten im Gehirne und im übrigen Leibe vorkommen. Bey der Gelbsucht, die mochte von Verschiebung des Gallenganges durch Gallensteine (Störck I. p. 150.), oder von Leberentzündung (Fantoni opus. p. 145.), oder von andern Ursachen (Stoll III. p. 388) herrühren, fand man nicht selten auch am Gehirne Gallenpigment abgesetzt; zuweilen war die Höhlenhaut (Wenzel), oder die Gefäßhaut mit der äussern Seite der Rinde (Buzzi in italien. Bibl. III. 2 St. S. 96.), oder die Rinde mit dem Höhlenwasser (Störck a. a. O.) gelb gefärbt. Man hat das Gehirn sehr weiß und bleich gesehen bey leukoplasmatischer Cachexie (Morgagni XXVI. 13. Sömmerring de basi p. 14.) und schwärzlich bey der Meläna (Timm p. 85.). Stoll (II. p. 402.) sah Patechien gleichzeitig auf den Hirnhäuten, den serösen Häuten des Rumpfs und der äussern Haut. Blane (Sammlg. auserl. Abhh. XXV. S. 682.) fand nach unvollkommen eiternden und brandigen Blättern die Haut der Hirnhöhlen verdickt und mit vielen kleinen; durchsichtigen kuglichten Körpern besetzt; an den Därmen und der Luftröhre aber kleine verederte Stellen. 2) Häufig entstehen Hirnabnormitäten metastatisch. So entstehen nach Unterdrückung chronischer Hautausschläge, namentlich am Kopfe, blutige (Nr. 133.) oder seröse (Nr. 395. 398.) Ergießungen, oder Aftergebilde (Nr. 942.); nach Zuhilfenahme alter Geschwüre Wasserergießung (Nr. 330. 668. 706.); nach Masern eben so (Nr. 884.); nach Erkältung im Scharlach Hypertrophie (Nr. 693.); nach unterdrückter Hautandunstung überhaupt blutige (Nr. 159.) oder seröse (Nr. 304.) Ergießung, Eiterung (Nr. 488.); Erweichung (Nr. 723. 837.), oder Aftergebilde (Nr. 890. 1039. 1059.); nach Hautwassersucht seröse Ergießung (Nr. 331. 372. a); nach zurückgetretener Gicht Blutergießung (Nr. 218.) und Hydatiden (Nr. 1076.); nach Unterdrückung der Hämorrhoiden Blutergießung (Nr. 218.), Eiterung (Nr. 579.) und Aftergebilde (Nr. 885. 1002.) u. s. w. (Vgl. §. 233. 258. 260. 263.) — 3) Bey akrophalösen und rachitischen Kindern, wo der Eyweissstoff im

Uebersaasse vorhanden und der Easerstoff nicht gehörig entwickelt ist; wird bey mangelhafter Ernährung der Muskeln und Knochen das Gehirn verhältnißmäßig sehr groß: (Nr. 280.)

§. 280. Die Lebensthätigkeit der Kopfsinne steht in einer specifischen Beziehung zu dem Gehirn, welche theils durch die Nervenverbindung, theils durch die räumliche Nähe und die Fortsetzung der Häute und Gefäße, vermittelt wird. Auf die erste Weise wird das Gehirn besonders durch das Auge bestimmt: wenn dies durch eine äussere Gewalt zerstört, oder in Folge einer Entzündung atrophisch geworden ist, so welkt der Sehnerv, und diese Atrophie erstreckt sich bisweilen auch über den Sehhügel (Nr. 660.). Wenn Magendie (*Journal* III. p. 376.) bey Vögeln bloß die Hornhaut undurchsichtig machte, so war schon nach einem Monate der Sehnerv, der Sehstreifen und die Sehkugel atrophisch und die Strahlung an der Oberfläche der Letztern verschwunden. Durch die räumliche Nähe wirkt besonders das Ohr: seine Entzündung und Eiterung pflanzt sich vom Felsenbeine auf die feste Hirnhaut und auf das kleine Hirn, oder auf den hinteren oder untern Lappen des großen Hirns fort (Nr. 413. 447. 489. 543. 544. 550. 556. 558. 560.). Sehr häufig werden besonders Kinder, bey welchen die Ohren seit geraumer Zeit gestört hatten, von einer acuten oder chronischen Hirnentzündung befallen, indem der Eiteranfluß aufhört.

§. 281. Die Muskelbewegung steigert das plastische Hirnlehen dadurch, daß sie eine consensuelle Beschleunigung des Blutlaufs und des Athmens erregt. Daher ist bey einem entzündlichen Zustande des Gehirns, so wie bey der auf Schwäche beruhenden Erhöhung seiner Reizbarkeit eine stärkere Leibesbewegung nachtheilig: Reconvalescenten von Hirnwunden (Nr. 54.) bekommen darauf Schmerzen in der verletzt gewesenen Stelle, und wo eine Hirnabnormität Convulsionen verursacht, treten diese bisweilen (Nr. 654.) schon nach der geringsten Bewegung ein. Ein Anfall von Convulsionen äussert bisweilen einen günstigen Einfluß auf Hirnkrankheiten: bey einer Depression des Schädels (Nr. 201.) verminderten sich nach ihm alle Symptome; bey einem Aftersgebilde im Gehirne (Nr. 940.) fühlte sich der Kranke darauf wohler, und hatte weniger Schmerzen; und bey einem andern (Nr. 1005.) wurde dadurch die nach einem frühern Anfalle eingetretene Blindheit gehoben. Wie die Convulsion eine Art rückgängiger Bewegung ist, auf einem Uebergewichte der peripherischen Thätigkeit (Muskeln und Nerven) über das Centrale (Gehirn) beruht, und ein damit übereinstimmendes Zurückdrängen der Säfte von der Peripherie, eine erhöhte Wirksamkeit der Venen und Sanguinen bey herabgesetztem arteriösem Leben erregt, so scheint sie auch hier vornehmlich durch Beförderung der Resorption im Gehirne zu wirken. Offenbar fand dies in einem von mir beobachteten Falle Statt. Ein junger Mann wurde im Rausche von einer Apoplexie betroffen: die fortdauernde Bewußtlosigkeit, die Lähmung der linken Gliedmaßen, das bewußtlose Greifen nach der rechten Seite des Kopfs, die Empfindlichkeit dieser Stelle gegen äussere Druck, ließ hey den übrigen Symptomen einer blutigen Apoplexie ein Extravasat in der Schädelhöhle mit Bestimmtheit annehmen; nachdem dieser Zustand mehrere Wochen angehalten hatte, trat plötzlich in der Nacht ein starker epileptischer Anfall ein; und am folgenden Morgen war Bewußtseyn und willkührliche Bewegung völlig wieder hergestellt und der Kranke genesen. Auf solche Weise vermag denn auch die Anwen-

ung von Brechmitteln, welche schon bey geringern Gaben die rückgängige Bewegung im Gefäßsysteme erhöhen, die Resorption krankhafter Ergießungen im Gehirne zu befördern.

§. 282. Indem wir nur zur Untersuchung des seelenlosen Einflusses der Hirnthätigkeit auf das plastische Leben des übrigen Leibes fortgehn, sieht zuvörderst das Athmen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das Athmen besteht in einer Wechselwirkung zwischen Blut und Luft, beruht also auf einer stets erneuerten Berührung beyder Flüssigkeiten. Es wird nöthig durch zweyerley organische Thätigkeiten bedingt: erstlich durch eine solche Thätigkeit des Herzens, vermöge welcher ununterbrochen Blut aus dessen rechter Arterienkammer in das Athmungsorgan, und aus diesem in den linken Venensack geführt wird; zweytens durch eine von dem sensiblen Systeme und namentlich vom Gehirne bestimmte abwechselnde Erweiterung und Verengerung des Athmungsorgans, vermöge deren dasselbe die Luft bald aufnimmt, bald ausstößt. Der Grund dieser letztern Bewegung ist hier unser Gegenstand, und wir haben ihn zu suchen a) in den Nerven der Lungen selbst, also im Rumpfnerven (§. 283.) und im herumschweifenden Nerven (§. 284 — 289.); b) in den Nerven der peripherischen Athmungsbewegung, also a) in Zwerchfellnerven und den Nerven der Brustmuskeln (§. 290.); b) in denen der Bauchmuskeln (291.); c) in denen der Muskeln des Kehlkopfs, des Zungenbeins, des Kiefers, der Zunge, der Nase und des Mundes (§. 292 — 294.).

§. 283. Der Rumpfnerv scheint auf die Bewegungen des Athmungsorgans nur wenig Einfluß zu haben. Kein Zweig des Ganglienstamms tritt, ohne zuvor mit einem Zweige des zehnten Hirnnerven verschmolzen zu seyn, in die Substanz der Lungen. Es kann zwar zum Theil von seiner Affection herrühren, daß die Entzündung des Rückenmarks innerhalb der Brustwirbel eine Beklemmung auf der Brust verursacht. Aber wenn man den Ganglienstamm auf beyden Seiten des Halses durchschneidet, so wird das Athmen fast gar nicht gestört, und durchschneidet man ausser ihm auch noch den zehnten Nerven, so erfolgt der Tod nicht früher, als wenn dieser allein durchgeschnitten worden wäre; auch dauert das Athmen noch eine Zeitlang fort, wenn das Rückenmark über dem obersten Brustknoten des Ganglienstamms durchgeschnitten ist. Mit diesen Erfahrungen Bichats (recherches p. 318.) ist wenigstens soviel bewiesen, daß der Ganglienstamm nicht, sofern er vom Gehirne abhängig ist, die Athmungsbewegung erregt. Daß er aber auch weder vermöge der ihm mitgetheilten Kraft des Rückenmarks, noch auch durch seine eigene Wirkksamkeit diese Bewegung bestimme, vielmehr in den Lungen, wie in andern Organen, vornehmlich auf das Gefäßleben sich beziehe, ist darum wahrscheinlich, weil nur wenige seiner Fäden ihr Centralende im Rückenmark haben (§. 61.); weil er überhaupt wenig Einfluß auf Bewegung hat (§. 36.), und weil, wenn er unverletzt bleibt, die Durchschneidung von Nerven des Gehirns und Rückenmarks hinreicht, das Athmen aufzuheben.

§. 284. Der zehnte Hirnnerv ist der eigentliche Nerve des Athmungsorgans. Dies läßt sich schon aus der Art seiner Verzweigung schließen, ergiebt sich aber auch

aus den Erscheinungen, welche nach seiner Durchschneidung oder Unterbindung eintreten. Dergleichen Versuche wurden angestellt von Galen (*de Hipp. et Plat. lib. II. p. 854. de anat. admin. lib. VIII. p. 351. sqq.*), Willis (*cer. c. 8. p. 127.*), Lower (*de motu cordis p. 90.*), Petit (*academie de Paris 1727. p. 1.*), Haller (*opp. min. I. p. 359. sqq.*), Brunn (*Ludwig script. neur. II. p. 285. sqq.*), Arnemann, Cruikshank (*Reils Archiv II. S. 58 — 75.*), Haighton (*ebendas. S. 76 — 81.*), Bichat (*recherches p. 317.*), Dupuytren (*med. chir. Ztg. 1808. Nr. 9.*), Dumas (*Journ. de med. 1808. Dec.*), Blainville (*Gehlen Journ. f. Chemie VII. S. 530.*), Prevencal (*Journ. de med. 1810. Janu.*), Emmert (*Reils Archiv IX. S. 398 — 403. XI. S. 118 — 124.*), Brodie (*bibl. de med. britan. 1814. Dec.*), Legallois (*experiences p. 188. — 228.*), Magen die (*physiologie II. p. 297 — 301.*), Wilson Philp. (*S. 96 — 100.*), Broughton (*Magendie Journ. I. p. 123 — 150.*) und Andern, welche von Arnemann (*Versuche S. 230 — 136.*) und Legallois (*experiences p. 161. — 183. 202. sqq.*) verzeichnet sind. Wurde bey Hunden, Pferden oder Kaninchen bloß der eine herumschweifende Nerve durchschnitten, so blieb das Thier gewöhnlich am Leben; nur in seltenen Fällen starben Kaninchen eben bis drey Tage (Arnemann), Hunde eine bis drey Wochen (Petit, Cruikshank) nach der Durchschneidung. Nach der Durchschneidung der Nerven beyder Seiten blieben nur ausnahmsweise zwey Hunde am Leben (Cruikshank, Haighton), indem die durchschnittenen Nervenenden wieder verwuchsen. In der Regel starben die Thiere, und zwar Kaninchen nach 6 — 18 Stunden (Blainville, Legallois); oder am zweyten Tage (Emmert, Wilson), oder am dritten oder vierten Tage (Haller, Magendie); Hunde nach sieben bis zwölf Stunden (Petit, Haighton), oder am zweyten oder dritten Tage (Willis, Haller, Arnemann, Cruikshank, Haighton, Dupuytren); oder am vierten bis siebenten Tage (Petit, Haighton, Bichat, Cruikshank), ausnahmsweise erst in der fünften Woche (Arnemann); Pferde in der ersten Stunde bis am zweyten Tage (Dupuytren, Broughton), Tauben und Hühner sterben später, als Säugethiere (Blainville). Uebrigens ist zu bemerken, daß bey Hunden und Pferden mit dem zehnten Hirnnerven wohl für immer auch der mit ihm verwachsene Ganglienknoten durchschnitten wurde.

§. 235. Die Tödllichkeit der Operation beweiset, daß der durch das zehnte Nervenpaar vermittelte Einfluß der Hirnthätigkeit auf die Rumpfeingeweide die Fortdauer des Lebens bedingt. Nun hat dieser Nerve seine peripherischen Enden in den Athmungsorganen, in dem Herzen und den großen Gefäßstämmen, und in dem Magen und der Leber. Seine Durchschneidung muß also die Functionen dieser sämtlichen Organe schwächen. Wenn wir aber den Einfluß der Hirnthätigkeit durch den zehnten Nerven überhaupt als einen Coefficienten jener Functionen anerkennen, so fragen wir, auf welche er am meisten einwirkt, für welche er am wichtigsten ist, und welche es ist, deren Vernichtung nach seiner Durchschneidung zunächst den Tod nach sich zieht? a) Erwägen wir zuerst die Zeit, in welcher der Tod erfolgt, so können wir diesen nicht von der Störung der Verdauung ableiten, da er hier viel früher eintritt, als in Fällen, wo die Ernährung gehindert ist. Auf der andern Seite erfolgt er zu spät, als daß er sich aus einer Aufhebung des Herzschlages erklären ließe. Das Athmen hingegen steht in Hinsicht auf das Bedürfnis in der Zeit mitten inne: es kann ohne Gefahr des Lebens länger cessiren, als der Kreislauf, aber

nicht so lange als die Verdauung; und somit sind wir geneigt, anzunehmen, daß die Hirnthätigkeit das Leben am unmittelbarsten durch ihren Einfluß auf das Athmen bedingt. b) Die Veränderlichkeit in dem Zeitpunkte des Sterbens deutet darauf hin, daß mehrere Coefficienten vorhanden sind, welche nach Mangabe des jedesmaligen individuellen Lebenszustandes mehr oder weniger wirksam seyn können. Nun kann nach aufgehobener Verbindung mit dem zehnten Hirnnerven der Herzschlag und die Verdauung noch vom Ganglionstamme aus eine sensible Einwirkung erfahren, das Athmen hingegen nicht, bloß von diesem, sondern auch vom Zwerchfellnerven, und von den Brust- und Bauchnerven des Rückenmarks her unterstützt werden; mithin ist jene Annahme auch in dieser Hinsicht wahrscheinlich. c) Endlich gewinnt dieselbe noch mehr Grund, wenn wir bemerken, daß eine Affection der Athmungsorgane die gewöhnliche und deutlichste Krankheitserscheinung ist, welche nach Durchschneidung des zehnten Hirnnerven beobachtet wird. Die angeführten Beobachter bemerkten nach der Operation ein beschwerliches, langsames, seltnes, zerschüttertes, keichendes, schnaufendes, seufzendes, krächzendes Athmen, mit Anstrengungen, als ob etwas im Halse stecke, mit vorgestrecktem Kopfe, aufgesperrtem Munde, aufgerissnen Nasenlöchern und verminderter Thätigkeit der Brustmuskeln und des Zwerchfells. Diese Athmungsbeschwerden waren anfänglich schwächer und nahmen allmählig zu; sie verstärkten sich besonders, wenn das Thier fraß, saß, lief, sich sträubte oder zum Zorne gereizt wurde. Sie waren dagegen nicht so bedeutend und verloren sich nach und nach, wenn nur der Nerve der einen Seite durchschnitten war. Uebrigens wurde nach Treviranus (Schriften I. S. 106.) auch bey Fröschen das Athmen langsam, unordentlich und aussetzend nach der Durchschneidung der Nerven.

§. 286. Auf welche Weise wird aber durch die Zerschneidung des zehnten Hirnnerven das Athmen gestört? Und wie wirkt folglich dieser Nerve im Normalzustande auf das Athmen? Vermittelt er durch seine Thätigkeit unmittelbar die Metamorphose des Bluts, die Verbindung desselben mit dem atmosphärischen Sauerstoffe und die Ausstoßung der Kohlensäure? Dapuytren war geneigt, dies anzunehmen; Allein wir wissen, daß das Blut selbst ausserhalb des lebendigen Körpers dieselbe chemische Wechselwirkung mit der Luft eingeht; Dumas und Emanert fanden, daß, wenn nach der Durchschneidung des zehnten Nerven Luft in die Lungen eingeblasen wird, bey bestehendem Kreislaufe auch die Röthung des Blutes fortdauert; eben so bewies Brodie (Reiss Archiv. XII. S. 154. 208 — 212.) durch chemische Untersuchung, daß bey künstlichem Athmen an einem geköpften Thiere die Luft beynahe eben so viel Sauerstoff verliert und Kohlensäure gewinnt, als bey natürlichem Athmen; damit stimmten auch Blainville's Versuche überein, und Prevencal erklärte, daß durch Durchschneidung des zehnten Hirnnervenpaares die Wechselwirkung zwischen Luft und Blut nicht aufgehoben, sondern nur geschwächt werde. Wir haben also Grund anzunehmen, daß die dann erfolgende Schwärzung des Bluts bloß auf Verminderung der gegenseitigen Berührung von Blut und Luft beruht, daß also der Nerve vermöge der Bewegungen, welche er erregt, und vermöge des dadurch gesetzten mechanischen Verhältnisses das Athmen bestimmt.

§. 287. Legallois (*expériences* p. 188 — 208.) sah bey einem Kaninchen nach Durchschneidung des zehnten Hirnnerven die Stimmritze sich anhaltend verengern, und erklärt

den darauf folgenden Tode, aus einer Lähmung der Muskeln, welche die Stimmritze erweitern und aus der dadurch bewirkten Unmöglichkeit des Einathmens. Daher soll die Durchschneidung des zurücklaufenden Astes eben so schnell töden, als die des Nervenstammes selbst; eine Oeffnung in der Luftröhre nach Durchschneidung des Nerven die Fortdauer des Athmens möglich machen; und die Operation bey ältern Thieren und bey einigen Thiergattungen vermöge, der größern Stimmritze weniger lebensgefährlich seyn. Aus diesen von Magendie und Wilson Philip bestätigten Erfahrungen ergiebt sich, daß der obre Kehlkopfnerve die bey'm Ausathmen vor sich gehende Verengung der Kehlritze, der unterhängen die bey'm Einathmen Statt findende Erweiterung derselben erregt; denn jene Verengung, welche nach aufgehobenem Einflusse des zurücklaufenden oder untern Kehlkopfnerven eintritt, setzt voraus, daß das Gleichgewicht zwischen den Muskeln der Kehlritze aufgehoben ist und die verengenden deshalb zu stark wirken, weil die erweiternden gelähmt sind. Wir sehen aber, daß die meisten Muskeln der Kehlritze, sowohl vom obern, als vom untern Nerven Zweige bekommen; nur der quere und die schrägen Schnepfenmuskeln scheinen, was freylich auch noch nicht ganz ausgemacht ist, sondern noch eine genauere Untersuchung verdient, bloß mit Zweigen des obern, nicht des untern, versehen zu seyn, also auch die Verengung nach Durchschneidung des zurücklaufenden Astes zu erregen. Zugleich ergiebt sich daraus, daß ein Muskel, welcher zweyerley Nerven bekommt, auch beyder zu seiner Thätigkeit bedarf, indem er gelähmt wird, wenn bey Integrität des einen Nerven der andre durchschnitten wird. — Indessen mag die Verschließung der Stimmritze wohl nur dann die Ursache des Todes abgeben, wenn dieser plötzlich nach der Operation erfolgt: wo er dagegen erst nach mehreren Tagen eintritt, kann das Einathmen durch die Operation nicht ganz aufgehoben, sondern nur vermindert worden seyn; so lange aber nur noch etwas Luft durch die Kehlritze dringt, wird das Leben erhalten. Auch treten nach Durchschneidung des zehnten Nerven nicht eigentliche Erstickungsanfälle ein, und selbst das Blut behält zuweilen noch seine hellrothe Farbe. Endlich ist die Durchschneidung des zurücklaufenden Astes in den meisten Fällen nicht tödlich, die des zehnten Nervenstammes hingegen fast immer tödlich. Wir müssen also noch einen andern Grund der Tödllichkeit aufsuchen.

4. 283. Wir finden an der Luftröhre, so wie an ihren feinsten Aesten in den Lungen irritable Fasern, welche durch ihre Bewegung eine Verengung bewirken müssen. Und wenn es schon an sich kaum denkbar ist, daß sich die Lungen bey den Athmungsbewegungen ganz passiv verhalten sollten, so fehlt es auch nicht an Erfahrungen, welche eine selbstständige Bewegung dieses Organs beweisen. Sowohl die Analogie, als die Betrachtung jener Fasern überzeugt uns, daß diese Bewegung in Verengung der Luftröhrenäste, in Zusammenziehung der Lungen, in Austreiben der Luft, also in Ausathmen besteht; insofern sie nun von sensibler Thätigkeit bestimmt wird, müssen die Lungenerven des zehnten Paares, welche die Luftröhrenäste begleiten, als Ausathmungsnerven betrachtet werden. Sind sie nun durchschnitten und ausser Zusammenhang mit dem Gehirn gesetzt, so müssen die Lungen allmählig passiv werden, das Ausathmen kann dann bloß durch das Nachlassen der Thätigkeit des Zwerchfells und der Brustmuskeln, so wie durch die Bewegung der Bauchmuskeln vor sich gehn, also nicht vollständig seyn. In den ausgedehnt klei-

benden Lungen muß sich nun das Blut anhäufen, da die Rückkehr desselben zum Herzen nicht mehr durch das Ausathmen unterstützt wird, und diese passive Congestion muß, da die Luftröhrenäste gelähmt sind und ihre Contractilität verloren haben, eine Durchschwitzung und Ergießung seröser Feuchtigkeit nach sich ziehen. Hierdurch muß die Schwierigkeit des Athmens zunehmen und endlich eine solche Höhe erreichen, daß die Rumpfwände unvernünftig werden, dasselbe durch ihre Bewegungen zu unterhalten. Diese von Bartels (die Respiration als vom Gehirne abhängige Bewegung S. 60 — 82) zuerst aufgestellte und von Legallois (p. 219 — 235.) zum Theil angenommene Ansicht ist so einleuchtend, daß sich kaum etwas Erhebliches dagegen einwenden läßt, und wird durch mehrere nach dem Durchschneiden des zehnten Hirnnerven eintretende Erscheinungen bestätigt. Nämlich das Athmen wird nach dieser Operation überhaupt seltner, und zwar nach Cruikshank und Broughton das Einathmen langsam und tief, das Ausathmen kurz und schnell, mit wiederholten und selbst convulsivischen Bewegungen der Bauchmuskeln. Nach dem Tode findet man die Lungen aufgetrieben, ausgedehnt, voluminöser als im natürlichen Zustande (Legallois, Wilson, Magendie, Broughton), im Zustande des Einathmens (Hallé und Pinel mit Dupuytren und Dupuy), von Blut, welches in den Arterien angehäuft ist, strotzend, dadurch in einzelnen Stellen so dicht, daß sie im Wasser unter sinken, auch mit dunkelrothen, schwarzen Flecken, wie von ergoßnem Blute, besetzt. In den Luftröhrenzweigen findet man meist eine schaumige, seröse Feuchtigkeit, im Herzen aber zuweilen (Emmert, Broughton) polypöse Gerinsel.

§. 289. So giebt denn der zehnte Hirnnerv in den Lungen das wesentliche Moment des Ausathmens; er bestimmt ausserdem die sowohl zum Ein- als zum Ausathmen dienenden Bewegungen der Kehltritte, welche indeß bey der natürlichen Respiration unbedeutend zu seyn und erst bey Erschwerung derselben stärker zu werden scheinen. Indem ein lebhafteres Ausathmen auch ein lebhafteres Einathmen zur Folge hat, kann die Reizung jenes Nerven am Halse die Respiration überhaupt beschleunigen (*Bichat recherches* p. 316.). Da aber das Athmen durch mehrere Momente gegeben wird, so kann dasselbe noch eine Zeitlang fortauern, nachdem der zehnte Nerve durchschnitten ist; und es folgt daraus keinesweges, wie Bichat behauptet, daß das Gehirne bloß durch die Zwerchfellnerven und Brustnerven das Athmen bestimme. Uebrigens lehrte schon Galen (*de odoratus instrum.* c. 6. p. 112. *de meth. med. lib. VII.* c. 13. p. 49.), daß das Athmen vom Gehirne abhängig sey.

§. 290. Die Zwerchfellnerven und Brustnerven sind Einathmungsnerven; indem sie durch das Herabsteigen des Zwerchfells und die Erweiterung der Brust, welche sie erzeugen, den Lungen Raum geben, daß sie mit Luft sich füllen können. Auch ihre Thätigkeit wird durch den ununterbrochenen Zusammenhang mit dem lebendigen Gehirne bedingt. Wird der Zwerchfellnerv durchschnitten, so dauert das Athmen noch einige Zeit fort, indem die Brustmuskeln an seiner Stelle wirken und die Brust in wagerechter Richtung erweitern, aber es ist schwach und hört bald gänzlich auf. Diese Erfahrung kannte schon Galen (*de anat. admin. lib. VIII.* c. 5. p. 101.); sie ist vielfältig, unter Andern auch von Bichat (*recherches* p. 307.) angestellt worden. Durchschneidet man das Rückenmark unterhalb des Zwerchfellnerven, zwischen dem untersten Halswirbel und dem

obersten Brustwirbel, so werden die Brustmuskeln gelähmt, und das Einathmen geschieht dann bloß durch das Zwerchfell, aber das Thier lebt oft noch 15 bis 20 Stunden; auch dies beobachtete schon Galeu (a. a. O.). So sah auch Legallois (p. 53. 89. 95.) selbst nach Zerstörung des ganzen Brust Rückenmarks die Einathmungsbewegungen noch zwey Minuten lang durch das Zwerchfell vor sich gehn und dann erlöschen. Wird endlich das Rückenmark oberhalb des Zwerchfellnerven durchschnitten oder das ganze Hals Rückenmark zerstört, so hört, da sowohl Zwerchfellnerven, als Brustnerven von dem Gehirn getrennt sind, das Einathmen augenblicklich auf.

§. 291. Die Bauchnerven sind Gehülfen des herum schweifenden Nerven, indem sie durch Erregung der Thätigkeit der Bauchmuskeln zum Ausathmen beytragen. Indessen ist ihr Einfluß auf das Athmen geringer, als der der obigen Nerven. Nach Zerstörung des Brust Rückenmarks wurde das Athmen anfangs zwar etwas gestört, dann aber wieder regelmäßig, und dauerte so noch eine Viertelstunde (Legallois p. 90. 97. 102.).

§. 292. Die Athmungsbewegungen am Kopfe und Halse beschränken sich im normalen Zustande mehr auf die eigentlichen Athmungsorgane, treten aber bey erschwertem Athmen in einem weitem Umkreise stärker hervor. Bey dem Einathmen wird die Brust der fixe Punkt für den Hals, die Nackenmuskeln strecken sich, Kehlkopf, Zungenbein, Kiefer, Zunge, werden herabgezogen, die Nasenflügel werden heraufgezogen, und bey sehr mühsamen Athmen wird selbst der vordere Theil der Brust gegen den am hintern Theile derselben fixirten Hals und Kopf heraufgehoben. Der ganze Act bleibt ein Einsenken in die Brust, ein Bestimmwerden des Oberrn gegen das Untere. Beym Ausathmen hingegen wird der Unterkiefer, der Boden der Mundhöhle, die Zunge, das Zungenbein und der Kehlkopf heraufgezogen, die Mundhöhle und ihre Oeffnung, so wie auch die der Nasenhöhle, verengt.

§. 293. Nun fragt es sich zuvörderst, ob diese Bewegungen durch eigenthümliche Nerven erzeugt werden, und ob es also besondere Athmungsnerven am Kopfe giebt? Charles Bell und Shaw (Magendie Journal I. p. 384—390. II. p. 66—146.) bejahen diese Frage, und behaupten, daß das fünfte Hirnnervenpaar die zur Aufnahme der Nahrung nöthigen Bewegungen, das siebente aber die Athmungsbewegungen hervorbringe. Bey den Versuchen, auf welche diese Behauptung sich stützt, ist theils mancher Erfolg, welcher angegeben wird, nicht gehörig beobachtet worden, wie schon Magendie bemerkt; theils haben sich in die Beobachtung vortheilhafte Schlüsse eingemischt, welche auf einem schiefen Gedanken beruhen. Wir wissen, daß die besondre Qualität der Function eines Nerven durch die Natur des Organs, in welchem er sein peripherisches Ende hat, bestimmt wird (§. 38), und daß demzufolge der zehnte Hirnnerv in dem Kehlkopfe, der Luftröhre, und den Lungen das Athmen, so wie in dem Speiseröhrenkopfe, der Speiseröhren und dem Magen das Schlingen und Verdauen begründet. Wenn nun das Wesentliche zweyer Functionen in ganz verschiednen Organen durch einen und denselben Nerven gegeben wird, wie ist es dann gedenkbar, daß beyde Functionen in ihrem minder wesentlichen Theile, wo sie ein und dasselbe gemeinschaftliche Organ haben, durch ganz verschiedne Nerven vermittelt werden sollten? daß aber die Bewegungen des Kiefers, der Zunge, des Gaumensegels, des Zungenbeins, des Kehlkopfs und der Backen sowohl dem

Kauen und Schlingen, als dem Athmen dienen, ist angesehnlich. Wir bewegen willkürlich die Lippen und Backen bald zum Trinken, Essen, Kauen, bald zum Athmen, Sprechen, Pfeifen, Lachen: ist es gedenkbar, daß derselbe Wille dieselben Bewegungen in denselben Organen nach Verschiedenheit der Beziehung auf Ernährung oder auf Athmen durch verschiedene Nerven vollbringe? Saugen und Schlürfen wird durch Einathmungsbewegungen bewerkstelligt, und deshalb auch durch die Ansathmung beym Lachen oder Husten gestört. Die Bewegungen des Zwerchfells, so wie die der Bauchmuskeln, dienen gleichzeitig dem Athmen und der Verdauung, und werden durch dieselben Nerven bestimmt: wie sollte das, was unterhalb der Brusthöhle geschieht, nicht auch oberhalb derselben Statt finden können? Endlich lehren auch die angestellten Versuche, daß nach Durchschneidung des siebenten Nerven bey Thieren die Freibewegungen der Lippen und Backen aufgehoben sind. Bell's Behauptung erscheint demnach als ein misslungener Versuch zu Erklärung des Umstandes, daß die Gesichtsmuskeln verschiedene Nerven erhalten.

§. 294. Der Einfluß der Sensibilität auf die Athmungsbewegungen kann entweder auf die Art vor sich gehn, daß die Nerven auf die Reizung an ihrem peripherischen Ende entgegen wirken, oder daß sie den Antrieb zur Thätigkeit von ihrem centralen Ende her empfangen. Im erstern Falle giebt die atmosphärische Luft den ersten Impuls, indem sie die Nerven der Athmungsorgane reizt; die Nerven reagieren und erregen Bewegungen dieser Organe, vermögen dies aber nur, so lange ihr Zusammenhang mit dem Centralorgane, dem Gehirne, ungestört ist, und sie so unter dem Gesamteinflusse der Sensibilität stehn; dabey wirken nun die Nerven der Muskeln, welche am Umkreise der Athmungsorgane liegen und das Athmen unterstützen, consensuell mit. Im zweyten Falle geht der Impuls zur Athmungsbewegung vom Gehirne und Rückenmarke aus; diese Centralorgane bestimmen durch eigene Kraft wechselsweise die Muskeln des Einathmens und Ausathmens, wodurch das Zusammentreffen und Auseandertreten von Luft und Blut erst möglich gemacht wird. Die Erwägung aller Umstände überzeugt uns, daß nicht der erste, sondern der zweyte Fall wirklich Statt findet. Denn a), wenn es auch wahr ist, daß die Trennung eines Nerven von seinem Centralende eine Reaction desselben gegen äussere Reize mit der Zeit aufhebt, so vernichtet sie doch dieses Reactionsvermögen nicht auf der Stelle: der ausgeschnittene Muskel zieht sich noch auf äussere Reize zusammen. Wenn dagegen die Athmungsnerven durchschnitten sind, so führt der äussere Reiz, die Luft, fort zu wirken, nemlich zuerst auf den Kehlkopf, aber die Bewegung ist erloschen. b) Gäbe die Luft den ersten Antrieb zur Athmungsbewegung, so müßte diese sogleich nachlassen, wenn es an jener mangelte: wir sehen aber im Gegentheile, daß bey Mangel an Luft die Athmungsbewegungen stärker und ausgebreiteter werden. c) Bey dem Embryo fangen schon die Athmungsbewegungen des Zwerchfells an, ehe noch Luft auf die Athmungsorgane wirkt. d) Der Consensus zwischen den Bewegungen der eigentlichen Athmungsorgane und denen der unterstützenden Muskeln gründet sich nicht auf peripherische Reizung, denn theils sehen wir in den Verzweigungen mancher zu diesen Muskeln gehenden Nerven keine Anastomose mit den Nerven der Athmungsorgane, theils dauern die Bewegungen in jenen fort, wenn die Nerven der Letztern durchschnitten sind.

Wenn nun der Consensus in den Centralenden begründet ist, so muß auch hier der Grund der Bewegung überhaupt liegen. e) Wenn man den zehnten Hirnnerven oder das Halsrückmark durchschneidet, oder den Kopf ganz vom Rumpfe getrennt hat, so denert die Athmungsbewegung des Kieters fort: z. B. das abgeschnittne Kopfeines jungen Kaninchens schnappt eine Viertelstunde lang nach Luft (Legallois p. 28. 83. 91. Meyer in med. chir. Ztg. 1815. III. S. 192.) Also selbst ohne Athmungsorgane geht ein Impuls zur Athmungsbewegung vom Gehirn aus. Foderá (Journ. compl. XVI. p. 295.) legte bey einem Kaninchen die Luftröhre bloß, unterband sie oben, und machte darunter einen Einschnitt, durch welchen die Luft beym Athmen strömte: gleichwohl dauerte die Athmungsbewegung der Nase fort. f) Abnormalitäten des Gehirns sind oft die Ursachen des gestörten Athmens. Wenn bey kopflosen Misgeburten die Lungen fehlen oder bloße Rudimente derselben vorhanden sind und bey manchen Hemicephalen (Nr. 610) die Luftröhre oben geschlossen ist, so spricht sich darin bloß die mangelhafte Entwicklung der obern Körperhälfte und der edlern Organe aus. Dagegen rührt es offenbar von der mangelhaften Entwicklung des Gehirns her, wenn bey Hemicephalie, Hirnbrüchen und angeborner Hirnhautwassersucht die Stimme schwach (Nr. 356.) und fein (Nr. 346.) ist; (ein Kind dieser Art (Nr. 287.) konnte nicht schreyen, und bloß wenn der Hirnbruch aufgehoben wurde, siepte es wie eine Maus;) wenn ferner dabey das Athmen langsam, schwach, kaum zu bemerken (Nr. 292. 347. 352. 649.) ist, oder mit gewaltsamer Streckung des Kopfs (Nr. 638.) erfolgt, die Hautfarbe bleich (Nr. 292. 346. 359.), oder leichenartig (Nr. 347.), oder rothbraun und schwarzbraun (Eller, Knackstädt) ist, und die Lungen selbst nach zwölfjährigem Leben noch im Wasser untersinken (Nr. 347.); in manchen Fällen (Nr. 354. 627. 646.) ist indess das Athmen natürlich. Was die übrigen Abnormalitäten des Gehirns anlangt, so verhält sich noch der unten gegebenen XXX. Tabelle die Zahl derer, wo das Athmen gestört war, zur Gesamtzahl wie 1: 21, und zwar bey Hydatiden wie 1: 8, bey Blutergießung wie 1: 9, bey Wunden wie 1: 10, bey zerüßter Ergießung wie 1: 14, bey Concrementen wie 1: 15, bey Eiterung wie 1: 27, bey Erweichung wie 1: 33, bey Aftergebilden wie 1: 36, bey Atrophie wie 1: 39, bey Verhärtung wie 1: 44, bey Hypertrophie wie 1: 45. Bey dem höchsten Grade und im ersten Momente der Hirnerschütterung setzt das Athmen gänzlich aus; dann wird es keichend oder schnarcend, und wenn auch dies sich verloren hat, so bleibt es noch eine Zeitlang langsam und schwach. Ein starker Druck auf das große oder kleine Hirn anbrecht, hebt nach Foderá's (Magendie's Journal III. p. 196.) Beobachtung auch bey Thieren das Athmen auf. Vermöge der Hirnerschütterung und des Druckes ergoßner Flüssigkeiten geben die Kopfverletzungen häufig zu Störung des Athmens Anlaß, und man findet dann oftmals die Lungen entzündet, mit kleinen Abscessen oder mit Eiterergießung bey Menschen, die vor der Verwundung gar nicht an der Brust gelitten hatten (Morgagni LI. 17—21. 50. LII. 8. Klein S. 118. 123.). Da die Durchschneidung des zehnten Hirnnerven eine Ueberfüllung der Lungen mit Blut und eine abnorme Secretion in ihnen herbeiführt, und da Brodie (Gerson IV. S. 348.) nach Unterbindung desselben sogar eine in Eiterung übergehende Lungen- und Brustfellentzündung beobachtete, so ist an dem Zusammenhange dieser Krankheitserscheinungen um so weniger zu zweifeln. Ueberdies bemerkte Klein (S. 137.) in solchen Fällen immer die

Eiterung in den Lungen auf derselben Seite, auf welcher der Kopf verwundet war. — Am stärksten wirkt die Blutergießung: das Athmen wird davon schwer, mühsam, langsam, oft röchelnd, indem die Lungen mehr oder weniger passiv sich verhalten, die angesammelten serösen und schleimigen Flüssigkeiten nicht ausgestoßen werden, und die Bewegung vorzüglich nur durch die äussern Athmungsmuskeln bewerkstelligt wird. Wie auf diese Art das Röcheln ein Symptom der Lähmung des herumschweifenden Nerven und der Lungen ist, so deutet das bey Extravasaten ebenfalls häufig vorkommende Schnarchen auf eine Lähmung des dreygelheilten Nerven und des Gaumensegels, und das bläsende Athmen auf eine Lähmung des Antlitznerven und des Buccinator. — Nächst der Blutergießung wirkt die seröse Anblähung am stärksten auf das Athmen. Bey der hitzigen Höhlenwassersucht gehört das durch die geschwächte Einwirkung des Gehirns gestörte, unregelmäßige, ungleiche, bald langsame, bald hastige Athmen zu den gewöhnlichsten Krankheitserscheinungen; besonders ist es gegen das Ende der Krankheit nicht tief genug, das Ausathmen aber vorzüglich unvollkommen und oft winselnd oder seufzend, Dafs diese Erscheinungen wirklich auf einem mechanischen Momente beruhen, sieht man aus den Wirkungen der veränderten Stellung: bey aufrechter Stellung, wo der senkrechte Druck des Wassers mehr den Hirnstamm trifft, wird das Athmen noch mehr erschwert, und erfolgt zuweilen Husten (Nr. 379.) und, wenn noch Bewußtseyn Statt findet, ein Gefühl heftiger Beklemmung auf der Brust (Nr. 367.). Eben so beobachtet man auch bey Eiteransammlung bisweilen, dafs die Kranken vorwärts gebeugt sitzen, und beym Aufrichten tief seufzen (§. 599.), oder schnarchen und beynahe ersticken (Nr. 565.).

§. 295. Das Athmen geht ganz gewöhnlich ohne Mitwirkung des Bewußtseyns und der Willkühr vor sich, namentlich im Schlafe, und dauert im Zustande der Betäubung fort. Da es nun vom Gehirne bestimmt wird, so ergiebt sich daraus, dafs dieses eins von Bewußtseyn und Willkühr ganz verschiedene Lebensthätigkeit besitzt, vermöge deren es auf das Leben andrer Organe einwirkt. Diese seelenlose oder pflanzliche Hirnthätigkeit erregt, nach den obigen Erfahrungen, Bewegungen, und bestimmt dadurch die Mischungsveränderungen des Blutes, so wie auch die räumlichen Verhältnisse desselben und die Secretionen, hat also sowohl auf die Aeusserungen der Irritabilität, als auch auf die Plasticität andrer Organe Einflufs. Da nun das Athmen, unabhängig vom Willen, schneller oder langsamer, leichter oder mühsamer, tiefer oder seichter wird, je nachdem die atmosphärische Luft freyer oder beschränkter, reiner oder unreiner, schwerer oder leichter, wärmer oder kälter ist, so ergiebt sich daraus, dafs die Aeusserungsweise des pflanzlichen Hirnlebens mit durch die Beschaffenheit der äussern Reize und durch den von ihnen erregten Zustand der Organe beschränkt wird.

§. 296. Was ist nun aber der Grund davon, dafs das Gehirn so die Athnungsbe-
wegungen erregt? Wir können erwiedern: Alles im lebendigen Organismus wirkt auf bestimmte Zwecke hin; er braucht beluftetes, arteriöses Blut; das Gehirn greift durch seine organische Thätigkeit als Glied in das Gesamtleben ein, indem es durch die Bewegungen, die es erregt, eine solche Umwandlung des Blutes möglich macht. Allein wir fragen nicht blofs nach dem letzten Grunde, warum das Gehirn so wirkt, sondern auch nach dem nächsten Grunde, wodurch es zu dieser Wirkbarkeit bestimmt wird.

Diesen Grund hat man nun in dem Verhältnisse des Bluts zum Gehirn gesucht. Boerhaave (*Hist. elementa* III. p. 261.) sagte: bey dem Einathmen sammelt sich das Blut in den Venen, es kommt keines in die Aorta, also auch nicht in das kleine Hirn; und da dieses durch solche Entleerung geschwächt wird, so schickt es keine Geister zu den Brustmuskeln und dem Zwerchfelle, mithin muß die Thätigkeit dieser Muskeln und somit das Einathmen aufhören; und Ausathmen erfolgen. Eine ähnliche Erklärung giebt R o o s e (anthropologische Briefe S. 115; und Reils Archiv V. S. 166.); bey dem Ausathmen wird das Gehirn mit Blut überfüllt, dadurch in einen Zustand erhöhter Reizung versetzt, und zu Erregung der Nerven bestimmt, welche das Einathmen vermitteln; bey diesem sinkt das Gehirn, der Zustand seiner Reizung hört auf, und mit ihm auch die Wirkung der Einathmungsmuskeln, indem aber diese erschlaffen, tritt das Ausathmen ein. -Gegen diese Erklärungswiese müssen wir zunächst einwenden, daß sie die Ausathmungsbewegungen als bloß passiv betrachtet, wofür wir sie keinesweges können gelten lassen. Bartels (die Respiration S. 99—102. 141—150.) stellt die entgegengesetzte Ansicht auf. Nach ihm häuft sich bey dem Ausathmen Blut im Gehirn an, aber venöses, welches nicht reizend, vielmehr lähmend, gleichsam narkotisch auf dasselbe und so auch auf seine Athmungsnerven einwirkt, indem zugleich das arteriöse Blut weniger Spielraum findet; bey dem Einathmen hingegen strömt Letzteres von Neuem zu, erregt das Gehirn und sein zehntes Nervenpaar, und veranlaßt so das Ausathmen. In dem Rückenmark findet eine solche Ebbe und Fluth des Bluts nicht Statt, da seine Gefäße anders verlaufen und seine Gefäßhaut, vermöge größerer Festigkeit, der Ausdehnung mehr widersteht; während nun der zehnte Hirnnerve unthätig ist, wird der Zwerchfellnerve mit den Brustnerven antagonistisch um so thätiger, und dadurch entsteht die Bewegung des Einathmens. Allein a) das erste Einathmen nach der Geburt, oder nach tiefer Ohnmacht, oder nach dem Scheintode, erfolgt, ohne daß arteriöses Blut vorhanden ist und ohne daß das Gehirn zuvor gewirkt hat: wenn nun das Rückenmark eigenmächtig die Athmungsbewegungen bestimmt, warum sollte es das Gehirn nicht eben so vermögen? b) Nach langem Einathmen häuft sich (z. B. bey dem Keichhusten) ungleich mehr venöses Blut im Gehirn an, als bey dem natürlichen Ausathmen; demungeachtet erfolgt das Ausathmen, und der Trieb hierzu nimmt in demselben Maße zu, als die Einathmung länger dauert. c) Im verlängerten Marke sind nicht bloß die Centralenden von ausathmenden, sondern auch von einathmenden Nerven; ja, der zehnte Hirnnerv ist selbst für das Einathmen wichtig; wenn also venöses Blut bey dem Ausathmen die Nerven des verlängerten Marks lähmt, so könnte gar kein Einathmen erfolgen. d) Die Athmungsbewegungen des Kiefers dauern fort, wenn der Kopf vom Rumpfe getrennt ist und gar kein Blut mehr empfängt. e) Wie Treviranus (Schriften I. S. 106.) bemerkt, findet bey Fröschen während des Aus- und Einathmens kein solches Steigen und Senken des Gehirns; mithin auch keine solche Ebbe und Fluth des Blutes in ihm Statt, und doch bestimmt das Gehirn die Athmungsbewegungen bey ihnen, wie bey warmblütigen Thieren. — Wir müssen also diese Theorien, welche die Bestimmung der Hirnthätigkeit vom Blute ableiten, aufgeben. Sie gehören zu den eiteln Bestrebungen in der Physiologie, den Grund der einen Lebenserscheinung in der andern zu finden, und so den Mechanismus zu erklären, wobey man am Ende nur im Zirkel sich dreht, die Feder des ganzen Mechanismus sich erträumt, und, um nur vor der Hand das Einzelne erklären zu können, die Erfahrung

entstellt. So glaubte man das Athmen von Nichts Andreem ableiten zu können, als davon, daß bald in den Lungen, bald in dem Gehirne eine Stockung des Blutes entstehe, welche das Leben zu vernichten drohe, ungeachtet wir von einer solchen Stockung bey dem natürlichen Athmen gar keine Erfahrung haben; man klemmte das Leben zwischen Steckfluß und Schlagfluß, und meynte, um Jenem zu entgehen, athme man aus, und um Diesen zu verhüten, athme man ein.

§. 297. Halten wir uns vielmehr an die reine Anschauung dessen, was die Beobachtung gelehrt hat! Das Centralorgan des Nervensystems hat ein pflanzliches Leben, welches seine Kraft durch die Nerven über die Athmungsorgane ausbreitet und die Bewegungen derselben erregt. Wie dieses in seinem bewußtlosen Einwirken auf Bewegung und Bildung mit dem rein organischen Leben übereinstimmt, so muß es auch den rhythmischen Charakter mit ihm gemein haben. Alles Leben ist ein Wechsel von Steigen und Sinken, von Expansion und Contraction, und dieser Wechsel ist, wie der Umlauf der Planeten, an bestimmte Zeiten geknüpft; in dem lebendigen Leibe selbst liegt der Grund dieses Wechsels, dessen Regelmäßigkeit nur gestört wird, insofern die Einzelheit in der Natur störend eingreift, insofern also entweder ein einzelner, sogenannter zufälliger, äußerer Umstand, oder eine psychische Individualität einwirkt. In einem organischen Systeme zeigt sich aber der Wechsel so, daß während das eine Glied nach der einen Richtung hin wirksam ist, das Andre im entgegengesetzten Zustande sich befindet, so daß Expansion und Contraction immer gleichzeitig bestehen, nur Jedes an einem besondern Theile: so bey der Bewegung des Herzens, oder bey der wurmförmigen Bewegung der Därme. Auf gleiche Weise wird nun auch das pflanzliche Leben im Centralorgane des Nervensystems einem innern Typus folgen und in einem gesetzmäßigen Wechsel sich äussern, so daß es in dem einen Momente von dem einen Puncte erregend nach aussen tritt und Bewegungen anfaßt, während es im andern Puncte sich nach innen wendet und das Aeusserere ruhen läßt, in dem folgenden Momente aber umgekehrt im erstern Puncte in sich zurückkehrt, und vom zweyten aus über die Nerven ausströmt. Dieses antagonistische Verhältniß hat Bartsch (die Respiration S. 99. fg. 133. 170.) in Hinsicht auf den herumschweifenden Nerven und den Zwerchfellnerven bereits aufgefaßt, und mit einer Pendelschwingung, mit dem Steigen und Sinken der Arme eines Hebels treffend verglichen. Wir wollen diese Ansicht, die er, wie uns scheint, zu früh verläßt, fest halten. a) Der herumschweifende Nerve ist als der eigentliche Athmungsnerve zuerst zu betrachten. Der äussere Zweig seines obern Kehlkopfstastes vermittelt die Einathmungsbewegungen, nämlich das Herabziehen des Kehlkopfs durch den *Sternothyroideus* und das Herabziehen des Zungenbeins durch den *Thyrohyoideus* und *Gendohyoideus*; sein unterer oder zurücklaufender Ast bewirkt dieselben vermittelt der Erweiterung der Stimmritze, besonders durch den *Cricothyroideus posticus*. Aber noch ausgebreiteter ist die Wirksamkeit dieses Nerven auf das Athmen, indem er nicht nur vermittelt seiner Brustzweige die Zusammenziehung der Lungen und der Luftröhre erregt, sondern auch in den innern Zweigen seines obern Kehlkopfstastes, vornehmlich durch den *Arytenoideus obliquus* die Kehlritze verengt. Er stellt also ein ganzes System dar, welches Gegensätze in sich schließt: der äussere Zweig des obern Kehlkopfstastes wirkt gleichzeitig mit dem zurücklaufenden

Aste heym Einathmen; der innre Zweig des Erstern ist zugleich mit den Lungenästen wirksam beym Ausathmen. Wie beym Durchschneiden des zurücklaufenden Astes der innre Zweig des obern Kehlkopfstes stärker wütht und die Kehltritz schließt (§. 287), so wird auch im Normalzustande, wenn die Thätigkeit des einen Zweiges nachläßt, die des Andern um so stärker hervortreten und die entgegengesetzte Bewegung erregen. Uebrigens spricht sich in dem zehnten Nerven das pflanzliche Hirnleben am entschiedensten aus, da es theils an die unwillkürlichen Muskelfasern der Lungen und der Luftröhre sich verbreitet, theils auch die Bewegungen des Kehldeckels und der Schnepfenknorpel der Herrschaft der Willkühr sehr entzogen sind, so daß man sie nur vermittelst einer Feuchtigkeits oder einer festen Substanz, die man schluckt, oder der Luft, die man athmet, hervorbringen kann. — b) Tiefer unten, in gleicher Höhe mit den sechs oder sieben obern Halsnerven, entspringt der elfte Hirnnerv, welcher beym Einathmen das Aufheben der Schulter durch den *Cucullaris*, und wenn das Athmen mühsamer ist, selbst das Aufheben des Brustbeins und Schlüsselbeins durch den *Sternocleidomastoideus* vermittelt. Der Zwerchfellsnerv entspringt in mittlerer Höhe der Ursprünge des elften Hirnnerven, vorzüglich vom vierten Halsnerven, und giebt das wichtigste Moment des Einathmens durch die Zusammenziehung des Zwerchfells. Wie die mittlern Halsnerven durch den *Omohyoideus* und *Cucullaris*, und die untern durch den *Levator scapulae*, durch die *Rhomboideus* und *Scalenos*, so bewirken die Brustnerven durch die *Intercostales* und *Levatores costarum* das Einathmen. Also der ganze Hals- und Brusttheil des Rückenmarks bestimmt die Einathmungsbewegungen, und zwar so, daß der Antrieb zu denselben in der Gegend des Centralendes der vierten Halsnerven am stärksten ist, und von da aus nach oben und nach unten schwächer wird. — c) Der Theil des Rückenmarks, welcher die Centralenden der Bauchnerven enthält, bestimmt durch die Bewegungen der Bauchmuskeln das Ausathmen. Er steht also in Antagonismus mit dem obern Theile des Rückenmarks, so daß er zu wirken beginnt, wenn dieser zu wirken aufhört. Dagegen steht er in Consensus mit der Majorität des zehnten Hirnnerven, namentlich mit seinen Lungenästen, Luftröhrenästen, und dem innern Zweige des obern Kehlkopfstes.

§. 298. Wenn nun aus diesen Betrachtungen augenscheinlich sich ergibt, daß das pflanzliche Leben in dem Centralorgane des Nervensystems in Hinsicht auf seinen Rhythmus sich eben so verhält, wie die Bewegung des Herzens oder des Darms, daß also während die eine Stelle stärker nach aussen wütht und eine Zusammenziehung der Muskeln erregt, die zunächst angränzende Stelle pousirt und eine Erschlaffung gestattet, so dürfen wir vermuthen, daß auch an den Centralenden der übrigen zum Athmen mitwirkenden Nerven ein gleiches Verhältniß Statt finde. Zwischen dem zehnten und elften Nerven entspringt aus dem verlängerten Marke der zwölfte Hirnnerv, der durch Aufhebung des Zungenheims vorzüglich zum Ausathmen mitzuwirken scheint. Oberhalb des zehnten entspringt der neunte und siebente; Beyde scheinen vorzüglich die Einathmungsbewegungen zu vermitteln, Jener durch Herabsiehen der Zunge, Dieser durch Herabziehen des Unterkiefers und des Zungenbeins, so wie durch Erweiterung der Nasenlöcher. Noch höher entspringt der fünfte Nerve, welcher vorzüglich dem Ausathmen durch Aufheben des Unterkiefers, des Zungenbeins und der Zunge, so wie durch Herabziehen des

Gaumensegels zu dienen scheint. Endlich können wir zum sensibeln Athmungs-systeme wohl noch das erste Hirnnervenpaar rechnen, insofern seine Function mit dem Einathmen eng verbunden ist. Wir erhalten dann folgende Uebersicht des Ganzen:

Erster Hirnnerv	Einathmen
Fünfter —	Ausathmen
Siebenter —	Einathmen
Neunter —	
Zehnter —	
Zwölfter —	Athmen
Elfter	Ausathmen
Halsnerven	Einathmen
Zwerchfellnerv	
Brustnerven	
Bauchnerven	Ausathmen.

Hiernach erscheinen Gehirn und Rückenmark in Beziehung auf das Athmen als ein System, aus wechselseitig auf einander folgenden positiven und negativen Gliedern bestehend. Das Centralende des zehnten Hirnnerven macht den Mittelpunkt des Ganzen aus; es bestimmt Einathmen und Ausathmen, und insofern es mehr der Willkühr entzogen ist und am unmittelbarsten auf die Plasticität einwirkt, stellt es den eigentlichen Indifferenzpunkt dar. Von ihm aus nach oben erstreckt sich eine Reihe von Nerven, in welchen die Ingestion und die Sensibilität vorherrscht, da sie sämmtlich mit der Sinnesthätigkeit in näherer Beziehung stehen: zuerst der Zungenschlundkopfnerv und der Antlitznerv für das Einathmen; dann der dreygetheilte Nerv für das Ausathmen; endlich als polares Ende der Riechnerv, welcher gar nicht mehr nach aussen und auf Bewegung wirkt, sondern die Function des Einathmens in ein innerliches sensibles Aufnehmen unwandelt. Wie die obre Reihe zunächst am zehnten Hirnnerven mit Einathmungsnerven beginnt, so hebt die untere Reihe mit einem Ausathmungsnerven an, und bezeichnet dadurch ihren Charakter als vorwaltende Irritabilität und Egestion: der Zungenfleischnerv ist der einzige Nerv dieser Reihe, welcher zu einem Sinnesorgane geht, und zwar gehört er demjenigen Sinnesorgane zu, dessen Element die Irritabilität ist, und hat selbst keinen Antheil an der Sensation, sondern vermittelt nur Bewegungen. Darauf folgen die wichtigsten Nerven des Einathmens überhaupt; sie gehören dieser irritablen Reihe an; insofern die Bewegung überhaupt vorzüglich nur auf das Einathmen sich bezieht, und indem sie über eine so große Fläche des Rückenmarks ausgebreitet sind, scheint es, als ob ein kleiner Raum desselben unvernünftig wäre, diese Bewegungen zu vollziehen, und als ob nur eine Combination vieler Punkte sie zu Stande bringen könnte. Endlich folgt als unterer Pol das Centralende der Bauchnerven: wie im Riechnerven die Beziehung zum Athmen, als Bewegung, beschränkt ist, dagegen ein eigener, wenn auch verwandter Zweck sich zeigt, und die Thätigkeit gegen das innere, geistige Leben sich wendet, so dienen die Bauchnerven ebenfalls nur mittelbar und auf entfernte Weise dem Athmen, denn die von ihnen bestimmten Bauchmuskeln beziehen sich zunächst vorwaltend auf die Verdauung, und stellen die entschiedensten Egestionsmuskeln dar; auf die grösste Materiali-

tät sich beziehend, bilden sie demnach auch den schneidendsten Gegensatz zum Riechnerven.

§. 299. Die Athmungsbewegungen werden also von einem sehr bedeutenden Theile des sensibeln Centralorgans bestimmt, jedoch so, daß im Gehirn das Centralende des herumschweifenden Nerven, am Rückenmark hingegen des des Zwerchfellnerven den wichtigsten Punct ausmacht. Ist ein Punct thätig, so wirken die consensuellen Puncte des Centralorgans mit, während die antagonisirenden pausiren; hört er auf zu wirken, so fangen diese an. Aus den mannichfaltigen Verhältnissen dieser verschiedenen Factoren unter einander ergeben sich nun die mancherley Respirationsacte, welche als besondro Arten des Athmens überhaupt sich darstellen, und bey welchen bald ein überwiegendes Einathmen, z. B. bey'm Schluchzen, bald ein überwiegendes Ausathmen, z. B. bey'm Niesen, hervortritt. Sie können durch verschiedene Umstände hervorgebracht werden, z. B. eine Form mit überwiegendem Einathmen kann entstehen von einer Erregung eines oder mehrerer Einathmungsnerven; oder von einer Unterdrückung der Thätigkeit eines oder mehrerer Ausathmungsnerven; jene Erregung und diese momentane Lähmung kann entweder in der Peripherie der Nerven ihren Sitz haben, und bald von unmittelbarer äußerer Einwirkung, bald von consensueller Uebertragung herrühren, oder vom Centralorgane ausgehn. Die Stimme wird ihrem wesentlichen Theile noch im Kehlkopfe erzeugt, hängt demnach auch von dem durch das zehnte Nervenpaar vermittelten Einflusse des Gehirns ab. Wird dieser Nerve auf beyden Seiten unterbunden oder durchschnitten, so geht sogleich die Stimme verloren: schon Galen (*de Hipp. et Plat. lib. II p. 854. de anat. admin. lib. VIII. p. 351. sqq.*) kannte diese Erfahrung; Willis (*cerebrum p. 127.*), Vieussens, Petit, Haller (*elem. III. p. 409. opp. I p. 360. sqq.*), Brunn (*Ludwig script. neur. II. p. 285. sqq.*), Dupuytren, Dupuy, Emmert und mehrere Andre bestätigten sie. In seltenen Fällen wird die Stimme nicht verloiret, aber doch widernatürlich, wenn der Nerve unterhalb des obern Kehlkopfnerve durchschnitten ist, Letztrer also noch auf die Muskeln wirkt: so beobachtete Cruikshank (*Reils Archiv II. S. 61.*), daß ein Hund, welcher 28 Stunden nach der Durchschneidung starb, bey jedem Ausathmen laut bellte. Wird nur der Nervenstamm der einen Seite unterbunden oder durchschnitten, so geht die Stimme bisweilen sogleich verloren, und wird in andern Fällen nur schwächer; Beydes beobachtete z. B. Petit (*Acad. de Paris 1727. p. 7—10.*); wurden Stücke herausgeschnitten, so wurde nach Cruikshank's (a. a. O.) Beobachtungen die Stimme verstimmt, nach Arneemann (91, 107, 108, 112. Versuch) bloß rein, hoch und heiser. Haigh-ton (*Reils Archiv II. S. 80.*) beobachtete nach Durchschneidung des einen Nerven Stimmlosigkeit, wenn aber nach erfolgter Verheilung desselben späterhin der der andern Seite durchschnitten war und ebenfalls wieder verwuchs, so wurde nach einem halben Jahre auch die Stimme wieder hergestellt. — Noch deutlicher ist der Erfolg, wenn der Stamm unverletzt bleibt und bloß die zurücklaufenden Nerven beyder Seiten durchschnitten werden, indem dann die Störung des Athmens und die Gefährdung des Lebens geringer ist. Hier entsteht oft Stimmlosigkeit nach Galen (*de anat. admin. lib. VIII. c. 4 p. 100. de loc. aff. lib. IV. c. 6. p. 6. de praeognitione c. 5. p. 216.*), Vesal, Columbus, Chirec, Riolan und mehrere Andere; in andern Fällen, welche Valsalva und Emmert (Morgagni

LII, 27.) beobachteten, kehrte die Stimme nach einigen Tagen zurück, und wurde allmählig wieder stärker; in andern Fällen ging die Stimme gar nicht verloren (Drelin-court), oder wurde nur heiser und schwierig (Arneemann 63. Versuch). In den letztern Fällen müssen die unverletzt gebliebenen obern Kehlkopfzweige vermöge ihrer Anastomose mit den untern die Function der Letztern mit übernommen haben. So wurde auch nach Monroe (p. 65.) und Arneemann (85. 86. Versuch) auf Durchschneidung des rücklaufenden Nerven der einen Seite die Stimme nur einen oder zwey Monate lang schwach, quärend, heiser und hernach wieder natürlich.

§. 300. Wir haben nun den Einfluß des pflanzlichen Hirnlebens auf die Thätigkeit des Gefäßsystems, und zwar zuvörderst auf den Schlag des Herzens und der Arterien zu erwägen, und stellen zunächst Das, was directe Versuche darüber gelehrt haben, zusammen, um eine Grundlage für andre Beobachtungen zu gewinnen. — Wenn man nur zu oft darauf ausging, die Lebenskraft im Netze zu fangen, und den Quell des Lebens unter das anatomische Messer zu bringen, so konnte man auch meynen, daß das Gehirn allein wirklich lebe und daß nur durch seinen Einfluß das an sich tode Herz in lebendige Thätigkeit versetzt werde. Die Erfahrung widerlegte diese Ansicht. a) Der herumschweifende Nerve kann unterbunden oder durchschnitten werden, ohne daß die Bewegung des Herzens dadurch sogleich aufgehoben wird: dies bemerkte schon Galen (*de Hipp. et Plat. lib. II. c. 6. p. 239.*), dann Riolan, Emmet, Martin (Haller elem. III. p. 409.), endlich Bichat (*recherches p. 334.*). Eben so kann man ihn reizen, ohne daß der Herzschlag dadurch beschleunigt wird: dies beobachteten Senac und Haller (*elem. I. p. 463.*), Cruikshank (Reils Archiv II. S. 70.), und Bichat (p. 334. 339.). b) Das Gehirn kann gereizt oder zusammengedrückt werden, ohne daß eine entsprechende Veränderung im Herzschlage eintritt: so beobachtete es Bichat sowohl bey mechanischer Einwirkung auf das Gehirn (p. 334.), als auch bey galvanischer Armirung des Gehirns und des Herzens an Fröschen (p. 336.) und enthaupeten Menschen (p. 339.). Auch Wilson (S. 65.) überzeugte sich, daß ein beträchtlicher Druck auf das Gehirn den Herzschlag wenig oder gar nicht ändert. Derselbe (S. 54. 58.) sah ferner, wie Treviranus (verm. Schriften I. S. 104.), daß bey Fröschen das Gehirn ohne Einfluß auf das Herz zerstört und aus dem Schädel genommen werden konnte. Gleiches gilt von der Durchschneidung des Rückenmarks und von dem Abschneiden des Kopfs, wenn dabey der Blutverlust gehindert wird, nach Brodie (Reils Archiv XII. S. 137.); der Herzschlag dauert dann auch bey warmblütigen Thieren mehrere Stunden fort, wenn man das Athmen künstlich fortsetzt. Auch Flourens (p. 189. 196.) sah, daß nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks der Blutlauf fort dauerte; aber geschwächt wurde, und zwar zuerst an der Peripherie, und von da aus fortschreitend gegen das Herz zu. c) Daß das ausgeschnittne Herz sich noch bewegt, wußte schon Galen (*anat. administr. lib. VII. c. 8. p. 96.*). Er lehrte daher (*de Hipp. et Plat. lib. III. c. 6. p. 245.*), daß Herz und Gehirn durch eigene Kraft ihre eigentümlichen Functionen vollziehen. — Wollte man den Einfluß des Gehirns in allen diesen Erfahrungen durch die Annahme zu retten suchen, daß die in der Substanz des Herzens sich verbreitenden Zweige, des herumschweifenden Nerven an der vom Gehirn empfangenen Kraft nach dessen Trennung oder Zerstörung noch eine Zeit-

lang zehren, so ließe sich dagegen Wilsons (S. 67.) Erfahrung auführen, nach welcher das nach Zerstörung des Gehirns nur schwach sich bewegende und dann völlig still stehende Herz durch die Ruhe wieder Kraft gewinnt und von Neuem pulst.

§. 301. Der Einfluß des Gehirns ist also nicht die Ursache des Herzschlags, aber wohl ein Bestimmungsgrund desselben. Dies geht hervor a) aus allen den obigen Erfahrungen, insofern nach aufgehobenem Zusammenhange mit dem Gehirn das Herz auch unter den günstigsten Umständen nach einigen Stunden starb. So wie nichts Einzelnes im Organismus besteht, so ist auch die Thätigkeit des Herzens durch den Einfluß des Hirnlebens organisch bedingt. b) Die an das Herz sich verbreitenden Hirnnerven deuten schon darauf hin. Wenn Galen. (*de usu part. lib. VI. c. 18. p. 155.*) sagte, daß sich, ausser bey einigen großen Thieren, keine Nerven an das Herz, sondern bloß an den Herzbeutel zu verbreiten scheinen, dann meynte (*de Hipp. et Plat. lib. I. c. 10. p. 233.*) das Herz habe bloß einen schwachen Nerven, und endlich (*Ibid. lib. II. c. 8. p. 240.*) behauptete, es habe bloß nervöse Theile d. i. Sehnenfasern, keine wirklichen Nerven, so meynten Sömmering und Behrds mit mehr Gründlichkeit, daß seine Nerven nicht sowohl seiner Substanz, als vielmehr seinen Kranzadern zugebören. Aber diese Meynung wird, wenn auch nicht durch Scarpas anatomische Gründe, so doch durch die folgenden physiologischen Erfahrungen widerlegt. Zuvörderst erfolgte auf Unterbindung des herumerschweifenden Nerven nach Willis (*cerebr. p. 127.*), Lowera (*de motu cordis p. 90.*) und Morgagni's (XIII. 26. 37.) Beobachtungen ein Erbeben des Herzens, oder nach Chirac und Senac (*Haller elem. I. p. 462.*) eine Schwächung, oder nach Boyle (ebend.) ein Aussetzen seiner Bewegung. Nach Durchschneidung des Nerven beobachtete Haighton (Reils Archiv II. S. 77.) Herzklopfen, und Emmert (ebend. IX. S. 408.) ein Anschwellen der Halsvenen und geringere Ausdehnung der Carotiden vermöge der geschwächten Bewegung des Herzens; und nach dem Ausschneiden eines Stückes aus dem Nerven sahen Arneemann (Versuche, an Kaninchen 2v.) und Cruikshank (Reils Archiv II. S. 59. 61.) eine Beschleunigung des Herzschlags. Doch alle diese Erfahrungen beweisen nichts, denn die hier beobachteten Veränderungen des Herzschlags konnten abhängen erstlich von der Störung des Athmens, welche auf die Verletzung des Stimmnerven erfolgt; zweytens von den Strühen des Thiers und seinen Versuchen zu entfliehen, da jede lebhaftige Bewegung der willkührlichen Muskeln auch den Herzschlag beschleunigt; drittens von dem psychischen Zustande des gequälten und gekünstigten Thiers, indem aus dieser Ursache oft schon nach bloßer Oeffnung des Schädels und der Wirbelsäule, ehe noch Nerven oder Gehirn und Rückenmark verletzt sind, der Kreislauf aufhört (Wilson S. 58.). Solche Versuche können also nur dann ein Resultat geben, wenn zuvor Empfindung, willkührliche Bewegung und Athmen aufgehoben und Letzteres künstlich fortgesetzt wird, so wie dann, wenn besondere Reize auf die Nerven angebracht werden. Dahin gehören nun theils die in diesem Werke (I. Bd. S. 228.) angeführten Versuche Hallers, Humbolds und Fowlers, vorzüglich aber die von mir gemachte Erfahrung (ebendas. S. 220. fg.), daß die Befuchtung des herumerschweifenden Nerven mit Kali oder Ammonium die Pulsation des Herzens verstärkte. c) Wenn daher auch auf Emmerts (Meckels Archiv I. S. 183.) Beobachtung, daß auf Durchschnei-

dung des verlängerten Marks der Herzschlag sogleich vermindert und unfühlbar wird, und eine geöffnete Arterie wenig Blut giebt, kein großes Gewicht zu legen ist, so beweisen dagegen die auf obige Weise von Wilson angestellten Versuche um so bestimmter, daß gewisse Affectionen des Gehirns den Herzschlag verändern. Die Resultate dieser Versuche sind folgende. Um auf das Herz zu wirken, braucht man irgend eine Gegend des Gehirns, an der Oberfläche oder im Innern zu reizen; während vorzüglich nur bey Reizung des Hirnstammes und namentlich der Nähe der Nervenursprünge Krämpfe in den willkürlichen Muskeln entstehen. Mechanische Affection des Gehirns wirkt auf die willkürlichen Muskeln leicht und stark, auf das Herz nicht so leicht, und nur wenn sie eine große Fläche trifft (S. 82. 87.) oder plötzlich und gewaltsam ist, wie denn namentlich die Zerquetschung des Gehirns mit einem Hammerschlage die Bewegung des Herzens sogleich bedeutend schwächt oder aufhebt. Nur die Anbringung von Salpetersäure oder Salzsäure auf das Gehirn wirkte auf die Muskeln (S. 84.); die Application von Weingeist, Opiumtinctur und Tabacksaufguß beschleunigte nur den Herzschlag, aber so bestimmt, daß er sogleich wieder langsamer wurde, wenn man diese Flüssigkeiten abwusch, und von Neuem sich beschleunigte, wenn sie wieder angebracht wurden (S. 62 — 65. 70. 83.). Die Affection des Herzens erfolgt noch, wenn die Muskeln nicht mehr durch Reizung des Gehirns in Bewegung gesetzt werden können, und dauert gleichförmig fort, solange der reizende Körper mit dem Gehirne in Berührung steht, während in den Muskeln nur vorübergehende Zuckungen Statt finden, ungeachtet der Reiz im Gehirne bleibt (S. 85.). Fassen wir nun dies Alles zusammen, so scheint daraus zu folgen, daß eine eindringende, durchgreifende, mehr über die Gesamtheit des Gehirns sich verbreitende Affection, namentlich auch durch solche Substanzen, welche überall auf die Sensibilität specifisch einwirken, den Kreislauf zu verändern vermag.

§. 302. Was nun die gewöhnliche Wirkung äusserer Reize betrifft, so sehen wir allerdings, daß specifische Reize des Gehirns, Opium, Wein u. s. w. auch den Kreislauf beschleunigen, und der bey darauf erfolgter Bewußtlosigkeit in seiner Kraft sich erhaltende Herzschlag ist keinesweges, wie Bichat (*recherches* p. 333.) meynt, ein Beweis völliger Unabhängigkeit des Herzens, da bey schon sinkender psychischer Thätigkeit die pflanzliche Hirnthätigkeit noch gesteigert seyn kann. Daß aber diese Substanzen und namentlich die narkotischen Gifte nur das Gehirn unmittelbar, durch dieses aber erst mittelbar das Herz afficiren, wird durch Brodies (Reils Archiv XII. S. 166. — 170. 210.) Versuche sehr wahrscheinlich, indem Tabacksaufguß oder *Woorara* bey Hunden mit unverletzter Hirnthätigkeit einen Stillstand des Herzens, bey enthaupteten Hunden hingegen mit künstlichem Athmen eine Beschleunigung des Herzschlags mit heftigen Krämpfen in allen willkürlichen Muskeln bewirkte.

§. 303. Noch bestimmter zeigt sich der Einfluß des Gehirns im krankhaften Zustande desselben. a) Bey *Hémicéphalie*, Hirnbruch und angeborener Hirnhautwassersucht fehlt bisweilen (Nr. 630.) der Herzbeutel, und (Nr. 347.) das Herz hat dabey eine abnorme Lage; in andern Fällen (Nr. 290. 649.) ist der Puls sehr schwach und langsam; in noch andern (Nr. 627.) ist er natürlich. b) Bey der *Encephalitis* ist der Herzschlag nicht sehr merklich verändert, im Ganzen genommen klein, schnell, schwach und veränderlich.

Dieselben Merkmale hat er auch bey der Meningitis, wo er anfänglich schnell, dann bey dem Eintritte der Oppression langsam, und endlich ungemein schnell, schwach, unregelmäßig und aussetzend zu seyn pflegt. Bey der Perimeningitis ist der Puls hart und gespannt. c) Entscheidender sind die Erscheinungen bey der Hirnerschütterung: der Puls ist hier (Nr. 806.) anfänglich gar nicht zu fühlen, und wird zunächst ungleich, aussetzend, klein, dann aber langsam, voll, weich und matt. d) Am augenscheinlichsten ist der Einfluß des Gehirns, wenn dasselbe durch irgend einen Körper gedrückt wird. Bey Blutergießung ist der Puls gewöhnlich unregelmäßig, ungleich, hart, gespannt, zuweilen ansetzend, oder langsam, oder unterdrückt: so sank er bey einem Knaben allmählig auf 60, 40; 30 bis 15 Schläge in der Minute (Nr. 235.). Wenn Knochensplitter oder andre fremde Körper in das Gehirn gedrungen sind, so ist der Puls zusammengezogen und klein, bisweilen schnell, bisweilen so selten, daß man z. B. (Nr. 1046.) nur 58 Schläge in der Minute zählt. Bey depressirten Schädelknochen ist er unterdrückt, oder schnell, klein und hart. Bey stockendem Eiter ist er unterdrückt; bey Aftergebilden ist er bisweilen klein und unregelmäßig, und sinkt bis auf 40 Schläge in der Minute (Nr. 886. 944.). Wie das ergossene Blut (Nr. 230. 823.), der fremde Körper (Nr. 94.), oder der stockende Eiter (*Queenay in ac. de chir. II. p. 130.*) aus dem Gehirne entfernt, oder der eingedrückte Schädelknochen heraufgehoben wird (*Siebolds Tagebuch S. 16. Klein in Gräfe III. S. 222.*), so wird alsbald der Puls normal, größer, stärker, freyer, weicher, regelmäßiger, und wenn zuvor die geöffnete Vene kein Blut gab, so fängt dasselbe jetzt an, reichlich zu fließen. Umgekehrt, wenn man einen Schwamm der festen Hirnhaut in die Schädelhöhle zurückbringt, so wird der Puls klein (*Louis in ac. de chir. XIII. p. 57.*). Hiermit ist nun völlig erwiesen, daß das Gehirn durch einen örtlichen, mechanischen Druck gelähmt wird, und daß diese Lähmung die Thätigkeit des Herzens schwächt und stört. Es wird noch bestätigt durch die Erscheinungen bey Veränderungen der Stellung: bey Ergießung von Wasser in den Hirnhöhlen konnte ein Kranker nicht auf dem Rücken liegen, sondern mußte mit gebeugtem Kopfe sitzen; bog er den Kopf nur etwas rückwärts, so entstand sogleich Herzpöchen und eine tiefe Ohnmacht (*Willis de morb. convuls. p. 67.*); bey einer Atrophie des kleinen Hirns (Nr. 664.) und bey einer Eiteransammlung im Vorderlappen (Nr. 54.) verursachte die aufrechte Stellung sogleich Ohnmacht, und bey einer Eiterung in den Vierhügeln (Nr. 438.) verursachte jede Bewegung eine Anwandlung von Ohnmacht. Dadurch wird es denn nun auch zur Gewisheit gebracht, daß die Ohnmacht zuweilen vom Gehirn ausgeht, da sowohl ihre Gelegenheitsursachen (psychische Veranlassungen, Schmerzen, Riechstoffe u. s. w.), als auch die vorgehenden Symptome (Schwindel, Ohrenklagen, Beklemmung, Uebelkeit) darauf hindeuten (*Kreyssig Herzkrankheiten I. S. 322—327.*). So trat Ohnmacht ein bey einem Drucke mit dem Finger auf abgestorbene (Nr. 201.), oder ceröse (Nr. 836.) Stellen des Schädels, oder auf einen Schwamm der festen Hirnhaut (Nr. 909.), ferner schon bey leiser Berührung der Letztern (Nr. 664.), und bey Unterbindung eines Hirnhautwasserbruchs (Nr. 357.). Auch geht aus dem Allen der Grund von Bichats (*recherches p. 342.*) Behauptung, daß das Gehirn nur mittelbar durch Bestimmung des Athmens auf das Herz wirke, hervor.

§. 304. Das Gehirn wirkt aber nicht allein auf das Herz, sondern auch unabhängig von demselben auf die Arterien, denn seine örtliche Abnormität afficirt bisweilen bloß einzelne derselben. Daß bloß in den durch Hirnleiden gelähmten Gliedern der Puls klein ist (Nr. 1065.) ist, ganz in der Regel, je bisweilen (Nr. 215.) ist gleich bey dem Eintritte der Apoplexie der Puls an einem Gliede nicht mehr zu fühlen, und die Lähmung offenbart sich erst späterhin, oder es wird der Puls an dem Arme der dem Hirnfefler entsprechenden Seite ohne Lähmung desselben klein und kaum fühlbar (Nr. 545.).

§. 305. Bey der Hirnerschütterung ist das Gehirn eingesunken und seine Bewegung schwach: diese veranlaßt sich allmählig, wie der Kranke sich erholt (Nr. 3.). Wenn Eiter im Gehirne sich anhäuft, so ist es so zusammengefallen, daß es bedeutend vom Schädel absteht (Kopenhagener Soc. S. 322.). Dieser Zustand ist nicht immer mit allgemeiner Schwäche der Lebensthätigkeit verbunden, sondern oft nur von örtlichem Leiden abhängig (Beiträge I. S. 312. fgg.). Selbst ein unbedeutender Knochensplitter hebt die Bewegung des Gehirns auf, und läßt die feste Hirnhaut flach erscheinen. Wird dann der Splitter (Nr. 75.), oder das extravasirte Blut (Nr. 279.), oder der Eiter (Nr. 901.) aus dem Gehirne oder von dessen Oberfläche entfernt, so fängt das Gehirn wieder an, sich zu bewegen. Diese Substanzen können die Hirnbewegung nicht auf rein mechanische Weise, vermöge ihrer Schwere, aufheben, da diese viel zu unbedeutend ist, sondern sie müssen durch ihre mechanische Wirkung eine Lähmung der Hirnthätigkeit hervorbringen, vermöge deren die Bewegung erlischt oder unmerklich wird. Nun hängt diese Bewegung vom Blutlaufe ab (§. 270.). Es sind also zwey Fälle möglich: die Lähmung des Gehirns wirkt entweder deprimirend auf den Herzschlag, so daß dieser nun wieder auf dasselbe schwächer einwirkt; oder sie wirkt bloß auf die Hirnarterien schwächend. Erstres kann allerdings der Fall seyn; aber auch der letztre Fall kann eintreten. Denn 1) bemerkt man bey der Gegenwart fremder Körper mit Mangel an Hirnbewegung nicht immer eine verhältnißmäßig entsprechende Schwäche des Herzschlages; 2) wissen wir, daß jedes Organ, je nachdem seine Lebensthätigkeit gesteigert oder gesunken ist, auch mehr oder weniger Blut anzieht; 3) haben wir (§. 304.) gesehen, daß die durch fremdartige Substanzen bewirkte Lähmung des Gehirns eine Schwächung des Blutlaufs in einzelnen Gliederarterien herbeiführen kann: sie muß also auf die Hirngefäße ebenso wirken können; 4) nach Dorigny's (*Traité de Biol. V. S. 258.*) Beobachtungen nimmt bey jeder Reizung des Rückenmarks das Anschwellen des Gehirns zu, und Reizungen des Nervensystems beschleunigen die Hirnbewegung, selbst wenn die Luftröhre und die Carotiden unterbunden sind, mithin bloß noch die Wirbelarterien wirken.

§. 306. Der Blutlauf in den Haargefäßen wird durch den Einfluß der Hirnthätigkeit nicht unmittelbar notwendig bedingt, denn er dauert nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks eine Zeitlang ungestört fort (Wilson S. 60.); aber er kann dadurch bestimmt werden, indem eine plötzliche Zerstörung des ganzen Rückenmarks ihn aufhebt, eine plötzliche und gewaltsame Erschütterung des Gehirns ihn beschleunigt, ein Zerquetschen des ganzen Gehirns ihn unterbricht und schwächt, eine Anbringung von Weingeist, Taback oder Opium auf dasselbe ihn anfänglich beschleunigt, dann schwächt,

und in solchem Falle die Entfernung jener Reize ihn wieder herstellt (ebend. S. 72 fg.). Was hier die mikroskopische Beobachtung unmittelbar erkannt hat, bestätigt die allgemeine Erfahrung über die Veränderungen des Blutlaufs in der Haut.

§. 307. Die Wärmeentwicklung wird bedingt durch Blutlauf in den Hautgefäßen und Thätigkeit der daselbst befindlichen Nervenenden; namentlich des Rumpfnerven, und auf diese Weise wird sie auch durch die Hirnthätigkeit bestimmt. Da aber der Kreislauf und die Thätigkeit des Rumpfnerven in eigenen Kräften begründet sind, so ist es auch nicht befremdend, wenn nach aufgehobenem Einflusse der Hirnthätigkeit die Wärmeerzeugung nicht völlig erlischt, so lange jene Thätigkeiten noch bestehen. Die oben (I. Bd. S. 199) angeführten Beobachtungen Brodies sind von Hastings und Wilson (S. 161. fg.), von Emmert (Meckels Archiv I. S. 184.) und Gamage (*New-England Journal of Med.*) dahin berichtigt worden, daß zwar nach Durchschneiden des verlängerten Marks oder nach Abschneiden des Kopfs, oder nach einem betäubenden Schläge auf den Kopf das künstliche Athmen, ungeachtet der Unterhaltung des Kreislaufs, doch den natürlichen Wärmegrad nicht zu unterhalten im Stande ist, daß aber diese Abnahme der Wärme nicht so schnell, wie ohne künstliches Athmen, erfolgt, so lange nur eine mäßige, wie es scheint, für die Umwandlung des Bluts gerade erforderliche Quantität Luft eingeblasen wird; daß aber, wenn man zu viel davon einbläset, der Körper bey fortdauerndem Kreislaufe früher erkalte, als bey gänzlich erloschenem Athmen und Kreislaufe. Den Einfluß der Hirnthätigkeit auf die Wärmeerzeugung beweisen auch die Versuche Provencals (*Journ. gen. de med.* 1810. Janu.) und Wilsons (S. 130.), nach welchen die Durchschneidung des zehnten Hirnnerven, und die Zerstörung des Rückenmarks bey fortdauerndem Kreislaufe und Athmen die Wärme vermindert. Daß dies durch Schwächung des Athmens geschehe (Emmert a. a. O. Legallois p. XX), ist keinesweges erwiesen; vielmehr fand Chossat, daß die Durchschneidung des herum-schweifenden Nerven die Wärmeentwicklung ungleich weniger stört, als die Zerstörung des Gehirns. Uebrigens war die Verminderung der Wärme um so stärker, je weiter nach oben das Rückenmark verletzt wurde. — Bey der chronischen Hirnwassersucht ist die Wärme vermindert, und die in Folge andrer Hirnfehler gelähmten Gliedmaßen sind kalt.

§. 308. Die den Absonderungsorganen eingewebten Nerven gehen durch ihre Thätigkeit einen Bestimmungsgrund für die Absonderung ab, und je nachdem sie mit dem Gehirne in einer nähern oder entferntern Beziehung stehn, übt auch dieses mehr oder weniger Einfluß auf sie aus (§. 314. 323. 324. 328. 332.).

§. 309. Die allgemeine Ernährung ist an und für sich selbstständig, aber die Hirnthätigkeit vermag einen Einfluß auf sie auszuüben. 1) Die Ernährung wuchert antagonistisch, wo das Hirnleben fehlt oder unvollkommen ist. Die kopflosen Mißgeburten sind dicke, klumpige Massen, die aber meist nur aus einem dichten, schwammigen, mit wässeriger oder gallertartiger Flüssigkeit gefülltem Zellgewebe bestehen. Bey den Hemicephalen hat sich diese indifferente Masse schon in Muskeln und Fett polarisch geschieden. Ihr ganzer Körperbau ist dick und stämmig; die Schultern sind breit, so daß die Geburt oft erschwert wird; Muskeln und Haut sind dach; das Fett ist reichlich vorhan-

den, bisweilen fest, körnig, röthlich (Nr. 607. 617. 618. 620. 628. 638. 642.). Auch bey anderweitiger Unvollkommenheit der Hirnbildung (Nr. 649. 651.) ist die Ernährung des Leibes öfters üppig. a) Wo das Hirnleben durch eine Abnormität gestört ist, leidet die allgemeine Ernährung. a) Bey dem Hirnbruche magert der Körper zuweilen (Nr. 288. 293.) schon in den ersten Wochen nach der Geburt ab. b) Bey der chronischen Hirnwassersucht ist die Abmagerung ganz in der Regel (Nr. 340. 361. 371. 377. 381.), auch bey normaler Eßlust und Verdauung (Nr. 341. 363. 365. 374.) oder bey Eßgier (Nr. 367.), und bey gesundem Zustande der Verdauungsorgane (Beyträge I. S. 241.). Bisweilen wird das Kind wohlgenährt geboren, und zehrt (Nr. 358.) in den ersten Wochen ab; öfters ist zugleich das Wachsthum in die Länge gestört (Nr. 398.); ein Kind von anderthalb Jahren (Nr. 339.) war nur 2 Fuß groß; ein Andres (Nr. 370.) hatte eine Länge von 32 Zoll, wovon $\frac{1}{4}$ auf den Kopf kam; ein Kind von 6 Jahren (Nr. 380.) war 36 Zoll lang, wovon mehr als $\frac{1}{4}$ auf den Kopf kam; eine 30jährige Person (Nr. 392.) war nur 4 Fuß 2 Zoll groß, und eine 40jährige (Nr. 395.) hatte nur die Größe eines Kindes. Die Knochen (Nr. 347.) sind sehr schwach, und die Muskeln (Nr. 370.) wenig entwickelt; hey einem fünfjährigen Kinde (Nr. 345.), dessen Körper 24 Pfund; und dessen Kopf 12 $\frac{1}{2}$ Pfund wog, war wenig Blut; fast bloß Serum in den Gefäßen, und die Gesichtsmuskeln waren dünn, bleich; fast verschwunden. In den seltnern Fällen, wo die Ernährung (Nr. 356. 372. 4.) 398.) oder das Wachsthum (Nr. 369.) nicht merklich gestört wird, ist zum Theil eine Annäherung zur Hemicephalie zu erkennen. c) Nach Hirnwunden tritt bisweilen Abmagerung oder Cachexie ein. d) Eine Abmagerung erfolgt ferner zuweilen bey Eiterung, Erweichung, Verhärtung und Afferbildung im Gehirne. Gewöhnlich magert die gelähmte Seite stärker als als die gesunde (Nr. 474. 851.). Wenn die organische Thätigkeit des Gehirns z. B. durch anhaltenden Druck herabgesetzt wird, so zehrt auch der übrige Leib ab. So entsteht bey Geschwülsten der festen Hirnhaut eben sowohl, wie bey Desorganisation der Lungen, der Leber u. s. w. Abzehrung und hektisches Fieber (Beyträge I. S. 76.). Hill (S. 157.) bemerkt, daß, wenn man, um den Hirnschwamm zu verhüten, die Schädelswunde mit Charpie oder mit einer Bleypatte ausfüllt, der Kranke entweder der Schwäche und Niedergeschlagenheit unterliegt, oder an einem schleichenden Nervenfieber abzehrt. In der vor uns liegenden Sammlung pathologischer Beobachtungen (XXXIII. Tabelle) verhielt sich die Zahl der Fälle, wo Abmagerung Statt fand, zur Gesamtzahl der Fälle von Hirnabnormität wie 1: 24, und zwar bey Affergebilden wie 1: 13, bey Gehirnaffekten wie 1: 14, bey Hypertrophie wie 1: 15, bey Verhärtung wie 1: 22, bey Concrementen wie 1: 25, bey Wunden wie 1: 26, bey seltnerer Ergießung wie 1: 27, bey Erweichung wie 1: 43, bey Blutergießung wie 1: 68, bey Atrophie wie 1: 78. — Uebrigens bemerkt Ploucquet (Sommerrings Hirnlehre S. 371.), daß der Körper von Thieren, die an Hirnwunden gestorben sind, früher in Fäulnis übergeht.

§. 310. Unter den eigentlichen Verdauungsorganen ist der Magen mit dem Gehirne am unmittelbarsten verbunden, nämlich durch das zehnte Nervenpaar. Wird dieser Nerv durchschnitten, also der Einfluß der pflanzlichen Hirnthätigkeit auf den Magen aufgehoben, so wird die Verdauung geschwächt und bisweilen ganz unterbrochen, so

dafs, wenn das Thier nach der Operation noch eine Zeitlang gelebt und Nahrung genommen hat, diese nachher weniger, als sonst, oder gar nicht verändert gefunden wird (Hallier elem. I. p. 462. III. p. 409. Legallois p. 214. Macdonald in Meckels Archiv VI. S. 365. u. s. w.). Nur in den seltenen Fällen (Hallier opp. I. p. 360. exp. 132. 135. 136. Brann in Ludwig ser. neurol. II. p. 286 sqq. Dupuy in Meckels Archiv IV. S. 108.) wird durch die Zerschneidung des zehnten Hirnnerven die Verdauung in so hohem Grade gestört, dafs der Speisebrei im Magen faulig und wie Koth aus den weiten Därmen riechend gefunden wird: wenn man aber meynt, dafs diese Erscheinung nicht unmittelbar von der Durchschneidung des Nerven herrühre, sondern zunächst von einem beginnenden Faulfieber (Arnemann Regeneration S. 262) oder von einer antiperistaltischen Bewegung, welche den Koth aus den weiten Därmen in den Magen bringe (Treviranus Biologie IV. S. 343), so hat man keinen andern Beweis dafür, als die Seltenheit der Erscheinung, welche für einen solchen nicht gelten kann, da jene Operation die Verdauung immer stört, die Fäulniß des Speisebreys nur ein höherer Grad gestörter Verdauung ist, und bey allen Experimenten am thierischen Körper der Erfolg, vermöge der individuellen Verhältnisse, bald stärker, bald schwächer hervortritt. — Breschet, Milne, Edward und Favaux (Propriété. FL S. 263.) bemerkten übrigens, dafs, wenn beyde Nerven ohne Substanzverlust durchschnitten, und die durchschnitten Enden nicht weiter von einander getrennt werden, die Verdauung weniger geschwächt wird, als durch Ausschneidung eines Stückes aus den Nerven, oder durch weitere Trennung der Schnittflächen, oder durch Verwundung des Gehirns, dafs aber in den letztern Fällen, wie zuerst Wilson bemerkt hatte, die Anwendung des Galvanismus die Verdauung noch unterstützt. — Bey Hunden, welche die Operation länger überlebten, bemerkte Arnemann (Regeneration 68. 92. 104. 105. 110. Versuch) oft eine bedeutende Abmagerung, welche auch Cruikshank (Edinb Archiv II. S. 61) und Blainville (Gehrens Journ. VII. S. 532.) in ihren Versuchen beobachteten.

§. 311. Wenn es nach diesen Erfahrungen gewifs ist, dafs der directe Einfluß der Hirnthätigkeit durch den herumschweifenden Nerven eine der Bedingungen ist, von welchen die Verdauung abhängt, so kommt es nun darauf an, diesen Einfluß näher zu bestimmen. Wir bemerken hier fürs Erste, dafs durch diese Verbindung mit dem Gehirn der Magen die specifische Empfänglichkeit für die auf ihn einwirkenden Reize erhält, vermöge deren er den Centralpunkt der Bestimmbarkeit des Organismus durch chemisch-dynamisch wirkende Substanzen abgibt. Dupuy (s. a. O.) beobachtete, dafs bey Pferden nach Durchschneidung des zehnten Hirnnerven die in den Magen gebrachten Krähensugen ohne Wirkung blieben. Bey der Hirnerschütterung ist das pflanzliche Hirnleben geschwächt, und daher die Reizbarkeit des Magens so stumpf, dafs nur ausserordentlich starke Gaben von Brechmitteln ein Erbrechen bewirken; daselbe gilt von der Hirnwassersucht und von manchen Fällen der Apoplexie. Dagegen zeigt sich eine solche Unreizbarkeit des Magens zuweilen bey der Hirnentzündung (Lallemand p. 238.) aus dem entgegen gesetzten Grunde, weil nämlich hier die organische Thätigkeit des Gehirns in diesem Organe selbst abnorm gesteigert ist, sich hier concentriert und zu wenig nach aussen wirkt.

§. 312. Die Hirnthätigkeit hat zweyten^{ten} offenbar Einfluß auf die Bewegung des Magens: reist man das Speiseröhrengestlecht des zehnten Nervenpaares in der Brusthöhle mechanisch oder durch Befruchtung mit Weingeist, so zieht sich der Magen zusammen (Tie demann und Gmelin über die Wege aus dem Magen ins Blut. S. 15. 14. 22. 33.). Nach der Durchschneidung dieses Nerven dauert zwar die Bewegung des Magens noch fort (Magendie II. p. 27.), indem er theils noch andre Nerven hat, theils die Bewegung aller plastischen Muskeln weniger von der Nerven-thätigkeit abhängig ist. Aber man beobachtet dabey noch zwey andre Umstände; welche auf eine Schwächung oder theilweise Lähmung des Magens hindeuten, nämlich Ausdehnung desselben, meist mit Anhäufung der in ihm zurückgebliebenen Nahrungsmittel, und Erbrechen. Legallois (p. 214.) fand den Magen von dem nach der Operation gewonnenen und unverdaut gebliebenen Futter enorm ausgedehnt; aber Wilson (S. 99.) bemerkt dieselbe Ausdehnung auch bey Thieren, die nach der Durchschneidung kein Futter mehr genommen hatten, und hierzeugt sie offenbar von einer lähmungsartigen Erschlaffung, denn als eine bloße Folge des Würgens, wie Wilson meynt, läßt sie sich wohl nicht ansehen: auch fand Dupuy (Mémoires Archiv. IV. S. 108.) die Muskelhaut des Magens und der Speiseröhre völlig erschlafft. Das Würgen oder Erbrechen ist die gewöhnlichste Folge der Durchschneidung des zehnten Hirnnerven (z. B. von Petit, Arneemann, Cruikshank u. a. w. beobachtet). Wilson (S. 123) leitet es davon her, daß das unverdaut zurückbleibende Futter die ihres Magensaftes beraubte Fläche des Magens reizt; aber das Würgen erfolgt auch bey leerem Magen. Es scheint vielmehr auf Störung des Gleichgewichts in den Organen der Oberbauchgegend zu beruhen, indem theils die Thätigkeit des Magens in Verhältniß zu der des Zwerchfells, oder die der linken Magenhälfte in Verhältniß zu der der rechten zurücktritt. Denn der obere Magenmund wird ausschließlich von Zweigen des zehnten Hirnnerven umstrickt: ist nun dieser durchgeschnitten, so muß die Gegend des unteren Magenmundes; an welche sich vorzüglich Zweige des Rumpfnerven, so wie auch des Zwerchfellnerven verbreiten, überwiegen werden, und dadurch eine rückgängige Bewegung am Magen entstehen. Eben so wird, wie überall durch das Herausreißen eines Gliedes aus der organischen Kette die übrigen Glieder in hastige unregelmäßige Thätigkeiten verfallen, mit dem Sinken der Lebens-thätigkeit im Magen durch Aufhebung des unmittelbaren Einflusses der Hirnthätigkeit, eine regelwidrig starke und krampfartige Bewegung des Zwerchfells und der Bauchmuskeln, deren Nerven unverletzt geblieben sind, als das zweyte Moment des Erbrechens gegeben. Wenn auf mechanische Reizung des Rachens Erbrechen entsteht, so scheint dies darauf zu beruhen, daß bey erhöhter Reizung der Geflechte des zehnten Nerven am Speiseröhrenkopfe die Magengeflechte desselben Nerven antagonistisch in ihrer Thätigkeit nachlassen, und so ebenfalls jene Disproportion erfolgen muß. Broughton (Magendie Journal I. p. 126) sah bey Berührung des Nerven mit der Pincette Erbrechen entstehen. Uebrigens beobachtete schon Schwarz (Haller Disp. I. p. 336.) bey seinen Vivisectionen, daß die Verwundung des Gehirns meistens theils antiperistaltische Bewegungen des Magens erregte.

§. 313. Die Erscheinungen bey Krankheiten des Gehirns finden in diesen Ansichten ihre Erklärung, so wie sie dieselben hinwiederum bestätigen. Eine abnorme Steigerung der Gefäßthätigkeit am Gehirne hat ein Erbrechen zur Folge bey der Meningitis, wo das

selbe noch vor der serösen Ergießung, anfangs bloß nach dem Essen, späterhin ohne äussern Anlaß, ohne anderweitige gastrische Beschwerden und ohne vorübergehende Uebelkeit erfolgt, so wie auch bey der Peritonitis und Encephalitis. Magendrücken und Mangel an Eßlust finden im ersten Zeitraume der Meningitis meist dabey Statt. Wie der Einfluß der Hirnthätigkeit auf den Magen hief deshalb unterbrochen wird, weil sie bey ihrer intensiven Steigerung in der Extension beschränkt ist, so kann er auch durch intensive Schwächung derselben vermindert werden; und so entsteht das Erbrechen bey der Ohnmacht, bey der Erschütterung und Zusammendrückung des Gehirns ergossene Feuchtigkeiten, wo das mit eintretender Lähmung des Gehirns bey noch bestehender Thätigkeit des Rückenmarks und des Rumpfnerven häufiger werdende Erbrechen die Verschlimmerung des Zustandes bezeichnet. So kann es also bey den verschiednen Abnormitäten des Gehirns, bald auf diese, bald auf jene Weise verursacht werden. Nach der XXXI. Tabelle verhielt sich seine Frequenz zur Gesamtzahl der Fälle wie 1: 9. Bey dem geringsten Drucke auf einen Hirnschwamm (Nr. 1053.) entstand Ekel und Erbrechen; der Druck auf einen Schwamm der festen Hirnhaut verursachte Uebelkeit. (Brown in Repertorium II. S. 105.). In dem (§. 367.) angeführten Falle, wo die Zinke einer Heugabel in das Gehirn gefahren war, entstand nach der Mahlzeit Erbrechen, ohne daß Symptome von Hirnerschütterung vorhanden waren. Bey Kopfwunden erfolgt es bisweilen nach einem chirurgischen Verfahren entweder unmittelbar darauf, z. B. bey Anlegung des Verbandes (Nr. 29.) bey dem Herausnehmen von Knochenstücken (Nr. 13.), nach der Unterbindung eines Hirnbruchs (Nr. 298.), oder am zweyten bis vierten Tage nach Einscheiden (Nr. 888.) oder Abschneiden (Nr. 1007.) eines schwammigen Aftergebildes, und nach der Trepanation (Nr. 129.). Eingedrungene fremde Körper verursachen dasselbe am zweyten (Nr. 43. 94. 436. 320.), dritten (Nr. 95.), oder auch durch Eiterung erst am siebenten Tage (Nr. 88.). Dagegen erfolgt es bey einfacher Eiterung am häufigsten in der zweyten Hälfte der zweyten Woche, am zehnten (Nr. 511. 593.), elften (Nr. 570. 596.), zwölften (Nr. 587.), vierzehnten (Nr. 477. 578.) Tage nach der Verwundung; seltner in der dritten (Nr. 478. 575.), vierten (Nr. 450.), sechsten (Nr. 600.), siebenten (Nr. 830.), dreyzehnten (Nr. 538.) Woche, oder erst nach mehreren Jahren (Nr. 480. 565.). Die Erweichung scheint dasselbe später, etwa in der vierten Woche (Nr. 802.), die seröse Ergießung aber bald früher (in der zweyten Woche Nr. 323.), bald später (in der elften Woche Nr. 324.) nach der Verwundung zu erregen. Eine Depression des Schädels (Nr. 115.) verursachte Magenkrampf. — Daß das mechanische Verhältniß und die Wirkung des senkrechten Druckes oder die Schwere Einfluß hat, sehen wir daraus, daß die aufrechte Stellung bey der Meningitis, so wie bey der ausgebildeten Höhlen- und Hirnhautwassersucht (Nr. 395. 568.) bisweilen sogleich Aufstossen, Uebelkeit und Erbrechen erregt; seltner ist es, daß diese Zufälle durch die wagerechte Lage erregt worden bey Kranken, die nur durch die aufrechte Stellung sich erleichtert fühlen (Nr. 706.). Nach der XXXI. Tabelle erfolgte Erbrechen am häufigsten bey Erschütterung (= 1: 3.), dann bey seröser (= 1: 5.), eitriger (= 1: 6.), blutiger Ergießung (= 1: 7.), bey Aftergebilden (= 1: 6.), Wunden (= 1: 7.), Hydatiden (= 1: 8.), Depression (= 1: 9.),

fremden Körpern ($\equiv 1:10$.); seltner bey Brand, Atrophie, Hypertrophie, Erweichung, Verhärtung und Concrementen.

§. 314. Die Hirnthätigkeit übt endlich auch einen Einfluß auf die Absonderung des Magensaftes aus. Wenn in irgend eine Wunde Arsenik gebracht wird, so erfolgt eine sehr starke Secretion von schleimiger und seröser Feuchtigkeit im Magen: Diese Wirkung bleibt aber nach Brodies (Meckels Archiv I. S. 428.) Erfahrungen aus; wenn vor der Application des Arsens die herumschweifende Nerve durchschnitten worden ist. Diese Operation scheint also die Secretion des Magensaftes zu stören und nach Wilsons (S. 98. 99. 208.) Vermuthung, hierdurch vorzüglich die Verdauung zu schwächen. Man findet nach derselben das Futter im Magen bisweilen ganz trocken (Dupuy in Meckels Archiv IV. S. 108.); Blainville fand zwar bey Vögeln eine weißliche, säuerliche Flüssigkeit im Kropfe angehäuft, indessen fragt es sich, ob die obere Nervenzweige des Kropfs wirklich vom Gehirne getrennt worden waren. — Die pathologischen Erfahrungen scheinen den Einfluß des Gehirns auf die Absonderung im Magen zu bestätigen: bey Eiterung (Nr. 550.) oder Aftergebilden (Nr. 928.) erfolgt zuweilen ein Erbrechen von eitrigem, selbst stinkender Materie, und zu Hirnwunden gesellt sich zuweilen (Nr. 19.) eine Magenentzündung. Die Erweichung und Durchlöcherung des Magens, die besonders bey Kindern vorkommt, ist oft ohne Symptome von Affection des Magens, und dagegen von typhösen, meningitischen und hydrocephalischen Erscheinungen begleitet; die Leichenöffnung zeigt dann blutige, seröse oder eitrige Ergießung an der Oberfläche oder in den Höhlen des Gehirns. In solchen Fällen scheint die kranke Hirnthätigkeit entweder die Absonderung eines abnorm gemischten Magensaftes zu erregen, welcher dann den Magen selbst angreift, oder die lebendige Thätigkeit dieses Organs so zu lähmen, daß es von seinem eignen Secretionsproducte rein chemisch afficirt wird, wie man bisweilen beobachtet, daß der Magen nach dem Tode durch den Magensaft aufgelöst wird.

§. 315. Nach diesen Beobachtungen wirkt also das Gehirn durch sein zehntes Nervenpaar auf die Reizempfänglichkeit, die Bewegung und die absondernde Thätigkeit des Magens. Daß es bloß vermittelt der Athembewegungen auf die Verdauung Einfluß habe, ist höchst unwahrscheinlich. Magendie (II. p. 94.) führt zwar dafür an, daß die Verdauung nach der Durchschneidung des zehnten Nerven unterhalb der Lungenzweige nicht gestört werde; aber er hat wohl aus einzelnen Versuchen zuviel geschlossen, da Brodie (a. a. O.) auch in diesem Falle eine Unterbrechung der Secretion des Magensaftes beobachtete. — Bey Acephalen fehlt gewöhnlich der Magen; bey Hemicephalen hat man ihn bisweilen (Nr. 613.) sehr groß gefunden.

§. 316. Ausser dem zehnten Hirnerven hat unstreitig auch der Rumpfnerv mit seinen Magenzweigen bedeutenden Einfluß auf die Verdauung. Durch ihn wird die Störung dieser Function bey abnormer Thätigkeit andrer Unterleibsorgane oder des Gefäßsystems vermuthet, wie denn in solchen Fällen öfters die vor mehreren Tagen schon genossenen Speisen unverdaut weggebrochen werden. Durch ihn wird ferner das Erbrechen erregt, welches bisweilen bey der Affection des Glinrysystems durch Depression des grauen Staars eintritt. Durch ihn wird wohl auch die Thätigkeit des zehnten Hirnerven in solchen Fällen ersetzt, wo nach Durchschneidung des Letztern die Verdauung wenig oder

gar nicht gestört ist, dergleichen Broughton (*Magendie Journ. I. p. 123. 124. 125.*) anführt. Durch ihn vermag endlich auch das Rückenmark auf die Verdauung zu wirken. Als eine Wirbelspaltingeschwulst (Nr. 366.) geöffnet wurde, erfolgte Erbrechen. Breschet (*Protop. VI. S. 263.*) sah, daß Verwundung des Rückenmarks die Verdauung schwächte. Wenn Wilson (S. 127 — 134) das Rückenmark innerhalb der Brust- oder Bauchwirbel zerstörte, so wurde die darauf in den Magen gebrachte Nahrung wenig oder gar nicht verdaut; wurde dagegen das Rückenmark in der Mitte seiner Länge bloß durchschnitten, so ging die Verdauung noch vor sich. Hieraus folgt denn, daß der Rumpfnerv entweder nur des organischen Zusammenhangs mit einzelnen Stellen des Rückenmarks, unabhängig von dessen Verbindung mit dem Gehirne, bedarf, um gehörig wirken zu können, oder daß er nur durch Zerstörung des Rückenmarks, nicht durch eine einfachere Verwundung desselben, gelähmt wird.

§. 317. Von den Därmen erhält nur das obere Ende Zweige von Gehirnnerven, und nur das untere Ende welche von Rückenmarksnerven; der übrige größere Theil hat nur Rumpfnerven, welche mit Rückenmarksnerven Verbindungen eingehn. Wenn das Gehirn auf die Därme einen Einfluß ausübt, so sind drey Fälle möglich. a) Entweder wird dieser Einfluß durch den sechsten Hirnnerv vermittelt, so daß er hey seinen Anastomosen mit dem Rumpfnerven am Magen und Zwölffingerdarme consensuell den übrigen Darmesal bestimmt; dafür spricht Arneimanns (Regeneration. 66. 91. 94. 104. 105. 107. 110. Vers. und S. 262) Erfahrung, daß hey allen Hunden, welche die Durchschneidung dieses Nerven überlebten, nach einigen Tagen ein Durchfall entstand, der mehrere Monate anhielt, bis die Nervenenden verwachsen waren. Indess könnte man freylich auch es so erklären, daß die Därme in einen abnormen Zustand gerathen wären, weil der Speichrey, den sie empfangen, nicht durch die Magenverdauung gehörig vorbereitet gewesen sey. b) Oder das Gehirn wirkt durch das Rückenmark und dessen Beckennerven auf den Mastdarm; dafür spricht der Umstand, daß bey Abnormitäten des Gehirns häufiger Symptome der Retention und Excretion, als der Secretion in Betreff der Därme, vorkommen, wiewohl diese Symptome auch von dem obern Theile der Därme ausgehen können. c) Oder endlich das Gehirn wirkt durch das Rückenmark auf den Rumpfnerven und dessen Verzweigungen am Darmcanale, welches dadurch wahrscheinlich wird, daß die Entzündung im untern Theile des Rückenmarks Kolikschmerzen zu erregen pflegt, und daß man nach Reizung des Rückenmarks bisweilen eine Verstärkung der peristaltischen Bewegung beobachtet (Wilson S. 112.) Die Natur pflegt sich aber ihre Wege nicht so zu beugen, vielmehr alle Möglichkeiten zu erschöpfen; und so sind wir auch geneigt, zu glauben, daß das Gehirn auf allen drey Wegen auf die Gedärme wirken kann, je nachdem die lebendige Spannung der Organe gegen einander es gerade mit sich bringt.

§. 318. Schwarz (Holler disp. I. p. 356.) sah, wenn er Hunde ins Gehirn stach, bisweilen convulsivische Bewegungen der Därme ohne Convulsionen der Gliedmaßen erfolgen. Wilson (S. 112) sah, daß nach Anbringung von Weingeist auf das Gehirn die peristaltische Bewegung bisweilen verstärkt wurde, diese jedoch ungestört fortsetzte, wenn das Rückenmark zerstört, oder, nebst dem Gehirne, weggenommen worden

war (ebend. S. 103, fg.). Es ist also offenbar, daß der Einfluß der höhern sensibeln Centralpunkte die Darmbewegung nicht verursacht, wohl aber sie stimmen und modificiren kann — Bey Acephalen sind fast immer Därme, wiewohl meist ohne Gekröse, vorhanden, und sie enden bisweilen nach unten eben so blind, als nach oben. Bey Hemicephalen ist bisweilen (Nr. 609) der After geschlossen, oder (Nr. 630) es fehlen auch die weiten Därme; in den meisten Fällen aber ist der Darmcanal normal. — Bey einem Kranken (Nr. 1045) verursachte das Anlegen der Ligatur um einen Hirnschwamm heftige Schmerzen im Unterleibe. Enteritis (Nr. 1086) und Peritonitis (Nr. 796) gesellen sich zuweilen zu Afterbildungen und Erweichung im Gehirne. Man hat Verhärtungen (Nr. 944), Anschwellungen (Nr. 695), Aftergebilde (Nr. 1001), Eiterung (Nr. 19) Blutergießung (Nr. 564) gleichzeitig im Gehirne und in den Därmen, oder dem Bauchfelle gefunden. Bey der Hirnhautwassersucht (Nr. 308.) bemerkt man einen besondern Gestank des Darmkoths; dieser ist meist schleimig und dunkelgrün.

§. 319. Abnormitäten des Gehirns verursachen am häufigsten Trägheit des Stuhlgangs und Verstopfung. Diese ist die gewöhnliche Begleiterin der Hirnerschütterung, so wie zum Theil auch der Meningitis und Encephalitis. Nächst dem bewirken Aftergebilde am häufigsten Verstopfung: nach der XXXII Tabelle verhielten sich die Fälle von Verstopfung bey Aftergebilden zur Gesamtzahl wie 1: 19, und bey seröser Ergießung wie 1: 13, während die Fälle von Verstopfung bey Abnormitäten des Gehirns überhaupt zur Gesamtzahl sich verhielten wie 1: 37. Zuweilen ist dieser Zusammenhang sehr deutlich: so hörte z. B. in einem Falle (Nr. 1050) die Verstopfung sogleich auf, als das Aftergebilde aus der Schädelhöhle hervortrat. Bey einem Hirnbruche (Nr. 292) war sie so bedeutend, daß Klystiere nur Erbrechen erregten. Seltner kam Verstopfung bey Hydatiden (= 1: 25), Erweichung (= 1: 43), Verhärtung (= 1: 44), Blutergießung (= 1: 50) und Eiterung (= 1: 68) vor.

§. 320. Durchfälle kommen bey Abnormitäten im Gehirne seltner vor, und die Zahl solcher Fälle verhält sich (nach der XXXII Tabelle) zur Gesamtzahl wie 1: 147, so daß man sie für ein zufälliges Zusammentreffen halten könnte. Indess wechseln sie öfters mit Verstopfung (Nr. 1056) oder folgen auf dieselbe (Nr. 1074), und sind dabey zuweilen blutig, oder, wie bey der Meningitis, grün, schleimig, stinkend, ohne daß entsprechende Symptome eines selbstständigen gastrischen Leidens bemerklich wären. In einem Falle chronischer Hirnhautwassersucht (Nr. 343) erfolgte nach Abzapfung eines Theils des Wassers ein wässeriger Stuhlgang, und endlich 4 bis 5 Tage lang eine Ausleerung von reinem Wasser durch den After. Nach den zusammengestellten Beobachtungen verhielt sich die Zahl der Fälle von Diarrhoe bey Hydatiden im Gehirne wie 1: 51, bey Aftergebilden wie 1: 54, bey fremden Körpern wie 1: 75, bey Blutergießung wie 1: 84, bey Eiterung wie 1: 137, bey seröser Ergießung wie 1: 298, bey Erweichung wie 1: 303.

§. 321. Die unwillkührliche Darmausleerung ist bisweilen bloß die Folge der Betäubung; daß sie aber auch unmittelbar von dem materiellen Zustande des Gehirns abhängt, ersieht man aus den Fällen von seröser (Nr. 367) oder eiteriger (Nr. 558) Ergießung, wo sie durch jedes Aufrichten des Körpers oder Aufheben des Kopfs erregt wird. Nach den (XXXII Tabelle) gesammelten Beobachtungen war ihre Frequenz bey Gehirn-

abnormitäten überhaupt 1: 54; bey Hydatiden 1: 17, bey seröser Ergießung 1: 27, bey Blutergießung 1: 42, bey Verhärtung 1: 44, bey Aftergebilden 1: 54, bey Atrophie 1: 78, bey Erweichung 1: 101, und bey Eiterung 1: 137.

§. 322. In gestörter Secretion der Darmsäfte bestehende gastrische Symptome kommen (nach XXXIII Tabelle) bey Abnormitäten des Gehirns überhaupt in dem Verhältnisse von 1: 127 vor: bey Brand 1: 15, bey Wunden 1: 26, bey seröser Ergießung 1: 69, bey Aftergebilden 1: 72, bey Eiterung 1: 137, bey Erweichung 1: 151, bey Blutergießung 1: 252.

§. 323. Was die dem Verdauungssysteme beygegebenen Organe betrifft, so scheinen die Speicheldrüsen, in einem theils consensuellen, theils antagonistischen Verhältnisse zur plastischen Thätigkeit des Gehirns zu stehen, namentlich bey encephalitischem Typhus, wo ihre Anschwellung bald ein Symptom der Krankheit, bald eine kritische Erscheinung ist. Bey Blutergießung im Gehirne erfolgte eine Anschwellung der Speicheldrüsen (Nr. 257. 258), und zwar in dem einen Falle nur auf derselben Seite, wo das Blut ergossen war. Bey chronischer Hirnwassersucht findet bisweilen (Nr. 356. 395) ein stetes Speicheln Statt, welches zum Theil von der Stupidität und von der lähmungsartigen Schwäche des Kiefer, zum Theil aber auch von einer antagonistisch erhöhten Thätigkeit der Speicheldrüsen herrührt. So findet man diese Drüsen bey manchen Hemicephalen (Nr. 612) sehr stark entwickelt. — Selten ist es, daß das Pankreas gleichzeitig mit dem Gehirne Verhärtungen zeigt (Nr. 944) oder bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns fehlt (Nr. 360).

§. 324. Die Leber empfängt mehr Zweige des Rumpfnerven, als des zehnten Hirnnerven, kann also zum Theil durch diesen, vorzüglich aber durch jenen und das Rückenmark von dem Gehirne bestimmt werden: Die pflanzliche Hirnthätigkeit üssert im Zustande wider-natürlicher Aufreizung einen bedeutenden Einfluß auf das Organ. Bey Hirnentzündung tritt öfters galliges Erbrechen oder galliger Durchfall ein. Wenn indeß diese Symptome neben den gleichzeitigen fieberhaften Krankheitszufällen weniger hervortreten, so zieht dagegen die Häufigkeit der Leberaffectionen bey Kopfwunden die Aufmerksamkeit auf sich: hier entsteht oft ohne bedeutende Störung der übrigen Functionen, Spannung und Schmerz im rechten Hypochondrium, gelbliche Färbung der Zunge und der Haut, galliges Erbrechen, und eine schleichende Leberentzündung, welche häufig in Eiterung übergeht. Die Annahme, daß in solchen Fällen eine Leberkrankheit schon früher bestanden habe und durch die Kopfverletzung nur weiter entwickelt worden sey (*J. D. Burger Diss. de hepatis affectione capitis laevissimes inaequante. Landshut 1800. 8.*), ist in ihrer Allgemeinheit nicht gebüßig zu erweisen, da oft gar keine Zeichen von Leberkrankheit früher beobachtet worden sind. Daß die mechanische Gewalt, welche auf den Kopf wirkt, durch Störung des Kreislaufs und durch Erschütterung der weichen, blutreichen, schweren, wenig unterstützten Leber, die Function dieses Organs verletze, läßt sich auch nicht allgemein annehmen, da auch nach einer bloß auf den Kopf sich beschränkenden Erschütterung oder nach einer Stichwunde, ohne alle merkliche Erschütterung, Entzündung und Eiterung der Leber erfolgt; auch findet man hier Abscesse nur nach solchen Kopfverletzungen, bey welchen das Gehirn selbst afficirt ist (Cheston p. 40). Eben so wenig befriedigt die Erklärung der Anschwellung

der Leber aus einer durch die Schlafsucht bewirkten Schwächung des Kreislaufs (Bell in Sammlung auserl. Abhh. XVII. S. 540), da auch sie den Grund, warum nun gerade die Leber allein hier leidet, nicht angiebt. Es bleibt uns also nichts übrig, als bey dem Erfahrungssatze stehn zu bleiben, daß die Leber in einer besondern dynamischen, d. h. durch mechanische Verhältnisse wohl vermittelten, aber nicht darauf eigentlich beruhenden Beziehung zum Gebirne steht, so daß sie durch die kranke Aufregung desselben in einen klinischen, abnormen Zustand versetzt wird. Diese Uebereinstimmung wird noch durch manche Thatsachen bestätigt. Gallige Symptome, bitterer Geschmack, Aufstoßen, grünes Erbrechen, erscheinen oftmals bey Eiterung (Nr. 423. 433. 436. 542. 545. 570. 582. 584. 590) im Gehirne, sie mag von dynamischen Ursachen, oder von mechanischer Gewalt veranlaßt seyn; ferner bey Blutergießung (Nr. 238), Erweichung (Nr. 817) und Aftergebilden (Nr. 922). Bey Letztern werden bisweilen (Nr. 1001) ähnliche Ausartungen in der Leber gefunden. Schmerzen in der Lebergegend gesellen sich besonders zu solchen Abnormitäten, die in der rechten Seite des Gehirns ihren Sitz haben (Nr. 831). Erhitzende, überflüssige, geistige und narkotische Substanzen bringen in Gehirn und Leber eine gleiche Reizung und Aufregung hervor. Wiewohl in der Thierreihe mit zunehmender Entwicklung des Gehirns der Umfang der Leber im Verhältniß zur übrigen Körpermasse abnimmt, so sehen wir doch bey dem Menschen im krankhaften Zustande beyde Organe oft in gleichem Verhältnisse entwickelt. Die Leber fehlt gewöhnlich, oder ist abnorm und ohne Gallenblase bey Acephalen; meistens, wiewohl nicht ohne Ausnahme (Nr. 352), klein, zuweilen (Nr. 360) ohne Gallenblase bey Hemicephalen; dagegen meist groß bey der Rachitis, wo das Gehirn groß ist.

§. 325. Die Milz wird nach Kopfverletzungen bisweilen krank gefunden (Klein S. 156). Bey Acephalen fehlt sie gewöhnlich; bey Hemicephalen ist sie bisweilen (Nr. 613) klein und in Nebenzitzen zerfallen.

§. 326. Das Harnsystem ist bey Acephalen gewöhnlich mehr, als die übrigen Eingeweide entwickelt, und fehlt äusserst selten. Bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns findet man aber bisweilen die Nieren abnorm, unter einander verwachsen (*Deslandes in Journ. de méd. XXVI. p. 74*) oder traubig (*Timm obs. 6. p. 25*). Bisweilen sind sie gleichzeitig mit dem Gehirne in einem abnormen Zustande: so fand man (Nr. 149) eine Blutergießung in der linken Seite des Gehirns und in der linken Niere.

§. 327. Brodie fand, daß bey Fortdauer des Kreislaufs und der Umwandlung des venösen Blutes in arteriöses durch künstliches Athmen nach Abschneiden des Kopfes kein Harn mehr abgesondert wurde (Reils Archiv XII. S. 139 — 145), und daß auch die Verletzung des Rückenmarks die Harnabsonderung stört (Gerson IV. S. 348). In andern Fällen hat man keine Unterbrechung derselben nach Aufhebung des Einflusses des Gehirns beobachtet (*med. chir. Ztg. 1818. II. S. 242*). In Krankheiten zeigt sich aber dieser Einfluß allerdings wirksam, wenn auch nicht häufig. Bey Aftergebilden im Gehirne ist bisweilen (Nr. 924. 929) die Harnabsonderung sehr sparsam; die Harnverhaltung (§. 529) gehört wahrscheinlich öfters auch hierher. Bisweilen (Nr. 273) geht vor dem auf Blutergießung beruhenden apoplektischen Anfalle und während desselben citronengelber Harn in großer Menge ab. Bey der Hirnwassersucht ist die Harnabsonderung gewöhnlich spar-

am. Bey einer angeborenen Hühnenwassersucht (Nr. 363) bildete sich im vierten Monate eine Geschwulst auf der großen Fontanelle; als 3 Tage lang ein stetes Tröpfeln des Harns fortgedauert hatte, war die Geschwulst gänzlich verschwunden, der Kopf kleiner und die Haut in Falten, der vermehrte Harnabgang hielt fast 2 Monate an, und als er nachließ, nahm der Kopf schnell zu, die Geschwulst erschien wieder, und wuchs zu einer ungeheuern Größe. Auch in andern Fällen chronischer Hühnenwassersucht (Nr. 380.) wurde ein starker Harnabgang beobachtet.

§. 328. Was die Mischungsverhältnisse betrifft, so ist der Harn vor dem Ausbruche der Meningitis oft trübe und molkig, und bekommt dann im ersten Zeitraume derselben einen weißen, kreideartigen Bodensatz, oder (nach *Coindet*) einen glänzenden, glimmerartigen Niederschlag, welcher anfänglich an der Oberfläche eine Haut bildet. Wenn der Harn späterhin bey eingetretener Ergießung in der Blase sich anhäuft, so erregt er in derselben eine Entzündung, entwickelt bisweilen Schwefelwasserstoffgas, von welchem eingebrachte silberne Sonden schwarz anlaufen; auch bey chronischer Hühnenwassersucht wird er bisweilen (Nr. 380.), indem er reichlich abgeht, übelriechend. Hat nicht die Zersetzung des Hirnfettes an diesen Veränderungen Antheil? Die Ähnlichkeit seines Aussehens mit dem jenes Niederschlags, die Verstärkung des brennstoffigen Charakters im Harn, und die festere Gerinnung des Eyweissstoffs im Gehirne, berechtigen zu dieser Vermuthung. Das Hirnfett kann entweder durch Rücksaugung in das Blut gelangen, wie man denn bey Eiterung im Gehirne (Nr. 456.) flockigen, fettigen, weißfröthlichen Eiter mit dem Harn abgehen sehen; oder die mangelhafte Ernährung des Gehirns kann eine Entwicklung seiner Elemente in den Nieren veranlassen. In einem Falle (Nr. 1118.), wo ein Bestandtheil des Harns, der phosphorsaure Ammoniumsalz, ein Concrement in einer Hirnhöhle gebildet hatte, wurde auch die eine Niere krank gefunden. Nach *Brodie* (*Gerson* IV. p. 518.) wird der Harn nach Verletzungen des Rückenmarks so einmüthig, daß er in den Harnleitern und in der Blase Entzündung erregt.

§. 329. Wenn das Gehirn mittelst des Rückenmarks durch den Kumpferren auf die Harnabsonderung wirkt, so bestimmt es durch die untersten Rückenmarksnerven die Harnausscheidung. Diese ist durch Lähmung der genannten Nerven bisweilen erschwert oder unterdrückt bey Verwundungen (Nr. 14.), Eiterung (Nr. 406.), Erweichung (Nr. 725. 809.), Aftergebilden (Nr. 915. 924. 992.) des Gehirns. Die Harnausscheidung erfolgt bisweilen unwillkürlich bey Anlegung des Verbands nach Schädelwunden (Nr. 1050.), bey Hirnwunden (Nr. 49. 51. 95.), Blutergießung (Nr. 253. 285.), Eiterung (Nr. 429. 490.), Erweichung (Nr. 756.), Aftergebilden (Nr. 971. 1039.), und Hydatiden (Nr. 1063. 1065.). Bisweilen folgt auf Harnverhaltung unwillkürliche Ausleerung, so bey Hühnenwassersucht (Nr. 398.) oder Aftergebilden (Nr. 1016.). Welchen Antheil die Bewußtlosigkeit an dieser Ausleerung hat, läßt sich nicht immer genau bestimmen; in einem Falle (Nr. 70.) erfolgte bey ungestörtem Bewußtseyn unwillkürliches Harnen, wenn der Finger in die Hirnwunde gebracht wurde.

§. 330. Die Nebennieren sind bey Acephalen klein, oder fehlen gänzlich. Bey Hemicephalen sind sie meist klein (Nr. 352. 613. 630.) und fehlen bisweilen (Nr. 610. 611.); aber in manchen Fällen (Nr. 355. 612.) sind sie auch normal, und selbst unge-

wöhnlich groß (Blanchett, Bayle, Timm p. 25.), so daß daraus für die Bedeutung dieser Organe sich nichts folgern läßt.

§. 331. So wie die Zeugungsorgane am stärksten auf das Rückenmark wirken (§. 277.), so ist auch ihre Thätigkeit von ihm besonders abhängig, und erlischt bey der chronischen Entzündung und Abschrumpfung desselben; geköpft Frösche, deren Rückenmark unverletzt ist, begatten sich noch. Das Gehirn vermag nur insofern, als es das Rückenmark bestimmt, auf die Zeugungsorgane zu wirken. Fälle dieser Art sind nicht häufig: unter den gesammelten Beobachtungen (XXXIV. Tabelle) verhält sich ihre Zahl zur Gesamtzahl der Hirnabnormitäten wie 1: 73, und zwar bey Atrophie wie 1: 19, bey seröser Ergießung wie 1: 25, bey Blutergießung wie 1: 36, bey Erweichung wie 1: 151, bey Altergebilden wie 1: 216, bey Eiterung wie 1: 275. Home (*phil. tractact. 1821.*) erzählt, daß eine kleine Depression des Schädels Geilheit verursachte, welche verschwand, als jene gehoben wurde. Abnorm heftiger Geschlechtstrieb findet zuweilen bey acuter (Nr. 303.) chronischer Hirnwassersucht (Nr. 394. 398.) und Erweichung (Nr. 759.) Statt. Nach einer apoplektischen Wasserergießung beobachtete Lancisi (*anab. mort. p. 207.*) noch am Leichname eine Erection. Bey apoplektischer Blutergießung (Nr. 142—147.) tritt bisweilen Hitze und Anschwellung der Hoden, Pollution und eine selbst nach dem Tode fortdauernde Erection ein. — Daß Kopfwunden Impotenz veranlassen können, wußte schon Avicenna (*sen. 20. fr. 3. c. 13.*), und ist spätemhin öfters beobachtet worden (Nr. 654.). Eben so kann sie bey Hirnarterie (Nr. 429.) eintreten. Unvollkommene Entwicklung der Zeugungsorgane, Mangel an Geschlechtstrieb und sparsame Menstruation kommt bey chronischer Hirnwassersucht (Nr. 342. 346. 388. 389. 392. 395.) häufig vor. — Uebrigens sind bey Acephalen die Zeugungsorgane selten vollständig entwickelt, oft sind nur die Äußern vorhanden, und bisweilen fehlen sie gänzlich.

§. 332. Die Haut verliert bey Hemicephalen da, wo die Schädelknochen aufhören, ihre normale Bildung, und eine dünne, rothe, leicht blutende, unbehaarte Fortsetzung desselben bedeckt die Rudimente des Gehirns. Da der Haarwuchs auf der Wölbung des Kopfs gehindert ist, so zieht er sich auf eine abnorme Weise weiter abwärts z. B. an der Stirne auf die normal geliebten Hautstellen, und bildet einen Kranz, der die Afterbildung einschließt. Dabey ist bisweilen (Nr. 620.) der ganze Körper behaart. — Bey der Meningitis und Encephalitis ist die Haut trocken, und bey der Besserung tritt meist allgemeiner Schweiß, auch Friesel oder Hautwassersucht ein; zuweilen bemerkt man auch vor dem Ausbruche der Krankheit einen feinen, trocknen Auschlag, namentlich am Munde und am Oberarme. Einen eigenen Geruch der Ausdünstung, wie von Mäusen, der mit mangelhafter Harnausleerung verbunden zu seyn scheint, bemerkt man nicht allein bey der Meningitis im Zeitraume der serösen Ergießung (Parent p. 65. Lallemand I. p. 236.), sondern auch bey der Encephalitis im Zeitraume der Eiterung (Nr. 522. 556.) oder Erweichung (Nr. 750. 752.). Bey der Hirnerschütterung ist die Haut trocken und kalt, und bey Rückkehr des Bewußtseyns, wenn sie auch erst nach 10 und mehrern Tagen (Nr. 1050.) eintritt, wird sie weich und warm. Roque (Gerson VII. p. 116.) beobachtete 4 Monate nach einer Hirnerschütterung einen örtlichen Schweiß auf der rechten Seite vom Kopfe bis zur Schulter, der nach einem

Jahre an der hintern Fläche abnahm, an der vordern aber blieb; zugleich waren die Haare auf der rechten Seite des Kopfs grau geworden. So fielen auch bisweilen die Haare über einzelnen kranken Stellen des Schädels (Nr. 1084.) und des Gehirns aus; nach einer Hirnerschütterung hat man die Kopfhare, Augenbrauen und Wimpern der einen Seite grau werden und ausfallen sehen (*Mezger adversaria* p. 63.).

§. 333. Die Hirnthätigkeit ist also ein Moment des Gesamtlebens, und ein höherer Grad ihrer Störung verursacht den Tod. a) Was die ursprünglichen Bildungsfehler anlangt, so sterben die allermeisten Hemicephalen vor der Geburt. Von 23 lebendig gebornen starben 17 am ersten Tage, nämlich 6 (Nr. 616. 620. 628. 636. 639. 644.) in der ersten Stunde, 5 (Nr. 603. 608. 619. 622. 647.) nach 2 bis 12 Stunden, 6 (Nr. 601. 604. 623. 634. 637. 638.) in der zweyten Hälfte des Tags; 2 (Nr. 632. 648.) lebten 2 bis 3 Tage, 2 (Nr. 645. 646.) 4 Tage, 2 (Nr. 627. 633.) 6 Tage. Von 6 lebendig gebornen Kindern mit Wassersucht und unvollkommener Entwicklung des Gehirns starb eins (Nr. 355.) nach einigen Minuten, eins (Nr. 354.) am dritten, eins (Nr. 353.) am fünften, zwey (Nr. 347. 352.) am zwölften Tage, eins (Nr. 351.) nach 7 Wochen. Unter 5 mit Hirnhautwasserbruch lebte 1 (Nr. 359.) eine, 1 (Nr. 361.) drey, 1 (Nr. 358.) acht Wochen, 1 (Nr. 357.) zwey, 1 (Nr. 356.) sechs Jahre. Von 2 Kindern mit abnormem Hirnbaue lebte das eine (Nr. 651.) eine halbe Stunde, das andre (Nr. 649.) 7 Jahre. Unter 10 Fällen von Hirnbruch erfolgte der Tod bey 7 in den ersten 2 Monaten, nämlich bey 3 (Nr. 290. 291. 292.) nach 2 Tagen, bey 1 (Nr. 288.) in der zweyten, bey 1 (Nr. 294.) in der dritten, bey 1 (Nr. 293.) in der vierten, bey 1 (Nr. 287.) in der fünften Woche; bey 2 (Nr. 295. 297.) erfolgte Heilung durch Compression; und in 1 Falle (Nr. 296.) blieb die Abnormität, ohne das Leben zu stören. — Wie die wenigsten Hemicephalen an Erstickung sterben, so töden auch die später entstandenen Abnormitäten des Gehirns weniger durch Aufhebung des Athmens, als durch Störung des Gesamtlebens. b) Bey der Hirnerschütterung (Nr. 1. 2.) erfolgt der Tod augenblicklich, indem Herzschlag und alle andern Lebensthätigkeiten mit einem male vernichtet werden. Bey chronischen Hirnkrankheiten erfolgt öfters eine allgemeine Entkräftung; die endlich den Tod nach sich zieht. c) Wenn die unten zusammengestellten Fälle einigermaßen einen Maasstab geben können, so dürfen unter 4 Fällen von Verwundung des Gehirns ungefähr 3 einen tödlichen Ausgang haben. Daß unter 4 Verwundeten Einer genas, konnte nur dann befremden, wenn man die mechanische Organisation für den Grund der Lebensthätigkeit, und das Gehirn für die Springfeder hielt, welche das Räderwerk des gesammten Lebens eigentlich in Bewegung setze. Die Verzeichnisse gebellter Hirnwunden, welche Yonge (p. 40. seqq.), Haller (*elem. IV. p. 340. seqq.*) und Arnemann lieferten, bieten in der That nichts Auffallendes dar, wenn man theils die Frequenz der Genesung von Wunden anderer Organe damit vergleicht, theils berücksichtigt, daß das Gehirn mit dem Leibesleben nicht in einer so unmittelbaren Beziehung steht, als die Organe des Rumpfs. Die meisten Todesfälle nach Hirnwunden erfolgen vom 1ten bis 14ten Tage, in der dritten und zu Ende der vierten Woche. In die Schädelhöhle eingedrungene fremde Körper können unter günstigen Umständen erst nach mehreren Jahren (Nr. 57. 81. 83. 84. 101. 103.) den Tod bewirken, während sie in der Regel viel früher töden. d) Blutergießungen töden

am schnellsten. Unter 57 Fällen waren 54, wo der Tod im ersten Monate nach der Verwundung erfolgte, und zwar 7 am ersten, 18 am zweyten, 5 am vierten Tage, 7 zu Ende der ersten Woche, 7 in der zweyten, 5 in der dritten und 5 in der vierten Woche; in den 3 übrigen Fällen, wo der Tod mehrere Jahre nach der Verwundung eintrat, war die Blutergießung, welche man bey der Leichenöffnung fand, unstreitig später entstanden. Quetschungen mit dunkelbrauner oder schwarzgrüner Verfärbung der Hirnsubstanz haben einen tödlichen Ausgang, so wie schon bey Quetschungen der festen Hirnhaut selten eine Genesung erfolgt. Nach Blutergießung mit Rissen im Gehirne sah Henkel (Abhh. S. 70.) am zweyten, am vierten (S. 62.) und am zehnten (S. 66.), Klein (S. 160.) und Ollenrodt (Arneemanns Magazin I. 2. St. S. 128.) am vierten, Clossy. (p. 14.) am siebzehnten Tage den Tod unter fortwährender Betäubung erfolgen; indess will Willmer (Arneemann S. 141.) auch einen Fall beobachtet haben, wo der Kranke bis kurz vor seinem noch einigen Wochen erfolgten Tode sich ganz wohl befand. Unter 59 Fällen einer dynamisch veranlasseten Blutergießung erfolgte der Tod in 39 Fällen in der ersten Woche nach dem Eintritte der Apoplexie, und zwar in 15 am ersten, 2 am zweyten, 9 am dritten, 1 am vierten, 5 am fünften, 7 am siebenten Tage; 5 in der zweyten, 3 in der vierten Woche; 5 im zweyten, 1 im dritten, 1 im fünften Monate, 2 nach einem halben, 3 nach einem ganzen Jahre, 2 nach einigen Jahren. e) Die seröse Apoplexie tödtet nicht ganz so schnell; unter 30 Fällen in 15 in der ersten, 3 in der zweyten Woche, 4 in der dritten und vierten Woche, 3 im zweyten Monate, 4 in den folgenden Monaten, 1 nach mehreren Jahren. Wenn Kopfverletzungen seröse Ergießung zur Folge haben, so sterben die Kranken am häufigsten vom 1ten bis 14ten Tage. Bey der chronischen Hühnerwassersucht scheint die Lebensdauer unter Andern auch von dem Zeitpunkte der Entstehung der Krankheit abzuhängen; je früher diese entsteht, um so eher kann der abnorme Zustand habituell werden. In den Fällen, wo das Leben am längsten bestand (Nr. 389. 392. 393. 395.), hatte sich die Krankheit im ersten und zweyten Monate nach der Geburt entwickelt; war diese im dritten Monate entstanden (Nr. 365. 379. 380.); so erfolgte der Tod spätestens nach 6 Jahren; hatte sie sich im vierten bis siebenten Monate (Nr. 369. 372. u. 374.) gebildet, so dauerte das Leben höchstens noch 2 Jahre; und war sie im dritten Jahre (Nr. 377.) eingetreten, so tödete sie schon im folgenden Jahre. f) Die durch Kopfverletzungen veranlassete Eiterung führt am häufigsten zu Ende der zweyten Woche (besonders am 11 und 13ten Tage), dann zu Ende der dritten und vierten Woche den Tod herbey; seltener in den folgenden Monaten; zuweilen (Nr. 101. 464. 479. 480. 512. 564. 565. 577. 596. 597.) erst nach mehreren Jahren. Von 130 Kranken genasen 22. Bey dynamisch veranlasseter Eiterung ist die Berechnung der Lebensdauer ganz unbestimmt; zuweilen hat das Uebel durch gar keine Krankheitserscheinungen sich bemerklich gemacht, und der Tod tritt plötzlich ein (Nr. 309. 326.); in den häufigern Fällen erfolgt der Tod nach einem Uebelbefinden von mehreren Tagen, Wochen und Monaten; zuweilen (Nr. 411. 417. 425. 426. 441.) erst nach mehreren Jahren. g) Noch unbestimmter ist die Lebensdauer bey Erweichung des Gehirns: man findet diese bisweilen, wo der Tod (Nr. 277.), 3 (Nr. 820.) oder 4 (Nr. 34. 286.) Tage nach erlittener Kopfverletzung erfolgt ist, zuweilen (Nr. 597. 803. 825.) erst nach mehreren Jahren. Ist die Krankheit dynamisch ver-

anfaßt, so tödtet sie zuweilen (Nr. 224. 811.) plötzlich, häufiger nachdem sie 1, 2 oder 3 Wochen Zufälle erregt hat, zuweilen (Nr. 729. 747.) auch nach jahrelangem Uebelbefinden. h) Gleiches gilt von den Aftergebilden, welche bisweilen (Nr. 992. 995. 998.) erst wenige Tage vor dem Tode Zufälle hervorbringen, zuweilen (Nr. 411. 999.) nach vieljährigem Leiden töden. Nach Bayles und Andrales Bemerkung sollen sie eine lange Agonie bewirken.

§. 354. Unter den Sinnesorganen steht das Auge in der innigsten Beziehung zum Gehirne. Bey unvollkommener Entwicklung des Letztern ist bisweilen (Nr. 360. 609. 650.) nur ein einziges Auge vorhanden. Bey Hemicephalen sind die Augenhöhlen gewöhnlich leicht, zuweilen (Nr. 639.) mit Verschmelzung ihrer Spalten und Löcher in eine gemeinschaftliche Oeffnung; die Augen ragen daher weit hervor, wie bey Fröschen, sind groß, und stehen oft weit von einander; die Augenlider sind öfters ödematös und zuweilen ohne Wimpern. — Röthe und Thränen oder Trockenheit des Auges, und das Sehen herumziehender, dunkler Punkte gehört zu den Vorläufern der Meningitis und Encephalitis. Erreicht die Entzündung eine bedeutende Höhe, so wird die Bindehaut roth, entzündet, zuweilen mit eysweisstoffiger Anschwellung; das Auge wird blitzend, funkelnd, vorgequollen, gegen das Licht sehr empfindlich; zuweilen sieht der Kranke Funken oder Blitze. Mit dem Eintritte des lähmungsartigen Zustandes, sey er nun rein dynamisch, oder mit Eiterbildung oder seröser Ergießung verbunden, wird der Blick stumpf, das Auge bekommt ein mattes Ansehen und verliert seinen Glanz, die Hornhaut wird trübe und mit schmutzigem Schleime bedeckt, die Empfindlichkeit gegen das Licht nimmt ab, das Sehen wird undeutlich, und am Ende entsteht völlige Blindheit. Bey einer Blutergießung innerhalb der Schädelhöhle wird das Auge trübe, röthlich, wie leicht entzündet. Das Funkensehen ist öfters ein Vorbote der Apoplexie. Bey der Hirnerschütterung verliert das Auge seinen Glanz, und zuweilen bleibt Verdunkelung des Gesichts oder auch Blindheit noch derselben zurück. — Nach der XVII. Tabelle kommt auf 11 Fälle von Abnormitäten des Gehirns einer mit Schwächung oder Verlust des Gesichts. Die Unterbindung eines Hirnbruchs (Nr. 357.) verursachte Blindheit. Als ein in das Gehirn gedrungener Knochensplitter (Nr. 78.) herausgezogen, eine Depression des Schädels (Nr. 113.) gehoben, ergossenes Blut (Nr. 235. 240.) entfernt wurde, so kehrte die durch diese Abnormitäten verlorne Sehkraft alsbald zurück. Nach Abschneidung eines Aftergebildes (Nr. 1007.) bekam der Kranke sogleich wieder einen Schein des Lichts. — Das Doppeltsehen ist oftmals Folge von Hirnaffecten, und beruht dann zuweilen auf ungleicher Stellung der beyden Augen (Nr. 957. 975.), kommt aber auch ohne diese vor (Nr. 31. 999. 1027. 1030.), entstand in einem Falle (Nr. 492.), so oft eine neue Eiterung im Gehirne eintrat, beschränkte sich in einem andern Falle (Nr. 110.) auf das eine Auge; ein andres mal (Nr. 563.) wurde das Seitliche einfach, das gerade vor den Augen Liegende doppelt gesehen; ein andrer Kranker (Nr. 14.) sah eine Lichtflamme zwanzigfach. Zuweilen (Nr. 924.) wird nur das schräge von aussen einfallende Licht gesehen, oder (Nr. 154.) die Gegenstände erscheinen in falscher Richtung, oder es entstehen anderweitige optische Täuschungen (Nr. 708.) und Visionen (Nr. 115.). Auch wird bey Hirnabnormitäten zuweilen (Nr. 217. 746.) das Auge atrophisch, und schrumpft ein.

§. 355. Das Ciliarsystem wird durch den Zustand des Gehirns häufig bestimmt. Bey einem entzündlichen Zustande des Letztern, so wie bey Blutergießung in demselben ist die Pupille meistens verengert mit großer Empfindlichkeit gegen das Licht; im spätern Zeitraume der Meningitis erweitert sie sich, indem sie bey starkem Lichte anfänglich noch schnell und stark sich zusammenzieht, um eben so schnell sich wieder zu erweitern. Bey Hirnerschütterung, seröser oder eitriger Ergießung, oder anderweitiger Compression des Gehirns ist die Pupille erweitert und unbeweglich; in einem Falle dieser Art (Nr. 78.) zog sie sich sogleich zusammen, als ein Knochensplitter aus dem Gehirne genommen worden war. Meistentheils verhält sie sich dabey consensuell mit dem Sehnerven, doch zeigt sie auch eine gewisse Selbstständigkeit, so daß z. B. bey der Hirnwassersucht zuweilen (Nr. 377.) fast gänzliche Blindheit ohne Erweiterung der Pupille; in andern Fällen aber Erweiterung derselben bey ganz normalem Sehen Statt findet, während in noch andern Fällen (Nr. 371. 381. 389. 395.) das Auge gar nicht afficirt ist.

§. 356. Bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns ist bisweilen (Nr. 609.) nur ein einziges und unvollkommenes Ohr vorhanden. Bey Hemicephalen ist das äussere Ohr gewöhnlich groß, flach, und vermöge der Richtung der Schläfebeine abwärts stehend, so daß es bey dem ohnedies kurzen Halse fast auf der Schulter steht. — Die Taubheit kommt nach der XVIII. Tabelle unter 35 Fällen von Hirnabnormitäten einmal vor. Bey der Apoplexie leidet das Gehör meist mehr, als die übrigen Sinne. Bey der Meningitis, nach Kopfverletzungen und bey andern entzündlichen Zuständen des Gehirns, findet zuweilen eine besondere Schärfe und krankhafte Empfindlichkeit des Gehörs Statt, vermöge deren jedes Geräusch schmerzhaft wirkt, oder auch Verwirrenheit und Schwindel verursacht, oder die Töne scharf und schneidend werden: so bey der Hühnenwassersucht (Nr. 327. 389. 391.), bey welcher auch öfters die Normalität des Gehörs sich behauptet (Nr. 372. z. 377. 379. 380. 381.); ferner bey Hirnhautwassersucht (Nr. 308. 341.); bey Eiterung (Nr. 437. 573.) oder Aftergebilden (Nr. 988.). Ohrenausen tritt häufig ein bey Entzündung der festen Hirnhaut, oder der plastischen Hirnhäute, bey Ergießung von Blut (Nr. 243. 279.). Serum (Nr. 316. 407. 938.) oder Eiter (Nr. 407.); ferner bey Erweichung (Nr. 732. 733. 809. 817.), Aftergebilden (Nr. 929. 938. 975.) und Erschütterung des Gehirns (Nr. 10.). Es geht häufig der Apoplexie voraus und entsteht bisweilen bey bloßer Berührung der festen Hirnhaut (*Salemann de mira crani fractura p. 4.*) oder wenn man einen Schwamm derselben drückt (Nr. 909. 910.) oder abschneidet (Nr. 1007.). — Oefters kommt ohne Taubheit Beifraß im Felsenbeine und Eiterfluß aus den Ohren gleichzeitig mit einem Aftergebilde (Nr. 972.) oder einer Eiterung (Nr. 410. 428. 430. 483.) im Gehirne vor, ohne mechanischen Zusammenhang beyder Abnormitäten; in andern Fällen findet ein solcher Zusammenhang zwischen dem Beifraße und einer Eiterung (Nr. 423. 424. 425. 426. 434. 542. 545. 548. 554.) oder einer Erweichung (Nr. 723.), oder einem Aftergebilde (Nr. 1020. 1115.) Statt. Zuweilen vermindern sich die Zufälle der Hirnkrankheit bey eintretendem Eiterfluße aus dem Ohre (Nr. 541. 548. 547.). So werden hierdurch auch Hirnkrankheiten zuweilen gehoben. Le Blanc empfand, als er in der Münze in eine Form sah, wherein eben geschmolzenes Silber gegossen wurde, plötzlich eine heftige Erschütterung im Kopf und Gliedern, wie von einem elektrischen Schläge, und behielt einen heftigen Kopf-

schmerz mit Zuckungen; bis nach 8 Wochen ein reichlicher Eiterfluß aus dem linken Ohre erfolgte; das linke Scheitelbein war dabey so ausgedehnt, daß der Umfang des Kopfs um 15 Linien zugenommen hatte (*Journ. de med. XVII. p. 455.*).

§. 337. Die Nase ist bey unvollkommner Ausbildung des Gehirns öfters monströs; ohne Scheidewand und mit einer einzigen Oeffnung (Nr. 611), oder cylindrisch (Nr. 609. 660.); in einen Rüssel verlängert, und durch Uebergewicht des fünften über den ersten Hirnnerven in ein Tastorgan verwandelt, oder sehr breit, wie sie bey der Mehrzahl der Hemicephalen vorkommt. — Die Hirnkrankheiten haben Geruchlosigkeit noch seltner zur Folge, als Taubheit. Im ersten Zeitraume der Meningitis juckt die Nase, und wird von eingetrocknetem Schleime verstopft. Der Geruch wird vermindert oder geht verloren, nach Verwundung des Gehirns (Nr. 21. 31), bey Höhlenwassersucht (Nr. 373.), bey Schwämmen der festen Hirnhaut (Nr. 886. 901), bey Aftergebilden des Gehirns (Nr. 1035. 1036); und bey Hydatiden (Nr. 1065. 1069); bey Eiterung im Gehirne wird zuweilen (Nr. 467. 480) die Nase verstopft. In dem einen Falle (Nr. 901) kam der Geruch wieder, als der angehäufte Eiter ausgeleert war. Diese 11 Fälle kamen unter 1912 Fällen von Hirnabnormitäten vor, so daß jene zu diesen in Hinsicht auf Frequenz sich verhielten wie 11:195. — Bey der Hirnentzündung wird die Nase meist trocken. Nach einer Verwundung (Nr. 13) und bey einer Verhärtung im Gehirne (Nr. 857) erfolgte häufiges Niesen. Durch Niesen aber werden noch häufiger, als aus dem Ohre, in der Schädelhöhle angesammelte abnorme Flüssigkeiten ausgeleert (Beyträge I. S. 288 fgg., Abercrombie S. 60 fgg.). Bey einem Extravasate am Mantel (Nr. 217) erfolgte am 7ten Tage der Krankheit Nasenbluten, nach 4 Wochen ein Schneuzen von geronnenem Blute, und in der 8ten Woche der Tod. Ein Verwundeter (Nr. 324) erholte sich von der nach 12 Tagen eingetretenen Betäubung, als ein dicker, schwärzlichrother Ausfluß aus der Nase erfolgte. Bey einer chronischen Höhlenwassersucht (Nr. 363) sickerte blutiges Wasser 3 Tage lang ununterbrochen aus der Nase, wohey die Geschwulst auf dem Scheitel verschwand und der ganze Kopf kleiner wurde; hielt man den Kopf vorwärts, so floß das Wasser reichlicher aus. Bey einer Verhärtung im Gehirne (Nr. 847) niesete der Kranke häufig, wobey Wasser abging und er sich jedesmal erleichtert fühlte. Bey einer Hydatide am Schläfen (Nr. 1066.) wurde durch Niesen ein Pfund Wasser mit Erleichterung ausgeleert; als späterhin die Krankheitszufälle von Neuem eintraten, brachte eine gleiche Ausleerung wieder Erleichterung. Bey Eiterung im Gehirne (Nr. 441) erfolgte ein eiteriger Ausfluß aus der Nase (441) oder ein oftmaliger Katarrh (Nr. 464); ein andermal (Nr. 593) erfolgte 5 Wochen nach der Verwundung ein häufiges Niesen, wobey verdorbene Hirnsuhstanz abging; ein andrer Kranker (Nr. 600) genas, als er nach dem Einblasen eines Schnupfpulvers Blut und Eiter ausgesniet hatte: er bekam unmittelbar darauf sein volles Bewußtseyn wieder, klagte über nichts, als daß ihm der Kopf wüste und wie leer wäre, und wurde späterhin durch Schnupfback nicht mehr gereizt. Sierogt (*Haller disp. II. p. 817*) erzählt von einem Manne, der, nachdem er Breter auf dem Kopfe weit getragen hatte, heftige Kopfschmerzen bekam, und als am 7ten Tage Blut und Eiter aus der Nase abging, genas. In dem oben (§. 336) angeführten Falle bekam Le Blanc nach einer Erkältung von Neuem Kopfschmerzen und Zuckungen; nach dem Gebrauche

eines Schnupfpulvers erbrach er dicken, stinkenden Eiter, welcher seiner Empfindung nach aus der Nase in den Rachen gekommen war, und wurde so geheilt. Ein Mädchen bekam 11 Tage nach einem Stosse gegen den vordern Theil des Scheitelbeins heftiges Kopfweh mit Schwindel und Fieber; der Schmerz zog sich am 17ten Tage gegen die Nase, und als 14 Tage später ein unerträglich stinkender Eiter ausgeschraubt wurde und ein starker Schwefels ausbrach, verschwanden alle Zufälle (*Dupré de Lisle* in *Sammlg. f. Wundärzte* VI. S. 182.).

§. 338. Die Zunge ist bey Hemicephalen zuweilen groß (Nr. 607.) und hängt weit aus dem Munde heraus (Nr. 617.). — Der Geschmack wird übrigens durch Abnormitäten des Gehirns noch seltner gestört, als der Geruch; in den unten gesammelten 1912 Fällen wurde ein Verlust des Geschmacks nur 2 mal (Nr. 21. 31.) beobachtet. Im letzten Zeitraume der Meningitis wird die Zunge trocken und schwärzlich.

§. 339. Auch das Gemeingefühl findet eine seiner wesentlichen Bedingungen in der Hirnthätigkeit. Als Wirkung von Hirnkrankheiten tritt allgemeine Fühllosigkeit bey Betäubung immer, partiella bey Lähmung einzelner Glieder meistens ein; aber auch ohne Störung des Bewusstseyns und der Bewegung erscheinen öfters Vorstimmungen des Gemeingefühls, welche einzig in einer Abnormität des Gehirns ihren Grund haben. Es wird bisweilen durch einen Erethismus des Gehirns, namentlich bey Verwundung (Nr. 87.), Eiterung (Nr. 561. 940.) und Erweichung (Nr. 707. 819.) so erhöht, daß jede Berührung des Körpers heftige Schmerzen erregt. Dagegen tritt bey Hirnbrüchen (Nr. 356.), Blutergüssen (Nr. 197.), Verhärtungen (Nr. 857.) und Aftergebilden (Nr. 885.) zuweilen Stumpfheit des Gemeingefühls entweder in einem Theile des Rumpfs und der Gliedmaßen, oder im ganzen Rumpfe, oder zugleich auch im Kopfe ein. *Bilguer* (S. 162.) sah bey einer Fissur im Siebbeine eine völlige Fühllosigkeit vom Halse bis zu den Zehen, während die Thätigkeit der Kopfsinne ungestört war. Hierdurch, so wie durch andre Gründe, welche *Haller* (*elem. IF. p. 258—265.*) anführt, ist denn die Meynung von *Perault*, *Godart*, *Stuart*, *Borden*, daß die Empfindung, vermöge der Allgegenwart der Seele, an den peripherischen Nervenenden erfolge, widerlegt. Aber die pathologischen Erfahrungen beweisen auch, daß das Gehirn selbst bey der Aufnahme der äussern Eindrücke auf die Poespherie einwirkt, seinen eignen Zustand auf diese überträgt, und durch Reflexion mittelst der Empfindung von diesem consensuellen Zustande afficirt wird. So bewirkte Eiterergießung unter dem Vorderlappen (Nr. 589.) einen Kitzel in der Nase. So entstehen ferner bey Hirnkrankheiten öfters Schmerzen in den Ohren (Nr. 427. 757. 1019.), in den Augen (Nr. 70. 243. 562. 944. 980. 1009. 1083.), im Nacken (975. 1030.), in Hals und Schultern (Nr. 940. 1102.), im Rückgrate (Nr. 654. 931.), in den Armen (Nr. 110.), in Bauch und Beinen (Nr. 1074.), in Armen und Beinen (Nr. 890.), im ganzen obern Theile des Körpers (Nr. 888.), endlich im ganzen Körper (Nr. 436.). Ausserdem sind Schmerzen in den durch Entzündung und Eiterung des Gehirns gelähmten Gliedern sehr häufig. Die Empfindung ist hier von den äussern Gegenständen ganz abgewendet, und nur auf den innern Erregungsstand gerichtet, oder nach aussen abgestorben und nach innen exaltirt: so waren z. B. bey einer Verhärtung im Gehirne

(Nr. 875.) die Glieder der rechten Seite gegen Stiche und andre Verletzungen ganz unempfindlich; wenn man sie aber bewegte, so schrie der Kranke für Schmerzen.

§. 340. Der Einfluß des Gehirns auf die willkürlichen Muskeln ist sehr bedeutend. Bey Acephalen sind die Muskeln nicht gehörig ausgebildet, weißlich, speckig oder wässrig, und unter einander zu einem regellosen Gewirr verschmolzen; das Zwerchfell fehlt gewöhnlich, oder ist häutig und zellgewebig. Bey Hemicephalen fehlen zuweilen die Muskeln in einzelnen Gegenden: so fand ich (Nr. 612.) anstatt der Antlitzmuskeln bloß eine dunkelrothe Masse mit vielem Fette; in andern Fällen waren anstatt der Augenmuskeln bloß dünne Fäden mit Feuchtigkeit vorhanden (Nr. 620.), oder es fehlten die Muskeln des Nackens und Rückens (Nr. 629.), oder das Zwerchfell war unvollständig (Nr. 630.), oder es fehlte das Brustbein, Schlüsselbein und Schulterblatt (Nr. 609.). Manche Hemicephalen können zwar die Augen öffnen, saugen, schlucken, schreyen und die Glieder bewegen (Nr. 623. 633. 637. 644.); aber meist sind diese Bewegungen gering und unvollkommen (Nr. 354. 619. 628. 638. 646.); oder sie fehlen gänzlich (Nr. 627. 649.).

§. 341. Vielfältig an Thieren angestellte Versuche (*Haller elem. IF. 357.*) haben gelehrt, daß die mechanische Reizung des Gehirns, besonders in der Nähe des Centralens der Nerven Krämpfe in den willkürlichen Muskeln erregt, dagegen Zusammendrückung oder Zerstörung desselben, so wie die Zusammendrückung oder Durchschneidung der Nerven, Lähmung hervorbringt, jedoch so, daß, wenn man den Nerven selbst unterhalb der Verletzung reizt, in den Muskeln, mit welchen er in unverletztem organischen Zusammenhange steht, noch Krämpfe erfolgen. Mit vollem Rechte hat man daraus geschlossen, daß der Nerve nicht die Kraft, Bewegungen zu erregen, wohl aber den Antrieb, den Reiz dazu vom Gehirne empfängt, so wie der Muskel seine Bewegungskraft in sich selbst hat, und durch den Gegensatz des Nerven nur zur Aeusserung erregt wird.

§. 342. Was die verschiedenen Modificationen der Bewegung anlangt, welche durch Hirnkrankheiten verursacht werden, so bemerkt man zuvörderst im ersten Zeitraume der nach Wunden eintretenden Entzündung der Hirnhäute bisweilen bey einem Zustande psychischer Aufregung auch eine Leichtbeweglichkeit und Agilität des Körpers; noch häufiger aber eine stete Unruhe und oft rastloses Herumwerfen. Auch sind bey einem gereizten Zustande des Gehirns durch fremde Körper (Nr. 87.), oder Entzündung und Ergießung (Nr. 880.) öfters die Glieder in steter Bewegung.

§. 343. Auf der Höhe der Entzündung des Gehirns oder seiner Häute brechen Krämpfe aus, welche besonders dann häufig sind, wenn der Kranke noch im Kindesalter ist, und die nur dann fehlen, wo die Entzündung nicht so intensiv und der Gang der Krankheit mehr schleichend ist. Die Muskeln werden hart, die Flecken hervortretend, die Augen verdreht, Lippen, Augenlider und Gliedmaßen convulsivisch bewegt, es entsteht Zählknirschen, und zuweilen wirkliche Epilepsie. Je mehr die Krankheit steigt, desto anhaltender werden die Krämpfe; daß diese aber auf einem gereizten Zustande beruhen, erhellt unter Andern aus ihrer Abnahme nach einem Aderlasse. Nach Lallemand (I. p. 251. 460. 475) verursacht die Encephalitis Krämpfe nur in der einen Seite des Körpers, und zwar in derjenigen, welche der entzündeten Seite des Gehirns gegenüber liegt und späterhin gelähmt wird, oder auch schon gelähmt ist. Die Meninges

hingegen, wenn sie durch dynamische Momente veranlaßt und nicht complicirt ist, bewirkt allgemeine Convulsionen auf beyden Seiten; tritt sie aber zu einem Zustande des Gehirns hinzu, welcher eine Lähmung begründet, so erregt sie vorzüglich in der nicht gelähmten Seite Convulsionen. — Unter den unten zusammengestellten Fällen von Hirnabnormitäten verhält sich die Zahl derer mit Krämpfen zu der Gesamtzahl wie 59:1912, oder wie 1:3, 23. a) Am häufigsten ($\approx 1:2, 39$) entstanden Zuckungen und Convulsionen bey Eiterung des Gehirns oder seiner Hülle, namentlich bey dem Beginnen derselben. In dem einen Falle (Nr. 529) traten Convulsionen im rechten Arme ein, wenn der Eiterabgang stockte, welche aufhörten, sobald der Eiter wieder frey abfloß, daß der ergossene Eiter, vermöge seines Drucks, die Krämpfe erregt, wird auch dadurch bewiesen, daß diese vermehrt oder vermindert werden; je nachdem die Stellung des Kopfes verändert wird. Unter Andern erzählt Schmuoker (Schriften III. S. 126) einen Fall (Nr. 599), wo 5 Wochen nach einer Verletzung des Kopfes die Erscheinungen einer Eiteranhäufung eintraten: lag der Kranke auf einer Seite, so entstanden heftige, unwillkürliche Bewegungen der andern Seite; lag er auf dem Rücken, so war er soporös und ruhig; richtete man ihn auf, so öffnete er die Augen, drehte den Kopf, und schaute bisweilen; bog man den Kopf nach vorne, so konnte er auf den Füßen stehen; bog man den Kopf nach hinten, so schloß er die Augen und bekam Zuckungen in Armen und Beinen. b) In Hinsicht auf Häufigkeit folgt zunächst die Hirnwassersucht ($\approx 1:2, 52$), welche auch in ihrer chronischen Form häufig epileptische Anfälle erregt, und die ihr verwandte Atrophie ($\approx 1:2, 43$). In einem Falle (Nr. 340) nahmen bey aufrechter Stellung die Zuckungen im Gesichte und in den Augenmuskeln zu. c) Hierauf kommen die Atergebilde ($\approx 1:2, 60$) und die Hydatiden ($\approx 1:3, 92$). d) Sodann die Blutergießung ($\approx 1:3, 36$): als in dem einen Falle (Nr. 561) das Extravasat entfernt wurde, so hörten die Convulsionen auf. e) Verhärtung ($\approx 1:3, 36$) und Erweichung ($\approx 1:3, 93$) schloßen sich in der Reihenfolge an. f) Sodann kommen die abnormen Knochenbildungen, die Concremente ($\approx 1:4, 18$), besonders in der festen Hirnhaut (Beiträge II. S. 54 — 57), der Beinfraß ($\approx 1:4, 66$), die Depression ($\approx 1:5, 28$). Oeffters (Nr. 114. S. 115, 120) hören die Convulsionen sogleich auf, wenn der eingedrückte Schädelsknochen gehoben wird. Hierher gehört auch die Hypertrophie und Exostose des Schädels, welche eine der häufigsten Ursachen der Epilepsie ist. g) Fremde Körper verursachen bisweilen ($\approx 1:6$) Krämpfe. h) Die Hirnerschütterung bringt vorzüglich lähmungsartige Zufälle hervor, aber auch ($\approx 1:11$) Krämpfe, indem sie die Irritabilität von der Herrschaft der centralen Sensibilität entbindet und dadurch auch Erbrechen und unwillkürliche Ausleerung von Koth und Harn bewirkt. — Uebrigens bemerken wir noch, daß in vielen der angeführten Fälle die Krämpfe, namentlich die klonischen erst kurz vor dem Tode eintraten. Wie nämlich der Krampf überhaupt auf einer Störung des Gleichgewichts unter den Factoren der Bewegung beruht, so kann er auch in einem relativen Ubergewichte des Peripherischen seinen Grund haben und namentlich den vom Centrum des Lebens ausgehenden Tod bezeichnen. So sterben auch die Hemicephalen gewöhnlich unter Convulsionen. — Am offenbarsten zeigt sich der Einfluß auf die Bewegung bey der mechanischen Behandlung von abnorm bloß liegenden Stellen des Gehirns. Durch einen nach und nach verstärk-

ten Druck auf einen Schwamm der festen Hirnhaut (Nr. 887) konnte man nach Willkür Epilepsie erregen; bey fortdauernder Compression eines Hirnschwammes (Nr. 1056) entstanden von Zeit zu Zeit Zuckungen im linken Arme. Nach Unterbindung eines Hirnbruchs (Nr. 288) traten Zuckungen ein. Als ein Hirnschwamm (Nr. 110) abgeschnitten wurde, erfolgte eine allgemeine Erstarrung; als Knochensplinter und Hirnsubstanz aus einer Wunde (Nr. 77) genommen; als Schwämme der festen Hirnhaut geöffnet (Nr. 897., 900) oder abgeschnitten (Nr. 836) wurden, und als die feste Hirnhaut geöffnet und Eiter ausgeleert wurde (Nr. 536), entstanden Convulsionen. Zuweilen ist das verwundete Gehirn besonders reizbar: bey der Berührung einer eingedrückten Stelle des Schädels (Nr. 34) bewegte der betäubte Kranke die Arme stark und verzog den Mund; bey dem Einbringen der Sonde in eine Wunde (Nr. 29) entstanden Zuckungen in Armen und Beinen; bey Berührung einer Wunde (Nr. 31) entstand Schluchzen; bey einem Drucke verzog ein Kranker (Nr. 233) den rechten Mundwinkel; ein Andre (Nr. 67) bekam bey einem Drucke auf die linke Seite des Kopfes ein fast convulsivisches Zittern des rechten Fußes; bey Einbringung eines Fingers in die Wunde (Nr. 903) entstanden Convulsionen in den Gliedern der entgegengesetzten Seite, und als *Marechal (acad. de chir. II. p. 154)* am neunten Tage nach der Verwundung den Finger ganz leise in die Wunde brachte, entstanden sogleich die fürchterlichsten Zuckungen, die bald wieder aufhörten. Uebrigens verursachte bey Hemicephalen die Berührung (Nr. 627) oder das Aufheben (Nr. 635) der die Stelle des Gehirns vertretenden schwammigen Masse ebenfalls allgemeine Krämpfe und Zuckungen.

§. 344. Ausser dem eigentlichen Starrkrampf tritt auch in Folge einer Hirnkrankheit, besonders der Erweichung, Eiterung, Blutergießung und Afferbildung, nicht selten eine anhaltende Zusammenziehung und Starrheit einzelner Muskelpartien, ein partieller tonischer Krampf ein, die Gliedmaßen, besonders die obern, werden starr, unbegleitet, und zwar meistens in gebogener Stellung verharrend (Nr. 750., 754., 750.); oft sind sie dabey schmerzhaft, vorzüglich wenn man einen Versuch macht, ihre Lage zu ändern. Nicht selten (Tabelle XXVI.) sind, die Nackenmuskeln erstarrt, zuweilen (Nr. 958.) gleichzeitig mit den Rumpfmuskeln. In einem Falle (Nr. 888.) wurden bey jedem Anfalle von Kopfschmerz die Bauchmuskeln so fest, wie ein Bret. Häufiger ist der Starrkrampf der Kaumuskeln (Tabelle XXIV.). In den Fällen, wo der Hals (Tabelle XXVI.) oder die Lippen (Tabelle XXVII.) oder die Augen auf eine Seite gezogen; oder die Augenlider geschlossen (Tabelle XXVIII.) sind, sind zwar gewöhnlich die antagonistischen Muskeln gelähmt; aber es kann auch ein tonischer Krampf in den Muskeln selbst, welche diese Bewegungen hervorbringen, zum Grunde liegen. So bemerkte *Lallemand (l. p. 253)*, daß die Augenlider bisweilen dem Versuche, sie mit den Fingern zu öffnen, Widerstand entgegenzusetzen, und nachher wieder zurückzuschnellen, also nicht durch Lähmung ihres Hebemuskels, sondern durch Krampf ihres Schließmuskels geschlossen sind. — Zuweilen sind tonische und klonische Krämpfe zugleich vorhanden und an die beyden Seiten des Körpers vertheilt. Da der tonische Krampf mehr von einem Eröthismus des Gehirns abhängt, so geht er späterhin in Erschlaffung und Lähmung (Nr. 557. 958) über. Häufig kommt er aber auch zugleich mit der Lähmung vor, und zwar entweder in den Gliedern der andern Seite (Nr. 145. 212), oder in den gelähmten Gliedern selbst (Nr. 247. 248. 265. 555. 740. 752. 754. 812.

843. 1072). Letzteres ist auch der Fall, wenn der Hals (Nr. 212) oder der Mund auf die gelähmte Seite gezogen ist.

§. 345. Mattigkeit und Muskelschwäche kann die Wirkung einer erhöhten Gefäßthätigkeit im Gehirne seyn, wodurch dessen freye Wirksamkeit nach aussen gestört ist. Zu den Vorläufern der Meningitis gehört Mattigkeit, Schwere der Glieder, leichtes Ermüden, Mangel an fester Haltung, Unsicherheit der Bewegung, Schleppen oder hohes Aufheben der Beine, häufiges Stolpern oder Ausgleiten. Auch im Verlaufe der Krankheit ist meist allgemeine Schwäche zu bemerken: die Kranken liegen, namentlich im spätern Zeitraume, gewöhnlich auf dem Rücken, bohren mit dem Hinterhaupte im Kopfkissen, und vermögen sich nicht aufrecht zu halten. Auch bey einem chronisch und local entzündlichen Zustande des Gehirns, der mit Beweichung verbunden ist und mit Apoplexie endigt, gehört Muskelschwäche und ein schwankender Gang zu den zuerst bemerklichen Symptomen dieser schleichenden Krankheit. Jucken und Spannen im Nacken und Rückgrate, Einschlafen und Armeisenkriechen der Glieder, Mattigkeit, Zittern und Stottern sind oft die Vorboten der Apoplexie. Im zweyten Zeitraume der Perimenigitis, wo dieselbe über eine grössere Fläche sich ausbreitet, tritt Mattigkeit ein. — Dasselbe findet aber auch Statt, wenn die Hirnthätigkeit überhaupt gesunken oder unterdrückt ist. Bey der chronischen Hirnwassersucht entsteht allgemeine Kraftlosigkeit, unvollkommene Ernährung der Muskeln, und lähmungsartige Schwäche der Füsse und des Halses, so daß Rumpf und Kopf nicht aufrecht gehalten werden können. Nach einer Hirnerschütterung bleibt große Mattigkeit zurück. Dasselbe ist der Fall bey Thieren, deren Hirn man verwundet, oder bey denen man bloß eine Flüssigkeit in die Schädelhöhle gespritzt hat (Bichat von den Häuten S. 266 fg.). Hill (p. 137) bemerkt, daß, wenn man zu Verhütung eines Hirnschwamms eine Schädelöffnung mit Charpie ausgestopft, oder eine Bleypfanne darein legt, Entkräftung erfolgt.

§. 346. Wirkliche Lähmung entsteht bey der Hirnentzündung gewöhnlich im letzten Zeitraume, zuweilen aber auch, wenn Kopfverletzungen den Anlaß gegeben haben, schon im ersten Zeitraume, überhaupt um so früher, je heftiger die Entzündung und je stärker die dadurch erregte Convulsion gewesen ist. Daß übrigens die Entzündung ohne alle Ergießung so wirken kann, wird unter Andern durch Andersons Beobachtung (Nr. 78) bestätigt, wo die nach einer Kopfverletzung eingetretene Lähmung, die durch Entfernung eingedrungener Knochenstücke bereits gehoben worden war, drey Tage später bey Entzündung der festen Hirnhaut wieder sich einstellte, bey dem Eintritte der Eiterung aber verschwand. — Nach der vorliegenden Sammlung pathologischer Beobachtungen verhielt sich die Zahl der Fälle von Hirnabnormität mit Lähmung zur Gesamtzahl wie 660: 1912 oder wie 1: 2, 89. a) Blutergießung erregte am häufigsten (\approx 1: 2, 11) Lähmung, und zwar erscheint diese plötzlich, wenn die Ergießung mit einem male eintritt durch Zerreißen eines stärkern Gefäßes; erfolgt die Ergießung allmählig, so geht Mattigkeit, Schwere und Taubwerden der Glieder der Lähmung voran. Ist durch Hirnerschütterung oder durch eine bedeutende Blutergießung das Bewußtseyn aufgehoben, so macht sich die Lähmung erst dann bemerklich, wenn die Betäubung gehoben ist. Wenn man das Extravasat wegnimmt (Nr. 236, 238, 490), so wird die freye Bewegung wieder hergestellt.

Bey Hühlingen, als Wirkungen früherer Blutergießung ist die Lähmung ziemlich eben so häufig ($\equiv 1:2, 16$). b) Die Eiterung steht in Hinsicht der Frequenz von Lähmungen der Blutergießung zunächst ($\equiv 1:2, 13$). Wenn sie nach Kopfverletzungen eintritt, so erfolgt die Lähmung am häufigsten vom fünften bis elften Tage (Nr. 36, 59, 62, 63, 70, 506, 530, 531, 546, 552, 559, 569, 1050), seltner am zweyten bis vierten (Nr. 492, 499, 537), oder am zwölften bis achtzehnten Tage (Nr. 66, 94, 503, 510, 534), in der vierten (Nr. 67, 533), fünften (Nr. 508), sechsten (Nr. 536) Woche; oder im vierten (Nr. 539) oder sechsten (Nr. 569) Monate; oder nach mehreren Jahren (Nr. 83, 565). Kann durch chirurgische Hülfe der Eiter entfernt werden, so verschwindet die Lähmung (Nr. 901, 902). c) Nach der Erweichung ($\equiv 1:2, 28$) folgen die Aftergebilde ($\equiv 1:2, 81$). Als ein Hirnschwamm (Nr. 70) abgeschnitten, und ein Schwamm der festen Hirnhaut (Nr. 919) geöffnet wurde, hörte die Lähmung auf. Hydatiden kühnen seltner ($\equiv 1:4, 63$); so auch Verhärtungen ($\equiv 1:4, 45$). d) Die Lähmung von seröser Ergießung ($\equiv 1:2, 89$) tritt nach Kopfverletzungen gewöhnlich in der Mitte der zweyten Woche ein (Nr. 321, 322, 708). e) Eindringene fremde Körper verursachen Lähmung ($\equiv 1:4, 56$) am ersten (Nr. 61), zweyten (Nr. 78.) oder dritten (Nr. 83) Tage nach der Verwundung; zuweilen erst bey eintretender Eiterung (Nr. 62). Nach der Entfernung von Knochensplintern hört die Lähmung entweder sogleich (Nr. 66, 78, 82, 136, 450.) oder nach einigen Tagen (Nr. 63) auf. Zuweilen (Nr. 68, 70) gewinnt das Gehirn seine frühere Kraft wieder, und die Lähmung verschwindet, ungeachtet die fremden Körper im Gehirn bleiben. So bemerkte auch Arne'mann, daß die bey Händen unmittelbar nach dem Verluste von Hirnsubstanz eingetretene Lähmung meist nach 8 Tagen sich verlor. f) Die Lähmung von Eindrückung des Schädels ($\equiv 1:7, 40$) vergeht, sobald der Knochen gehoben wird (Nr. 113, 120). g) Die Hirnerschütterung verursacht Lähmung ($\equiv 1:11$), und zwar bisweilen eine partielle, so daß unmittelbar nach der Verletzung die eine Seite gelähmt ist (Nr. 507.). h) Endlich tritt auch bisweilen Lähmung der Gliedmaßen ein, wenn der Wundarzt einen Hirnbruch (Nr. 301) oder einen Hirnschwamm (Nr. 1056) anhaltend comprimirt.

§. 347. Man findet, daß bey Abnormität des Gehirns die Fälle von Lähmung häufiger sind, als die von Krampf, besonders wenn man von Letztern diejenigen abrechnet, wo die Convulsion erst kurz vor dem Tode eintritt. Die Meningitis bewirkt mehr Krampf, wie überhaupt abnorma Aufregung; die Affection der Hirnsubstanz selbst hat mehr Lähmung zur Folge. — Nach partiellen Convulsionen tritt nicht selten (Nr. 62, 213, 490, 537, 1013.) in demselben Gliede späterhin Lähmung ein. Selten finden die Convulsionen in dem schon gelähmten Gliede Statt (Nr. 583, 585, 742.). Am gewöhnlichsten (Nr. 194, 212, 259, 752, 754.) ist die eine Seite gelähmt, und die andre von Convulsionen befallen.

§. 348. Die von einer Hirnabnormität abhängigen Krämpfe befallen gewöhnlich zuerst eine Muskelparte und verbreiten sich von da aus fortschreitend über andre. Arne'mann (S. 23.) sah bey einem Hunde, der 3 Monate nach einem Verluste von Hirnsubstanz epileptische Anfälle bekam, wie die Zuckungen zuerst an den Augen hervortraten, dann die Ohren, dann das Vorderbein, dann das Hinterbein der entgegengesetzten Seite, und darauf den ganzen Körper ergriffen. Die *Aura epileptica* zeigt den Heerd der Krankheit gewöhnlich, aber nicht immer an: so ging sie (Nr. 1036.) vom Kopfe aus, und ver-

breitete sich den Nacken und Rücken entlang; aber in einem ähnlichen Falle (Nr. 1037.) ging sie von den Gliedmaßen der rechten Seite aus. So ist auch das Fortschreiten der Lähmung, wie der Genesung von derselben, an keinen festen Gang gebunden, sondern geht bald von dem Rumpfe abwärts, bald von den Fingern und Zehen aus nach oben gegen den Rumpf zu (Abercrombie S. 185.). So breitet sich auch bisweilen die Affection des Rückenmarks über die oberhalb der gekrümmten Stelle wurzelnden Nerven aus: als bey einem Kaninchen das Skalpell in das am Anfange der Lendenwirbel durchschnitten Rückenmark einige Linien nach oben gestossen wurde, entstanden heftige Bewegungen des Brustkastens, der Vorderfüsse und des Kopfs, und bey ähnlichem Verfahren an einer Katze rollten die Augen, und wurde die Zunge vorgestreckt. (Merk über thierische Bewegung S. 79.)

§. 349. Eben so zeigt sich kein bleibendes Verhältniß zwischen Empfindung und Bewegung (Abercrombie S. 185.). a) Beyde werden und bleiben oft auf gleiche Weise afficirt. b) Häufig dauert die Empfindung bey gelähmter Bewegung fort: die Receptivität des Gehirns dauert fort bey aufgehobener Spontaneität desselben, weil zu Jener eine mindere Lebenshätigkeit hinreicht, als zu dieser erforderlich ist, wie denn auch bey Sterbenden die Bewegung früher erlischt, als die Empfindung (*Haller elem. IV. p. 299.*). So wird auch häufig ein gelähmtes Glied wieder empfindlich, während die Bewegung aufgehoben bleibt. Auch treten oftmals stechende Schmerzen in den gelähmten Gliedern ein und nehmen, wenn man diese berührt oder sie zu bewegen versucht, zu (*Lallemant I. p. 273.*). c) Daß bey aufgehobener Empfindung die willkürliche Bewegung fort dauert, kommt selten vor, und scheint nicht auf einer Abnormität des Gehirns, sondern der Nerven zu beruhen, wo denn der mächtigere Impuls des Gehirns das ausrichtet, was der schwächere Impuls von den peripherischen Nervenenden her nicht vermag. (Vergl. §. 24.) — Eine schwache Compression, des Gehirns stört die Bewegung, eine stärkere das Bewußtseyn; wenn eine Compression, die lange gedauert hat, gehoben wird, so tritt zuerst die Bewegung und nachher erst das Bewußtseyn wieder ein.

§. 350. Nach dem Ausweise der XIX. und XX. Tabelle sind allgemeine Krämpfe viel häufiger, als allgemeine Lähmung. Die Lähmung trifft am häufigsten die Gliedmaßen, und zwar vorzüglich beyde Gliedmaßen der einen Seite. Nächst dem ist die Frequenz der Lähmung der Zunge am stärksten; ein Symptom dieses Zustandes besteht darin, daß der Kranke nur einsyllbige oder sonst kurze Wörter, und auch diese bisweilen nur mit starkem Ausnahmen aussprechen kann. Nächst der Zunge werden die Augenmuskeln am häufigsten afficirt: bey Krämpfen ist der Augapfel starr, oder rollend, oder verdreht; bey Lähmung ist das obere Augenlid weder im Wachen ganz geöffnet, noch im Schlafe ganz geschlossen. Hierauf folgt in Hinsicht auf Frequenz die Affection der Gesichtsmuskeln, welche häufiger in Lähmung, als in Krämpfen, besteht. Selten wird der Kiefer afficirt, und zwar häufiger krampfhaft, als paralytisch. Darauf folgt die Lähmung der Organe des Schlundes. Am seltensten sind die localen Affectionen der Halsmuskeln; wenn bey der Hirnwassersucht die Kranken den Kopf nicht aufrecht halten können, so ist dies nur eine Aeusserung der allgemeinen Schwäche.

§. 351. In Hinsicht auf die verschiedenen Dimensionen bemerken wir, daß zwischen den beyden Seiten häufig Consensus Statt findet, oder daß die Abnormität in der einen Hemisphäre des Gehirns, anfangs in einer, und späterhin in beyden Seiten des Körpers Lähmung hervorbringt (Nr. 215. 801. 924. u. a. w.). — Vorne sind die Krämpfe im Ganzen genommen häufiger, als hinten, so wie die Beugekrämpfe häufiger, als die Streckkrämpfe. Zuweilen ist das Gleichgewicht zwischen den Muskeln der vordern und hintern Fläche aufgehoben (Nr. 409. 885.), so daß die Kranken nur nach vorne oder nur nach hinten zu fallen geneigt sind. — Im Ganzen genommen werden bey Hirnabnormalitäten die obern Gliedmaassen häufiger, als die untern afficirt; in den unten zusammengestellten Fällen war das Verhältniß bey Lähmungen wie 67: 53, und bey Krämpfen wie 19 zu 5.

Zweyter Abschnitt.

Vom psychischen Hirnleben.

I. Verhältniß zwischen Gehirn und Seele.

1. Einwirkung des Gehirns auf die Seele.

§. 352. Indem wir zuvörderst (§. 352—389.) das Verhältniß zwischen Gehirn und Seele untersuchen wollen, betrachten wir fürs Erste (§. 352—385.) den Einfluß, welchen jenes auf diese ausübt. — Ureprüngliche Misbildungen des Gehirns kommen nie mit normaler Seelenthätigkeit vor. Bey Acephalen zeigt sich keine Spur von psychischem Leben, Hemicephalen zeigen auch bey normalem Athmen und Herzschlage keine willkührliche Bewegung und nehmen weder Nahrung, noch haben sie Ausleerungen (Nr. 627.), oder leeren zwar aus, aber können nicht saugen, noch schlingen (Nr. 638.), oder sie haben bey diesem Unvermögen Bewegung der Glieder (Nr. 646.), oder sie sind wie betäubt (Nr. 351.), und zeigen wenig Bewegung (Nr. 619. 628.), oder sie nehmen die ihnen eingeflossene Nahrung (Nr. 645.) und bewegen die Gliedmaassen (Nr. 637.), aber auch diese schwachen Spuren von Seelenthätigkeit erlöschen bald. Wenn bey unvollkommener Hirnentwicklung das Leben Monate oder Jahre lang besteht, so bleiben die Kinder dabey betäubt (Nr. 351.), selbst ohne äussere Sinnesthätigkeit und willkührliche Bewegung, so daß man, um sie zu nähren, Flüssigkeiten durch Röhren ihnen in den Schlund fließen muß (Nr. 649.). Personen mit einem monströs kleinen Gehirne bleiben blödsinnig, so daß sie, auch wenn sie erwachsen sind, gefüttert werden müssen (Nr. 653.). Bey dem angeborenen Hirnbruche sind die Kinder meist schläfrig und betäubt, so wie derselbe, auch, wenn er später entstanden ist (Nr. 299. 300. 301.), Schlafsucht und Betäubung hervorbringt.

§. 353. Ein leichter Grad der Hirnerschütterung verursacht eine vorübergehende Störung der Urtheilskraft; ein stärkerer schwächt das Gedächtniß; ein noch stär-

kerer hebt das Bewußtseyn auf: die Sinne schwinden, der Mensch verfällt in einen schlafähnlichen Zustand, und weiß beym frühern oder spätern Erwachen durchaus nichts von dem Ereignisse der Verletzung, kann sich auch andrer Dinge nur mit Mühe erinnern; sein Denken ist erschwert, er ist matt, düster, stumpfsinnig, schläfrig, besonnen, wie berauscht. Bey Alten und Schwachen verlieren sich diese Folgen später, als bey kräftigen und jungen Menschen, doch bleibt bisweilen (Nr. 3.) auch bey diesen eine merkbare Verstandesschwäche Jahre lang zurück; ehe die Seelenkräfte völlig wieder gewonnen werden. Wie bey Schwäche und Reizbarkeit des Gehirns auch durch leichte Bewegungen ein der Hirnerschütterung ähnlicher Zustand hervorgebracht werden kann, sieht man besonders an Menschen, die, nachdem sie von Hirnwunden genesen sind, durch Fahren (*Salzmann de cranii fractura. Argent. 1718. p. 4.*) oder durch Niesen (*Repertorium II. S. 105.*) betäubt werden.

§. 354. Ein Druck auf das Gehirn verursacht Schyrtze des Kopfs, Schläfrigkeit, Schwindel, Benommenheit, Verdunkelung des Bewußtseyns und endlich völlige Betäubung. Tritt er plötzlich ein, so ist diese Wirkung am deutlichsten: so von eingebrungenen Knochensplittern und andern fremden Körpern, von Depression des Schädels und von Blutergießungen; entsteht er hingegen allmählig und in Folge eines anderweitigen krankhaften Zustandes, wie bey Eiterung und seröser Ergießung, so zeigen sich seine Wirkungen nicht ganz so rein und deutlich; am geringsten sind sie aber, wenn er durch eine chronische Abnormität des Bildungsherganges, namentlich durch Aftergebilde und Exostosen hervorgerufen wird.

§. 355. Dafs die Betäubung wirklich auf dem mechanischen Verhältnisse des Drucks beruht, sehen wir zuvörderst daraus, dafs sie bisweilen nur bey einer gewissen Stellung des Kopfs eintritt. Sie erfolgte bey einer Blutergießung in den Seitenhöhlen (Nr. 192.), und bey einer Eiterung im vordern Theile des Gehirns (Nr. 599.), sobald die Kranken sich wagerecht auf den Rücken legten; bey einer Eiterung in der rechten Hemisphäre (Nr. 570.), sobald sich der Kranke auf die linke Seite legte; bey Aftergebilden im Gohrne (1001.), sobald der Kranke sich aufrichtete.

§. 356. Noch deutlicher zeigt sich dies Verhältnifs darin, dafs durch die Entfernung der ergossenen Flüssigkeit die Betäubung meist auf der Stelle gehoben wird. Wenn ergossenes Blut (Nr. 38. 236. 240. 279. 280. 281. 492. 509.) oder Eiter (Nr. 55. 114. 469. 472. 481. 492. 512. 538. 578. 1053.) ausgeleert, ein Knochensplitter (Nr. 56. 63. 65. 79. 82. 96. 114. 119. 469. 536.) oder ein andrer fremder Körper (Nr. 69. 71. 89.) herausgenommen, oder ein niedergedrückter Schädelknochen (Nr. 120. 129. 599.) aufgehoben wurde, so kehrte das Bewußtseyn auf der Stelle zurück, und die Kranken erwachten wie aus tiefem Schlafe. Bisweilen ist die Eiterung so reichlich, dafs, wenn nicht die Wunde täglich mehrere male verbunden (Nr. 129.), oder nicht auf andre Weise, z. B. durch Husten (Nr. 481.) der Eiter täglich ausgeleert wird, alsbald Betäubung eintritt. Jede Hemmung des freyen Eiterabflusses (Nr. 512.) hat diese Wirkung. Zuweilen tritt mehrere male nach einander Eiterung mit Betäubung ein, und diese wird jedesmal durch die Ausleerung gehoben (Nr. 492. 1052.). Wenn das Gehirn lange zusammengedrückt gewesen ist, so können seine Functionen nach Beseitigung des Drucks nicht unmittelbar völlig

wiederhergestellt werden, sondern es dauert bisweilen die Betäubung noch eine Zeitlang, während die übrigen Symptome des Drucks verschwunden sind.

§. 357. Die Betäubung erfolgt ferner unmittelbar auf einen bey der chirurgischen Behandlung angebrachten Druck: so bey dem Einspritzen von Flüssigkeiten oder Einbringen der Sonde in ein Hirngeschwür (Nr. 469.); bey dem Drucke mit der Hand auf einen Hirnschwamm (Nr. 1049, 1053.), oder auf einen Hirnbruch (Nr. 299.), oder auf einen Schwamm der festen Hirnhaut (903.), oder auf den durch Exfoliation des Schädels bloß gelegten Sichelblutleiter, so wie späterhin auf die Narbe, welche davon zurückblieb (Ollenrodt in Arneimanns Magazin I. 2. St. S. 116.); ferner einige Stunden (Nr. 298.) oder Tage (Nr. 359.) nach Unterbindung eines Hirnbruchs; endlich bey dem Zurückbringen eines Schwamms der festen Hirnhaut in die Schädelhöhle (Nr. 893, 909, 910.).

§. 358. Versuche an Thieren stimmen mit diesen Ergebnissen überein. Zwar bemerkte Lorry (*Mémoires présentés III. p. 350.*) bey örtlicher oder allgemeiner Zusammen-drückung des Gehirns durch den Druck der Finger, oder durch eingespritztes Wasser oder Blut bloß ein allgemeines Zittern, aus Schmerz mit Anstrengung zu entstehen. Aber Kees (p. 31.) und Metzger (*adversaria p. 76.*) sahen, als sie Hunden Blut auf die feste Hirnhaut, oder unter dieselbe eingespritzt hatten, Betäubung und Apoplexie erfolgen, und Fodéra (Magendie Journ. III. p. 195.) bewirkte bey Thieren, durch einen allmählichen und gleichförmigen Druck auf den mittlern Theil des Gehirns, Betäubung.

§. 359. Man bemerkt oft, daß die mechanische Kraft der fremden Substanz nicht in Verhältniß steht zu dem Grade der Störung der Seelenthätigkeit: einmal findet man bey völliger Betäubung kaum eine halbe Unze ergossener Flüssigkeit, oder einen unbedeutenden Knochensplitter, und ein andres mal ist eine bedeutende Stelle des Schädels eingedrückt (Nr. 126.), oder ein fremder Körper eingedrungen (Nr. 57, 105.), oder Blut ergossen (Nr. 239.), ohne daß die Seelenthätigkeit gestört wird. Allein es würde sehr übereilt seyn, wenn wir daraus mit Le Cat, Weikard und Abercrombie schließen wollten, daß die Störung der Hirnthätigkeit gar nicht durch einen mechanischen Druck bewirkt werde, sondern immer eine innere, abnorme Veränderung voraussetze. Denn 1) wenn auf den lebendigen Organismus ein Körper mechanisch einwirkt, so ist dessen Qualität dabey nicht gleichgültig: ungeachtet die mechanische Wirkung vorwaltet, so kommt es doch nicht allein auf Umfang und Dichtigkeit, kurz, auf Wasserverhältnisse, sondern zugleich auf die Beschaffenheit der Substanz an. So ist denn auch die Wirkung des Drucks auf das Gehirn verschieden nach der Qualität des drückenden Körpers: der Druck des Serums wirkt offenbar am schwächsten, da das Gehirn im Normalzustande von einer gewissen Quantität desselben umgeben ist; stärker wirkt der des Eiters, als eines Erzeugnisses abnormer Bildung; noch stärker der des aus seiner Bahn getretenen Blutes. 2) Der Organismus ist keine sich stets gleich bleibende Größe, und die Wirkung wird nicht allein durch die Beschaffenheit der einwirkenden Potenz, sondern auch durch den jedesmaligen Zustand, in welchem diese den Organismus findet, bestimmt. Ist also das Gehirn sehr reizbar, ist es so expandirt in Verhältniß zum Schädel, daß eine bedeutende Spannung daraus erwächst, so muß jeder neu hinzutretende, fremddringende Druck seine Thätigkeit stören. Dagegen wird es nicht afficirt werden, wenn seine

Reizbarkeit stumpf und seine Ausdehnung geringer ist, so daß zwischen ihm und dem Schädel noch Zwischenräume hieüben. 3) Endlich kommt es auf die nähern Umstände an, unter welchen die äussere Potenz mit dem Organismus in Beziehung tritt. Die Wirkungen des Drucks müssen verschieden ausfallen, je nachdem er diese oder jene Stelle des Gehirns trifft. Ein nach allen Seiten hin wirkender Druck vertheilt sich mehr gleichförmig, und hat demnach auch geringere Wirkungen: darum schaden fremde Körper, welche mitten in der Hirnsuhstanz sitzen und sowohl gegen die Höhlen, als gegen die äussere Oberfläche zu drücken, verhältnissmässig weniger, als die, welche zwischen Gehirn und Schädel ihren Platz haben. Ist ferner der Druck anfangs unbedeutend, und wächst er allmählig, so gewöhnt sich das Gehirn an denselben, und behauptet seine Functionen dahey geraume Zeit, ehe es der übermächtigen Masse unterliegt: so kann die chronische Wassersucht und die Aftersorganisation im Gehirne auf einen sehr hohen Grad anwachsen, ehe die Seelenthätigkeit gestört wird, namentlich bey Kindern, wo der Schädel leicht nachgiebt; ist dieser verknöchert, so macht die seröse Ergiessung leichter Betäubung. Selbst an den plötzlich entstandenen Druck gewöhnt sich das Gehirn, so daß er ihm fortan gewissermassen Bedürfnis wird, wie überhaupt der Selbsterhaltungstrieb des lebendigen Organismus auch so sich ausspricht, daß er sich in die nicht zu überwindenden feindlichen Verhältnisse fügt und sie selbst in Bedingungen seines Bestehens verwandelt. Das Gehirn ist im Normalzustande, vermöge des in seinen Höhlen, so wie zwischen ihm und dem Schädel enthaltenen serösen Dunstes, in einer Spannung begriffen, welche seine Thätigkeit bedingt. Der abnorme Druck vermehrt die Spannung bis auf einen Grad, der durch Angewöhnung Bedürfnis werden kann, namentlich wenn vorher die Spannung zu gering war.

§. 360. Was die Entzündungen betrifft, so wirkt die Perimenigitis, so lange sie in ihrem ersten Zeitraume und noch örtlich ist, aulegend auf die Seelenthätigkeit: die Kranken sind munter und lebhaft, und können sich deshalb nicht entschließen, sich als Kranke behandeln zu lassen und im Bette zu bleiben: sie gehn an ihre Geschäfte, und betragen sich, als ob ihnen nichts zugestoßen wäre. Nimmt die Entzündung bloß an Intensität zu, so greift sie erst mit dem Eintritte der eiterförmigen Absonderung störend in die Seelenthätigkeit ein; und bewirkt Schlafsucht und Betäubung, mit Unruhe verbunden. Breitet sie sich weiter aus, so verursacht sie Unruhe, Verdrüsslichkeit; Niedergeschlagenheit, Mattigkeit; allgemeine Unbehaglichkeit, unruhigen Schlaf oder Schlaflosigkeit. Geht sie in Meningitis über, so tritt ein wildes Irreden ein.

§. 361. Die psychischen Symptome der Meningitis bezeichnen bald einen Zustand von Aufregung, bald von Unterdrückung, je nachdem das Gehirn mehr oder weniger Reactionsvermögen besitzt und so von dem abnorm gesteigerten Leben seiner Hüllen entweder in krankhaft ausschweifende Thätigkeit versetzt oder dadurch gelähmt und unterdrückt wird. Entsteht die Entzündung durch Mittheilung von außen her, indem eine Perimenigitis in Folge von Kopfverletzungen sie verursacht, so zeigt sich in ihrem Anfange zuweilen eine Aufregung, die innerhalb der Gränzen der Gesundheit zu fallen scheint: Munterkeit, Lustigkeit, auffallende Regsamkeit des Gedächtnisses und große Agilität des Körpers. In den meisten Fällen findet nur eine exaltirte Sensibilität bey ört-

chem Kopfschmerze Statt. Bey der hydrocephalischen Form findet mehr Depression Statt: Schläfrigkeit, Unthätigkeit, Muthlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Unzufriedenheit, Vordrüsslichkeit, Empfindlichkeit und etwas Ungewöhnliches in den Aeusserungen und in der Handlungsweise, sind die vorherrschenden Symptome, bey welchen der unruhige Schlaf, die schreckhaften Träume, das plötzliche Auffahren und das laute Aufschreyen auf den gereizten Zustand hindeuten. Zuweilen tritt auch schon in diesem ersten Zeitraume eine leichte Betäubung ein, namentlich wenn die Krankheit sehr acut und das Gehirn sehr schwach ist. Im zweyten Zeitraume oder auf der Höhe der Entzündung, nimmt der Kopfschmerz zu, oder er verliert sich mit der Verminderung des Bewusstseyns. Im aufgeregten Zustande tritt dann Unruhe, Schlaflosigkeit und Delirium ein. Letzteres macht den Uebergang aus dem ersten in den zweyten Zeitraum aus: nachdem die Kranken etwas gestört, fast wie betäubt, entweder aufgereggt und geschwätzig, oder still, düster und schläfrig gewesen sind, aber sich leicht ermuntern lassen und verständig geantwortet haben, so werden sie allmählig sich selbst mehr entfremdet, sie gehen auf die an sie gerichteten Fragen verwirrte Antworten, sind unschlüssig und drücken oft das Gegentheil von dem aus, was sie meinen, bis denn ein anhaltendes Delirium ausbricht. Der Zustand der Unterdrückung zeigt sich als Stumpfsinnigkeit, Indolenz und Betäubung, welche bisweilen mit Irreden abwechseln. — Im dritten Zeitraume tritt, als Folge der Entzündung, Lähmung ein, es mag übrigens seröse Ergießung oder Eiterung erfolgen, oder nicht. Das Delirium geht jetzt in Betäubung über, oder wenn diese schon früher eingetreten war, so wird sie nun stärker. — Zuweilen ist die Krankheit so heftig, daß gleich in ihrem Anfange Delirium oder Betäubung, oder Beydes in wechselnder Folge eintritt. In andern Fällen schleicht sie so langsam einher, und ist an sich so gering, daß sie gar keine bemerkliche Störung erregt, bis erst ihre Folge, die seröse Ergießung oder die Eiterung, die Seelenthätigkeit niederdrückt. So dauerte die Krankheit bey einem Mädchen ein halbes Jahr lang ohne Störung der Seele; nachdem es Tages zuvor noch in der Schule gewesen und jedoch nur mit großer Mühe ein leichtes Exempel gerechnet hatte, wurde es plötzlich betäubt und starb an demselben Tage; Kortum fand 4 Unzen Wasser in den Hirnhöhlen (*Hoflands Journ. VI. S. 153, fgg.*). Ein junger Mensch bekam Kopfschmerz, wurde bald betäubt, und starb nach 24 Stunden; man fand Eiter unter der Spinnwebhaut ergossen (Ebenselbst VIII. S. 112.). — Ein chronisch entzündlicher Zustand findet oft bey Seelenkrankheiten Statt, da man nach Manie und Melancholie häufig Congestionen in der Gefäßhaut (Beyträge II. S. 273, fgg.) und durch Entzündung entstandene Abnormitäten an der Spinnwebhaut (Lallemand I. p. 246) bemerkt.

§. 362. Die Encephalitis offenbart sich in ihrem Entstehen durch eine eigne Verstimmung der Seele, durch eine fremdartige Heftigkeit, oder mürische Laune, oder Niedergeschlagenheit und Äengstlichkeit, oder Indolenz und allgemeine Gleichgültigkeit, durch Unaufgelegtbeit zum Denken und Vergesslichkeit, und durch einen von unruhigen Träumen unterbrochenen, nicht erquickenden Schlaf. Dieser bedrückte Zustand der Seele nimmt auf der Höhe der Krankheit zu: die Kranken sind benommen oder betäubt, antworten langsam und unpassend oder unzusammenhängend, sind schläfrig ohne in eigentlichen Schlaf zu kommen, sind unruhig und greifen bewußtlos nach dem Kopfe, oder lie-

gen in stillem, marmelndem Delirium. — Bey jeder wirklichen und ausgebreiteten Entzündung der Hirnsubstanz selbst ist die Seelenthätigkeit niedergedrückt und gelähmt: Roseray findet nur bey Congestion nach dem Gehirn und bey Entzündung seiner plastischen Hölle Statt. Ist die Encephalitis nicht heftig, oder ist sie auf eine einzelne Stelle beschränkt, so kann sie ohne irgend bemerkliche Symptomé dahin schleichen, bis die Lähmung einbricht und nach kurzer Betäubung dem Leben ein Ende macht. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wo man von Krankheitserscheinungen bloß Schlafsucht (Kerkring obs. 55) oder Apoplexie (Morgagni III, 6. 24. V, 11.) beobachtet hatte und bey der Leichenöffnung das Gehirn erweicht fand. Eine solche schleichende örtliche Entzündung ist es, welche Rostan und Bricheteau als Gehirnweichung beschreiben, wo bey anhaltendem Kopfschmerz die Geisteskräfte allmählig abnehmen, bis apoplektische Anfälle eintreten, welche in Kurzem töden.

§. 363. Die Tendenz der Meningitis zu acuter Hirnwassersucht spricht sich besonders dadurch aus, daß gleich vom Anfange der Krankheit an ein bedrückter Zustand der Seelenthätigkeit vorhanden ist. Mit dem Daseyn der Ergießung ist Schlafsucht und Betäubung verbunden; aber die durch die Entzündung herbeigeführte Lähmung der Geistes ist das Wesentliche hierbey, da die Wasserergießung nur die Folge der Krankheit ist und die Betäubung nach der Entzündung auch dann eintritt, wenn keine Ergießung erfolgt. Doch überall wirkt das Erzeugniß der Krankheit auf diese zurück, und so ist denn kein Zweifel, daß auch hier das ergossene Serum die Lähmung unterhält und vermehrt. Zuweilen scheint übrigens bey schon begonnener Ergießung die Meningitis noch an Heftigkeit und Umfang zuzunehmen, indem nach einem Zustande von Stumpfsinn und Betäubung noch ein wüthendes Delirium ausbricht (Beyträge I S. 251.). — Die typhöse und traumatische Wasserergießung hat, da sie gleichfalls auf Entzündung beruht, im Ganzen gleiche Symptome.

§. 364. Bey der idiopathischen chronischen Hirnwassersucht zeigt sich anfangs zuweilen eine erhöhte Empfindlichkeit; häufiger entsteht anhaltende Schläfrigkeit, welche, wenn die Krankheit schneller fortschreitet, in Schlafsucht übergeht. Bey langsamem Verlaufe wird das Kind verdrüsslich, der Geist wird stumpf, es tritt Blüdsinn ein, selbst die äussere Sinnenthätigkeit erlischt und es erfolgt anhaltende, völlige Betäubung. Bey dem allmählig zunehmenden Drucke sind die Wirkungen einer sehr bedeutenden Anhäufung bisweilen geringer: der Verstand ist schwach oder gestört, doch nicht ganz unthätig, und in einzelnen Fällen erhält er sich selbst in so weit, daß er die Gegenstände des gemeinen Lebens richtig zu beurtheilen vermag. — Die seröse Ergießung ist für immer in einem abnormen Verhältnisse der Absonderung und Rücksaugung, also in einem krankhaften Zustande der Lebensthätigkeit begründet, und so ist sie denn auch natürlich bey der Apoplexie nie ein primärer Zustand, aber auch nie eine ganz gleichgültige Nebenwirkung, für welche sie unter Andern Abercrombie (S. 44. figg. 144. figg.) ansieht. Wahrscheinlich bewirkt der Krankheitszustand, auf welchem sie beruht, bloß die vorangehenden Symptome, als Kopfschmerz, Schwindel, Stumpfsinn, und erst der Druck des Serums bewirkt völlige Lähmung des Gehirns und dadurch den apoplektischen Anfall. Daher tritt denn auch, wenn die Ergießung nur langsam entsteht und wächst, eine allmählige

Stumpfsinnigkeit und Betäubung ohne eigentliche Apoplexie ein (Beyträge I. S. 250. fg.). — Häufig erscheint die seröse Ergießung endlich im Gefolge von Seelenkrankheiten, und zwar, wie es scheint, meist erst gegen das Ende des Lebens, verursacht aber selten Betäubung und Apoplexie, indem das Gehirn hier zu stumpf ist, um von dem Drucke des Wassers bedeutend afficirt zu werden. Unter 216 seiner Kranken fand Greding die seröse Ergießung zwischen den beyden Hälften der Spinnewebenhaut in 120, und unter der Gefäßhaut in 57 Fällen. Die Letztere scheint besonders bey solchen Kranken vorzukommen, welche anfangs sehr aufgeregt, geschwätzig und rasend gewesen, zuletzt still und betäubt geworden und an Abzehrung oder Apoplexie gestorben sind (Beyträge II. S. 216. fgg.). Eben so schien die Ergießung über der festen Hirnhaut vorzüglich nach heftiger Raserey oder lange anhaltender Melancholie und dazu gekommener allgemeiner Cachexie eingetreten zu seyn (Beyträge I. S. 184. fgg.).

§. 365. Was die Eiterung betrifft, so verursachen Geschwüre der festen Hirnhaut Delirium und Sopor. Die Ergießung eiterförmigen Stoffs an dieser Membran erregt, so lange sie nicht bedeutend und die Flüssigkeit nicht ausgetretet ist, oft wenig Symptome. War die Entzündung örtlich geblieben, so erscheint ganz unvermuthet mit dem Eiterungsfieber Eingenommenheit des Kopfs und Betäubung; war sie allgemein, so läßt das Entzündungsfieber mit den übrigen Symptomen bey der anfangenden Ergießung nach, darauf folgt aber Schauder, Kopfschmerz, Unruhe, Schlaflosigkeit, Eingenommenheit des Kopfs und endlich Betäubung. War die Entzündung chronisch, so wird der Kranke düster, mürrisch, verdrüsslich, oder still und fühllos, dann schlafüchtig und betäubt; bisweilen haben alle Symptome der Entzündung gefehlt, und die Ansammlung des eiterförmigen Stoffs blüht plötzlich das Gehirn, indem ihre Wirkung die Form der Apoplexie annimmt (Beyträge I. S. 209 — 219).

§. 366. Stockt der Eiter, welcher in Folge einer acuten Entzündung der Hirnsubstanz sich gebildet hat, so sprechen die Symptome reine Niederdrückung der Seelenthätigkeit aus: Schwäche des Gedächtnisses, erschwerte Verbindung der Gedanken, Stumpfheit der Sinne, Schläfrigkeit, Fühllosigkeit, Schlafsucht, Betäubung, folgen auf einander. Die Schlafsucht soll nach Abercrombie leichter, und die Erweckung aus derselben eher möglich seyn, als bey seröser Ergießung. Die Betäubung tritt übrigens oft schon während der Entzündung ein, bevor noch Eiterung Statt findet (Lallemand I. p. 472); rührt aber oft auch von Letzterer allein her, wo die Entzündung zu schwach war, um eine bedeutende Störung der Seelenthätigkeit hervorzubringen, und diese erst zur Zeit der Eiterung erfolgt, indem die Betäubung offenbar mit dem Massenverhältnisse des Eiters in ursächlichem Zusammenhange steht (§. 344. 345). Uebrigens werden mit dem Eintritte der Eiterung die Symptome der Entzündung vermindert, und es erscheint eine Besserung, welche, wenn der Eiter zur Regeneration verwendet oder resorbirt wird, oder einen freyen Abzug findet, kurz, wenn er nicht zum Stocken kommt, auch anhaltend ist: die entzündliche Spannung läßt nach, indem die bildende Thätigkeit mehr nach aussen geht und sich in einer neuen Bildung wirksam erzeugt. So sahen John Bell (*Edinburgh Journ.* Nr. XIV. p. 308) und Dease (Nr. 492) bey einer Kopfverletzung das Gehirn 5 bis 6 mal in Eiterung kommen: so oft eine neue Entzündung entstand, erfolgte Fieber und Betäubung, und wie sich

Eiter bildete, schwanden immer diese Zufälle wieder. Auch Lallemand (L. p. 463) bemerkte, daß eine jede Eiterbildung Remission herbeyführte, und daß, wo nach einer Besserung von Zeit zu Zeit Rückfälle eingetreten waren, auch mehrere Abscesse im Gehirne sich vorfanden. — Bey der chronischen Encephalitis sind oftmals die Zufälle ganz unbedeutend gewesen, haben z. B. bloß in Kopfschmerz bestanden, und die folgende Eiterung bewirkt denn zuweilen auch nur eine Bodrückung des Kräftegefühls, so daß sich nichts Andres, als Entkräftung, spüren läßt, unter deren Symptomen der Tod mehrere Monate nach der erlittenen Kopfverletzung eintritt (Nr. 594). In andern Fällen bewirkt das Uebel, bey eben so langsamem Verlaufe, Kopfschmerzen. Zuweilen bleibt mit diesen nach der Verletzung eine entzündliche Diathesis und abnorme Aufregung der Seelenthätigkeit, oder passive Congestion und Stumpfsinn zurück; allmählig in einem nicht bestimm- baren Zeitraume entwickelt sich dann eine Eiterung, die weit um sich greift, und nach mehreren Jahren erfolgt der Tod entweder in stufenweise zunehmender Betäubung, oder in plötzlich eintretender Apoplexie. So starb ein Mann (Nr. 803) elf Jahre nach einer Kopfverletzung, nachdem er in diesem Zeitraume öfters an Erithismus des Gehirns mit gesteigerter Phantasie gelitten hatte; ein Andre (Nr. 469), der als sechsjähriger Knabe auf den Kopf gefallen war und davon eine Vertiefung behalten hatte, war muskeltark und arbeitsam, aber dumm und still, und starb 40 Jahre nach dem Falle apoplektisch. — Ueberhaupt wird die Verschiedenheit der Erscheinungen bey Eiterung des Gehirns vornehmlich durch den Charakter der Krankheit und durch die Zurückhaltung oder Ausleerung des Eiters bestimmt. War die Entzündung chronisch und auf eine kleine Stelle beschränkt, ist die Eiterung allmählig entstanden und nicht weit verbreitet, und ist der Eiter mild und so gelagert, daß er die benachbarten Theile, namentlich die gesunde Hemisphäre wenig drückt, so kann derselbe in bedeutender Masse sich anhäufen, ehe er die Seelenthätigkeit stört. Häufig beobachtet man einen Ausfluß aus Hirngeschwüren durch das cariöse Felsenbein, der Jahre lang anhält und nur zuweilen mit Kopfschmerz vergesellschaftet ist, und nach dessen Hemmung erst Betäubung oder Apoplexie erfolgt.

§. 367. Bey den Verwundungen des Gehirns sind für die Thätigkeit der Seele folgende Momente entscheidend. a) So lange das Gehirn nicht im Ganzen ergriffen wird, leidet die Seele weniger; in seiner Gesamtheit wird es aber afficirt, theils durch die mit der Verwundung verbundene Erschütterung, theils durch die Folgen der Verletzung, Extravasat, Entzündung, Eiterung, seröse Ergießung, Erweichung, Brand. b) Die Störung der Seelenthätigkeit wird ferner bestimmt durch die Art, wie der Zusammenhang der Hirnsubstanz verletzt wird. Einfache Stich- und Schnittwunden stören die Seele weniger und oft erst spät durch die folgende Entzündung und Eiterung. Kürzlich wurde bey Königsberg eine Hengabel einer Magd so gegen den Kopf geschleudert, daß die eine Zinke zwischen dem Augapfel und der obern Augenhöhlenwand durch den vordern Hirnlappen bis in die Seitenhöhle drang; die Verwundete blieb bey Bewußtseyn, zog sich selbst die Zinke aus der Wunde, und ging, da es eben Mittag war, zu Tisch; nach dem Essen kehrte sie zu ihrer Arbeit zurück, mußte sich aber erbrechen und bekam nun nach einer vorübergehenden leichten Betäubung Kopfschmerzen, welche bey übrigens voller Besinnung anhielten, bis nach 4 Wochen Betäubung und der Tod erfolgte, wo denn die

gerichtliche Leichenöffnung Eiter im Gange der Wunde und in der linken Seitenhöhle zeigte. — Quetschungen und Seblwunden bewirken auf der Stelle Betäubung. c) Das Eindringen eines fremden Körpers in die Schädelhöhle stört die Seelenthätigkeit mehr oder weniger, nach Maaßgabe seiner Größe, Schwere, Gestalt und Lage. Unter günstigen Umständen kann er geraume Zeit im Gehirne ruhen, bis er entweder bey zufällig hinzutretender Spömmung, Expansion und Congestion in diesem Organe durch Druck wirkt, oder allmählig, so wie unter Hinzutritt begünstigender Umstände Entzündung und Eiterung erregt und die mit diesen Abnormitäten verbundenen Störungen der Seele herbeiführt. So wirkt die Depression des Schädels bey Kindern bisweilen anfangs gar nicht nachtheilig, und übt erst späterhin bey dem Anwachsen und festeren Gerinnen, und bey der Verknöcherung des Schädels einen schädlichen Druck aus, welcher Blödsinn zur Folge hat (Fabricius p. 142.). d) Es kommt ferner darauf an, ob durch die Verwundung selbst oder durch Eiterung und schwammige Ausartung mehr oder weniger Hirnsubstanz verloren geht. Ein mäßiger Verlust dieser Art, bringt an und für sich keine bemerklichen Störungen hervor, oder nur leichtere Zufälle, Schwindel und Kopfschmerz. Ist dagegen viel Substanz verloren gegangen, so bleibt öfters Schwäche des Verstandes zurück. e) Die Wirkungen sind ferner verschieden nach Maaßgabe der Natur der verletzten Theile. f) Es kommt endlich darauf an, wie weit das Hirnleben entwickelt ist. Ist das Gehirn in seiner höchsten Bedeutung herrschend, die Seele regsam und vielseitig thätig, so ist gewissermaassen zwar die Widerstandskraft, vorzüglich aber auch die Summe der Angriffsponcte vermehrt. Wo das Seelenleben nur in den untersten Sphären wirksam und überhaupt träge ist, da wird es durch Verletzungen des Gehirns weniger gestört. Je stumpfsinniger und träger eine Thiergattung, und je kleiner und unentwickelter ihr Gehirn ist, um so weniger sind psychische Folgen nach Hirnverletzungen bey ihr zu bemerken. Wenn wirklich in einzelnen Fällen Amphibien nach dem Verluste des ganzen Gehirns sich geraume Zeit willkürlich bewegt und in ihre Höhlen sich geflüchtet haben, so bezieht sich diese Erscheinung darauf, daß in der Thierreihe abwärts die centrale Bedeutung und Macht des Gehirns immer mehr abnimmt, und das Rückenmark, vermöge der gleichförmigern Verbreitung des sensibeln Lebens, seine Stelle einigermaassen vertreten kann.

§. 363. Die Atrophie des Gehirns und seiner einzelnen Gebilde verursacht vorzugsweise Blödsinn, demnächst Betäubung und Apoplexie. Die Hypertrophie, welche auf einem Misverhältnisse zwischen Schädel und Gehirn beruht, bewirkt vorzüglich Schmerz, Blödsinn und Betäubung. Verdickung der Hirnhäute kommt theils als Folge von Meningitis bey Manie und Melancholie, namentlich bey wilder Raserey oder Geistesheit zu gewaltsamen Ausbrüchen abnormer Affecte, theils und zwar noch häufiger in Folge passiver Congestion bey Blödsinn und stumpfsinniger Melancholie vor (Beyträge II. S. 187 — 194. 244. fg. 250 — 258.).

§. 369. Erweichung des Gehirns kommt häufig nach Raserey vor, und führt vornehmlich Betäubung herbey. Die Verhärtung hingegen bewirkt, wenn sie weit verbreitet oder allgemein ist, am häufigsten Blödsinn, Stumpfsinnigkeit, Fühllosigkeit, und findet sich öfters bey dumpfem, melancholischem Hinbrüten. Meckel (acad. de Berlin 1764. p. 65. 299.)

wollte bemerken, daß die specifische Schwere der Hirnsubstanz bey dem Blödsinne geringer sey, als im gesunden Zustande und bey Raseyre: ein Würfel Marksubstanz von 6 Linien im Durchmesser wog von gesunden Menschen 64 bis 65 Gran, von Blödsinnigen hingegen bey bedeutender Festigkeit und Elasticität nur 63 Gran.

§. 370. Knötchen an den Hirnhäuten kommen häufig bey anhaltenden Kopfschmerzen, bey Verrücktheit, und besonders bey Blödsinn vor (Beyträge II. S. 165—172. 292—295.) Aftergebilde an der festen Hirnhaut verursachen Schwere des Kopfs, Schmerzen, Schläfrigkeit, endlich Schlafsucht und Betäubung (Beyträge II. S. 58—92.) Aftergebilde der Hirnsubstanz stören bey ihrem allmählichen Entstehen die Seelenthätigkeit oft gar nicht, oder verursachen bloß Kopfschmerz; allmählig bringen sie zum Theil durch Erregung von Entzündung und Erweichung in ihrer Umgehung Schwere des Kopfs, Stampfsinn, Benommenheit, Irrreden oder Blödsinn, zuletzt aber Schlafsucht, Betäubung und Apoplexie hervor.

§. 371. Verknochungen und erdige Concremente an den Häuten (Beyträge II. S. 22—51. 245—249.) und in der Hirnsubstanz erzeugen ausser einem drückenden Kopfschmerze oft eine düstre Stimmung, Schwermuth, Lebensüberdruß und Blödsinn, bisweilen auch Manie. Exostosen an der Schädeldecke bewirken vorzüglich Schwere des Kopfs, Schläfrigkeit und Blödsinn.

§. 372. Nach allen diesen Erfahrungen (§. 352—371.) bewirken die Abnormitäten des Gehirns so unmittelbar und so häufig eine Störung der Seelenthätigkeit, als keine in irgend einem andern Organe: so erfolgte unter den im Anfange gesammelten Beobachtungen materieller Hirnabnormitäten Betäubung oder Apoplexie in 922 Fällen unter 1912, also in dem Verhältnisse von 1 zu 2,07, alle anderweitigen Erscheinungen gestörter Seelenthätigkeit ungerechnet. Da nun ausserdem diese Abnormitäten oft einzig und allein die Seele afficiren, ohne andre Krankheitserscheinungen zu verursachen, so erkennt der schlechte Verstand daraus, daß die Seele von dem Gehirne mehr und unmittelbarer abhängig ist, als von irgend einem andern Organe, und daß das Gehirn die Seelenthätigkeit stärker und unmittelbarer, als irgend eine andre Function, bestimmt, daß es also das Organ derselben ist.

§. 373. Mit diesem Satze stimmt nun die Aussage unsres Gemeingefühls überein: wir haben eine Empfindung im Kopfe, deren Veränderungen dem Wechsel unsrer Seelenzustände entsprechen, welche folglich mit unsrer Seelenthätigkeit in einer wesentlichen und ursächlichen Verknüpfung stehen muß. So schließen wir den Gesetzen der Induction gemäß, und da wir durch eine Empfindung in andern Organen von dem Zustande der Function derselben unterrichtet werden, so schließen wir der Analogie nach, daß jene örtliche Empfindung bey dem Denken auch auf einen Sitz des Denkens hindeutet, oder daß das Gehirn, dessen Zustand wir bey dem Denken empfinden, auch das Organ desselben ist. Dieser Satz ist demnach eben so fest begründet, als irgend ein andrer der Physiologie, und wir lassen uns bey Anerkennung desselben keinesweges, wie Kant (Sömmerring Seelenorgan S. 82.) behauptet, einen Fehler der Subreption zu Schulden kommen. — Das Gemeingefühl von der Function eines Organs ist aber eine Rückstrahlung des Lebens, welche nicht eintreten kann, solange das Leben ungehindert sich ergiebt:

erst wo Hemmungsanpunkte die Strömung des Lebens anhalten und dasselbe auf sich zurückwerfen, werden wir die Functionen inne. Demnach haben wir in ganz normalen Zustände bloß eine Empfindung von der Thätigkeit unserer Muskeln und Sinne, weil dies gerade diejenigen Punkte des Lebens sind, in welchen die Gegensatzung und der Kampf charakteristisch ist; in den übrigen Organen gehen die Functionen vor sich, ohne dem Gemeingefühle sich zu offenbaren. Wie wir bey vollkommener Verdauung nichts von unserem Magen wissen, so fühlen wir auch bey leichtem, freyem Denken unser Gehirn nicht: geht aber das Denken schwer und nur mit Anstrengung von Statten, so fühlen wir das Gehirn als eine schwere Masse. Dieses Gefühl von Schwere des Kopfs tritt ein, wenn eine Anstrengung die Seele ermüdet hat, und gleichwohl fortgesetzt wird; ferner wenn bey Unpäßlichkeit und Krankheit das Hirnleben durch den beschränkenden Einfluß eines andern Organs oder des Blutes gestört wird, und nimmt dann bey Versuchen zu denken zu. Am deutlichsten zeigt sich aber dies Verhältniß, wenn die Hemmung in der psychischen Sphäre selbst liegt. Das aufmerksame Betrachten und lange fortgesetzte Untersuchen mannichfaltiger, aber unter einander zusammenhängender und verwandter Gegenstände hat am Ende bloß Ermüdung zur Folge: aber wenn wir schnell hinter einander eine Menge ganz verschiedener und doch anziehender Gegenstände mit Anstrengung betrachten, wenn wir z. B. eine große Bildergallerie binnen wenigen Stunden in der Anschauung aufzufassen uns bemühen, so entsteht ein Gefühl von Wüstigkeit und wirklicher Schmerz im Kopfe. Wenn wir in stetigem Zusammenhänge den Denkgesetzen gemäß meditiren, so fühlen wir unser Gehirn nicht, wohl aber, wenn der Gang unsrer Gedanken häufig unterbrochen und gewaltsam gehemmt wird: bey einem Gespräche, welches immer abspringt, einschaltet und das Homöteste mit dem Tausendsten vermengt, oder bey'm Lesen oder Hören eines unklaren, unzusammenhängenden, verworrenen Vortrags, bekommen wir eine lästige Empfindung, welche im hintern Theile der Stammganglien des großen Hirns ihren Sitz zu haben scheint, und bey längerer Dauer zu wirklichem Kopfschmerz wird. Es ist eine übliche Empfindung, welche man als ein Stillstehen des Verstandes bezeichnet. Eben so vermischt die angestrenzte Bemühung, etwas Unmögliches zu denken, das Unendliche in einer sinnlichen Vorstellung zu fassen, das Widersinnige als ein Wirkliches scharf anzuschauen, oder auch nur das, was unsere individuellen Kräfte übersteigt, zu verstehen, Schwindel oder ein Gefühl vom Druck und Schwere im Kopfe. Wie es mit dem Geiste ist, so verhält es sich auch mit dem Gemüthe. Das freye Hervortreten des Unwillens im Zorne hinterläßt nur ein Gefühl von Abspannung und Ermüdung; ist aber bey'm Aerger die Thätigkeit des Gemüths gehemmt, und in sich zurückgedrängt, so entsteht Kopfschmerz. Sinnen auf Rath mit Hoffnung des Gelingens erleichtert; Sorgen und Kümern mit dem Gefühle der Erfolglosigkeit macht den Kopf schwer und schmerzhaft. Also die gehemmte und ihr Ziel zu erreichen unermüdete Wirkksamkeit der Seele giebt die damit vorhandne Hirnthätigkeit durch das Gemeingefühl vorzüglich kund, und erst die Vergleichung mit diesem Zustande überzeugt uns, daß, wenn wir bey freythätigem und erfolgreichem Wirken unsrer Seele den Kopf frey, leicht und klar fühlen, dies auf das ungehemmte und normale Vorstättengehen der Hirnthätigkeit hindeutet. Diese Erfahrungen stimmen also mit dem überein, was wir von

dem durch das Gemeingefühl vermittelten Erkennen andrer Functionen wissen, und bestätigen, daß das Gehirn das Organ der Seele, diese aber eine Lebensthätigkeit ist.

§. 374. Da das Gemeingefühl eines Organs nicht bloß bey Ausübung von dessen Functionen, sondern auch bey dem Zusammentreffen desselben mit äussern Einwirkungen, und bey seinen krankhaften Zuständen hervortritt, so haben wir das Gemeingefühl des Gehirns auch noch in diesen beyden Beziehungen zu betrachten. — Was die äussern Einwirkungen betrifft, so zeigt sich das Gehirn gegen dieselben meist unempfindlich. Schon Aristoteles (*de part. anim. lib. II. c. 5. p. 604.*) machte diese Erfahrung; Galen (*de sympt. causis lib. I. c. 8. p. 18. de utilit. resp. p. 69. de virtutibus p. 60.*) bestätigte sie. Fallopiä (*de vuln. capit. c. 8. p. 552.*) berührte und stach das Gehirn häufig, sowohl bey Menschen, die ihr volles Bewußtseyn hatten, als auch bey Thieren, ohne daß Schmerzen erfolgten. Eben so reizte es Lorry (*Mém. présent. III. p. 350.*) mit scharfen und stumpfen Instrumenten, ohne ein Zeichen von Schmerz wahrnehmen zu können. Schmucker (Schriften I. S. 268.) brachte eine Sonde tief in eine eiternde Hirnwunde: das Anstoßen derselben verursachte keine Empfindung. Hirnschwämme (Nr. 1051.) sind in der Regel gegen Berührung und Druck unempfindlich, und werden ohne Schmerzen abgeschnitten. Haller (*elem. IV. p. 312.*) behauptete, wie sein Lehrer Boerhaave, die graue Substanz sey unempfindlich; doch wurde er zu dieser Annahme vorzüglich nur durch die Betrachtung bestimmt, daß der empfindliche Nerve aus derselben Marksubstanz bestehe, wie das Gehirn. Zwar sprechen die von Zinn (Haller disp. VII. p. 447.) an Thieren gemachten Beobachtungen für die Hallersche Behauptung. Allein Arneemann (S. 4.), Metzger (*Ludwig script. neurop. I. p. 125.*) und Andre fanden auch die Marksubstanz empfindungslos, und bemerkten nur den Unterschied, daß die Verletzungen des untern Theils, oder des Kerns schmerzhafter waren, als die an der Oberfläche. So kann auch bey Kopfwunden Marksubstanz ohne allen Schmerz abgeschnitten werden. — Diese Erfahrungen waren den meisten Beobachtern sehr unerwartet. Aristoteles ließ sich dadurch verleiten, dem Gehirne alle Gemeinschaft mit der Wahrnehmung abzusprechen, und mehrere Andre (siehe Haller *elem. IV. p. 306.* und Sprengels Geschichte V. S. 191. fgg.) glaubten, dabey die Empfindlichkeit der Nerven nicht anders erklären zu können, als durch die Annahme, daß die Hirnhäute der Sitz der Empfindung seyen. Andre, welche das Gehirn als das Seelenorgan anerkennen, suchten jene Thatsachen anders zu erklären. Galen meynte, es sey unempfindlich, aber es empfinde das, was empfindet (es nehme die Thätigkeiten der Sinnesorgane wahr); es sey kein besondres, sondern ein allgemeines Empfindungsorgan. Varoli (p. 6.) leitete seine Unempfindlichkeit davon her, daß es nicht selbst von äussern Gegenständen berührt werde, sondern die Eindrücke derselben auf die Sinne innerlich wahrnehme; Piccolomini (*lib. F. lect. 6. p. 271.*) davon, daß es kein Tastorgan habe, dergleichen die Haut ist; und Thomas Bartholin (*lib. III. c. 3. p. 321.*) von seinem Mangel an leitenden Nerven; Dulaurens (*lib. X. c. 9. p. 566.*) lehrte, es empfinde bloß energetisch, nicht pathetisch: es bringe die sinnlichen Eindrücke zur Anschauung, werde aber nicht selbst von ihnen afficirt. Indes könnten diese zum Theil scharfsinnigen Erklärungen nicht genügen, weil wir theils dem Gehirne keine absolute Unempfindlichkeit gegen äussere Einwirkungen beylegen können, theils eine ähnliche be-

dingte Empfindlichkeit auch an andern Organen wahrnehmen. Wir müssen also den Grund in einem andern Verhältnisse suchen. — Alle Empfindung beruht auf dem Gegensatz eines innern Lebens und eines äussern Daseyns: wo Eins oder das Andre überwiegend ist, tritt das Gemeingefühl zurück, und dieses ist nur da reger, wo jene Factoren in einer gewissen Spannung sich befinden. Auf der niedrigsten Lebensstufe erlischt dieser Gegensatz, indem das äussere Seyn überwiegend ist: Bänder, Flechten, Knorpel, Knochen sind im Normalzustande fühllos. Eine regere, aber einseitige und dem Seyn vorzüglich noch zugewendete Lebensthätigkeit findet sich gepaart mit stumpfer Empfindlichkeit in dem Gefäßsysteme; in den Ausbreitungen seiner peripherischen Enden zu absondernden und umwandelnden Eingeweiden tritt mehr Mannichfaltigkeit der Gliederung und etwas regeres Gemeingefühl hervor. Dies erreicht seine Höhe in den Vermittlungsorganen des Innern und Aeussern, in den willkürlichen Muskeln, und noch mehr in der Haut und den übrigen Sinnesorganen, wo der Nerve in lebendigem Gegensatz zu Muskelfasern, Gefäßen und plastischen Gebilden steht. Dagegen sinkt das Gemeingefühl wieder in den Centralorganen, wo die höchste Lebendigkeit durch entschiedenes Übergewicht von Sensibilität oder Irritabilität sich ausspricht: im Herzen, wo die Muskelthätigkeit in ihrer ganzen Macht erscheint und alle Kraft nach aussen gewendet ist; und im Gehirn, wo die Nervensubstanz allein herrschend erscheint und das innere Leben seinen Gipfel erreicht. Der Mantel ist fühlloser, als der Kern, weil der Gegensatz zu dem Aeussern in ihm geringer ist; im Hirnstamme ist mehr Gegensetzung, vermöge seiner Nerven, so wie vermöge seiner innigen Verwebung grauer und markiger Schichten. Das Gehirn wird aber empfindlich, sobald durch Congestion und Entzündung eine höhere Spannung gegen das Aeussern in ihm gesetzt wird: dann erregt der Knochen splitter oder jeder andre fremde Körper heftige Schmerzen, welche wieder aussetzen, sobald der Andrang des Blutes sich legt und das reine Hirnlehen wieder die Allenherrschaft gewinnt. Schwämme der festen Hirnhaut, die vorher unempfindlich gewesen waren, werden späterhin schmerzhaft (Nr. 893), oder sind gleich bey ihrem Erscheinen so empfindlich, daß eine leise Berührung heftige Schmerzen verursacht (Nr. 888). Der Hirnschwamm ist zuweilen empfindlich, so daß Druck und Unterbindung (Nr. 1045), oder auch das Abschneiden (Nr. 1056) Schmerzen erregt; sonst kann man eine Sonde ohne Schmerz tief in ihn einstoßen, wenn aber Regenerationswürmchen sich ansetzen, so ist die Berührung der Sonde sogleich schmerzhaft (Nr. 1049). Bey einem Hirnbruche verursacht das Herabhängen der Geschwulst (Nr. 293), oder das Ansehen der Ligatur (Nr. 288), oder ein anderweitiger Druck und selbst die bloße Berührung (Nr. 289, 293, 294, 299, 358) häufig Schmerzen. Beym Einstoßen des Trepan in das Gehirn schrie ein Verwundeter auf, hatte aber nach dem Herausziehen des Instruments keine Schmerzen mehr.

§. 375. Bey organischen Abnormalitäten des Gehirns, entsteht Kopfschmerz und mit ihm Schwierigkeit und Unvollkommenheit des Denkens. Nach der unten gegebenen III. Tabelle verhielt sich die Zahl der Fälle, wo bey Hirnabnormalitäten Kopfschmerz Statt fand, zur Gesamtzahl der Fälle von Hirnabnormalitäten wie 1: 3, 09, und zwar, wo dynamische Veranlassungen vorhanden waren, wie 1: 2, 84, bey äussern Gewaltthätigkeiten aber wie 1: 4, 02. Am häufigsten war der Kopfschmerz bey entzündlichen und mit Congestionen

verbundenen Zuständen als Brand, Caries, Eiterung, Verwachsung, Concrementen, Atergebilden und seröser Ergießung; weniger häufig bey Erweichung, Hydatiden, Bluter gießung, Atrophie und Hypertrophie; noch seltner bey Höhlungen und einfachen Wunden. Bey Verhärtungen kam er gar nicht vor, so dafs es scheint, als würde die Empfindlichkeit des Gehirns durch die normale Weichheit desselben bedingt. — Die häufigste Ursache der idiopathischen Kopfschmerzen ist eine Congestion nach dem Gehirne, wie man denn nach langer Dauer derselben die Gefäße oft abnorm erweitert und die ihnen entsprechenden Gruben der innern Schädelfläche abnorm vertieft findet. Diese Congestionen können durch verschiedene Umstände veranlaßt werden, auch durch mechanische Verhältnisse, z. B. durch eine Zusammendrückung und Verengerung der Bauchaocta. (Morgagni L. 17.). — Die Entzündung der festen Hirnhaut erregt erst in ihrem zweyten Zeitraume Schmerzen, welche sich allmählig ausbreiten und spannenden Art sind, als wäre das Gehirn von einem Stricke zusammengesehnürt oder zwischen zwey Bretter gespannt u. s. w. Bey der Entzündung der Gefäße hülle erscheint der Kopfschmerz gleich anfangs, zeigt sich zum Theil schon als Vorläufer der Krankheit, tritt plötzlich ein, wird sehr heftig und anhaltend, stechend oder drückend, steigt, wenn das Uebel chronisch wird, zuweilen bis zum Rasendwerden, und hört bey der acuten Form nur auf, wenn Betäubung eintritt; dafs er vorzüglich vom dem mitleidenden Gehirne ausgeht, scheint daraus zu erhellen, dafs er nicht immer in der Gegend, wo die Spinnewebenhaut entzündet ist, seinen Sitz hat (Parent p. 105). Er ist ferner oft der erste Verkündiger, und der anhaltende Begleiter der eigentlichen Encephalitis, äussert sich besonders durch Schwere, seltner durch Stechen, Bohren, Reissen, Drücken, hat in der Tiefe des Gehirns seinen Sitz und besondere Heftigkeit, wenn die Kernorgane entzündet sind, weicht nur der Betäubung, und kussert sich zuweilen selbst während derselben noch durch ein bewußtloses Greifen nach dem Kopfe (Lallemand I. p. 231). Ein drückender, stumpfer Kopfschmerz entsteht bey Extravasaten, so lange noch Bewußtseyn Statt findet, geht der Apoplexie voran, und bleibt nach Erschütterung des Gehirns zurück. Er begleitet die Verwachsungen, Verknochnerungen und andre Aferorganisationen der Hirnhäute. Bey Afergebilden im Gehirne tritt er zuweilen nur periodisch ein, nimmt besonders bey Bewegungen zu, und hat seinen Sitz entweder an der leidenden Stelle, oder auch in einer andern Gegend (Nasse zu Abercrombie S. 26); die durch das Afergebilde erregte Spannung, Congestion und Entzündung scheint sein nächster Grund zu seyn. Bey Seelenkrankheiten findet er besonders im Anfange Statt; auf der Höhe derselben kist er nach, indem das Gehirn sein Gemeingefühl verliert; ungeachtet der Kopf brennend heiß ist, und offenbar eine starke Congestion fort dauert. — Wie er dagegen sich artet, wenn er von organischer Abnormität bey sich behauptender Seelenkraft, bey Kenntniß des Hirnbäues und lebendiger Phantasie herrührt, zeigt das Beispiel des Dr. Dehoffer (Nr. 803), bey welchem nach Erschütterung mit freyen Zwischenräumen während 18 Jahren ein chronisch entzündlicher Zustand, und endlich in der linken Hälfte des Gehirns eine große Vereiterung im Mantel, brandige Auflösung des Schädels, Zerreißen der Scheidewand und Consumption des Gewölbes und Ammonshorns Statt fand. Er hatte bey dem Falle auf die linke Seite des Hinterkopfs das Gefühl einer von hinten und links nach vorne und rechts sich

verbreitenden Erschütterung, und darauf, wiewohl minder deutlich, eines Zurückweichens, und endlich eines Austrahlens des Stosses durch sämtliche Hirnorgane, mit stechendem Schmerze auf der Grundfläche des Schädels und über der Augenhöhle. Als er sich nach zwey Stunden von der darauf erfolgten Betäubung erholt hatte, fühlte er einen dumpfen Schmerz am Boden der Schädelhöhle, im kleinen Hirne, in den Schenkeln des großen Hirns, dem Türkensattel und den Schuervcn. Er wurde wieder geistig thätig, schlief aber lange und tief. Am fünften Tage hatte er mehr Kopfschmerz, und das Gefühl einer Art wurmförmiger Bewegung des Gehirns, und ein Andres, als ob unzählige feine Nadeln in der Richtung von der linken Seite des Hinterhauptsbeins bis zur rechten Seite des Stirnbeins in das Gehirn gedrückt würden, darauf bey eintretender Entzündung des Pericraniums am Scheitel das Gefühl einer bey dem Einathmen vom schmerzhaftesten Punkte des Scheitels aus gegen die Stirn; und bey dem Ausathmen zurückfließenden Feuchtigkeit. Als diese Empfindung in der fünften Woche sich verlor, fühlte er die Diastole und Systole des Gehirns deutlich, und bey Anhalten des Athems einen Druck des Gehirns gegen den Schädel, als ob dieser zu eng wäre. War der Horizont in leichten Nebel gehüllt, so stieg der gewöhnliche Schmerz im Scheitel zu einer Empfindung, als ob ein gegen den Balken zugespitzter Keil zwischen beyden Hemisphären eingetrieben würde. Zelt und Siebel spannten sich gegen einander, wodurch der Keil bald verlängert, bald verkürzt wurde; dabey war unter dem Scheitel ein Gefühl, wie von Bewegungen des Rauschgolddes, oder wie vom Durcheinanderschieben der Kartenblätter, oder vom Schließen einer Windkloppe. Phantastische Träume gesellten sich zur Schlaflosigkeit, und ein Alp drückte im Nacken, stieg wie Windes Brausen auf, und verbreitete sich über den Kopf. Ausserdem waren die Empfindungen im Gehirne bald wie das Winden von Schlangen, bald wie das Laufen von Millionen Ameisen, bald wie das Kriechen vieler, dünner, durch einander verschlungener Regenwürmer. Bewegung des Kopfes verursachte Schwindel und bey Geistesbeschäftigung entstand Schmerz auf dem Boden der Schädelhöhle und Schlaflosigkeit. Als sich der Zustand nach zwey Monaten besserte, machte das Gehen und Fahren das Gefühl eines Schwankens im großen Hirne von hinten nach vorne, und eines Reibens am Schädel; bey geschwindem Gehen und Aufwärtssteigen trat eine Empfindung von Ueberfüllung sämtlicher Hirnorgane mit starkem Klopfen der Arterien und Zunahme der Kopfschmerzen ein. Späterhin änderte sich der Schmerz unter dem Scheitel so, daß der Keil ein breites, scharfes, mit unzähligen in beyde Hemisphären dringenden Stacheln besetztes Messer war. Als nach dem Gebrauche von Tropfbädern die Schmerzen und Hirnbewegungen sich minderten, stellte sich bey nebliger Witterung die Empfindung ein, als ob große, kalte Marmorkugeln nach allen Richtungen in der Substanz beyder Hemisphären sich bewegten, dann auch ein Geräusch unter dem linken Schläfenbeine, wie vom Verpuffen des Salpeters, oder vom Knistern des Kochsalzes, oder von elektrischem Funkenziehen. — Bey Bluterziefungen entsteht bisweilen eine Empfindung, als ob der Schädel zu eng wäre und bersten wollte (Nr. 226), oder als ob Wasser auf und ab flüßte (Nr. 280); bey Erweichung, als ob das Gehirn von Nadeln gestochen und etwas im Kopfe wäre, das den ganzen Schädel sprengen wollte (Nr. 802); bey der Entstehung einer Hydatide, als ob etwas im Kopfe zerrissen wäre (Nr. 1063); bey Aftergebilden, als ob ein

Kugel von einer Seite zur andern rollte (Nr. 950), oder eine Menge Flüssigkeit von hinten nach vorne stürzte (Nr. 951); bey chronischer Hirnwassersucht fühlte ein Kranker, (Nr. 389), wenn er sich niederlegte, eine prickelnde Wärme längs des Sielblatleiters; ein Anderer (Nr. 590) hatte, wenn er sich stark bewegte, ein Gefühl von Fluctuation, wie von warmem Wasser, u. s. w. Häufig entspricht der Sitz und auch der Umfang (Nr. 515) des Schmerzes genau dem Sitze und Umfange der Abnormität. — Uebrigens kann der Kopfschmerz, da die Empfindung auf dem Gegensatze innern und äussern Lebens beruht, nur bey bestehendem Bewusstseyn Statt finden: er verliert sich in dem Maasse, als dieses abnimmt, in den spätern Zeiträumen der Meningitis, und fehlt so auch bey ausgebildeten Seelenkrankheiten (Georges Verrücktheit S. 63. fg.); er tritt ein, wenn eine Betäubung z. B. durch Hinwegnahme von Knochensplittern und zerstörter Hirnsubstanz (Nr. 77) gehoben wird, und sein Aufhören bey dem Drucke auf einen Schwamm der festen Hirnhaut (Nr. 893, 909), oder bey Zurückbringung desselben in die Schädelhöhle (Nr. 910) ist nichts, als das Beginnen einer Betäubung, welche unmittelbar darauf sich völlig entwickelt.

§ 376 Der Schwindel ist eine Aeusserung des Gemeingefühls, welche dem Gehirne so eigenthümlich ist, wie dem Magen die Uebelkeit, den Lungen die Beklemmung, der Haut der Schauder. Er entsteht durch Wirkung der Phantasie bey'm Herabsehen in die Tiefe, so wie bey'm Denken eines nicht zu fassenden Gegenstandes; durch das Anschauen schnell und in ungewöhnlicher Richtung vorüberziehender Gegenstände, namentlich bey drehender Bewegung; durch Schwächung der Seelenthätigkeit, bey dem Rausche, bey der Wirkung narkotischer Mittel, nach Hirnerschütterung, bey allgemeiner Nervenschwäche und vor der Apoplexie; durch zu starken Andrang des Bluts nach dem Gehirne, bey Entzündung der Hirnhäute, bey Hirnwassersucht, oder auch bey Vollblütigkeit, namentlich bey vorwärtsgeho-genem Kopfe, oder durch Blutmangel im Gehirne, bey Compression der Carotiden; durch verschiedenartigen Einfluß plastischer Abnormitäten bey Unterleibskrankheiten; durch plötzliches Schwinden der Lebensthätigkeit bey eintretender Ohnmacht und plötzlichem Sterben. Der gemeinsame Grund bey diesen verschiedenen Veranlassungen scheint darin zu bestehen, daß die Seelenthätigkeit ihre Haltung verliert und so das Gefühl eines allgemeinen Wankens, eines bodenlosen Sinkens, eines unaufhörlichen Kreisens entsteht. Ob dabey nicht auch die Strömungen im Gehirne, das ist, die Beziehungen der verschiedenen Hirnorgane gegen einander gestört sind, wollen wir dahingestellt seyn lassen. — Nach der unten (Tabelle V) geklärten Zusammenstellung kam auf 55 Fälle von Abnormitäten des Gehirns einer mit Schwindel. Am häufigsten trat er ein bey Ergießung von Blut oder Serum, bey Caries und Depression des Schädels, Verwachsung der Hirnhäute, Eiterung und fremden Körpern im Gehirne; seltner bey Erweichung, Atrophie und Atergebilden; bey Verhärtung des Gehirns wurde er gar nicht beobachtet. Zuweilen hörte er sogleich auf, wenn Eiter (Nr. 481), oder Blut (Nr. 279) aus der Schädelhöhle geschafft wurde; zuweilen entstand er bey einer leichten Berührung der festen Hirnhaut (Nr. 654), oder bey einem Drucke auf einen Schwamm derselben (Brown in Repertorium II. S. 105).

§ 377. Zuweilen tritt bey Hirnkrankheiten eine eigenthümliche Art von Schlaflosigkeit ein, nämlich ohne Schmerz und ohne sonstige Aufregung. Bey idiopathischer

Höhlenwassersucht kommt dieser Zufall am häufigsten vor: die Kranken werden nie schläfrig (Nr. 375), schlafen wenig, leise, aber ruhig und ohne Träume (Nr. 380, 389, 390, 844). Auch bey symptomatischer Wasservergiefung in den Höhlen (Nr. 466, 543, 706, 974), bey Verdickung der Spinnwehenhaut (Nr. 707), bey Erweichung (Nr. 756) und Aftergebilden (Nr. 976, 997, 1073) findet in manchen Fällen Schlaflosigkeit Statt. Bey einigen dieser Kranken (Nr. 290) waren die Geisteskräfte ungeschwächt; Andre (Nr. 707, 844, 1073) waren blödsinnig, oder (Nr. 466.) betäubt. — Ausserdem erfolgt Schlaflosigkeit im ersten und zweyten Zeitraume der Meningitis mit Aufregung, und bey dem Eintritte der Ergiefung eiterförmigen Stoffes an der festen Hirnhaut. In der Enccephalitis ist der Schlaf unruhig und ohne Erquickung; die Kranken sind schläfrig, ohne in wahren Schlaf kommen zu können. Die Schläfrigkeit ist auch ein gewöhnliches Symptom der hydrocephalischen Meningitis und der Eiterung des Gehirns. Auch tritt der Schlaf, als ein niedriger Grad der Betäubung bey äusserem Drucke, ein; ein Kranker (Nr. 70) wurde, wenn der Wundarzt den Finger in die Hirnwunde brachte, schläfrig, ohne das Bewusstseyn zu verlieren; ein Kind brachte, nachdem ein Hirnbruch (Nr. 288) unterbunden worden war, die meiste Zeit schlafend zu; und der Druck auf einen Hirschschwamm (Nr. 1053) machte sogleich Schlaf. Die Schlafsucht gränzt an Betäubung; und läßt sich von dieser nicht immer unterscheiden, weshalb ich sie auch (§. 660, 661. und X. Tabelle) mit zu dieser gerechnet habe.

§. 378. Nach der VII. Tabelle verliert sich die Zahl der Fälle von Hirnabnormität mit Delirium zur Gesamtzahl wie 1: 6,05. Am häufigsten kam es vor bey den entzündlichen Zuständen: bey Eiterung (= 1: 3,87.), Sugillation (= 1: 4.), Brand (= 1: 5.), Verwachsung (= 1: 5, 25.), Hypertrophie (= 1: 5, 62.), seröser Ergiefung (= 1: 5, 91.), Erweichung (= 1: 5, 94.), und fremden Körpern (= 1: 6, 08.); seltner bey Aftergebilden (= 1: 7, 21.), Hydatiden (= 1: 10, 20.), Blutergiefung (= 1: 10, 50.), Erschütterung (= 1: 11.), Verhärtung (= 1: 11, 12.), Concrementen (= 1: 11, 75.), Depression (= 1: 12, 33.), und einfachen Wunden (= 1: 13, 25.); am seltensten (= 1: 26.) bey Atrophie und Höhlungen. Durch die Betäubung wird das Delirium unterdrückt, und es bricht aus, wenn sie gehoben wird, z. B. durch Entfernung von Knochensplittern und zerstörter Hirnsubstanz (Nr. 77.). Es tritt zuweilen von einer mechanischen Reizung der Wunde ein: ein Betäubter (Nr. 4) stiefs bey dem leisesten Drucke auf die geschwollenen Wandränder ein heftiges Geschrey und fürchterliche Flüche aus, und fiel dann wieder in Betäubung; ein Andre (Nr. 541.) fing an zu deliriren, als ihm ein Balsam in das Hirngeschwür gespritzt wurde. Das Delirium hörte auf, als eine Flintenkuugel (Nr. 71, 89.), Blut (Nr. 279.), Eiter (Nr. 553.) aus der Schädelhöhle entfernt, oder eine deprimirte Stelle des Schädels (Nr. 116, 120, 122.) gehoben wurde. — Die Phantasie schafft sich Bilder, welche dem Gehirnzustande entsprechen: ein Mann, bey welchem ich nach dem Tode eine auf einem langen Stiele sitzende und hin und her rollende Hydatide in den Seitenhöhlen fand, delirirte, mit auf den Kopf gelegter Hand, von einem Feldhern, der mit seinem Heere auf und abzog; einen geistreichen Mann hörte ich im Typhus bey der Heftigkeit des Fiebers von einem auführerischen, tobenden, gegen die heilige Veste ansturmenden Pöbel, und bey herannahendem Tode von einer Zer-

theilung der Wolken, von dem Erscheinen himmlischer Gestalten in Frieden und Klarheit, deliriren. Das Delirium im Typhus von einer doppelten Persönlichkeit, von einem Kranken, der neben uns im Bette liegt, uns beschwerlich fällt, für den wir Arzney nehmen müssen u. s. w., deutet auf die innere Spaltung und Zerfahrenheit des Lebens, auf die sich eindringende fremdartige Gewalt; und die nach heftigen Fiebern oft eintretenden, zuweilen mit sanfter Begeisterung verbundenen Visionen bezeichnen die mit dem beginnenden Absterben des Leibes wieder zu ihrer Freyheit gelangte und dadurch gesteigerte Hirnthätigkeit.

§. 379. Die Frequenz der Verrücktheit und Manie verhielt sich bey Hirnabnormitäten, laut der IX. Tabelle, wie 1: 20, 12. Am stärksten war sie bey Verhärtung (= 1: 5, 56.), Höhlungen (= 1: 6, 50.), Hypertrophie (= 1: 7, 50.), Concrementen (= 1: 7, 66.), Hydatiden (= 1: 8, 50.), Verwachsung (= 1: 10, 50.), Erweichung (= 1: 13, 17.); geringer war sie bey den stärker hervortretenden und in die Augen fallenden Abnormitäten, bey der serösen Ergießung (= 1: 17, 37.), bey Aftergebilden (= 1: 24.), Atrophie (= 1: 39.) und bey Blutergießung (= 1: 84.). Bey Eiterung und bey den durch mechanische Gewalt verursachten Abnormitäten wurde sie nicht beobachtet.

§. 380. Größer war die Frequenz der Geisteschwäche und des Blödsinns, nämlich wie 1 zu 9, 56. Am allzuhäufigsten war der Blödsinn bey Verhärtung (= 1: 2, 47.); häufig bey Hypertrophie (= 1: 4, 09.), Atrophie (= 1: 4, 88.), Concrementen (= 1: 5, 11.), Erschütterung (= 1: 5, 50.), also bey vorzüglich passiven Zuständen des Gehirns. Die Frequenz nahm ab bey Höhlungen (= 1: 6, 50.), Sugillation (= 1: 8.), Aftergebilden (= 1: 9, 81.); zeräuser Ergießung (= 1: 9, 92.). Noch seltner wurde der Blödsinn bey einem mit mehr: Erethismus verbundenen Zustande, bey Erweichung (= 1: 10, 10.), Verwachsung und Beinfrost (= 1: 14.), Hydatiden (= 1: 17.), Wunden (= 1: 17, 66.), Depression (= 1: 18, 50.), Eiterung (= 1: 25.), Blutergießung (= 1: 25, 20.), und fremden Körpern (= 1: 36, 50.).

§. 381. Das Gedächtniß wird in einzelnen Fällen während des ersten Zeitraums der durch mechanische Gewalt veranlaßten Meningitis sehr regé und lebhaft. Häufiger ist die Vergesslichkeit, die sich im Anfange der Encephalitis zeigt, und die Schwäche des Gedächtnisses auch für frühere Eindrücke, welche bey der Eiterung des Gehirns einzutreten pflegt. Nach der XIV. Tabelle war allemal unter 52 Fällen von Hirnabnormität einer mit Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses. Am häufigsten (= 1: 5, 50.) war dieser Verlust die Folge einer Erschütterung: viele Kranke (Nr. 3. 33. 50. 56. 553. 598. 1054.) wissen, wenn sie von ihrer Betäubung erwachen, nichts von dem Unfalle, welcher sie betroffen hat, auch nichts von den Umständen, welche unmittelbar vorhergegangen waren und eben den Unfall veranlaßt hatten. Demnächst ist die seröse Ergießung (= 1: 18.), die Atrophie und Höhlung (= 1: 26.), die Eiterung (= 1: 34.), die Blutergießung (= 1: 36.), die Depression und Erweichung (= 1: 37.) dem Gedächtnisse feindlich. Seltner wird die Gedächtnißschwäche bey Verwachsung (= 1: 42.), Verhärtung (= 1: 44.), Hypertrophie (= 1: 45.), Concrementen (= 1: 46.), Hydatiden (= 1: 51.), und Aftergebilden (= 1: 54.). Ein geringerer Grad von Gedächtnis-

schwäche äussert sich darin, daß man sich auf die Eigennamen nicht besinnen kann (Nr. 31.); bey einem höhern Grade hat der Kranke auch die Substantiva vergessen, so daß ihm bloß noch die Ausdrücke für die allgemeineren Begriffe der Handlungen und Verhältnisse zu Gebote stehen. Die Kranken müssen bey übrigen vollem Gebrauche des Verstandes in der Rede oft inne halten, weil sie das nöthige Wort nicht finden können (Nr. 436.), oder gebrauchen die Worte ganz verkehrt und in einer ihnen gar nicht zukommenden Bedeutung (Nr. 510-1023.); oder können sich überhaupt nicht ausdrücken (Nr. 687.). Einige sollten nach Kopfverletzungen bloß das Lesen und Schreiben verlernt haben (Mayer Gehirn S. 40.). Auch bey dynamisch veranlaßten Hirnabnormitäten schwindet zuweilen das Gedächtniß so ganz, daß die Kranken von ihrem frühern Leben und Schicksalen nichts mehr wissen (Nr. 1158.), und wenn sie sich bessern, von Neuem sprechen und ihren, so wie der übrigen Namen wieder kennen lernen müssen (Nr. 800.). Eine Schwäche des Gedächtnisses, welche nicht bloß auf das Speciellé, sondern auch auf das Allgemeineré, nicht bloß auf Bezeichnungen, sondern auch auf Thatsachen, nicht bloß auf Wahrgenommenes, sondern auch auf Begriffenes sich bezieht, geht bey einiger Dauer in Verstandesschwäche und Blödsinn über.

§. 382. Nicht selten hat die Abnormität des Gehirns eine besondere Affection des Gefühls zur Folge. Im ersten Zeitraume der durch Wunden und Perimeningitis veranlaßten Meningitis sind die Kranken zuweilen ungewöhnlich munter und ausgelassen lustig. Nach Kopfverletzungen pflegt eine besondere Unruhe vorzüglich um den 7ten; seltner um den 11ten bis 14ten, noch seltner um den 3ten Tag einzutreten; sie begleitet vorzüglich auch den Eintritt der Eiterergießung an der festen Hirnhaut. Im ersten Zeitraume hydrocephalischer Meningitis fahren die Kinder mit lautem Geschrey oft plötzlich auf, und sind übrigens verdrüsslich, unzufrieden, niedergeschlagen, müthlos. Bey der Encephalitis zeigt sich im Anfange öfters eine fremdartige Heftigkeit und mürrisches Wesen, oder Niedergeschlagenheit und Aengstlichkeit, oder Indolenz und Gleichgültigkeit. Bey der Eiterergießung werden die Kranken gewöhnlich düster, fühllos, stumpfsinnig und still. Die chronischen Zustände der Wasserergießung, der Concremente, der Hypertrophie, der Exostosen bewirken die Niedergeschlagenheit am häufigsten. Hill (p. 137.) bemerkte, daß, wenn man zu Verhütung eines Hirnschwamms einen anhaltenden Druck auf das Gehirn anwendete, der Kranke sehr niedergeschlagen wurde, und Kölpin (p. 62.) beobachtete, daß nach Hebung einer Depression des Schädels die frühere Munterkeit nicht zurückkehrte, ungeachtet die Verstandeskkräfte nicht gelitten hatten. Man hat Fälle beobachtet (Nr. 4.), wo der Kranke nach einer Kopfverletzung so empfindlich wurde, daß er bey dem geringsten Widerspruche am ganzen Leibe zitterte. Zinn (Haller disp. VII. p. 465.) bemerkte, so wie früher schon Kaew, daß alle Hunde bey Hirnverletzungen furchtsam und traurig werden, und daß selbst die bösesten dann nicht mehr beißen.

§. 383. Eine Veränderung der Neigungen und des Willens durch Hirnabnormitäten ist selten beobachtet worden. — Nach einer Apoplexie, von welcher Höhlungen zurückbleiben (Nr. 195.), nahm eine Person eine fädeliche Lebensweise an; und ein Mensch bekam nach einer durch eine Wunde veranlaßten Eiterung im Gehirn (Nr. 519.) eine ihm früher ganz fremd gewesene Neigung zum Stehlen, welche der gerichtliche Arzt für Folge der Kopfverletzung erklärte. — Häufiger und zuverlässiger ist es, daß der Hirn-

krankte Handlungen, die den Schein der Willkür haben, ohne seinen Willen vollbringt. Wie der Druck auf eine Kopfwunde bisweilen Zuckungen erregt, so kann er auch normale und willkürlich scheinende Bewegungen hervorbringen: so fing z. B. ein solcher Kranker (Nr. 34.) dann an, einige Worte zu buchstabiren, wiewohl er völlig betäubt war. Bey einer Blutergießung (Nr. 196.) mangelte der Kranke verschiedene Sprachen unter einander und sagte Gebete her, bis er betäubt wurde; bey einem Aftergebilde (Nr. 1002.) zeigte sich ein unwiderstehlicher Trieb herumzulaufen. Wenn das Gehirn von einem erlittenen Drucke befreyt wird, so kehrt bisweilen die Bewegungskraft früher zurück, als das Bewußtseyn: als am zweyten Tage nach einer Verwundung (Nr. 336.) das Extravasat hinweggenommen wurde, fing der betäubte Kranke wieder an sich zu bewegen, und versuchte aufzustehen und zu reden, ohne zu wissen, was er that und sprach; ein Andrei (Nr. 5.) bekam nach einem Aderlasse die Sprache wieder, redete aber ohne Sinn, sagte gedankenlos die auswendig geklärten Gebete her, und vermochte nicht, die Fragen, die man an ihn richtete, zu beantworten. Am deutlichsten zeigt sich aber der Zwang, welchen die Hirnabnormität auf den Willen ausübt; wenn dabey das Bewußtseyn ungestört ist. Ein Kranker mit einem Aftergebilde im Gehirne (Nr. 98.) zählte bey vollem Verstande und wider Willen von 1 bis 100; er wollte es unterlassen, fing aber immer wieder von Neuem an. Bey einer Depression des Schädels über dem linken Hinterlappen sagte der Kranke andre Worte, als er wollte, und konnte, ungeachtet er sich dieses Fehlers bewußt war, ihn doch nicht verbessern; als die Depression gehoben wurde, hatte er seine Freyheit wieder (Home in Meckels Archiv III. S. 114.). De Fouchy (*an. de Paris* 1784. p. 399.) bekam nach einem Falle auf die Nase und den innern Augenwinkel einen lebhaften Schmerz, und als dieser am folgenden Tage plötzlich sich verstärkte, konnte er die Worte, welche er sich dachte, und die er selbst sprechen hörte, nicht aussprechen, sondern mußte dafür andre Worte sagen. Ein Kranker, welchen ich jetzt beobachte, und bey welchem ich eine Abnormität im kleinen Hirne vermuthete, beklagt sich nicht allein über die ihm fremdartigen Gedanken, welche sich ihm öfters aufdringen, sondern bemerkt auch, daß er zuweilen etwas sagen will, was er weder sagen will, noch was mit seiner Meynung übereinstimmt.

2. Einwirkung der Seele auf das Gehirn.

§. 384. Wir wissen, daß die Uebung jeder Kraft im Leben auf das materielle Daseyn, an welches sie geknüpft ist, zurück wirkt, und daß das Vorratstgehen einer Function die lebliche Beschaffenheit ihres Organs bestimmt. Wenn wir nun finden, daß die Lebendigkeit der Seele auf den Bildungshergang im Gehirn einen bedeutenden Einfluß ausübt (§. 385—389.), so wird dadurch nur bestätigt, daß Gehirn und Seelenenthätigkeit sich zu einander verhalten, wie Organ und Function.

§. 385. Bey jeder lebhaften und anhaltenden Geistesanstrengung zieht das Gehirn mehr Blut an sich, so wie die erhöhte Lebendigkeit jedes andern Organs auch einen vermehrten Zufluß von Blut zu demselben zur Folge hat; der Kopf wird roth und heiß, es entsteht ein Gefühl von Völle und namentlich bey dem Nachdenken über schwierige Gegenstände oder bey Kränklichkeit und Ermattung ein Gefühl, als ob der Schädel,

zu eng wäre für das Gehirn und bersten wollte, mit zurückbleibendem Kopfschmerz. Bricheteau (*Journ. compl. IV. p. 17.*) erwähnt einen Menschen, der bey Geistesarbeiten ein Klopfen der Carotiden und Anschwellung der Halsvenen bekam. Daß die Carotiden ihre Pulsation bey der Asphyxie später verlieren und bey dem Erwachen aus derselben früher wieder erhalten, als andre Arterien (Parry S. 124.), kann zum Theil auf dieser Anziehungskraft des Gehirns beruhen.

§. 386. Mangel an Uebung der Seele vermindert die Kraft derselben, und zwar wie es scheint, auch durch Beschränkung des plastischen Lebens im Gehirn. Zweilen schwindet das Gehirn in Folge des Blödsinns, indem der Schädel dabey entweder dicker wird, und nach innen wuchernd die durch Einsinken des Gehirns entstandene Lücke ausfüllt, oder selbst in seiner Bildung nach aussen nachläßt, so daß der ganze Kopf kleiner wird. Wegen eines fest sitzenden Kopfschmerzes wurde im Königsberger chirurgischen Klinikum ein Blödsinniger trepanirt, der körperlich ganz gesund, auch durch die Operation nicht im Mindesten angegriffen wurde, und dabey weder Furcht noch Schmerz äusserte: ungeschadet der Herzschlag normal war, konnte ich schlechterdings keine Hirnbewegung sehen, noch fühlen, und ein starker Druck des Fingers auf die feste Hirnhaut verursachte weder eine Empfindung, noch irgend eine andre Veränderung. Es war hier offenbar ein rein örtlicher Mangel an Turgescenz und Blutvölle im Gehirn.

§. 387. Die Gemüthsbewegungen verursachen neben dem allgemeinen Orgasmus im Blute vorzüglich einen verstärkten Andrang desselben nach dem Kopfe. Wo sie überwältigend wirken, vernichten sie das Leben häufiger durch Apoplexie, oder durch Erstickung des Gehirns im Blute, als durch Stillstand des Herzens. Bey der durch Heimweh, Schreck oder Gram erregten Melancholie fand BARRÈRE (p. 9. 11 seq. 14. 17 sq. 20. 24. 29 sq. 32) die Hirngefäße von schwarzem Blute strotzend, polypöse Gerinnungen in den Blutleitern und Blutergießungen im Gehirn. Nach Parent kommt auf 11 Fälle von Melancholie immer einer, wo die Krankheit durch Gemüthsbewegungen veranlaßt worden ist. Besonders deutlich ist die Wirkung des Schrecks in dieser Hinsicht (Beyträge II. S. 272). Bey Gemüthsbewegungen und im Rausche entsteht leicht eine Blutergießung (Beyträge II. S. 113. fg.).

§. 388. Die Gefahr bey Kopfverletzungen hängt vorzüglich von der lebhaftern Sensibilität, und von der höhern Empfindlichkeit des Gehirns ab. Nach ARNEMANNS Beobachtungen wirkt die Verletzung des Gehirns auf Kanächen aufsend, sie werden wie während und sterben, indem dasselbe sich entzündet, erweicht und vereitert; auf Hühner, Hunde, Schafe wirkt sie mehr depressirend, und diese Thiere vertragen verhältnismäßig einen viel grössern Verlust an Hirnsubstanz. So sehen wir, daß bey körperlich starken Menschen, hey welchen die Irritabilität vorwaltend ausgebildet ist, die Kopfverletzungen nicht so gefährlich sind, als bey solchen, in welchen die Sensibilität vorherrscht. Auf der andern Seite ist aber auch bey der höchsten Geistesbildung, bey der Herrschaft der höhern Seelenkräfte über die niederen und daraus sich ergebendem gesetztem, kollektivem Charakter weniger Gefahr, als bey der Uebermacht des lebhaften Temperaments, und bey leidenschaftlicher, unruhiger Stimmung. — Ist eine Kopfverletzung im Streite oder überhaupt bey aufgeregtem Gemüthszustande erfolgt, so ist die gefäh-

cher, als im entgegengesetzten Falle. Nach Arnesmann (S. 196) Beobachtungen entstand der Hirschschwamm bey trepanirten Thieren immer um so schneller, je unbländiger sie bey der Operation gewesen waren. — Die schon entwickelte Entzündung und Eiterung der festen Hirnhaut wird durch niederschlagende Gemüthsbewegungen verstärkt und verschlimmert (Beyträge I. S. 208). Nach Quesnoy's (*ac. de chir. II. p. 156*) Bemerkung erfolgt bey Kopfwunden der Tod oft plötzlich nach einem Ausbruche des Zorns, nach einer Ueberraschung durch unerwartete Ankunft einer geliebten oder gebaßten Person, oder nach einer Begattung. Ein Verwundeter (Nr. 823) erzürnte sich am 13ten Tage und wurde darauf betäubt; nach einem neuen Ausbruche des Zorns am 26ten Tage bekam er Fieber, wurde 3 Tage darauf betäubt und starb 3 Tage später.

§. 389. Vielesley Abnormitäten des Gehirns entspringen aus psychischen Ursachen, wie denn namentlich die Aftergebilde in demselben besonders unter der Mitwirkung depressirender Affecte entstehen. Gram und Kummer ist ein ursächliches Moment zu Entstehung von Blutergießung (Nr. 151, 214, 248, 252, 683.), seröser Ergießung (Nr. 302), Eiterung (Nr. 457, 515, 520.), Atrophie (Nr. 654, 665, 674.), Erweichung (Nr. 716, 762.), und Aftergebilden (Nr. 883, 905, 955, 958, 969, 1014, 1023, 1106.). Nach Aeger und Zorn beobachtete man Blutergießung (Nr. 253.), Aftergebilde (Nr. 969, 1017); nach Furcht und Schreck Blutergießung (Nr. 689), Erweichung (Nr. 816.), Aftergebilde (Nr. 1015, 1036); nach Freude über unverhoffte Befreyung aus dem Gefängnisse Verhärtung (Nr. 855); nach zu angestrengtem Studiren Aftergebilde (Nr. 935, 1026, 1060). — In den meisten Fällen erkrankt die Seele durch sich selbst, durch ungehörigen Gebrauch der Freyheit, durch Einseitigkeit und Mangel an Ebenmaas in ihren verschiednen Thätigkeiten. Die Abnormitäten, welche man nachmals im Hirnbusse antrifft, müssen also durch den Einfluß der Seele auf die Plasticität hervorgebracht worden seyn. Die unregelmäßige, verworrene, unzusammenhängende, zu verschiedenen launenhaft überspringende, oder unbläßig über einem Punkte brütende und auf diesen Alles unnatürlich beziehende Geistesthätigkeit, oder die Verweichlichung des Gefühls, welche dem Wechsel der Eindrücke nicht widersteht und fortdauernd einer leidenschaftlichen Stimmung sich dahin giebt, kann, wie es scheint, die normalen Strömungen im Gehirne verwirren, ihren Einklang stören, einen zu starken Andrang des Blutes nach einzelnen Organen, bald wieder plötzliche Hemmung seines Laufes veranlassen, somit entweder eine zu starke Zersetzung, Auflösung und Verflüssigung, oder Stockung, Gerinnung und Verdichtung hervorbringen und eine Abnormität der Bildung erzeugen, welche auf die Seele störend zurück wirkt und sie nun ihrer Freyheit völlig beraubt.

II. Verhältniß zwischen Seele und Leib.

§. 390. Da wir ein Wechselverhältniß zwischen der Seele und dem Gehirne (§. 352 — 389), so wie auch zwischen dem Gehirne und dem übrigen Leibe (§. 264. — 351.) erkannt haben, so bleibt uns noch übrig, das Verhältniß zwischen dem Leibe und der Seele, und zwar den Einfluß von jenem auf diese (§. 391. — 430.) und von dieser auf jenen (§. 431. — 446.) zu untersuchen.

1. *Einwirkung des Leibes auf die Seele.*

§. 391. Das Blut ernährt das Gehirn; wie aber überall im Leben Materie und Kraft wechselseitig einander hervorufen, so ist die Ernährung nicht bloß Bildung von Masse, sondern zugleich Erzeugung von Kraft, und das Blut bedingt auf diese Weise das Hirnleben. Es wirkt als Repräsentant des Leibes zunächst auf das pflanzliche Hirnleben, und indem das Gehirn seine eigenthümliche Thätigkeit dagegen behauptet, so entsteht in demselben eine Spannung, d. h. eine auf Gegenseitigkeit sich gründende Gerechtigkeit zu regerer Thätigkeit; vermittelt dieser Erregung wird denn die Seele vom Blute bestimmt. Aristoteles (*de part. anim. lib. II. c. 7. p. 604.*) verkannte, wie die Bedeutung des Gehirns, so auch die seines Blutes, indem er behauptete, dieses trete bloß zu dessen Häuten, um ihm einige Wärme zu geben. Die meisten Physiologen treten der Wahrheit näher, indem sie das Blut als das Vermittelnde zwischen Leib und Seele betrachteten. Galen kleidete diese Ansicht in die Hypothese, daß die Arterien (*de nat. part. lib. IX. c. 4. p. 179.*), zum Theil aber auch die Venen (*de Plat. et Hipp. lib. III. c. 8. p. 347.*) Lebensgeister zur Bereitung thierischer Geister nach dem Gehirn führen. Hippokrates (*de morbis lib. I. §. 28. p. 33.*) hatte dagegen den einfachen Erfahrungssatz aufgestellt, daß das Blut Vieles, und, nach der Meynung Einige, selbst Alles zur Denkkraft beyrage.

§. 392. Betrachten wir die Quantität des zu dem Gehirne gelangenden Blutes (§. 392 — 397), so finden wir zurörderst, daß dieselbe im Ganzen genommen in der aufsteigenden Thierreihe zunimmt. Bey Fischen und Amphibien bekommt das Gehirn äusserst wenig Blut, und noch bey Vögeln ist die Gefäßhaut mehr eine eigene, dichte Membran, die wenig Gefäße hat, während sie bey den höhern Säugethieren den Charakter einer Membran beynähe aufgibt, und ein zartes Gewebe wird; welches bloß die Gefäße verbindet und anheftet. Den größten Reichthum an Blut schenkt das Gehirn der Amphibiensäugethiere zu haben. — Die Erscheinungen im krankhaften Zustande des Menschen überzeugen uns, daß das Blut als Reiz oder nach den Gesetzen der Erregung auf die Seelenthätigkeit wirkt, denn wenn die Quantität desselben in den Hirngefäßen entweder absolut, oder relativ für den Zustand der Erregbarkeit des Gehirns abnorm vermehrt wird (§. 393 — 395), so verursacht sie, nach Maasgabe ihrer Stärke, Steigerung oder Beklemmung, oder Verwirrung, oder Unterdrückung der Seelenthätigkeit.

§. 393. Ein mäßig vermehrter Andrang des Bluts, welchem das Wirkungsvermögen des Gehirns gewachsen ist, bringt eine größere Spannung, eine lebhaftere Erregung, eine erhöhte Thätigkeit der Seele hervor: lebhaftere Vorstellungen, schneller Wechsel und leichtere Verknüpfung derselben; Lebhaftigkeit der Phantasie und Gerechtigkeit zu ruhigen Affecten. Ueberall erscheint die mit einer gewissen Spannung verbundene Expansion, Auflockerung und Turgescenz der organischen Substanz gleichzeitig mit erhöhter Lebensthätigkeit: das Gehirn schwillt bey vermehrtem Blutandrang an, drückt gegen den Schädel, und tritt, wenn er verletzt ist, aus ihm hervor; mit dieser Turgescenz muß also auch seine Thätigkeit mehr aufgeregt werden. Lebhaftige Bewegungen des Körpers erhöhen durch Beschleunigung des Kreislaufs die Hitze des Zorns, die Ausgelassenheit der Freude und die Lebendigkeit der Phantasie; so kann man durch schnelles Gehen zu einer solchen Aufregung vorbereitet werden. Manche arbeiten leichter bey horizontaler Lage,

wo sich mehr Blut im Kopfe sammelt: Bricheteau (*Journal complémentaire* IV. p. 17) erwähnt einen Menschen, welcher nur mit tiefer liegendem Kopfe auswendig lernen konnte: Bey rachitischen Kindern, welche eine besondere Schärfe des Verstandes zeigen, ist nicht allein das Gehirn, sondern auch der Durchmesser der Caroditen größer (*Haller elem.* IV. p. 402). Durch den Irriabilitätszustand des Gefäßsystems wird aber vielmehr die Erscheinungsweise der Seele, die Schnelligkeit ihrer Thätigkeiten und die Art ihrer Aemserung, als das Maas ihrer Kraft bestimmt. Bey schnellem und kräftigem Kreisläufe findet man eine große Beweglichkeit der Seele oft bey beschränkter Intelligenz: es ist hier eine hohe Zündbarkeit, aber sie giebt nur ein Strohfeuer. Dagegen bey trägerem, matterem Kreisläufe ist die Seelenthätigkeit langsamer, ruhiger, aber dabey oft energisch; dergleichen Menschen urtheilen richtig, haben aber keinen schnellen Ueberblick; sie sind verhältnißmäßig ärmer an Gedanken, aber diese sind klärer; sie haben gute Einfälle, die aber nicht wie Blitze hervortreten und daher auch nicht als eigentlicher Witz sich geltend machen. Wird bey solchen Menschen durch einen beginnenden Katarrh ein rascherer Blutlauf und eine größere Spannung im Gehirn erregt, so tritt ihre geistige Lebendigkeit in schnellern Combinationen hervor, und sie zeigen sich witziger und in der Gesellschaft interessanter. — Marshall (S. 187. 191) fand bey einem jähzornigen und bey einem stolzen und zu Gewaltthätigkeiten geneigten Narren die Wände der Hirnarterien sehr dünn, so daß das Blut stärker auf das Gehirn wirken mußte. In einer dem Wirkungsvermögen des Gehirns angemessenen Fieberhitze zeigt sich eine größere Lebhaftigkeit der Seele, eine ungewöhnliche Bestimmtheit des Willens, Dreistigkeit und Keckheit, zuweilen Schamlosigkeit. Bey einem Zehrfieber mit entzündlichem Zustande werden die Kranken lebhafter, interessanter, heiterer, empfindsamer und gutmüthiger. Cabanis (I. p. 544) erzählt einen Fall, wo ein düster, melancholischer Mensch nach einem hartnäckigen Quartanfieber lebhaft, heiter und fast bis zur Narrheit fröhlich wurde; dies verminderte sich später, etwas, doch erschien der frühere Trübsinn nicht wieder. So erklären sich dann wohl auch aus dem aufgewegterem Blutlaufe die Fälle, wo einfältige Menschen nach einer Kopfverletzung eine ihnen ungewöhnliche Lebhaftigkeit des Geistes zeigten (*Haller elem.* IV. p. 296). Eine ungewöhnliche Munterkeit, ausgelassne Fröhlichkeit und gesteigerte Lebhaftigkeit der Seelenkräfte ist der gewöhnliche Vorbote einer von der Peripherie des Gehirns, namentlich von der festen Hirnhaut ausgehenden Entzündung (§. 360). So tritt nach Hirnwunden zuweilen eine auffallende Munterkeit 3 (Nr. 450), 4 (Nr. 319) oder 8 (Nr. 258) Tage vor dem Tode ein. Bey der Pneumonie äussert sich eine hinzutretende Meningitis zuweilen so, daß der Kranke sich unerwartet wohl fühlt, frey von Schmerzen, aufgelegt und scherzhaft ist, lebhaftes Gedächtniß äussert, treffende Antworten giebt und eine besondere Leichtbeweglichkeit des Körpers zeigt (Stoll I. p. 181).

§. 394. Ist der Andrang des Bluts stärker oder das Gehirn schwächer, so tritt der erste Grad der Bedrückung ein: es ist hier keine kräftigere Reaction, sondern mehr eine Reizung durch eine drückende Last. Es entsteht Kopfschmerz, Verstimung, Verdrossenheit, Unbehaglichkeit; es ist den Kranken dumpf, schwer und düster im Kopfe, sie sind unachtsam, verlieren leicht den Faden der Vorstellungen, erinnern sich schwer, werden still und verschlossen, oder unruhig, und ängstlich, schläfrig und doch im Schlafe

gestört; die Hastigkeit in ihren Reden und Bewegungen deutet auf die Statt findende Reizung hin. So sind anhaltende, heftige Kopfschmerzen die gewöhnlichen Symptome von Congestionen in der festen Hirnhaut, von Stockungen in den Blutleitern und von Verknöcherung oder Verwachsung derselben (Beyträge II. S. 94. 123.). Solche Verstimmung ist ferner die gewöhnliche Begleiterin der Fieber, vorzüglich aber der Encephalitis in ihrem ersten Zeitraume und der Meningitis, namentlich wo sie schwächere Constitutionen, vorzüglich Kinder, befällt, einen langsamern Lauf nimmt und zu aeröser Ergießung sich hinneigt (§. 363.).

§. 395. Ist der Blutandrang noch mächtiger, aber dabey eine größere Spannung im Gehirn, so wird die Seele sich entfremdet, und es erfolgt Verwirrung. Auf einer niedrigeren Stufe entsteht dann Täuschung der Sinne bey fortwährendem Bewußtseyn; bey einem höhern Grade erliegt die Freyheit des Geistes: die Besonnenheit oder das Vernögen, die Vorstellungen unter einander zum Ebenmaasse zu verknüpfen, geht unter, und die Phantasie schweift ohne Fesseln und Regeln umher. In der Fieberhitze sind die Kranken wie berauscht und in einem Gewirre von Vorstellungen befangen, und während der Vorbereitung zur Krisis tritt ein Unvermögen zum gewohnten Denken, Unruhe und Aufbruch in der Seele ein. Bey der Encephalitis und Meningitis zeigt sich eine gewisse Entfremdung, etwas Ungewöhnliches in der Stimmung, so wie in den Aeusserungen und der Handlungsweise schon als Vorläufer der Krankheit; dann tritt Vergessenheit, Gebrauch falscher Ausdrücke und Verworrenheit der Gedanken ein; heftiges Delirium bricht endlich besonders nur bey der Meningitis aus. Die Verrücktheit ist am häufigsten mit Wallung des Bluts verknüpft, und wenn diese auch zuweilen Folge der ausschweifenden, sich selbst verberbernden Seelenthätigkeit ist, so scheint doch auch in andern Fällen das Uebergewicht des Plastischen, Materiellen die Störung zu veranlassen. In den Anfällen der Krankheit zeigt sich deutlich eine stärkere Congestion nach dem Kopfe, die Carotiden pulsiren heftiger, als andre Arterien, und die Venen des Kopfs sind aufgetrieben (Georget von der Verrücktheit S. 68.). Cox (Reils Beyträge I. S. 616.) beobachtete einen Menschen, bey welchem ein Puls von 90 Schlägen mit einem Anfälle von Manie, und ein Puls von 70 Schlägen mit einem lichten Zeitraume immer gleichzeitig eintrat. Horn (Archiv 1818. Juni) fand in den Leichnamen von Verrückten fast nur im Gefäßsysteme Abnormitäten, und besonders die Venen des Gehirns von schwarzem Blute strotzend. Häufig ist in dergleichen Leichnamen die Marksubstanz röthlich, mit Blutpunkten durchsetzt, auch einzelne Stellen rosenroth, oder bläulich, oder dunkelbraun. Ein solches Strotzen des Gehirns bemerkte z. B. Haslam in den meisten Fällen, welche er beobachtete. Eben so findet man nach Raserey häufig die Gefäße in der Hirnsubstanz oder an der Peripherie des Gehirns erweitert (Haslam S. 52. 55. Home in Meckels Archiv III. S. 111. fg.). Blane (Sammlg. auserl. Abhh. XX. S. 560.) erzählt einen Fall, wo bey Aneurismen beyder innerer Carotiden, Schwindel, dann heftiger Schmerz in der Stirn, darauf Raserey mit dem Bewußtseyn derselben und endlich bestimmungslose Tobtsucht eintrat. Auch findet man Congestionen in der festen Hirnhaut nach Fieberdelirium, Verrücktheit und Wasserscheu (Beyträge II. S. 96. 102.). Bey Kopfverletzungen entsteht zuweilen auf der Stelle (Nr. 276.) oder doch an demselben

Tage (Nr. 87. 277.) Delirium, vorzüglich wohl vermöge des vermehrten Blutandrangs. Bisweilen kann auch eine Blutergießung (Nr. 240.) Delirium verursachen. Ein Blödsinniger (Nr. 223.) wurde plötzlich aufgeregt und delirirte: man fand eine Blutergießung an der Oberfläche des Gehirns. So kann auch die Entzündung der verschiedensten Organe durch Erregung eines allgemeinen Organismus Delirium veranlassen.

§ 396. Erreicht endlich die Ueberfüllung mit Blut ihren höchsten Grad, entweder durch ihre absolute Stärke oder vermöge der schwächeren Reaction des Gehirns, so unterliegt die Seelenthätigkeit dem Uebergewichte des irdischen Factors, der Blutmasse, und es tritt eine reine Oppression und Lähmung ein, welche entweder bloß das Seelenleben ergreift, und als Betäubung und Blödsinn auftritt, oder über das pflanzliche und psychische Leben des Gehirns sich verbreitet, so daß dieses im Blute erstickt oder apoplektisch stirbt. Bey der Encephalitis zeigt der tiefe Schlaf, das langsame und kurze Antworten u. s. w. die herannahende Lähmung an, welche als völlige Schlafsucht und Betäubung am Ende hervortritt, zuweilen aber auch schon im Anfange der mit voller Macht einbrechenden Krankheit sich zeigt. Passive Congestion und Ueberfüllung mit Blut, sie mag durch psychische Ursachen, oder durch Erregungsverhältnisse, oder durch mechanische Momente (Verengerung der Hirnvenen und Blutleiter, Aneurismen der Hirnarterien, Erbrechen u. s. w.) veranlaßt seyn, verursacht Benommenheit, Schlafsucht und Betäubung. Viborg (Reils Archiv V. S. 113.) sah, daß Pferde nach Unterbindung beyder Drosselvenen betäubt waren, bis sich die Würbelvenen hinlänglich erweitert hatten, um die Stelle jener vertreten zu können. Die Apoplexie beruht in vielen Fällen bloß auf einer solchen Ueberfüllung mit Blut; und diese findet bey Erstickung, narkotischer Vergiftung u. s. w., Statt, auch wenn der Tod nicht völlig die apoplektische Form hatte. Auch bey Blödsinnigen findet man nicht selten das Gehirn von Blut strotzend.

§ 397. Was die Verminderung des Blutandrangs betrifft, so verursacht die Verschließung der Carotis einige Betäubung (Morgagni XIX. 25. 26.), Schwindel (Browne in Horns Archiv 1822. S. 263.) und schlagflüssige Anfälle (Home in Meckels Archiv III. S. 112.). Ein Druck auf die Carotis hebt die von Congestion herrührenden Kopfschmerzen, Schwindel und Ohrensausen, und vermindert das Delirium (Perry in Samml. auslesener Abhh. XVI. S. 303.); nach einem unterdrückten Ausschlage traten Convulsionen ein, die sich durch einen Druck auf beyde Carotiden sogleich stillen ließen (Tübinger Blätter III. S. 92.). — Eine Verminderung des Blutandrangs durch Nasenbluten oder Aderlässe, so wie auch durch Purganzen, Quecksilber u. s. w., stellt die Freyheit der durch Ueberfüllung bedrängten Seelenthätigkeit her. So hebt ein Aderlaß die Betäubung nach Kopfverletzungen (Nr. 5. 482.), oder beseitigt sie wenigstens momentan, wo sie durch fremde Körper unterhalten wird (Nr. 132.). Nasenbluten erleichtert bey Eiterung im Gehirn (Nr. 539.), und selbst bey Aftergebilden wird durch den Aderlaß Kopfschmerz und Schwindel (Nr. 987.), oder Melancholie (Nr. 1061.) gehoben oder gelindert. Besonders wirksam ist die Oeffnung der Schläfearterie (Nr. 233.) oder des Sichelblutleiters (Beiträge II. S. 120. fg.). — In dem (§. 395.) angeführten von Cox beobachteten Falle trat Melancholie ein, wenn der Puls auf 50 Schläge sank, während bey 70 Pulsen die Seelenthätigkeit frey war. Zu dem Zehrfeber mit trügem Blutlaufe gesellt sich eine düstre

Stimmung des Gemüths (Cabanis I. p. 535.), und mit dem Eintritt des Fieberfrosts wird die Empfindung dunkel und schwach. — Wie bey der Ohnmacht der Kreislauf sinkt und stockt, sey es nun durch Blutverlust, oder durch Abnormität des Herzens, oder durch Affection andrer Organe; des Magens, der Därme, des Fruchthälters u. s. w., so wird die Seelenthätigkeit gestört: es entsteht Schwindel, Beklemmung, Benommenheit und in den allermeisten Fällen Bewußtlosigkeit. Zuweilen dauert zwar bey Ohnmacht und Asphyxie das Bewußtseyn mit der Gehörperception fort, und es ist bloß das Reactionsvermögen des Gehirns, der Zusammenhang mit der activen Seite seiner Aussenwerke, dem willkührlichen Muskeln, aufgehoben, also ein Zustand, wie bey angehender Lähmung, wo bey Unvermögen der Bewegung noch die Empfindung sich erhält, folglich eine Schwächung der Hirnthätigkeit, nur in geringerem Grade. Aber jenes Bewußtseyn ist gewiß auch sehr dunkel und auf den Kreis sinnlicher Wahrnehmung beschränkt; auch fragt es sich, ob nicht in solchen Fällen bloß der Puls an den Gliedmaßen völlig unterdrückt war, während der Kreislauf im Gehirne noch einigermaßen fort dauerte? Die von der Ohnmacht herrührende Unterbrechung des psychischen Lebens wird aber durch Belebung der Gefäßthätigkeit und neues Beginnen des Kreislaufs gehoben, also die Seele durch das Blut wieder erweckt. — Die Apoplexie kann, da sie überhaupt eine Unterbrechung des Hirnlebens ist, nicht bloß durch unmittelbare Schwächung desselben, oder durch Ueberfüllung mit Blut, sondern auch, wie besonders Abercrombie (S. 141.) gezeigt hat, auch durch Mangel an Blut im Gehirne, z. B. am Ende der aus Erschöpfung entstandenen Krankheiten herbegeführt werden.

§. 398. Die Qualität des Bluts ist ein andres Moment der Bestimmung der Seelenthätigkeit. Aus Bichats (*recherches* p. 236 — 247.) Versuchen ergibt sich, daß das Gehirn nur, wenn es durch Athmen geröthetes Blut empfängt, seine Functionen vollzieht, durch schwarzes Blut aber früher, als andre Organe, getödtet wird; denn nach dem Einspritzen venösen Blutes in die Carotiden hörte das thierische Leben auf, während der Kreislauf und selbst die Bewegung des Gehirns noch eine Zeitlang fort dauerte, und wurde dann wieder arteriöses Blut in das Gehirn gebracht, so kehrte Sinnenthätigkeit und Willkühr zurück. Auch schien es (ebend. p. 179.), als ob die aus dem Blute entwickelte oder in die Blutgefäße eingedrungene atmosphärische Luft vorzüglich durch Affection des Gehirns töde; denn es erfolgte bey solchen Versuchen zuerst Convulsion und Vernichtung des thierischen Lebens, während das Herz noch eine Zeitlang lebhaft pulsirte, und wurde die Luft in die Pfortader eingeblasen, so erfolgte der Tod viel später, als wenn sie in die Carotis gebracht worden war.

§. 399. Eine specifische Beziehung der Blutqualität zur Seele ist im Ganzen genommen nicht zu verkennen: Nach Thaenkrahs Beobachtungen steht bey den verschiedenen Thieren die Menge des Blutes in geradem Verhältnisse zur Kraft und Wildheit derselben, und die specifische Schwere des Blutes, die bey gesunden Menschen 1,050 bis 1,060 beträgt, und in verschiedenen Krankheiten bis auf 1,022 sinkt, steigt in der Manie bis auf 1,096. So hat man auch bey Thieren nach Einspritzung von fremdem Blute eine Veränderung der Stimmung beobachtet; Schafe, welchen Kalbblut eingespritzt worden war, wurden muthig, kampfslustig, wie berauscht oder wüthend (Scheele Geschichte der Transfusion I. S. 65, II. S. 144.

147. 156.); ein Fuchs, welchem man Lammblut eingespritzt hatte, wurde scheuer (ebend. I. S. 68). Auch wurde bey Menschen durch Kalbsblut Schlafsucht, ein andresmal Manie gehoben, und durch Lammblut eine Lähmung beseitigt und die Gemüthsstimmung erheitert (ebend. II. 104. 126. 152). Viel Vertrauen darf man jenen ältern Beobachtungen über die Wirkung der Transfusion freylich nicht schenken, und die neuern von Prevost und Dumas haben sie nicht bestätigt. Indes ist es doch nicht unwahrscheinlich, daß die Lebendigkeit des Geistes und die Hoffnungslust bey der Lungenucht mit dem oxydirten und leicht eine Entzündungshaut bildenden Blute in einem Zusammenhange stehe, so wie der Trübssinn bey Leberbeschwerden und Stockungen in der Pfortader mit der dicken, venösen Beschaffenheit des Bluts, und die Muthlosigkeit bey dem Scorbut mit dem flüssigen, venösen Zustande desselben.

§. 400. Daß flüchtige Stoffe, welche das Seelenorgan afficiren, in das Blut und mit diesem zum Gehirne gehn; ist längst behauptet, aber nicht erwiesen worden. Indessen will Hare (*view of the structure, functions and disorders of the alimentary organs. London. 1811. 8.*), bey Oeffnung der Hirnhöhlen den Wacholderbrandwein, dessen unmäßiger Genuß auf der Stelle getödtet hatte, und in einem andern Falle die *Ass foetida*, welche kurz vor dem Tode gegeben worden war, gerochen haben. Hardegg (Tübinger Blätter III. S. 84) fand bey Thieren, die mit Arsenik vergiftet waren, Gehirn und Rückenmark mit Blut überfüllt, aber keine Spur von Arsenik im Blute oder in jenen Organen. So läßt sich denn vermuten, daß die verschiednen Gifte, welche bald Aufregung, bald Verwirrung, Delirium und Wuth, bald Niederdrückung, Kleinmüthigkeit, Melancholie, Betäubung hervorbringen, zunächst nur die Proportion in den Elementen des Blutes stören, und hierdurch mittelbar die Seele afficiren.

§. 401. Der Impuls des gegen das Gehirn anströmenden Blutes steht in einer Beziehung zum Seelenleben, welche einigermaßen schon im Alterthume geahnet wurde. Galen (*de odoratus instr. c. 6. p. 112.*) nahm an; das Gehirn ziehe bey seiner Diastole Lebensgeister aus der Luft und dem Blute, und stoße durch seine Systole die Luft mit Schleim und andern Auswurfstoffen wieder aus. Diese Lehre wurde herrschend und mannichfaltig modificirt; so sollte nach Piccolomini (*lib. V lect. 3. p. 255.*) bey der Diastole des Gehirns der Zugang zur vierten Höhle durch die Vierhügel geschlossen; bey der Systole aber der thierische Geist durch diese Höhle zu den Sinuesorganen und dem übrigen Körper geführt werden; nach Perrault (*mécanique p. 405*) sollte durch die Systole das Serum aus dem Blute gepreßt werden zur Scheidung und Reinigung der Geister u. s. w. Dagegen hat Bichat am klärsten nachgewiesen, daß diese mechanische Agitation die Hirnthätigkeit belebt und die Regsamkeit der Seelenthätigkeit erhöht. Alle Lebendigkeit zeigt sich in der Form des Gegensatzes, und jede Kraft wässert sich am stärksten, wenn sie durch das Andringen der ihr gerade entgegengesetzten in regere Spannung gebracht wird. Dem Gehirne ist nichts mehr entgegengesetzt, als das Herz. Dies aber kann vornehmlich nur mechanisch, durch Bewegung, Stoß und Druck wirken: mit der Erschlüftung erfährt daher das Gehirn die volle Einwirkung des Herzens. Es ist dieselbe notwendige Beziehung des Herzens auf das Gehirn, dergleichen die Einwirkung der Arterie auf den Nerven ist.

§. 402. Daher ist denn die Bewegung des Gehirns bey dem Menschen stärker, als bey den Säugthieren; übereinstimmend mit der Entwickelungsstufe dieses Organs, ist sie nach Ravina (a. a. O. S. 134) bey Nagethieren schwächer, als bey Rauhthieren. Haller (*opera* I. p. 134) sah bey Thieren sehr oft keine Bewegung, unstreitig, weil sie an und für sich schwach ist, und durch die Angst hey dem Experimente noch mehr geschwächt wird. Ehen so zeigen die Thierschädel weniger ausgezeichnete Eindrücke vom Gehirne. Nur die Amphibien- und Reptilien, deren Hirnbildung überhaupt in mehrerer Hinsicht zu oberst in der Thierreihe steht, haben stärkere Abdrücke der Randwülste im Schädel. Bey Vögeln, Amphibien und Fischen fehlt die Hirnbewegung gänzlich (Sclibbing a. a. O. p. 114. Ravina a. a. O. S. 130 fg.); Treviranus (Schriften I. S. 106) betrachtete das entblößte Gehirn eines Frosches unter der Loupe, und fand keine Spur von Bewegung. Bemerkenswerth ist es aber, daß bey wirbellosen Thieren die Ganglien des Nervensystems auf eine andre Weise hewegt zu werden scheinen. Die Speiseröhre muß nämlich, wenn sie von durchgehenden Speisen angefüllt wird, diesen sie umgehenden Ring drücken; auch schiebt sie sich bey dem Ausstrecken und Zurückziehen des Kopfs durch den Ring hin und her. Ausserdem hat man hin und wieder selbst Spuren von Muskeln gefunden, welche sich an den Ganglienring ansetzen; mögen auch die Fasern, welche Swammerdam bey der Gartenschnecke für Muskeln hielt, Arterien gewesen seyn, so bemerkte doch Wöhrlich (p. 29), daß bey Limas einige Fäden von den Augenmuskeln zum Ganglienringe gehn, und Treviranus (Schriften I. S. 39) fand Muskelfasern, welche sich an den Ganglienring des Phalangium ansetzen. — Der Impuls muß um so stärker seyn, wenn die linke Herzkammer ihre ungetheilte Blutwelle gegen das Gehirn dazu ausstößt, und nur seitlich abgebende Arterienzweige das Blut zu andern Theilen leiten. Nun sehen wir dies Verhältniß nur bey dem Menschen, und eine immer größere Abweichung von demselben, folglich auch einen immer schwächeren Impuls des Blutes gegen das Gehirn, je weiter wir in der Thierreihe herabsteigen. Bey den Fischen vertheilt sich das aus dem Herzen kommende Blut zunächst an die Kiemen, und erst der aus der vordersten Kieme zurücktretende Ast giebt Zweige zum äußern Kopfe, so wie zu Gehirn und Rückenmark; folglich kann das Herz keinen unmittelbaren Einfluß auf das Gehirn ausüben, da die Kiemen dazwischen eingeschoben sind. Bey Fröschen theilt sich der aus dem Herzen tretende Arterienstamm in zwey Aeste, aus welchen Carotiden und Wirbelarterien, so wie die Lungenarterien, Arterien u. s. w. vereinzelt entspringen. Bey der Schildkröte ist die Kopfarterie ein schwacher Zweig der Schlüsselbeinarterie, und die Hirnarterie nichts, als der letzte Zweig der Erstern. Bey den Vögeln spaltet sich die Aorta gleich bey ihrem Ursprunge in drey Aeste, eine aufsteigende Aorta und eine rechte und linke Anonyma; jede Anonyma giebt ausser der Schlüsselbeinarterie und Wirbelarterie eine Carotis, welche verhältnißmäßig sehr eng ist und am Kopfe in mancherley Zweige sich zersplittert, von welchen ein unansehnlicher, von den übrigen nicht verschiedener zum Gehirne geht. Bey den Säugthieren allein geht die ganze Masse des Blutes vom Herzen aus in einem Strome durch die aufsteigende Aorta, also hier erst erscheint ein stärkerer Andrang gegen den Kopf und mit ihm eine Bewegung des Gehirns; allein die Basis des Herzens ist mehr gegen das Rückenmark, als gegen den Kopf, gerichtet, so

dafs ein stärkerer Andrang nach jenem, als nach diesem zu, entsteht, und die äussere, den peripherischen Organen des Kopfs zugewendete Carotis ist der eigentliche Stamm; die innere Carotis hingegen ungleich schwächer, und blofs ein untergeordneter Zweig, namentlich der innern Kieferarterie. Merkwürdig ist, dafs bey den Amphibiensäugethieren allein die Carotiden in demselben Verhältnisse entspringen, wie bey Menschen, während die Ein- drücke an der innern Fläche des Schädels dafür sprechen, dafs die Hirnbewegung bey ihnen stärker ist, als bey den meisten übrigen Thieren. Erst bey Menschen ist die Basis des Herzens und der Ausgang seiner linken Kammer mehr dem Gehirne zugewendet; erst bey ihm spaltet sich die Carotis gleich unten in die äussere, und in die eben so starke, oder noch stärkere und so als Stamm zu betrachtende innere; bey ihm allein dringt also der Blutstrom in gerader Richtung und mit voller Macht gegen das Gehirn. — Wir haben gesehen (§. 271, c.), dafs der Gegensatz der Carotis und der Wirbelarterie ein Moment der Hirnbewegung ist: bey Fischen und Amphibien fehlt dieser Gegensatz, und das Gehirn bekommt sein Blut nur durch die Carotis. — Wir erkannten ferner die Krümmungen der Arterien als ein Mittel zu Verstärkung des Einflusses des Blutes an (§. 271, d.): die innere Carotis macht aber bey den Säugethieren weniger Krümmungen, als bey dem Menschen, und diese Krümmungen fehlen bey Vögeln, Amphibien und Fischen gänzlich. — Mit diesem Verhältnisse zwischen dem Herzen und dem Gehirne stimmen auch andre Erscheinungen überein. Bey niedern Thieren leben beyde Organe einigermaassen mehr unabhängig von einander: bey Fröschen und Salamandern dauert die sinnliche Wahrnehmung und die willkürliche Bewegung fort, nachdem das Herz ausgeschnitten ist, oder die Gefäße unterbunden sind (*Bichat recherches p. 173*).

§. 403. Thiere mit langem Halse, wo das Herz vom Gehirne zu weit entfernt ist, sind im Ganzen dünner: Giraffe, Hirsch, Gazelle, Gans, Schwan haben einen beschränkten Instinct; bey den kurzhälsigen Affen, Katzen, Hunden, Füchsen, Bären ist die Seelenthätigkeit reger (*Bichat recherches p. 173*, *Bricheteau im Journal complet. IV. p. 17*). Bey Menschen mit langem Halse findet man häufiger eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, bey kurzhälsigen häufiger eine bedeutende Lebendigkeit, rastlose Thätigkeit und Leidenschaftlichkeit: Napoleons Hals war äusserst kurz. Ganz damit übereinstimmend ist die allgemein bekannte Thatsache, dafs Kurzhälsige zur Apoplexie geneigter sind, weil hier der Einfluß des Herzens auf das Gehirn mächtiger ist, und Letztes, wenn es nicht kräftig genug entgegen wirkt, leicht überwältigt wird.

§. 404. Auch manche pathologische Erscheinungen zeigen eine Uebereinstimmung zwischen Hirnbewegung und Seelenthätigkeit. Nach einer Hirnerschütterung (Nr. 3.) kehren die Seelenkräfte allmählig zurück, so wie die Hirnbewegung wieder zunimmt. Eine Frau hatte eine erweichte Stelle im Scheitelbeine vom Umfange einer flachen Hand, welche bisweilen einen halben Zoll tief einsank, während die Person ihres Verstandes nicht mächtig war; dies dauerte so lange bis eine Erhitzung des Kopfs eintrat, wobey der Knochen sich hob und der Verstand wieder zurückkehrte (Scharschmidts Nachrichten VI. S. 125). — Auf kein andres Organ wirkt der äussere Druck so störend ein, als auf das Gehirn, so lange es übrigens in normaler Thätigkeit begriffen ist. Eine geringe Quantität Serum, Blut oder Eiter an der Oberfläche des Gehirns kann

durch Beschränkung von dessen freyer Turgescenz Stumpfsinn und Betäubung bewirken: — Wie stark übrigens der Einfluß der von den Arterien ausgehenden Erschütterung ist, ergibt sich unter Andern aus Bichats (recherches p. 175) Versuchen, nach welchen ein gewaltsames Einsprützen von Wasser in die Carotiden die Hirnthätigkeit sogleich stört und selbst tödtet.

§. 405. Wie sehr auch das Gehirn zu Unterhaltung seines Lebens des Blutes bedarf, so verträgt es doch eine bedeutende Ueberfüllung mit demselben weniger, als irgend ein andres Organ. Es braucht lebendiges, fließendes Blut zu seiner Belehung; trübes, stockendes hemmt seine Thätigkeit. Ein Druck auf die Blulleiter bewirkt durch Hemmung des Abflusses, durch Stockung des Bluts und durch Ueberfüllung des Gehirns Betäubung, wie dies z. B. Ollenroth (Arzneyk. Magazin L. 2 St. S. 116.) sah; sielleicht können auch Extravasate durch Zusammendrückung der Blulleiter so wirken (Abercrombie S. 133).

§. 406. Krankheiten der Hirnarterien kommen häufig mit Affection der Seelenthätigkeit verbunden vor. Man findet Verknöcherungen derselben bey Apoplexie (Nr. 200, 212, 224, 686, 772, 1108), Kopfschmerz (Nr. 1108) und Wahnsinn (Nr. 682); aneurismatische Erweiterungen bey Apoplexie (Nr. 772, 1117.), Kopfschmerz und Schwindel (Nr. 940, 1116.), Delirium (Nr. 690, 1116), Melancholie (Nr. 940), Verrücktheit (Nr. 1036), Blödsinn (Nr. 592).

§. 407. Die Hypertrophie des Herzens oder die Verdickung seiner Wände verursacht Congestionen nach dem Gehirne, und dadurch Kopfschmerz, Schwindel, Betäubung, Blutergießung. Wie die von Herzkrankheiten ausgehenden Hemmungen des Kreislaufs die Geistesthätigkeit stören, zeigt besonders das Beyspiel von John Hunter, bey welchem die Leichenöffnung Verdickung des Herzbeutels, Bleichheit und Welkheit des Herzens mit Exsudationen, Verknöcherung der Klappen, so wie der Arterien des Herzens und des Gehirns eine aneurismatische Erweiterung der Aorta zeigte: in seinen Krankheitsanfällen trat Schwindel, erhöhte Empfindlichkeit von Auge und Ohr, erschwerter Gebrauch der Glieder, dann Krampf und Ohnmacht und Geistesverwirrung ein, oder er verlor die Erinnerung, so daß ihm die gewöhnlichen Umgebungen fremd vorkamen und er z. B. seine Wohnung nicht finden konnte (John Hunter über das Blut L. S. 33 — 51.).

§. 408. Ausser diesen allgemeinen Einwirkungen des Herzens auf die Seelenthätigkeit, erkennen wir noch einen speciifischen Einfluß desselben auf den Gemüthszustand. Dieser wird aber nicht allein durch das Blut, sondern auch durch die Nerven vermittelt; denn da erstlich die Einwirkung des Gehirns auf das Herz bey Affecten offenbar durch die Nerven geschieht, so läßt sich vermuthen, daß die Rückwirkung des Herzens auf die Gemüthseite des Seelenorgans auf demselben Wege vor sich geht; zweytens erkennen wir bey den Herzkrankheiten nicht immer so bedeutende Veränderungen im Blutandrang zum Gehirne, daß wir die dabey Statt findenden Verstimmungen des Gemüths davon ableiten könnten; drittens würden wir es auch nicht erklären können, warum bey Herzkrankheiten gewöhnlich nur das Gemüth, nicht auch die Geistesthätigkeit, leidet, wenn nicht die Nerven das Vermittelnde wären; endlich sind ähnliche Verstimmungen zuweilen die Folge eines Leidens anderer Organe, welche nicht durch Blutgefäße, sondern nur durch Nerven in einer unmittelbaren Verbindung mit dem Herzen stehen. Das allgemeinste Symptom bey Herzkrankheiten ist ein Gefühl von Angst, welches sowohl dem durch

Vorstellungen entstandenen, als auch dem bey Unterleibskrankheiten, bey drohendem Brande, bey Hemmung des Athmens und bey Nervenfebern eintretenden Angstgeföhle ähnlich ist. Dazu gesellt sich Unruhe, hypochondrische Verstimmung, Schwermuth, (Kreyszig Herzerkrankheiten I. S. 329—334.), überspannte Empfindlichkeit, Jähzorn oder besondere Weichheit des Geföhls, wie denn auch Nasse (Zeitschrift 1818. S. 56. fg.) bemerkt, daß, wenn der Herzschlag durch Fieber oder Arzneymittel sich hebt, die Stimmung heitrer wird; wenn er hingegen von selbst oder durch den Gebrauch der Digitalis sich verlangsamt, der Kranke trauriger und stiller wird. Bey dieser Empfindsamkeit und erhöhten Empfänglichkeit des Geföhls für alle Eindrücke mangelt es an Entschlossenheit und Festigkeit des Willens (Klaatsch p. 10.). Eine chronische Herzentzündung verursacht zuweilen blinde Triebe, selbst Mordlust. — Nach diesen reinen Erfahrungen läßt sich wohl zwischen den kindischen Gelüsten mit Mangel an Willenskraft bey einem Menschen, und dessen kurzem, breitem, in den Kammern erweitertem Herzen ein Zusammenhang annehmen; aber die verkehrte Lage des Herzens, die Spaltung seiner Spitze, oder das von lymphatischer Ausschwitzung entstandne haarige Aussehen desselben mit Ränberey und Mordthat, Diebsucht und Brandstiftung, Muth und Grausamkeit in Beziehung setzen zu wollen, ist zuviel gewagt, und gründet sich wohl zum Theil auf metaphysische Ansdrücke, z. B. daß Aristomenes, Leonidas und Lysander haarige Herzen gehabt haben sollen (Vergl. Klaatsch p. 9—16. Nasse Zeitschrift 1818. S. 110—114.). — Die Leichenöffnung von Seelenkranken läßt sehr oft bedenkende Abnormitäten des Herzens, Verwachsung, Ausschwitzung, Schlafheit, Welkheit, Erweiterung, Erweichung, Verknoorpelung, Verknochnerung, Trockenheit oder Wassersucht entdecken (Greding I. S. 343—350. II. S. 162—179. 334—338.). Aber es kann, eben sowohl die melancholische oder leidenschaftliche Gemüthsstimmung eine Abnormität des Herzens zur Folge geföhlt haben, als durch diese veranlaßt worden seyn. Nach Gredings Beobachtungen kam die Schlafheit und Welkheit des Herzens häufig bey Rasenden (= 1: 3, 68.), häufiger bey Blödsinnigen (= 1: 1, 48.), am häufigsten bey Melancholischen (= 1: 1, 25.) vor. Pinel der Jüngere (Nasse Zeitschrift 1821. 4. St. S. 165, 168, 169, 175.) fand bey Melancholie mit Argwohn, welche nach Gram entstanden war, Erweichung des Herzens. Mit der Kraft des Gemüths scheint auch der Tonus des Herzens abzunehmen. — Wir haben oben (§. 402) gesehen, daß mit der fortschreitenden Entwicklung des Thierlebens auch der Gegensatz des Herzens zum Gehirne sich steigert, so daß nur auf einer höhern Stufe das Herz seine Blutwelle mit ungetheilter Kraft ihm sendet, und so das innerliche eigenthümliche Leben des Gehirns stärker fördert. Wenn also der Blutandrang gegen das Gehirn bey dem Menschen stärker ist, als bey Thieren, so scheint dagegen die durch Nerven vermittelte Verbindung beyder Organe bey ihm schwächer zu seyn, indem unter seinen Herznerven weniger Zweige vom zehnten Hirnnervenpaare sind, als bey Thieren (Willis aer. c. 23. p. 185.). Durch sein Blut wükt nämlich nach unsrer Darstellung das Herz auf das Gehirn besonders leiblich erregend, dadurch die psychische Thätigkeit aufschauend und namentlich die Geistesthätigkeit bedingend; durch seine Nervenverbindung aber hängt es mit dem Geföhle zusammen. Bey Thieren ist also der sensible Verkehr

von Herz und Gehirn stärker, das Gefühl mehr überwiegend über die Erkenntniß; und das leibliche Gefühl mehr vorherrschend, als bey dem Menschen.

§. 409. Das Athmen wirkt auf die Hirnthätigkeit zunächst durch Bildung von arteriösem Blute, dessen Zutritt zum Gehirne eine nothwendige Bedingung für dessen Thätigkeit ist. Wenn venöses Blut eines Thiers in die Carotis desselben gespritzt wird, oder wenn man das Blut aus den Arterien, welches aber wegen Hemmung des Athmens schwarz geblieben ist, in die Carotis eines andern Thiers spritzt, oder wenn man das Blut unmittelbar aus dem untern Theile der Carotis des einen Thiers, dessen Athmen man unterdrückt, in den obern Theil der Carotis eines andern Thiers überströmen läßt, so wird dadurch Empfindung und willkührliche Bewegung eben so aufgehoben, wie bey der Erstickung (*Bichat recherches* p. 239. 243.). Wir dürften daher den Erstickungstod für ein Sterben des Gehirns aus Mangel an arteriösem Blut erklären.

§. 410. Ausserdem dürfen wir nicht zweifeln, daß die Lungen auch durch ihre Nerven auf das Gehirn einwirken, da sie durch dieselben von ihm bestimmt werden (§. 285.), da jeder Einwirkung eine Rückwirkung entspricht, und mit jedem Nerven eine gegenseitige Beziehung von Centrum und Peripherie gegeben ist. Wenn nach Durchschneidung des zehnten Hirnnerven das Thier leben bleibt, so wird es nach Arneemann (66. 104. 105. 110. Vex.) und Cruikshank (*Reils Archiv* II. S. 59. 61.) schläfrig, muthlos, furchtsam, nach Blainville traurig und sehr empfindlich oder fühllos. So können auch manche Wirkungen von Lungenaffectio auf das Gehirn nicht anders, als durch Wüthsamkeit dieses Nerven vermittelt seyn, z. B. in dem Falle, wo eine in einem Luftröhrenste steckende Krebscheere Anfälle von Wahnsinn und Schlafwandel verursachte (*Gräves Journ.* III. S. 579.).

§. 411. Die Seelenthätigkeit überhaupt steht in einem Zusammenhange mit dem Athmen: sie ist unter übrigens gleichen Umständen lebhafter und kräftiger bey reiner, freyer, mächtig schwerer und trockner Luft, und bey gehörig entwickelten, großen, gesunden Lungen; bey trüber, leichter, nehliger, feuchter Luft ist der Kopf schwer, benommen, die Seele träge und schläfrig. So schwindet, wie das Athmen, sey es, daß es durch unathembare Luft, oder durch mechanische Gewalt, oder durch einen organischen Fehler gehemmt wird, auch das Bewußtseyn. Man könnte zwar die Fälle des Scheintodes, wo das Bewußtseyn sich erhielt, dagegen anführen: allein erstlich ist in diesen Fällen für immer das Bewußtseyn anfänglich aufgehoben, und wenn es sich küssert, so ist es nurwiedergekehrt durch ein partielles Erwachen; zweytens dauern die Athembewegungen noch fort, wenn sie auch so gering sind, daß man sie nicht selbst sehen, sondern nur aus dem Wehen einer vorgehaltenen Feder oder Lichtflamme zu erkennen im Stande ist; drittens, wenn dies auch nicht der Fall ist, so dauert noch der Kreislauf des Bluts durch die Lungen, also auch ein unmerkliches Athmen fort, denn so lange der Scheintod anhält, fließt, wenn auch wenig, doch etwas Blut aus der geöffneten Ader, und die Haut färbt sich nicht blaulich, wie bey der Ersticken; — In allen diesen Fällen ist die Localaffectio der Lungen gering: man erkennt die nachtheilige Beschaffenheit der Luft und das Stocken des Athmens nicht sowohl unmittelbar und an einer Beschwerde in der Brust, als vielmehr an den Wirkungen auf das Gehirn. Es ist mithin auf das Product des gestörten oder gehemmten Athmens,

also das unvollkommen oder gar nicht umgewandelte schwarze Blut, was hier störend auf das Gehirn wirkt. Nun tritt aber das Blut mit dem ganzen Gehirn in Conflict, und zwar wirkt es theils durch seine Bewegung (§. 267. fgg.), theils durch seine chemische Beschaffenheit (§. 398.) auf Thätigkeiten desselben ein, deren wir uns nicht bewußt werden: es wirkt also auf das gesammte pflanzliche Hirnleben. Wenn es also, wie wir gesehen haben, ohne daß wir das Zwischenglieder im Bewußtseyn erkennen, den Zustand der Seelenthätigkeit bestimmt, so vermag es dies nur vermittelt seines Einflusses auf die pflanzliche Hirnthätigkeit: folglich muß die Gesammtzahl des Seelenlebens durch das pflanzliche Hirnleben bedingt seyn.

§. 412. Was aber die besondern Richtungen der Seelenthätigkeit betrifft, so wirkt das Athmen zunächst auf das Gefühl, indem die Beschränkung desselben eine Bedrückung und Beklemmung herbeyführt, welche zum peinigendsten Angstgeföhle wird. So zeigt sich auch eine Beziehung zur Willenskraft: freyes Athmen in reiner Luft verursacht Wohlbehagen, Gefühl erhöhter Kraft und Geneigtheit zu erregenden Affecten; in trüber, feuchter, unreiner Luft ist man mehr furchtsam und muthlos. Menschen mit breiter Brust zeigen unter übrigens gleichen Umständen mehr Muth, Energie des Willens, und Kraft zum Zorne; Engbrüstige sind mehr verzagt, ärgerlich und empfindlich. Wir sehen eine solche übereinstimmende Verschiedenheit der Athmungsorgane und der Willenskraft nicht bloß bey beyden Geschlechtern, sondern auch bey den Thieren; während z. B. das Insect bey seinen ausgebreiteten Athmungsorganen und seinem freyen unmittelbaren Verkehr mit der Luft, schon Zorn und Liebe äußert, zeigt der Fisch, auf welchen die Luft nur mittelst des Wassers wirkt, kaum eine Spur von Gemüthsbewegung. So ist auch in Lungenkrankheiten das Gemüth mehr afficirt, als die Geistesthätigkeit. — Das Athmen kann aber auf doppelte Weisa, entweder durch das Blut, oder durch die Nerven auf das Gehirn wirken: wirkt es mittelst des Blutes, so muß es auf das pflanzliche Leben des ganzen Gehirns seinen Einfluß ausüben, und dann muß diese Gesamtheit mit der Gemüthsthätigkeit in unmittelbarer Verbindung stehen; pflanzt sich die Spannung und der dynamische Zustand der Lungen durch Nerven auf das Gehirn fort, so kann dadurch nur das verlängerte Mark und das Rückenmark afficirt werden, und dann müssen zwischen diesen Organen und der Gemüthsthätigkeit nähere Beziehungen Statt finden.

§. 413. Der Zustand der Verdauungsorgane wirkt auf die Seelenthätigkeit ein, und zwar zuvörderst durch Erregung des Geföhls, des Nahrungsbedürfnisses und durch Erweckung des Nahrungstriebes. Das Bedürfniß des Athmens dauert ununterbrochen fort oder erneuert sich nach wenigen Pulsschlägen, während das der Nahrung ungleich später eintritt, und viel längere Zeit unbefriedigt bleiben kann. Bey dem Athmen zeigt sich also das Leibliche anhaltend herrschend oder stetig in die Seelenthätigkeit eingreifend, während die Verdauung nur nach größern Zeiträumen solchen Einfluß ausübt. Aber dieser Unterschied wird dadurch ausgeglichen, daß das Athmungsbedürfniß ohne Zuthun von Bewußtseyn und Willkühr durch das pflanzliche Hirnleben befriedigt wird, das Nahrungsbedürfniß hingegen die Aufmerksamkeit nothwendig in Anspruch nimmt, und willkührliche Bewegungen anregt. Der Einfluß des Magens ruft die Vorstellung der Nahrung

in der Seele hervor. Indem nun die Nahrung überhaupt, oder die von der angemessenen Art und in dem angemessenen Zustande sich nicht selbst darbietet, sondern erst durch willkürliche Bewegung, geleitet von der sinnlichen Wahrnehmung, so wie vom Urtheile erlangt wird, weckt das Nahrungsbedürfnis zuerst die geistige Thätigkeit, und hat in sofern viel mehr Einfluß auf die Entwicklung der Seelenkraft, als das Athmungsbedürfnis. Daher sehen wir denn auch, daß die Thiere, welche fest sitzen und ihre Nahrung bloß erwarten, von denen, welche derselben nachgeben; diejenigen, welche Allerley ohne Auswahl verzehren oder ihre bestimmte Nahrung in ihrer nächsten Umgebung schon vorbereitet finden, von denen, welche sich die ihnen zuzugende Nahrung suchen müssen; diejenigen, welche von Pflanzen, als passiv sich verhaltenden Naturkörpern leben, von denen, welche animalischer Kost bedürfen, also Thiere erzeilen, überlisten, überwältigen müssen, durch geringere Entwicklung der Seelenthätigkeit sich unterscheiden. Offenbar werden Thiere derselben Art unter übrigens gleichen Umständen im Zustande der Freyheit, wo sie sich ihre Nahrung selbst verschaffen müssen, psychisch thätiger, und klüger, als in der Sklaverey, wo der psychische Impuls im Sinnen und Trachten nach Nahrung wegfällt. Auf der andern Seite ist es aber auch nicht minder klar, daß bey den Thierarten, welche, um die ihnen entsprechende Nahrung zu erlangen, mehr überlegen und urtheilen müssen, auch ursprünglich mehr psychische Anlagen vorhanden sind. So erscheint denn die Seelenkraft selbst in Uebereinstimmung mit dem leiblichen Bedürfnisse, als ein organisches Mittel der Selbsterhaltung: wie die Natur jedem Wesen die zu seiner Erhaltung nöthigen Organe und körperlichen Kräfte gibt, so ertheilt sie ihm auch die entsprechende Seelenkraft, welche jene Organe und Kräfte leitet und bestimmt. Daß übrigens jene Verhältnisse auch von dem Menschengeschlechte, von den verschiedenen Völkern und von einzelnen Individuen gelten, leuchtet von selbst ein, und wird überall durch die Erfahrung nachgewiesen. — Daß übrigens der Nahrungstrieb vorzüglich durch den sechsten Hirnnerven geweckt wird, ist nicht unwahrscheinlich. Nach Durchschneidung desselben verlieren die Thiere die Fresslust, entweder weil der Magen zur Verdauung ungeschickt, oder das Gehirn für den Eindruck unempfindlich, oder der Eindruck des Magens auf das Gehirn unmöglich gemacht worden ist. Einem oder zwey Tage später fangen die Thiere wieder an, Nahrung zu nehmen, vielleicht weil nun der leere Zustand des Magens vermittelt der Rumpfnerven und des Rückenmarks auf das Gehirn einwirkt; vielleicht auch weil die Seele ohne ein Gefühl des Bedürfnisses, bloß durch die Vorstellung der Nahrung bestimmt, die gewohnten Bewegungen erregt. Dies mag auch der Fall seyn bey denselben Thieren, welche unmittelbar nach Durchschneidung des Nerven das ihnen gereichte Futter verzehren.

§. 414. Im Anfange der Verdauung, wo sich der Magen in voller Thätigkeit befindet, ist der Geist trüger, nur zu leichterer Beschäftigung geneigt, zu ernstem Nachdenken weniger aufgelegt; wird er durch freyen Willen oder durch den Reiz der Gegenstände doch dazu veranlaßt, so geschieht es nur mit größerer Anstrengung und mit geringerem Erfolge, als sonst: die Aufmerksamkeit ist minder gespannt, das Urtheil minder eindringend, die Combination minder glücklich. In einem Falle, den ich beobachtete, bekam ein Mann, als er unmittelbar nach einer starken Mahlzeit eine sehr schwierige Berechnung zu Stande brachte, plötzlich einen heftigen Kopf-

schmerz, der periodisch, dann anhaltend wurde; nach dem dadurch herbeigeführten Tode fand ich eine große Hydatide in den Seitenhöhlen. — Nach zu reichlichem Genuße von Nahrungsmitteln treten jene Wirkungen noch stärker hervor; der Kopf wird schwer und düster, die Phantasie erlahmt, die Fassungskraft wird geschwächt, es entsteht Stumpfsinn, Trägheit, Schläfrigkeit und unzufriedene, verdrießliche Stimmung. Wenn man eine Zeitlang nur wenige und leichte Speisen genießt, oder sich der Nahrung Tagelang gütlich enthält, oder auch durch Purgazten die Darmausleerung vermehrt, und dabey geistig sich anstrengt, so ist die Seele regserter, die Phantasie lebhafter, das Urtheil schärfer. Indem aber die Anfüllung der Verdauungsorgane auf diese Weise als ein den Flug des Geistes hemmendes Gewicht sich äussert, so erscheint sie doch auf der andern Seite auch als ein regulirendes Gegengewicht, als ein Ballast, welcher das normale Ebenmaße im Leben erhält. Denn das Fasten giebt zwar eine momentane Steigerung der Geisteskraft, aber ohne Ausdauer; die Phantasie wird zwar sehr regsam, gewinnt aber auch eine so reißende Schnelligkeit, daß ihr der Verstand nicht zu folgen vermag, und erlangt ein solches Uebergewicht, daß sie von der Vernunft sich nicht mehr zügeln läßt: so wird mehr Schwärmerey, als tiefes Eindringen und kräftiges Erfassen der Wahrheit dadurch begünstigt. Bey dem durch Verschließung der Speiseröhre verursachten Hungertode ist zwar anfangs die Geistesthätigkeit ungeschwächt, und die Seele noch im Schlafe mit klaren, heitern Träumen beschäftigt, aber allmählig läßt die geistige Energie nach, und es treten Delirien ein. — Je nachdem die gewöhnlichen Nahrungsmittel leichter oder schwerer zu verdauen, nahrungsloser oder nahrhafter; kühlend oder erhaltend, vegetabilisch oder animalisch sind, wird auch die Seelenthätigkeit modificirt: doch diese übrigen zu Tage liegende Wirkung können wir hier nicht weiter verfolgen; da sie in ihren ursächlichen Momenten verwickelter ist, und nicht bloß durch die Verdauung, sondern auch durch die Mischung und Bewegung des Blutes, so wie durch die gesammte Erregung und Ernährung vermittelt wird.

§. 415. Anhäufung verdorbener Stoffe im Magen verursacht Trägheit, Unlust, Kopfschmerz, Schwindel und Mangel an Kraft und an Ausdauer im Denken. — Die Ekelcur giebt eins der wirksamsten Heilmittel in Seelenkrankheiten ab; eine beginnende Störung der Seele mit Benommenheit, Irreden, Apathie, Melancholie wird oft durch einige Brechmittel gehoben. Die Schwindelcur, welche den Rasenden zur Ruhe, den Verrückten zu Verstande, den Stumpfsinnigen zur Thätigkeit bringt, wirkt zwar zum Theil auch durch das erregte Erbrechen, vorzüglich aber wohl durch die Veränderungen des Blutlaufs im Gehirn und durch den Schwindel selbst.

§. 416. Der Zustand des Darmcanals wirkt, gleich dem des Magens, besonders auf die Geistesthätigkeit. Bey Leibverstopfung ist der Kopf benommen und das Denken erschwert; nach einer angemessenen Ausleerung wird der Geist wieder freyer, lebendiger und kräftiger, die Stimmung natürlicher und heitrer, und das Gemüth gleichsam sich selbst wieder gegeben. Die Wirkungen des Darmcanals sind verschieden, nach Maassgabe des Erregungszustandes. Torpidität in den Verdauungsorganen, Trägheit der Absonderung und überhaupt des Wechsels der Materie in ihnen, Anhäufung von Würmern, Schleim und andern ausgearteten Stoffen stört oder lähmt die Geistesthätigkeit, und er-

zeugt Gedächtnisschwäche und Stumpfseinn. Zuweilen kann aber auch die Seelenthätigkeit durch eine widernatürliche Reizung des Darms gesteigert werden, wie man denn Beyspiele hat, daß Kinder von sehr schwachen Geisteskräften, während sie an Wormbeschwerden und davon herrührenden Schmerzen und Convulsionen litten, eine ausserordentliche Lebhaftigkeit des Geistes zeigten, die nach dem Abgange der Würmer sich wieder verlor (*Rahn in Ludwig script. neur. IV. p. 353. 599.*).

§. 417. Ganz anders wirken die Abnormitäten in dem Gefäßsysteme der Verdauungsorgane und in dem mit demselben verknüpften Rumpfnerven: hier wird nämlich im Ganzen genommen mehr die Gemüthsseite und die derselben verwandte Phantasie afficirt. Hämorrhoidalische Stockungen können Visionen erregen, welche nach dem Ansetzen von Blutgehn an den After verschwinden. Noch häufiger erzeugen sie Trübsinn und Aengstlichkeit. Die Hypochondrie mit ihren Aengsten, Besorgnissen und Einbildungen hat im Pfortadersysteme und in den Bauchgeflechten des Rumpfnerven ihren vorzüglichsten Sitz. Unterdrückung der Hämorrhoiden soll eine misstrauische Gemüthsart, besonders in Beziehung auf Eigenthumsverhältnisse erzeugen (Tübinger Dissertationen III. S. 98). Allgemeiner ist die Erfahrung, daß die periodische fixe Sucht oder die sogenannte Manie ohne Verrücktheit, die als Wuth, Zerstörungssucht, Brandstiftungssucht, Mordsucht sich äussert, in abnormer Erregung der Bauchgeflechte und der Gefäße der Unterleibshöhle begründet ist.

§. 418. Die Wirkung der Leberthätigkeit auf den psychischen Zustand besteht darin, daß sie eine Spannung und Aufregung setzt und die egoistischen Triebe stärker hervorruft. Menschen, bey welchen die Leber mehr entwickelt und unter den plastischen Organen vorherrschend ist, zeigen eine höhere Spannung in den Seelenthätigkeiten, lebhafter Empfänglichkeit, Regsamkeit, und vielseitige Geschäftigkeit; ferner Geneigtheit zu Aufwallungen, Heftigkeit in den Aeusserungen, Hartnäckigkeit in Meynungen und Bestrebungen, und Energie des Charakters; endlich Ehrgeiz und Herrschsucht. Bey zu geringer Entwicklung und Thätigkeit der Leber zeigt sich mehr Schläffheit und Trägheit in den Sedonwirkungen, Gleichgültigkeit, Liebe zur Ruhe und Mangel an Ausdauer. Wie im höhern Mannesalter die Leber stärker hervortreten beginnt, so regen sich auch in der Seele, die früher davon frey gewesen war, die egoistischen Triebe, der Drang nach Ruhm, Macht, Besitz, und die feindseligen Gesinnungen gegen das entgegen Tretende. Der Leberkranke ist reizbar, unruhig, aufgereg, und diese Aufregung wendet sich entweder nach innen, wo sie als Bangen und Zagen, als kindische Todesfurcht und auf die lieblichsten Abwege gerathende Besorglichkeit für das Leben sich äussert; oder sie bezieht sich auf äussere Objecte, und tritt aus Zornmüthigkeit, Aergerlichkeit, Grollsucht und Misanth hervor.

§. 419. Die Milz scheint sich von der Leber dadurch zu unterscheiden, daß sie weniger mit dem Begehrungsvermögen, und mehr mit dem Gefühle verwandt ist. Die Vorläufer ihrer Entzündung sind Traurigkeit, Verdrüsslichkeit und krankhafte Empfindlichkeit. Auch bey ihren chronischen Krankheiten ist die Gemüthsstimmung gewöhnlich mürrisch und düster, bisweilen bis zum Selbstmorde. Bey der Hypochondrie und bey

den eigentlichen Seelenkrankheiten, namentlich bey der Melancholie, findet man die Milz oft krank.

§. 420. Das Harnsystem scheint keinen speciſischen Einfluß auf die Seelenthätigkeit auszuüben. Wenn man bey Entzündung der Nieren Verdrüßlichkeit und Verschlossenheit, bey großer Zerstörung derselben mürrische Stimmung und Torpidität, und bey Harnsteinen Beklemmung beobachtet (Kleatsch p. 23), so sind diese Veränderungen wohl schwerlich etwas Andres, als die allgemeinen Wirkungen krenkhafter Zustände auf das Gefühl.

§. 421. Die Lebendigkeit der Zeugungsorgane weckt in dem Geiste die Vorstellung von Geschlechterverhältnissen, giebt dem Gefühle eine denselben entsprechende Richtung, und bestimmt die Begehrungen. Wie die durch organische Verhältnisse, durch Speisen, Getränke, Lage erregte Turgescenz der Genitalien in der Phantasie die entsprechenden Vorstellungen hervorruft, zeigt sich am deutlichsten im Schlafe, wo die Seele im Traume einen Text dazu dichtet, wie bey dem wachenden Willen die organische Kraft der Genitalien den gegebenen Text componirt: die Function und ihre Vorstellung sind also innig verbunden und in Wechselwirkung. Noch tiefer greift der Einfluß der Geschlechtsorgane in das Gefühl ein, indem er hier nicht bloß den stanklieben Kitzel und die Sehnsucht nach der Begattung erregt, sondern auch über das Sittliche sich verbreitet, insofern dasselbe mit der Fortpflanzung in Beziehung steht. Mit dem Eintritte der Pubertät hört die Unbefangenheit gegen das andre Geschlecht auf, und die Ahnung des künftigen Verhältnisses spricht sich nach Messung der Individualität als zarte Schonung oder Blödigkeit, als achtende Aufmerksamkeit oder Verschämtheit aus, und mit der ersten Liebe tritt die Seele in eine ganze Welt neuer Gefühle. So wird endlich nicht bloß der Geschlechtstrieb geweckt, der, wo der Verstand ihn nicht zügelt, in den gewaltseamsten Ausbrüchen hervortritt und eine sonst heyspiellose Stärke in der Muskelkraft entwickelt, sondern es wird auch der Wille auf alle mit der Fortpflanzung in Beziehung stehenden Verhältnisse gelenkt. Was in dem einen Thiere durch Gefühlsfähigkeit und Wachsthum für die Fortpflanzung geschieht, wird bey dem andern durch willkührliche Thätigkeit und Kunsttrieb vollzogen: dort schafft die bildende Kraft einen Uterus, hier banet sich das Thier ein Nest zum Brüten; dort ist durch Gefühlsfähigkeit dem Jungen nührender Stoff zu seiner vollen Entwicklung beygegeben; hier nährt die Mutter das Geborne an ihren Brüsten. Jede Thierseele ist also in Uebereinstimmung mit dem Bone und dem Leben des Körpers besonders organisiert. Was sie ober bewußtlos vollzieht, dasselbe verrichtet bey dem Menschen das Gemüth und die Ueberlegung, und es findet dabey ein solch unmerklicher Uebergang Statt, daß keine scharfe Gränzlinie gezogen werden kann: z. B. an der Furchtsamkeit und Behutsamkeit der Schwangeren hat sowohl ein gegebenes dunkles Gefühl, als die Besonnenheit und der Gedanke an die zu schützende Frucht Antheil, und bey dem Anlegen des Kindes an die Brust wirkt sowohl der Trieb, sich des drückenden Ueberflusses zu entledigen, als die liebevolle Sorge.

§. 422. Wie die Geschlechtsfunction selbst ein Heraustraten der Lebenskraft aus dem Bezirke der Individualität in die Allgemeinheit der Gattung ist, so schließt sie auch Geist und Gemüth der Universalität auf, und besiegt den Egoismus, oder giebt ihm vielmehr

seine höhere Bedeutung, indem sie zu der Ahaung oder zu der Erkenntniß führt, daß die wahre Lebendigkeit im Ganzen ruht. Die Natur verlangt eine Function, welche nur in Vereinigung mit einem andern, derselben eben so bedürftigen Individuum vollzogen werden kann; es ist ein gemeinschaftlicher Lebensact zweyer Individuen zu Erhaltung der Gattung. So ruft die Zeugungskraft Geschlechtsliebe und Kinderliebe hervor: die leibliche Function ist hier in das Geistige übergetragen; das Individuum genügt sich nicht, sondern sucht sein Leben in Andern. Diese andern Individuen sind es aber eigentlich nicht selbst, was es sucht, sonder nur das Medium, durch welches es zur Verbindung mit dem Ganzen gelangt; die Individualität vermag nicht, sich unmittelbar mit diesem zu einen, sie bedarf eines Abbildes, und die geliebten Wesen sind ihr die Vermittler und Stellvertreter des Weltalls. - So zieht denn mit der Liebe ein menschlicherer Sinn in das Gemüth ein: man wird sanfter, schonender, wohlwollender, mildthätiger; man fühlt lebendiger die Bande, welche uns an die gesammte Menschheit knüpfen. Diese Empfindungen erwachsen zu dem Gefühle des Höchsten, Allumfassenden, und Andacht trägt die Seele über das Irdische empor. Aus der so erwachten Gefühlsreligion reißt dann der in der Vernunft stehende sich gründende religiöse Sinn heran, und aus dem Gefühle allgemeinen Wohlwollens bildet sich der sittliche Charakter. - Dies ist die naturgemäße Stufenleiter, auf welcher die Seele von sinnlichem Boden erst im gegebenen Gefühle und in dunkler Ahaung, dann in klarem Bewußtseyn und in eigener Thatkraft zu dem Himmlischen sich erhebt; diesen Gang nimmt die Bildung in dem unverdorbenen Menschen, bey welchem mit der geistigen Entwicklung das Leben erst seine wahre und volle Bedeutung gewinnt. Anders muß es freylich seyn, wo innre und äussere Verhältnisse die freye Entfaltung des eigentlich Menschlichen bindern; aber auch noch in den Verirrungen finden sich Spuren von der Macht der Zeugungskraft. Wenn mit der Pubertät der Sinn für die Universalität erwacht, der Enthusiasmus für Menschenwohl und die Gluth der Andacht die Seele füllt, so entsteht oft das Aftergebilde religiöser Schwärmerey und kosmopolitischer Phantasterey. Wo das Geschlechtsverhältniß, bevor es noch seine sittliche Seite hat entfalten können, in seiner Materialität hervortritt, wo die erwachte Zeugungskraft, ehe sie ihren Einfluß auf die psychische Entwicklung ausgeübt hat, in sinnlicher Lust sich ergiebt, da bilden sich nur taube Blüten: in gemeinem Sinne, im Mangel an Empfänglichkeit für das Große und Edle schrumpft die Seele zu engherzigem Egoismus und roher Begier zusammen; glücklich genug, wenn die Anklänge aus dem kurzen Zeitraume der Unschuld späterhin noch wiederhallen! So ist in der Seele des Castraten der Charakter der Selbstsucht stehend, mit den Organen der plastischen Beziehung zum Organismus der Menschheit ist ihm auch die Kraft des Gemüths dafür genommen. So ist ferner der Weibling, dessen Genitalien in unvollkommener Entwicklung mehr den weiblichen Charakter, dadurch aber vielmehr den der Indifferenz und Nullität an sich tragen, ein eitles, selbstgefälliges, nur im Tande der Welt lebendes Wesen. Wenn bey der Ausschweifung noch eine gewisse Zartheit der Empfindung sich behauptet hat, und dann Eriechöpfung der körperlichen Kräfte eingetreten ist, oder wenn die Zeugungslust Hindernisse der Befriedigung gefunden hat, so entsteht ein Hang zu religiöser Schwärmerey; dem erschöpften Lüstlinge und der einsam gebliebenen Jungfrau, oder der früh

verwilteten lebenslustigen Frau ist die Frömmleley und der Mysticismus eine Art Wohlthust, und so zeigt sich noch in diesen Anmuthungen der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Zeugung und Sinn für Universalität.

§. 423. Die Zeugungsorgane wirken ferner auf die Stimmung und Energie der gesammten Seelenthätigkeit. Ist die Lebensthätigkeit und Secretion in ihnen energisch, so wird das Gefühl lebhafter, der Geist thätiger, der Wille kräftiger, und mit einer höhern Spannung ist ein stärkeres Kraftgefühl gegeben. Die Anhäufung der secretirten Feuchtigkeit verursacht, wo die in anderer Richtung thätige Seele vom Geschlechtstribe weniger ergriffen und gestört wird, durch zu große Spannung eine gewisse Trägheit des Geistes, Erschwerung des Gedankenlaufs, Unlust und Verdrossenheit. Dann tritt nach der höchsten Aufregung während der Begattung das Gefühl des wiederhergestellten Gleichgewichts ein; das leibliche Bedürfnis schweigt, die Befriedigung hinterläßt ein Gefühl von Wohlhaben, und die geistige Thätigkeit gewinnt wieder ihre volle Freyheit, ihre Lebendigkeit und Federkraft. Die Ausschweifung zerstört jede Kraft der Seele, und macht den Menschen zu einem wahren caput mortuum: anfänglich tastet sie nur die höhern Zweige an und zerknickt den zarten Sinn, das Gefühl für das Höhere und Edlere; dann saugt sie den Stamm aus, verstimmt das Gemüth, raubt der Denkkraft ihre Energie und Ausdauer, und entkräftet den Willen; endlich zerstört sie die Wurzel, und zwar so, daß sie entweder das Gedächtnis und den Verstand lähmt und zu Stumpfheit und Blödsinn führt, oder die Einheit aufhebt, die Seele zerrüttet, Ekel vor sich selbst, Lebensüberdruß und Wahnsinn erregt. — Der Geschlechtstrieb kann bey übermäßiger Heftigkeit auf Augenblicke den Verstand so übertäuben, daß die unbesonnensten und unsinnigsten Handlungen vollzogen werden, und die hitzige Befriedigung desselben versetzt in eine Art vorübergehenden Wahnsinns, wobey alle andre Sinnesthätigkeit unterdrückt, alle Besonnenheit und Ueberlegung aufgehoben und alle Kraft des Gefühls und des Willens von der Geschlechtslust verschlungen ist. So führt die Geschlechtsfunction, welche das Individuum sich selbst entrückt, an die Gränze zwischen dem höchsten Aufstreben der Seele, bey welchem sie ihre Einheit mit dem All erfährt (§. 422.) und ihrem tiefsten Falle, wo sie sich selbst entfremdet wird und in Wahnsinn verfällt. Boyde Zustände ruhen mit einander, so wie mit der Geschlechtsfunction, auf einem gemeinsamen Begriffe, nämlich dem des Aufgehens der Selbstheit: dort geht die Selbstheit in Unendlichen auf, hier geht sie im Endlichen unter; dort erreicht die Seele ihre Freyheit in der Idee, hier wird sie von den Banden der organischen Materie, von der Macht der Einseitigkeit gefesselt; dort erscheint sie in ihrer vollen Wesenheit, zu ihrem Urquelle aufsteigend und ihres Ziels sich bemächtigend, hier verliert sie sich in dem irdischen Boden der Thierheit, welcher nur als Pflanzstätte dienen sollte, sie zur Erscheinung zu bringen. In allen Epochen des Geschlechtslebens ist also die Seele beweglicher, eines höhern Aufschwungs fähiger, aber auch durch die Macht der Verhältnisse leichter in ihrer Normalität zu stören: daher kommen die Seelenkrankheiten bey dem Eintritte der Pubertät, im Wochenbette und bey dem Aufhören der Menstruation am häufigsten vor, und manche wahnsinnige Frauen sind während der Schwangerschaft verständig. Amenorrhoe ist oft Folge, zuweilen auch Anlaß der Melancholie und Manie. Der weder durch Genuß befriedigte, noch durch die Vernunft gebändigte,

und so in Geilheit ausartende Geschlechtstrieb, bleibt in der Zerrüttung der Seelenkräfte, welche er verursacht, vorherrschend, und gestaltet die Krankheit als Satyriasis und Nymphomanie.

§. 424. Der Einfluß der Hautthätigkeit auf die Seele ist im gewöhnlichen Zustande wenig bemerklich. Eine mäßig anschließende Kleidung befördert eine gewisse Rüstigkeit; in gemächlicher, weiter Bekleidung fühlt man sich weniger aufgeregt, und ist selbst muthloser. Wenn in der Manie Pantophobie, Gespensterfurcht und Schreckhaftigkeit, besonders im Finstern, hervortritt, so liegt nach Autenrieth (Tübinger Dissertation. III. S. 96.) immer ein zurückgetriebener Hautausschlag zum Grunde, wie denn die zurückgetriebene Krätze vorzüglich die Athmungsorgane afficirt und nächtliche Krankheitsanfälle erregt. Die Erregung eines abnormen Bildungsherganges in der Haut durch Einimpfen der unterdrückten Krätze, durch Waschen mit einer gesättigten Auflösung des Brechweinsteins u. s. w. gehört zu den wirksamsten Heilmitteln der Manie und Melancholie.

§. 425. Das Gehirn ist abhängig vom Rumpfe, namentlich durch Nerven, Rückenmark und Blut, und ohne Rumpf giebt es kein Hirnlehen, so wie keine mit diesem verknüpfte Seelenthätigkeit. Selbst die Köpfe, die auf einem vollständig entwickelten Rumpfe als Parasiten aufsitzen, zeigen keine menschliche Seelenthätigkeit, weil ihnen kein eigener Rumpf zugetheilt ist: hey normal gebildeten Sinnesorganen ermangeln sie doch des Wahrnehmungsvermögens, und ungeachtet ihnen Muskeln beygegeben sind, zeigen sie doch keine willkührliche, auf einen bestimmten Zweck gerichtete Bewegung. Ihre ganze Lebendigkeit besteht in bildender Thätigkeit, einem stumpfen Gemeingefühle und einer schwachen, unregelmäßigen, seelenlosen Bewegungskraft, so daß sie in psychischer Hinsicht noch tiefer, als die Polypen stehn. Wo aber zwey Köpfe auf einem gemeinschaftlichen Rumpfe stehn, auf welchen beyde gleichsam dieselben Ansprüche machen, entwickelt sich die psychische Kraft weder in dem einen, noch in dem andern, und die Natur vernichtet sehr bald wieder, was mit dem Begriffe menschlicher Individualität in so unterschiedenen Widersprüche steht. — Nur bey solchen Doppelkörpern kann eine doppelte psychische Individualität bestehen, wo jedes Gehirn mit einem eigenen vollständig entwickelten Rumpfe verbunden ist, und beyde Rumpfe nur in den untergeordneten Gebilden ihres Äußern Bereichs mit einander verwachsen sind.

§. 426. In den letzten Jahren des vorigen, und in den ersten des jetzigen Jahrhunderts hat man die Spuren des Lebens an den abgeschlagenen Köpfen unmittelbar nach der Enthauptung beobachtet, und verschiedne Meynungen darüber aufgestellt. (*Sedillot réflexions sur le supplice de la guillotine. Paris 1793. Sömmerring, Oelsner, Cabanis, Leveigiller in mémoires de la soc. méd. d'émulation. II. vol. Sur l'opinion sur le supplice de la guillotine. Paris 1797.*) Clossius über die Enthauptung. Tübingen 1797. Eschenmayer über die Enthauptung. Tübingen 1797. Eckoldt in med. chir. Ztg. 1799. I. S. 385. Wendt über die Enthauptung. Breslau 1803. Ist fortdauerndes Bewußtseyn an einem vom Körper getrennten Kopfe zu erkennen? Leipzig 1804. Schmidtmüller in med. chir. Ztg. 1803. III. S. 221. Aekermann ehendas. S. 364. Gruithuisen über die Existenz der Empfindung in den Köpfen und Rumpfen der Geköpften, Augsburg.

1808. Senff in med. chir. Zig. 1810. IV. S. 319. Klein in Elwert über die ärztliche Untersuchung des Gemüthszustandes S. 74, und in Harles Jahrbüchern der deutschen Medicin. III. Bd. S. 15. Wenn man den Finger in den mit dem Gehirne noch zusammenhängenden Theil des Rückenmarks stieß, so entstanden lebhaftere Verzerrungen des Gesichts und Verdrehen der Augen; noch fürchterlichere Gebärden erfolgten, wenn ein Trokar höher hernuf gestossen wurde: die Augen wurden krampfhaft verschlossen, die Zähne zusammengebissen. Wurde der Kopf so auf die Erde geworfen, oder so auf einen Tisch gelegt, daß die wunde Stelle berührt oder gedrückt wurde, so entstanden Krämpfe in den Gesichtsmuskeln und in der Zunge. Bey Anwendung des Galvanismus, z. B. durch Armiren des Gehörganges und der Gesichtsnerven, entstanden Zuckungen im Gesichte bis zum Zähneknirschen. Der Kopf eines Enthaupteten, mit dem Rumpfe eines andern in die galvanische Kette gebracht, gab noch stärkere Bewegungen, als wenn er mit seinem eigenen Rumpfe verbunden wurde. Diese Erscheinungen haben nichts Auffallendes; da die Reizung des Rückenmarks in den Muskeln des Rumpfs ähnliche Zuckungen erregt. Bisweilen entstanden ohne weitere Reizung Bewegungen in dem Kiefer, der Zunge und den Augen; der Mund öffnete und schloß sich, indem der Unterkiefer langsam herabsank und wieder aufgehoben wurde; die Zunge streckte sich aus dem Munde oder schlug sich nach unten hin; die Augen bewegten sich nach außen und innen. Diese Bewegungen hatten nicht den Charakter der Willkühr, sondern den des Krampfes; zuweilen erfolgte die Zusammenziehung langsam, der Nachlaß schnell. Diese Krämpfe konnten Wirkungen der Verblutung, oder einer zufälligen Reizung des Rückenmarks seyn; die Kieferbewegungen konnten Athembewegungen seyn (S. 294). Daß die Pupille in manchen Fällen noch so erregbar war, daß sie im Sonnenlichte sich verengerte, ist aus der fortdauernden Thätigkeit des Ohrsystems begreiflich. Aber man will auch beobachten haben, daß das Auge sich schloß, wenn man Sonnenlicht darauf fallen ließ, oder den Finger schnell gegen dasselbe bewegte; und daß, wenn man den Namen des Enthaupteten dem Kopfe ins Ohr rief, die geschlossenen Augen sich öffneten, und nach der Seite, von woher der Schall kam, sich hinwendeten, auch wohl der Mund sich öffnete. Dies waren unstreitig Zuckungen, dergleichen sonst ohne alle Reizung erfolgten und die hier mit jenen Einwirkungen zufällig zusammentrafen. Einige Physiologen hielten sie aber für Zeichen des im Kopfe noch fortdauernden Bewußtseyns, und erklärten die Enthauptung für eine schmerzhaft und grausame Todesart. Wie interessant auch jene Versuche in physiologischer Hinsicht seyn möchten, so war es doch ein wahres Zerrbild der Humanität und eine bittere Ironie gegen den herrschenden Blutdurst, daß man die durch Todesfurcht bereits tausendfach gemarteten Schlachtopfer zuletzt auf Rosen botten, und um ihnen die Unbequemlichkeit der Guillotine zu ersparen, sie (nach Oelensers Vorschlage) mit Kirschchlorbeeröl expediren wollte. Was jene Beobachtungen betrifft, so sind sie 1) verdächtig, weil bey ihrer Anstellung wohl selten die nöthige Gemüthsruhe Statt fand; man sah mehr, als zu sehen war, weil man sich in einem aufgeregten, gespannten Zustande befand; gläubte ja doch die Sentimentalität in vollem Ernste, daß das getrennte Haupt der Charlotte Corday in Unwillen über die unwürdige Behandlung des Henkers erröthet sey! 2) Schmidtmüller, Senff, Klein fanden in den Gesichtszügen durch-

ans keinen psychischen Ausdruck: nur momentane Bewegungen, also Zuckungen waren es, was man beobachtete. 3) Wenn das Gehirn nicht bloß kein Blut empfängt, sondern dasselbe auch in Strömen verliert, so muß das Bewußtseyn augenblicklich schwinden, da es schon bey der Ohnmacht und bey einer tiefen Verwundung des Herzens auf der Stelle erlischt. 4) Während die ohne Reiz erfolgenden Bewegungen noch sich zeigten, konnten Eckoldt und Senif durch Schneiden und Stechen des Gesichts keine Erregung: unmöglich konnte bey so erloschenen Gemeingefühle noch Sinneswahrnehmung bestehen. 5) Wenn ein Mensch ohne alle Verwundung mit dem Kopfe eben so gewaltsam auf den Boden stürzt, wie hier der abgeschlagene Kopf vom Rumpfe fliegt, so verliert er durch die Erschütterung das Bewußtseyn, und wird durch keine Nennung seines Namens geweckt; schon die Hirnerschütterung bey diesem Falle müßte also das Bewußtseyn auflieben.

§ 427. Der unmittelbarste Verkehr zwischen Seele und Leib findet bey Empfindung und Bewegung Statt. Die Empfindung ist eben nichts Anders, als die mit Bewußtseyn verbundene Aenderung des Seelenzustandes durch den Lebenszustand des Leibes; dieser wirkt hier bestimmend auf die Seele ein, aber die Seele verhält sich nur zum Theil passiv dagegen, so daß ihre Affection als ein subjectiver Zustand derselben hervortritt; zum Theil wirkt sie selbstthätig entgegen; unterscheidet sich im Bewußtseyn von ihrer Affection, als einem Fremdartigen, und faßt das, was die Affection veranlaßt, objectiv auf. In jeder Empfindung ist subjective Veränderung und objective Thätigkeit der Seele vorhanden; aber beyde stehn bey den einzelnen Arten der Empfindung in verschiedenen Verhältnissen zu einander, und zwar so, daß die stärkere Subjectivität die Uebermacht des Aeußern bezeichnet; die stärkere Objectivität hingegen einer höhern Entwicklung der Selbstständigkeit der Seele entspricht.

§ 428. Das Gemeingefühl des Leibes zeigt vorherrschende Subjectivität: es giebt der Seele eine gewisse Stimmung, versetzt den Geist bald in regere Thätigkeit, bald in einen Zustand von Trägheit und Kraftlosigkeit, und macht das Gemüth bald frey und heiter, bald düster und beklommen. Während es in seiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit auf solche Weise wirkt, nähert es sich mehr der Objectivität, wenn es sich mehr auf bestimmte Formen der Lebensthätigkeit, auf einzelne Functionen bezieht, denn hier giebt es der Seele eine bestimmte Richtung, und ruft besondere Vorstellungen und Beghrungen hervor. Dadurch wird das Gemeingefühl die Grundlage der psychischen Entwicklung. Die individuelle Seele muß als ein endliches Wesen durch den Gegensatz geweckt, durch die Hemmung gereizt werden, ehe sie so weit erstarkt, um aus innern Antrieben zu wirken und sich selbstthätig auszubilden. Ihre Erzieherin, die Natur, legt ihr den Schmerz auf, damit sie in seiner Ueberwindung ihre Kraft entwickle und übe. Der Schmerz des Hungers, des Durstes, des Frostes ist die Elementarschule des Menschenschlechts: es würde ohne denselben nie zu einer höhern Stufe der Entwicklung gelangen.

§ 429. Die Sinne geben eine mehr objectivere Erkenntniß, und bieten der Seele Reiz und Stoff zur Thätigkeit dar, ohne jedoch der Subjectivität sich je völlig entschlagen zu können. Mit ihnen beginnt das psychische Leben erst sich zu gestalten, da es,

so lange nur das Gemüthsgefühl waltet, trübe, verworren und nur im Keime vorhanden ist.

§. 430. Die Muskelbewegung hat Einfluß auf das Seelenleben, insofern sie bey der sinnlichen Erkenntniß mitwirkt, und mehr oder weniger in jede Sinnesthätigkeit ein greift. Ausserdem wirkt sie auf die allgemeine Stimmung der Seele. Das Gefühl von Muskelkraft giebt unter übrigen gleichen Umständen mehr Muth und Gewandtheit zu rüstigen Affecten; der körperliche Muth ist eben nichts Andres, als das Bewußtseyn der Muskelkraft, welches die Ueberzeugung giebt, daß wir siegen werden, während der Seelenmuth die Entschlossenheit ist, für einen bestimmten Zweck, zu Verwirklichung eines Gedankens zu wägen, zu dolden und selbst unterzugehen. Muskelschwäche macht furchtsam und zu Besorgniß; Mistranen, Aerger geneigt. Die Bewegung des Körpers muß, da sie auf Kreislauf und Athmen beschleunigend einwirkt, auch die Bewegung des Gehirns verstärken. Sie regt die Phantasie mehr auf, und begünstigt rüstige Affecte: der Zorn steigt, je stärker man sich dabey bewegt; kommt man erst zum Sitzen, so läßt er bald nach. Bey schnellerem Gehen wird auch der Gedankenlauf schneller; faules Gehen macht schläfrig, und eine träge Lebensweise, eine zu lange fortgesetzte Ruhe hat Stumpfheit und Trägheit der Seele zur Folge. Selbst die durch eine Hirnabnormität bewirkte Betäubung kann durch starkes Rütteln des Körpers unterbrochen werden. — Die abnorme krampfhafter Bewegung hebt mit seltenen Ausnahmen (Nr. 514) das Bewußtseyn auf, und hat Störung oder Unterdrückung der Seelenthätigkeit zur Folge: nach convulsivischen Anfällen erfolgt Irrereden (Nr. 997), oder Betäubung (Nr. 687. 1057). Die Epilepsie verursacht Schwäche der Geisteskraft und Blödsinn, und zwar um so mehr, je langwieriger sie ist, und je heftiger und häufiger ihre Anfälle sind.

2. Einwirkung der Seele auf den Leib.

§. 431. Was die Einwirkung der Seele auf den Leib betrifft, so bemerken wir zuvörderst, daß unsre geistige Thätigkeit keinen Einfluß auf den Kreislauf des Bluts zeigt: bey reinem, tiefem Nachdenken bleiben Herzschlag, Röthe und Wärme unsres Körpers unverändert. Diese Erscheinungen ändern sich aber, sobald zur geistigen Thätigkeit eine Aufregung des Gemüths sich gesellt, sobald das Gelingen oder Mislungen unsres Denkens, das eifrige Verlangen nach Wahrheit oder die Erkenntniß derselben; das unsrer Subjectivität zusagende oder widrig ihr entgegen tretende Resultat der Forschung unser Gefühl ergreift. Da nun die geistige Kraft nicht leicht eine längere Reihe ihrer Operationen vornehmen kann, ohne das Gefühl zu berühren, so ist auch während des Wachens als des Zustandes freyer geistiger Selbstthätigkeit im Ganzen genommen der Herzschlag mehr aufgeregt; im Schlafe dagegen wird der Puls ruhiger und der Kreislauf gleichförmiger, und nur von lebhaften Träumen, wo die Phantasie unser Gefühl stark bewegt hat, erwachen wir erhitet und mit klopfendem Herzen. Bey jeder Gemüthsbewegung haben wir, indem der Pulsschlag sich ändert, ein eignes Gefühl im Herzen: der Sprachgebrauch, daß das Herz uns weh thut, wenn wir uns grämen, daß die Sorge das Herz drückt, der Kummer am Herzen nagt, und daß das Herz für Freude springt, ist in der Beobachtung des Gemeingeühls völlig gegründet, und die Beobachtungen der Aerzte stimmen damit

überein. Die Krankheiten des Herzens sind oft die Folge heftiger Gemüthsbewegungen und kommen in bewegten Zeiten häufiger vor, wie sie denn z. B. in Frankreich während der Revolution um Vieles öfter beobachtet wurden, als früher (*Corvaisant des maladies du coeur* p. 372.); die Leichenöffnung hat nach anhaltendem Gramme Erweiterungen und aneurismatische Ausdehnungen, nach Kummer Abmagerung des Herzens gezeigt; von Heimweh und andern leidenschaftlichen Zuständen entsteht oft Herzentzündung und in deren Folge Ausschwitzung, Verwachsung, Verknöcherung. (Kreyssig Herzkrankheiten I. S. 112. fg. 122. fg. II. S. 150). Bey schon vorhandenen organischen Krankheiten des Herzens werden Gemüthsbewegungen besonders schädlich, oft schnell tödlich, während ruhiges Nachdenken keinen Nachtheil bringt; ja bisweilen bewirkt schon ein an sich geringfügiger Affect, als Ungeduld oder Verdruss ein Aussetzen des Herzschlages oder einen tödlichen Stillstand desselben. Ueberhaupt erkennen wir, daß jedes lebhaftere Bewegtseyn unsrer psychischen Subjectivität den Herzschlag ändert. Es entsteht ein Uebergewicht venöser oder arterieller Thätigkeit im Herzen, je nachdem im Gemüthe die Contorsion oder die Expansion vorherrscht. Wo das Gefühl belastet, zu tief ergriffen und beynahe überwältigt, der Wille gelähmt oder schwankend, überhaupt das Gemüth in sich zurückgedrängt und in einem Zustande passiver Reizung begriffen ist, da ist das Herz mehr venös, es zieht mehr Blut an, und kann es nicht beherrschen, erbebt unter dessen Last und ersetzt durch Häufigkeit oder Schläge, was ihnen an Kraft abgeht; der Puls ist klein, zusammengezogen, aussetzend. So treibt die Furcht oder die Vorstellung eines bevorstehenden Übels alles Blut nach innen, indem die venöse Thätigkeit überwiegend wird über die arteriöse, expansive Kraft; der Schreck verursacht eine momentane Lähmung des Herzens; Wo nicht bloß das Gefühl einwirkender Objectivität, sondern auch das Gefühl der selbstthätigen entgegen wirkenden Subjectivität gesteigert ist, und der Wille frey wirkt, wo ein Entschluß gefaßt, eine That ausgeführt ist, kurz wo die Seele sich in einem Zustande erkennt, in welchem ihre Kräfte sich frey ergeben und ihr Ziel erreichen können; da herrscht das Herz in leichtem Spiele das Blut, und treibt es mit kräftigen Schlägen, in großen Wellen nach aussen. Man hat Fälle, wo auf der Höhe eines Affects das Herz gebohrten ist; so bey Philipp V. als er erfuhr, daß die Spanier bey Piacenza geschlagen worden waren (Zimmermann von der Erfahrung II. S. 449); bey einem Mannes im Schrecke über den Tod seiner Frau (Tissot), bey einem Züchslinge während eines heftigen Streites (Chaussier in Sammlung auserl. Abh. XII. S. 723) u. s. w. Die Berstung erfolgt durch Ueberfüllung mit Blut, weil theils mehr Blut angezogen wird und zuströmt, als ausgestoßen werden kann, theils das Herz gelähmt, zur Reaction unvernünftig und seine Systole verhindert wird. So kann auch in andern Fällen der noch heftigen Gemüthsbewegungen plötzlich eintretende Tod vom Herzen ausgehen. Bey einem kräftigen Manne, der nach unterdrücktem Zorne über die von seinem Fürsten erlittene Beleidigung gestorben war, fand man, nach Harvey's Berichte, das Herz ausserordentlich erweitert; hingegen bey einem Missethäter, welcher sich gegen die Hinrichtung während gesträuchelt hatte, fand Testa dasselbe so zusammengechnürt, daß kaum eine Höhle zu erkennen war; hier zeigte sich offenbar eine enorme Systole und gesteigerte Arteriosität, wie dort Diastole und Venösität überwiegend geworden war. — Uebrigens ist zu bemerken,

dafs jedes lebhaftere Gefühl, sowohl im Kreise der niedrigsten Sinnlichkeit, als auch im idealischen Aufschwunge auf das Herz wirkt, und dafs Letztes bey solch hoher Empfänglichkeit für Gemüthszustände doch nur ein stumpfes Gemüthgefühl hat, und für das Materielle sehr fühllos ist, indem seine äussere Berührung, seine Verwundungen und Krankheiten wenig schmerzhaft sind und oft gar nicht empfunden werden.

§. 432. Das Alterthum erkannte die Uebereinstimmung von Räumlichem und Zeitlichem, so wie von Leben und Seele, an, suchte aber den Ausdruck der innern Thätigkeit nur im räumlichen Wechsel, in der Bewegung. Man forschte nach dem, was im Organismus ursprünglich sich bewegt, und erklärte dies für das eigentliche Organ des Lebens, und somit auch der Seele. Wie daher der Sprachgebrauch unter *σῆμα*, dem bey'm Athmen und Sprechen sich bewegenden Zwerchfelle, auch das Gefühl und die Begehrung, die Wahrnehmung und die Urtheilskraft, kurz, den Inbegriff der Seelenthätigkeit verstand (Carnus Geschichte der Psychologie S. 116), so hielt Aristoteles (*de part. anim. lib. II, c. 7. p. 664. lib. III, c. 4. p. 615. de generat. anim. lib. II, c. 6. p. 684. lib. F, c. 2. p. 695*), das Herz für das Organ der Seele, weil es zuerst entstehe, unpaarig sey, in der Mitte liege, die Nerven aller Sinnesorgane aufnehme, stets sich bewege, an den Gemüthsbewegungen Theil nehme, und weil mit seiner Verletzung das Leben erlösche. Es bedarf keines Erweises, dafs unrichtige Beobachtung und einseitige Beurtheilung dieser Ansicht zum Grunde liegt. Aber wiewohl schon in einer Hippokratishen Schrift (*de morbo acuto sect. 18. p. 343*) ausgesprochen war, dafs im Herzen blofs das Gefühl wirke, und dafs man mit Unrecht auch den Sitz des Verstandes in den Präkordien suche, und wiewohl Galen (*de Hipp. et Plat. lib. I, c. 8. p. 235. lib. III, c. 6. p. 245*) bewies, dafs nicht das Herz, sondern das Gehirn der Vereinigungspunct der Nerven sey, und nicht den Verletzungen des Herzens, sondern denen des Gehirns eine Störung der Seelenthätigkeit entspreche, so hielten doch die Peripatetiker fest an dem frthume des Meisters, und noch *Levar do a Capoa* sprach es offenkundig aus; er wolle lieber seinen Augen, als einem Ausspruche des Aristoteles misstrauen (*Hallen dem. IV. p. 385*).

§. 433. Man erkannte späterhin den Gegensatz zwischen Geist und Gemüth, und somit schien es denn auch ganz natürlich, einen entsprechenden Gegensatz in den Centralorganen anzunehmen, wie denn der Sprachgebrauch bey allen Völkern das Gemüth als Herz bezeichnet, die Geisteskraft aber Kopf nennt. Die Pythagoräer, namentlich Archytas, lehrten also, dafs die Denkkräfte (*νοῦς* und *σοφία*) im Gehirne, die Begehrung und der Affekt (*ἐπιθυμία*) hingegen im Herzen ihren Sitz haben (Carnus Gesch. d. Psych. S. 187), und die Schule der Akademiker folgte ihnen. Weniger consequent war es, wenn man in unsern Zeiten blofs das Gefühlvermögen in das Herz verlegte. Bichat (*recherches p. 198*) behauptete, hier hätten die Gemüthsbewegungen ihren eigentlichen Sitz, und sie afficirten das Gehirn blofs in Folge des gestörten Kreislaufs, und beruhte sich theils darauf, dafs die Symptome des Affects zunächst nur auf das Herz sich beziehen, theils auf seine Versuche, nach welchen das Gehirn nicht unmittelbar auf den Kreislauf einzuwirken schien. Allein diese Versuche sind nach den neuern Beobachtungen (§. 301) ungültig, und was jene Symptome anlangt; so wissen wir ja zur Genüge, dafs die Störung der Functionen in dem consensuell afficirten Organe oft viel stärker hervortreten, als in dem ursprünglich

erkranken. Die gestörte Verdauung giebt sich oft bloß durch Kopfschmerz und Verstimmung des Geschmacks zu erkennen, ohne daß es Jemandem einfällt, deshalb die Verdauung im Gehirne und in der Zunge zu suchen. Auch Nasse (Zeitschrift f. psych. Aerzte. 1818. I. St. S. 85. fgg.) behauptet, die psychische Beziehung des Herzens sey von der des Gehirns unabhängig, und führt außer Bichats Gründen vorzüglich das dafür an, daß schon eine bloße Anlage zu Herzkrankheiten hinreiche, das Gemüth zu verstimmen, daß z. B. eine verkehrte Lage des Herzens zu Verbrechen bestimmen könne; indefs ist doch daraus, daß man bey einem Verbrecher das Herz in verkehrter Lage gefunden hat, noch nicht bewiesen, daß diese Lage zu dem Verbrechen bestimmt hat. Nasse stellt die Beziehung der Seele auf das Gefühl zum Herzen, ihrer Beziehung auf Bewegung zum Muskel, und zur Sensation in den Sinnesorganen gleich, und giebt dadurch das Gegentheil seiner Behauptung zu, denn nicht der Muskel spricht, sondern die Seele vom Gehirne aus durch die Muskeln, und nicht das Sinnesorgan nimmt wahr, sondern die in dem einigen Centralpuncte aller Sinnesorgane erwachende Seele: folglich würde nicht das Herz fühlen, sondern ebenfalls die im Gehirne wirkende Seele. Geist und Gemüth sind nicht verschiedene Wesen, sondern die verschiedenen Seiten derselben Seele, mithin können sie auch nicht in wesentlich verschiedenen Organen ihren Sitz haben. Im Gehirne bilden sich offenbar die sinnlichen Vorstellungen, denn alle Sinnesnerven treten in ihm zusammen, und da das Denken eine Potenzirung sinnlicher Vorstellungen ist, so muß es ebenfalls hier vor sich gehen: nun stammt aber auch das Gefühl aus Vorstellungen und Gedanken, und geht in dieselben über, folglich muß diese Einheit auch in der Identität des Organs sich aussprechen. Die Nerven aller willkürlichen Muskeln haben im Gehirne und dem vom ihm abhängigen Rückenmarke ihr centrales Ende, also muß der körperliche Wille im Gehirne seinen Sitz haben, und da der geistige Wille theils in körperlichen Bewegungen sich kund that, theils auf das Denken sich bezieht, also mit diesem gleichen Sitz haben muß, so ist auch das Gehirn nothwendig das Organ des Willens: nun ist aber der Wille nichts vom Gefühle Geschiedenes, sondern nur die reactive Seite desselben, folglich kann dieses kein besondres Organ für sich haben.

§. 434. Vom Einflusse der Seelenthätigkeit auf das gesammte plastische Leben wird unten (§. 516 — 532) die Rede seyn; den Einfluß auf die Wärmeerzeugung haben wir schon früher (§. 23) berührt. Hier wollen wir nur in dem Beyspiele der körnigen Drüsen auf die nach Maassgabe ihrer Function verschiedene Qualität dieses Einflusses aufmerksam machen. Die der Verdauung und dem Geschmackssinne beygegebenen Speicheldrüsen werden durch Aufregung des Begehrungsvermögens zu stärkerer Secretion veranlaßt: bey Lüsternheit verursacht der Anblick, ja die bloße Vorstellung leckerer Speisen, ein Ausströmen des Speichels; so fließt auch bey Lüsternheit nach Geschlechtsthat der Speichel reichlicher zu und nöthigt zu öfterem Schlucken; der Zornige spuckt, und der Wüthende schäumt, wobey selbst die Qualität des Speichels bis zur Giftigkeit ausarten kann. Ganz entgegengesetzt verhalten sich die dem Licht- und Luftsinne beygeordneten Thränenrüsen: ihre Absonderung wird nur durch Affection des Gefühls und zwar durch eine tiefe Erregung und Erschütterung desselben, sey es in Betrübniß und Schmerz, oder in Mitleid, oder in Freude, verstärkt.

§. 435. Die Geistesethätigkeit äussert keine erregenden Wirkungen auf das Athmen. Bey ruhigem Nachdenken ist das Athmen selten, schwach, fast unmerklich, der Mund geschlossen, die Brust wenig bewegt; nur von Zeit zu Zeit, und namentlich gerade dann, wenn wir im Denken nachlassen, erfolgt ein tieferer Athemzug. So können auch mancherley Brustkrankheiten, welche das anhaltende Studiren nach sich zieht, von der habituellen Unvollkommenheit des Athmens entspringen (Nasse in seiner Zeitschrift 1820. I. S. 101. 1g., und in Muckels Archiv II. S. 3.). — Die erkrankte Seele ist bald in eine Vorstellung vertieft, wo sie auf eine ähnliche Weise, wie bey tiefem Nachdenken das Athmen hemmt; bald in stumpfe Gedankenlosigkeit versunken, wo das Athmen wie von geschwächter Hirnthätigkeit (§. 297.) unvollkommener wird; bald wieder von peinlichen Gefühlen oder wilden Begehungen aufgeregt, wo das Athmen die Wirkungen des Affectes (§. 436.) erfährt. Die Leichenöffnung von Seelenkranken zeigt nach Georget (Verücktheit S. 267.) in mehr als 75 unter 100 Fällen Abnormitäten der Lungen. Greding (I. S. 334—342. II. S. 150—162. 330—334.) fand unter 367 Fällen in 280 Verwachsung der Lungen mit den Brustwänden; in 202 Verhärtungen und Knoten der Lungen; in 189 Anfüllung derselben mit schwarzem, schmierigem, oder wässrigem und schaumigem Blute, oder schaumigem Schleime; in 175 Brustwassersucht; in 169 Trockenheit und Welkheit der Lungen, und in 138 Eiterung derselben. So waren auch unter 12 Fällen, welche Pinel der Jüngere (Nasse Zeitschrift 1821. 4. St. S. 165—181.) erzählt, 6, wo die Lungen entzündet oder eiternd waren. Wenigstens in einem großen Theile dieser Fälle war die Krankheit von der Seele ausgegangen, und fast durchgängig war die Brustaffection erst zuletzt hinzugekommen.

§. 436. Besonders deutlich ist der Einfluß, welchen der Zustand unserer innern Empfindungen auf das Athmen ausübt. Dieses verändert sich nämlich bey jeder Gemüthsbewegung. Es wird schnell und häufig, wenn die Seele die Fassung verliert und von einem Gefühle fortgerissen wird; es wird kurz, beklommen und seicht, wenn die Seele sich gedrückt fühlt, bey Furcht, Betrübniß, Gram; es wird stark und tief, wenn im gesteigerten Kraftgeföhle der freye Entschluß, die Thatkraft der Seele, der Muth, der Zorn u. s. w. hervortritt. So sehen wir auch bey Thieren die mit den Athmangsorganen in Verbindung stehenden häutigen Gebilde des Kopfes und Halses während des Zornes in einen Zustand der Turgescenz treten. So bricht ferner der Affect auch in der Stimme hervor, oder hebt dieselbe an.

§. 437. Geistige Anstrengung während der Mahlzeit oder unmittelbar vor und nach derselben verlangsamt oder stört die Verdauung; ein freyes, leichtes Spiel der Seelenthätigkeit befördert sie. Der Traurige verdaut später und schlechter, als der Heitere. Eine während der Mahlzeit eingetretene Gemüthsbewegung stört oder hemmt die Verdauung, so daß, wenn erst nach einem oder einigen Tagen ein Erbrechen erfolgt, theils noch unverdaute Nahrung, theils ausgearteter Speisebrei ausgelieft wird. Während des Wachens geht die Verdauung besser von Statten, wenn anders keine besondre Anstrengung sie stört. — Wenn Helmont die Empfindung, Woodward aber das Gefühl, so wie die Vorstellungskraft in den Magen verlegten, weil man alle Gemüthsbewegungen in diesem eher spürt, als im Kopfe (Haller elem. VI. p. 339.), so thaten sie dies ungelähr mit

gleichem Rechte, mit welchem Andre das Herz als das Organ des Gefühls oder der gesammten Seelenhätigkeit betrachteten.

§. 438. Ausser dieser allgemeinen Einwirkung der Seele auf die Verdauung bemerken wir noch eine specifische. Die Aufmerksamkeit auf das Essen fördert die Verdauung; wer die Mahlzeit als eigentliches Berufsgeschäft behandeln und seine Seele in dasselbe ganz versenken kann, gedeiht ganz vorzüglich. Was der Ekstase entspricht, dem Geschmacks zusetzt und mit Vergnügen genossen wird, verdaut man leicht; was man mit Widerwillen zu sich genommen hat, erregt oft Magenbeschwerden, oder wird unverdaut weggebrochen. — Die Vorstellung des Ekelhaften ist verbunden mit der Furcht, das Widerliche, Unreine mit uns in eine nähere Berührung treten könne, und mit dem Triebe, es von uns abzuhalten. Dabey entleert sich nem der Magen in regelwidrigen Bewegungen nach aussen; er, als das Organ, vermittelt dessen tastbare Stoffe in die nächste Gemeinschaft mit unserm Organismus treten und ihm einverleibt werden, scheint gleichsam selbst von jener Furcht befallen, da er von der Vorstellung des widerlichen Gegenstandes, sie mag nun durch den Anblick oder auch durch die bloße Phantasie erregt seyn, afficirt wird. Ja, selbst der lebhafteste Widerwille gegen sittliche Schlechtigkeit und gemeine Verworfenheit kann eine dem Ekel ähnliche Empfindung verursachen. Eben so führt auch der Schwindel oder eine Verwirrung erregende Reihe von Vorstellungen Ueblichkeit herhey.

§. 439. Die Ekstase vermindert sich oder wird aufgehoben, wenn die Seele mit einem Gegenstande des Denkens und Fühlens lebhaft beschäftigt ist, oder wenn auf eine analoge Weise die Hirnthätigkeit krankhaft gesteigert und concentrirt ist, so daß sie alle Kraft in sich verwendet, von der normalen Gemeinschaft mit dem Aeussern sich zurückzieht, und gegen die Einwirkungen des Magens unempfindlich wird: in der Manie, Melancholie, Meningitis und Encephalitis. Ist dagegen die Regsamkeit der Seele geschwächt, so kann sie sich nicht in ihren höhern Functionen äussern, und ihr Ueberrest zeigt sich als eine unerwähliche Esigier: so bey chronischer Wassersucht der Hühlen (Nr. 367. 376. 378. 385. 397. 398.), oder der Hirnhäute (Nr. 346. Vgl. Beyträge I. S. 240.), bey Hypertrophie derselben (Beyträge II. S. 258.), bey Blaterrgiefung (Nr. 259.), Eiterung (Nr. 557.), Verhärtung (Nr. 875.), Erweichung (Nr. 756. 771.), und Aftergebilden (Nr. 932. 992. 1034.), wohey zum Theil der Darmcanal so torpid ist, daß Purganzen ohne Wirkung bleiben (Nr. 992.). Zuweilen treten auch bey Hirnkrankheiten, z. B. bey Erweichung (Nr. 756. 771.), sonderbare Gelüste hervor, so daß Papier, Blumen, Schlangen, Eidechsen, Mäuse, Kohlen und dergleichen mehr gierig verzehrt werden. Zuweilen ist die Seelenhätigkeit so niedergedrückt, daß die Begierde nach Nahrung nicht einmal in freyen Bewegungen sich äussern kann: die Blödsinnigen verschlingen dann hastig, was man ihnen in den Mund bringt, ohne Unterschied. Auf der höchsten Stufe der Krankheit endlich schwindet selbst diese Aeusserung, und das Eingestülste wird nur langsam und schwermüthig verschluckt. — Mit der krankhaft gesunkenen Seelenhätigkeit ist oft eine mangelhafte Absonderung von Magensaft und Darmsaft verbunden, wodurch die Ekstase vermindert, die Verdauung erschwert und Verstopfung veranlaßt wird. So verursachen auch Gemüthsbewegungen zuweilen Verstopfung, in andern Fällen Diarrhoe. Nach mehreren Be-

obachtungen (Greding II. S. 190. fgg. 344. fg. Esquirot in Meckels Archiv V. S. 297. Georget Verrücktheit S. 268.) ist bey Seelenkranken zuweilen das Gekröse so erschlaft, daß der Quergrimmdarm ganz herabsinkt, oder eine senkrechte Stellung annimmt.

§. 440. Die meisten Gemüthsbewegungen scheinen die Thätigkeit der Leber nicht anders, als andre Absonderungen und als den Kreislauf überhaupt zu afficiren: so die Freude, welche eine allgemeine Belebung erregt und somit auch die Verdauung befördert; die Tranigkeit, welche bey Schwächung der Gefäßthätigkeit und der gesammten Secretion auch die Gallenabsonderung vermindert, dadurch Mangel an Eflust, Flaculenz und Verstopfung erregt, zu Anschwellung der Leber und zu Gallensteinen disponirt, und bitteren Geschmack, schmutzige Hautfarbe und Gelbsucht voranlaßt; endlich der Schreck, welcher eine allgemeine Erschütterung hervorbringt, die Secretionen plötzlich hemmt und dabey zuweilen Bitterkeit des Mundes, Ekel, Durchfall, Rothlauf oder Gelbsucht verursacht. Für immer aber und ungleich stärker, als auf andre Functionen, also specifisch wirken auf die Thätigkeit der Leber diejenigen Affecte, bey welchen der verletzte Egoismus empört, und die Seele, einen Stachel in sich tragend, feindseligen Gesinnungen Preis gegeben ist. Der Zorn oder der freye Ausbruch dieses Gemüthszustandes verursacht reichliche, bisweilen entartete Secretion der Galle, und wenn diese Wirkung einen hohen Grad erreicht, galliges Erbrechen und galligen Durchfall, oder bitteren Geschmack, Druck im rechten Hypochondrium und in der Herzgrube, Kopfschmerz, Leberentzündung, Gallenleber, Gelbsucht, Rothlauf. Der Aerger oder die gehemmte Ausserung des Zorns wirkt auf gleiche Weise, und erregt dabey noch häufiger eine Ausartung der Galle. Groll und Neid, als schleichende und langwierige Formen dieses Gemüthszustandes, stören ebenfalls die Gallenbildung, schwächen dadurch die Verdauung, und verursachen eine schmutzige, gelbliche Farbe der Haut. — Die Behauptung, daß die Gemüthsbewegung nur die schon früher erkrankte Leber afficire, setzt entweder eine Allgemeinheit der Leberkrankheiten voraus, für welche die Erfahrung den Beweis schuldig bleibt, oder erkennt doch die spezifische Beziehung zwischen dem Affecte und der Function dieses Organs an. Uebrigens zeigt sich diese spezifische Verwandtschaft auch darin, daß die Wirkungen des Affectes nicht auf eine oder auf die andre allgemeine Form, also auf Vermehrung oder Verminderung der Absonderung, auf Beschleunigung oder Hemmung der Aussonderung, auf Schärfung und Concentrirung oder Schwächung der Qualität sich zurückführen lassen, sondern bald in dieser, bald in jener, bald in mehreren Veränderungen gleichzeitig bestehen, immer aber auf die Thätigkeit der Leber und auf die Gallenbildung sich beziehen (*Vgl. L. M. Q. Niemeyer de commercio inter animi pathemata, hepatis bilemque. Göttingen. 1795. 4.*).

§. 441. Die Harnabsonderung wird durch die Seelenthätigkeit weniger merklich veründert. Bey Furcht und Schreck wird zwar der Harn bleich und wässerig, aber, wie es scheint, weniger durch spezifische Wirkung, als vielmehr durch eine allgemeine krampfhafter Constriction, da auch bey hysterischen Anfällen und Convulsionen der Harn gleiche Veränderungen erfährt. Bey einformiger, auf einen Gegenstand gerichteter und mechanisch fortwirkender Geistesthätigkeit, z. B. bey dem Rechnen, Efst man seltner Harn.

als während des Beobachtens mannichfaltiger Gegenstände und bey Thätigkeit der Phantasie; indess kann dies theils von der allgemeinen Wirkung auf den Kreislauf und auf die Absonderung überhaupt, theils von der durch die Rückenmarksnerven bestimmten Thätigkeit der Harnblase abhängen.

§. 442. Die Zeugungsorgane haben für allgemeine Seelenzustände eine hohe, aber keine spezifische Empfänglichkeit. Eine heitere, fröhliche Stimmung belebt sie, so wie Traurigkeit, Sorge, Gram, Furcht, Schreck sie lähmt; nicht bloß jeder sehr starke Affect, sondern auch ernstes Nachdenken vermindert ihre Thätigkeit. Diese Erscheinungen zeigen nichts, als ein stärkeres Hervortreten der allgemeinen Wirkungen der Seelenzustände: die Zeugungsorgane sind hier auf gleiche Weise, wie die gesammte Plasticität, durch die Seelenthätigkeit afficirt, und zwar in den zuerst angeführten Fällen consensuell, in den letztern antagonistisch. Dagegen wird die Thätigkeit dieser Organe durch alle auf sie selbst sich beziehende Vorstellungen spezifisch bestimmt: die lebhafte Einbildung der zu erwartenden Lust setzt Turgescenz, Ergießung und in Folge derselben bey'm weiblichen Geschlechte höchst wahrscheinlich auch zeugungsartige Afterbildung. Die Einbildung des Unvermögens verursacht wirkliches, momentanes Unvermögen. Auch ohne Vorstellung der Begattung kann ein sinnlicher Eindruck, welcher auf Geschlechtsverhältnisse sich bezieht, namentlich der Anblick eines schönen Körpers erregend auf die Zeugungsorgane wirken. Und eben so wirkt auch das psychische Verhältniß zwischen Individuen beyderley Geschlechts: die völlig reine, in Uebereinstimmung der Gemüther wurzelnde Liebe verursacht endlich eine Aufregung der Zeugungsorgane, welche den Gedanken der Begattung erst hervorruft, in selbst ohne deutliches Bewußtseyn zu derselben führen kann. Dagegen macht entschiedner Widerwille, Abneigung oder Ekel den Mann unvermögend zur Begattung, und das Weib meistentheils unfähig zur Befruchtung.

§. 443. Die Zeugung ist kein bloß materieller Act, sondern die Seele nimmt thätigen Antheil daran. Dafür spricht zuvörderst die psychische Aehnlichkeit der Kinder mit den Eltern, welche, wie eine genauere Beobachtung zeigt, ganz unabhängig von der Erziehung und vom Beyspiele hervortritt, indem sie selbst auf Eigenheiten und Schwächen sich erstreckt, welche wir an uns selbst mißbilligen, vor unsern Kindern verhehlen, und vor welchen wir sie zu bewahren suchen. So pflanzt sich der Keim der Cultur fort, und wird schon durch die Zeugung die Erziehungsfähigkeit bestimmt. Ferner zeigt der momentane Seelenzustand offenkundigen Einfluß auf die Zeugung: Kinder einer heißen Liebe sind schöner, lebendiger und geistreicher, als die Früchte einer aus Gewohnheit vollzogenen Begattung; bey im Rausche erzeugten Kindern entwickelt sich Geisteskraft und Sprache erst spät, und sie werden selbst blödsinnig, wenn ihre Zeugung ganz geistlos und in thierischer Betäubung vollzogen war. Endlich wirkt auch der Wille zu züchten auf die Zeugung, so daß diese auch unter ungünstigen Umständen vor sich geht: eine kinderlose, von aller Wollust freye und ihren Gatten zärtlich und sorgsam liebende Frau, erkannte, daß dieser ihr durch eine zehrende Krankheit bald entrissen werden würde, um nach seinem Tode nicht einsam in der Welt zu stehn, sondern einem von ihm erzeugten Kinde ihre Liebe zuwenden zu können, veranlaßte sie eine Begattung, und im festen Willen zu empfangen, empfing sie.

§. 444. Das Erröthen bey Zorn und Freude, das Erblichen bey Betrübniß und Furcht, und der Schauder bey Schreck und Entsetzen scheint nicht eine specifische Wirk- samkeit der Seele auf die Haut zu bezeichnen, vielmehr nur der Ausdruck vermehrter arteriöser oder venöser Thätigkeit des Herzens zu seyn. Specifisch wirkt dagegen die Scham, indem während derselben keine entsprechende Veränderung im Heraschlage, noch in einer andern Function zu bemerken ist. Bey lebhafter Scham röthet sich nicht bloß die Haut, sondern auch ihre Wärme wird erhöht und es bricht ein allgemeiner Schweiß aus, namentlich wenn man sich vor sich selbst schämt. — Bey Verrückten ist die Haut ge- wöhnlich trocken und schwer in Ausdünstung zu bringen, oft braun und kupferig (Geor- get Verrücktheit S. 72); das Haar entfällt, sträubt und verwirrt sich, verliert seine Krause, wird dürr und spaltet sich an den Spitzen; auch bekommen die Nägel auf der Seite, auf welcher eine Abnormität im Gehirne Statt findet, Eindrücke und Flecke (Reils Bey- träge I. S. 53). Endlich bemerkt man in Irrenhäusern einen specifischen unangenehmen Geruch, und einige Aerzte und Krankenwärter wollen bey einzelnen Kranken an solchem Geruche den bevorstehenden Anfall einer periodischen Manie vorauserkennen. In wie fern derselbe dem münseartigen Geruche der Ausdünstung bey Hirnkrankheiten (§. 352) verwandt ist, und mit Veränderungen im Harn zusammenhängt, ist noch nicht ausge- mittelt.

§. 445. Die Seele wirkt auf die Empfindung vermöge der Richtung, welche sie sich giebt. So wird durch Aufmerksamkeit auf die Objecte nicht bloß jede Sinnenthätigkeit geschärft, sondern auch der Schmerz gesteigert. Wendet sich die Seelenthätigkeit entwer- der von den äussern Objecten überhaupt, oder von einzelnen insbesondere ab, um in an- dern Richtungen zu wirken, so werden die Eindrücke abgestampft oder ganz aufgehoben. Die Listerheit erregt bey einem stärkern Zuflusse von Speichel, eine Turgescenz der Zungenwurzeln. Bey dem Lansen spannen sich unwillkürlich die Muskeln des Hör- organs; der nachtheilige Einfluß ermüdender Geistesanstrengung und niederdrückender Ge- müthsbewegung wird besonders von Schwerhörigen bemerkt. Am stärksten ist der Einfluß der Seele auf das Auge; bey dem aufmerksamen Sehen verengt sich die Pupille und wird der Augapfel durch seine Muskeln zusammengedrückt; ausserdem aber wird der Blick der reinste Spiegel der Seele.

§. 446. Die Seele beherrscht die willkürlichen Muskeln. Der Wille bestimmt die Bewegung überhaupt, so wie ihre Richtung und den Grad ihrer Anstrengung. Aber auch unwillkürlich giebt die kräftige Wirksamkeit der Seele den Muskeln eine Energie, deren sie sonst nicht fähig sind: in dem rüstigen Affecte sind sie fest und gespannt, die Bewe- gungen reich und kraftvoll, und es werden durch sie Lasten gehoben und Massen gebro- chen, wie im ruhigen Zustande nicht möglich ist. Gleiches gilt von dem Delirium und der Manie. Wie dagegen die Seele bey Furcht, Schreck, Angst und bösem Gewissen ihre Haltung verliert, so erbeben dabey die Muskeln, die Glieder sinken gelähmt herab, und alle Bewegungen werden unsicher und kraftlos; der Blödsinnige hat einen haltungslosen, unsichern, schleppenden Gang, und niederschlagende Gemüthsbewegungen können auch anhaltende Lähmungen hervorbringen.

Zweyte Abtheilung.

Von der Wesenheit des Hirnlebens.

§. 447. Die Wesenheit eines Dinges ist das volle Seyn desselben, oder der Inbegriff von seinen Erscheinungen nach ihrem Grunde. Der Grund aber ist das Innerliche, nur mit den Gedanken zu Fassende, was die Erscheinungen hervorbringt, folglich durch sie sich offenbart. Mithin erkennen wir ihn, wenn wir die gesammten Erscheinungen eines Dinges in einem gemeinschaftlichen Gedanken zusammenfassen. Die Theorie oder die Erkenntniß der Wesenheit der Dinge empfängt von der Empirie die Kenntniß der Besonderheit, von der Speculation die Anschauung des Allgemeinen, und findet die Einheit beyder, indem sie die Besonderheiten unter einander vergleicht und das Mannichfaltige auf ein Gemeinsames zurückführt. Sie verknüpft also, was die Empirie geschieden hatte (§. 221.), vereint die einzelnen Züge zu einem Gesammtbilde, betrachtet die Erscheinungen nicht neben oder nach einander, sondern in ihrer gegenseitigen Durchdringung, und stellt so das lebendige Daseyn wieder her, welches unter den Händen der Empirie erloschen war. Diese Verknüpfung kann aber auch nur allmählig ihrem Ziele sich nähern, indem sie zunächst auf die einander näher stehenden Erscheinungen sich bezieht, und dann erst das Gesammte umfaßt. So beginnt denn die Theorie des Hirnlebens mit der Betrachtung seiner psychischen (§. 448 — 472) und seiner pflanzlichen (§. 473 — 479) Seite, um hierauf das Ganze selbst anzuschauen.

Erster Abschnitt.

Vom psychischen Leben.

§. 448. Die empirisch aufgefaßten Erscheinungen (§. 350 — 383) führten uns zu der Ueberszeugung, daß die Seele auf dem Leben des Gehirns beruht, oder daß dieses ihr Organ ist. Um nicht bey vieldeutigen Worten und unbestimmten Begriffen stehen zu bleiben, vielmehr das Wesentliche jenes Verhältnisses einzusehen, müssen wir uns über das Wesen der Seele (§. 449 — 461.), des Lebens (§. 462 — 466) und eines Organs (§. 467 — 472) verständigen.

§. 449. Es kommt vor allen Dingen darauf an, den richtigen Wortbegriff von „Natur“ zu gewinnen, und dazu wird uns die Etymologie am sichersten leiten. Physis, Natur, Welt, ist der Inbegriff dessen, was entspringt, erwächst (γενε, nascitur, wird), also einen Anfang nimmt oder endlich ist, und als Erscheinung hervortritt oder sich der Anschauung als Einzelheit darstellt. Hieraus folgt, daß Jegliches, was nicht schlechthin durch sich, sondern endlich ist, und nicht als Idee des Ganzen, sondern als einzelne Erscheinung erkannt wird, zur Natur gehört, also auch in seinen allgemeinsten Merkmalen mit allen übrigen Dingen, die in der Natur sind, übereinstimmt; daß aber nur das Unendliche den Gegensatz zur Natur ausmacht. Wenn man Natur und Geist, Physisches und Moralisches als oberste Gegensätze betrachtet, so hat man dabey die Idee des Geistigen und Moralischen und die Erscheinung des Körperlichen im Sinne, übersieht aber dabey, daß Geistiges und Moralisches auch in der Endlichkeit hervortritt, und daß

die Körperwelt, welche man ihm gegenüber stellt, eben sowohl auf einem unendlichen Grunde beruht. Allerdings sind Körperliches und Geistiges von einander verschieden, aber nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise; sie bilden einen Gegensatz, aber nicht den höchsten und letzten, sondern lassen sich auf ein Gemeinsames zurückführen, nämlich, als Erscheinung betrachtet, auf den Begriff der Natur; — nach ihrem letzten Grunde betrachtet, auf die Idee des Unendlichen. Die Gegensatzung von Natur und Geist ist also durchaus irrig, indem sie das Eine bloß aus dem physischen, das Andre bloß aus dem metaphysischen Gesichtspuncte betrachtet, da doch jedes von Beidem sowohl aus diesem, als aus jenem Gesichtspuncte sich betrachten läßt. Dann in der That haben Physiker und Metaphysiker denselben Gegenstand, nämlich das Seyn, und weichen bloß in der Betrachtungsweise desselben von einander ab. Die Aufgabe des Physikers ist, die Erscheinungen zunächst in ihrer Einzelheit, mit ihren unterscheidenden Merkmalen als Thatfachen, als Gegenstände der Erfahrung aufzufassen, dann aber den Zusammenhang derselben unter einander zu erforschen und ihre nächsten Ursachen und Gesetze zu erkennen; sein Standpunct ist demnach der der Einzelheiten, der Erscheinungen; von ihnen blickt er aber aufwärts zum Ganzen, denn die Erscheinungen führen ihn endlich zu Anerkennung eines Seyns, welches jenseit der Erscheinungen liegt, und die Kettensreihe von Ursachen und Gesetzen leitet ihn zu Erkenntniß eines letzten Grundes und eines höchsten Gesetzes. Der Metaphysiker hingegen beschaut die Dinge von oben her, das Unendliche, was nicht Gegenstand der Erfahrung wird; faßt er, den allgemeinen Normen der Vernunft gemäß, unmittelbar und in voller Reinheit auf, die Idee, welche nicht erwachend in der Wirklichkeit hervortritt, sondern mit immer Nothwendigkeit von Ewigkeit her ist, schaut er an; aber indem er aus der Idee des Ganzen die Welt construirt, steigt er in das Reich der Erscheinungen herab, und begegnet so dem Physiker, der seinerseits auch ihm entgegen kommt. Dieses gegenseitige Begegnen ist unerläßlich, aber auch nur als Ziel und Endpunct der Forschung zulässig; die Bahnen selbst sind durchaus von einander verschieden. Wenn wir also bey Vergleichung zweyer Gegenstände den einen auf jenem, den andern auf diesem Wege erforschen, so muß der heillosste Irrthum sich daraus ergeben. Um dagegen uns zu verwahren, wollen wir bemüht seyn, den gegenwärtig gewählten Standpunct des Physikers fest zu halten, und von diesem aus die Seele zu betrachten.

§. 450. Hier finden wir nun erstlich, daß die Seele zur Erscheinung wird. Zwar erscheint sie nur sich selbst, aber sie wird von sich eben so, wie ein andrer Gegenstand, angeschaut. Wir werden sowohl aus, als die Aussenwelt, inne, und es ist dasselbe Wahrnehmungsvermögen, welches die Vorstellungen und welches die Eindrücke der Körperwelt aufnimmt, nur daß es dort nach innen, hier nach aussen sich wendet. Daher ist es denn auch für die Seelenthätigkeit zunächst ganz gleichgültig, ja oft ununterscheidbar, ob eine Vorstellung, ein Gefühl, eine Stimmung durch äußere Gegenstände oder durch Erinnerung und Phantasie hervorgerufen worden ist. Was Gegenstand der Wahrnehmung ist, muß auch im Allgemeinen und Wesentlichen sich gleich, und kann nur beziehungsweise verschieden seyn. Das Anschauungsvermögen ist das eigenthümliche Merk-

mal der Seele; die Anschaulichkeit hat sie mit den übrigen Naturerscheinungen gemein; und in so fern steht sie diesen gleich oder gehört mit ihnen zu einer Classe.

§. 451. Die Seele erscheint ferner nur als Einzelheit. Jeder von uns erkennt sich als Individuum, als besondres, eigenhümlich begränztes Wesen; in Jedem ist die Seele auf eigenthümliche Weise geartet, indem die allgemeinen Anlagen, Kräfte und Richtungen, welche in ihr liegen, in einem besondern Verhältnisse zu einander stehen. Es ist also hier nicht anders, als bey den übrigen Naturgegenständen, deren jeder einzelne den Begriff seiner Art auf besondre Weise verwirklicht. So ist auch die Seele in allen ihren Aeusserungen an feste Gränzen und an ein bestimmtes Maas gebunden. Sie schließt ferner verschiedene Kräfte in sich, und bezeichnet sich durch eine Mannichfaltigkeit ihrer Richtungen, welche nicht alle gleichzeitig und mit gleicher Energie wirken können: Empfindung, Erinnerung, Einbildungskraft, Verstand, Vernunft, Wille sind Glieder eines Ganzen, oder Aeusserungsarten desselben Wesens, welche zwar innig unter einander verknüpft sind, aber doch immer nur einzeln nach einander wirken.

§. 452. Die Seele ist ferner ein Endliches. Wenn dies sich schon aus dem Obigen (§. 451) ergibt, so wird es noch klärer bey der Betrachtung ihrer Thätigkeit: Die Seele wirkt auf eine endliche Weise, und ihre Thätigkeiten werden nur klar durch Begränzung, Gegensatzung, Unterscheidung. Sie erfüllt nur eine bestimmte Zeit; sie entsteht; erwächst in der Wirklichkeit, und verschwindet. In allem ihrem Wirken ist sie an Zeitverhältnisse gebunden: sie bedarf zu ihren Thätigkeiten einer gewissen Weile. Sie wechselt in der Zeit; wächst durch Uebung, erschöpft sich durch Anstrengung; erholt sich durch Ruhe. Sie lebt und erscheint also in der Zeit; die Zeit aber ist eben sowohl eine Form der Endlichkeit, als der Raum, wenn auch in ihr die Thätigkeit freyer erscheint, als in diesem. Nun sind beyde Formen der Endlichkeit immer verknüpft, und kein Endliches kann bloß in der einen oder in der andern seyn. Die Materie ist nur überwiegende; nicht reine Raumerfüllung; sie kann nicht anders seyn, als in einer bestimmten Zeit; sie muß entstehen und untergehen. So ist auch die Seele der Herrschaft des Räumlichen nicht schlechthin entzogen, sie wird vielmehr von dem Raumerfüllenden bestimmt, und wirkt auf dasselbe ein; sie tritt nicht anders auf, als in einem Körper, der einen begränzten Raum einnimmt, und ist an diesen Raum gebunden, so daß sie nur durch das officirt wird, was diesen Körper räumlich berührt, und nur auf das zu wirken vermag, was in dessen räumlichem Bereiche sich findet. Jedes gleichzeitige Seyn einer Mehrheit ist ein räumliches Seyn; nun ist meine Vorstellung gleichzeitig mit der Vorstellung eines andern Menschen; folglich ist sie an ein Räumliches geknüpft.

§. 453. Die nach dem oben (§. 449) aufgestellten Wortbegriffe der Natur ankommenden Prädicate finden sich also (§. 450 — 452) auch in der Seele, und wir können daher nicht anstehen, diese selbst als eine Naturerscheinung zu betrachten. Um ihr Wesen aufzufassen, müssen wir sie daher auch mit andern Naturerscheinungen vergleichen: denn nur durch Unterscheidng von dem Ähnlichen, Verwandten gelangen wir zur Kenntniß eines Dinges, und eben darum können diejenigen, welche die Seele als ein der Natur ganz fremdartiges, nur sich selbst gleiches Wesen betrachten, gar nichts Größliches von ihr aussagen, da sie sich jeden Maasstab entzogen und alle Vergleichungs-

puncte abgeschnitten haben. Ehe wir aber zu solcher Vergleichung schreiten, müssen wir uns den Begriff von dem Wesen der Natur vergegenwärtigen.

454. Die Naturforschung abstrahirt aus ihren einzelnen Beobachtungen allgemeine Kräfte, Cohäsion, Gravitation, u. s. w., welche sie als die Ursachen der Erscheinungen anerkennt. Aber in diesem steten Aufsteigen von der Wirkung zur Ursache kommt sie nicht zum Ende, so lange sie bey dem sinnlich Gegebenen steht, und sie fñhlt sich daher gedrungen, einen letzten Grund im Unergründlichen anzuerkennen, auf dessen Wesenheit sie der Erfahrung gemäß zu schliessen sich erlaubt. Sie findet nämlich, indem sie die Natur in ihren allgemeinsten Beziehungen anschauet, überall Einrichtungen, wie sie der menschliche Geist machen würde, wenn er in Einsicht und Macht allumfassend wäre. Sie zieht daraus den Schluß, daß der letzte und wahrhafte Grund der Natur der unendliche Geist, Gott, ist. In der Idee des Unendlichen liegt es, daß schlecht-hin nichts außer ihm seyn kann, da es sonst eben beschränkt und endlich seyn würde; es muß einzig und alleinig seyn. Die Natur kann folglich nicht außer Gott seyn. Gleichwohl ist ihr Wesen die Besonderheit und Mannichfaltigkeit: der Gegensatz ist der Grundcharakter aller Endlichkeit. Diesen Widerspruch können wir nur durch die Annahme heben, daß das, was in der unendlichen Einheit umfaßt wird, sich in eine Mannichfaltigkeit entwickelt und so zur Erscheinung wird. Auf welche Weise die Endlichkeit aus dem Unendlichen hervorgeht, wäre eine widersinnige Frage, denn sie verlangt, daß der Verstand das Unendliche begreife, welches doch die Vernunft bloß mit Nothwendigkeit anschauen kann; sie will die Metaphysik zur Physik machen, da doch eben an diesem Puncte ein ewiger Hiatus bleiben muß. Genug, der Verstand lehrt uns mit völliger Gewißheit, daß die Natur auf einer geistigen Grundursache beruht; und die Vernunft erkennt mit Nothwendigkeit, daß das Unendliche allein ist, und Nichts außer ihm besteht, daß also der Gegensatz zwischen Gott und Natur kein absoluter ist, sondern nur die verschiedenen Seiten desselben Seyns, Wesenheit und Erscheinung, Inneres und Aeußeres, Grund und Wirkung ausdrückt.

§. 455. Die verschiedenen Naturkräfte sind die einzelnen, gebrochenen Strahlen des unendlichen Daseyns, und indem aus ihnen die gesammte Welt sich aufbaut, ist diese göttlichen Ursprungs. Die Einrichtungen, welche in ihr überall sich behaupten, die ewigen Gesetze, welche in ihr walten, die unerschöpflichen Thätigkeiten und die endlosen Reihen der Dinge, welche sie unsrem Sinne zeigt, sind die Beglaubigungen ihres Bestehens auf dem Unendlichen. So ist denn die Natur im Ganzen die Offenbarung Gottes. Was sie aber in ihrer Gesammtheit ist, muß sie vermöge der Einheit ihres Ursprungs auch im Einzelnen seyn. Nun besteht ihr endlicher Charakter in Mannichfaltigkeit: folglich müssen die einzelnen Dinge von einander verschieden seyn, je nachdem mehr oder weniger das Ganze in ihnen sich abbildet. Ein jedes Daseyn ruhet auf einzelnen Naturkräften, erscheint demnach in überwiegender Endlichkeit, und vergleichungsweise als ein Abfall vom Unendlichen. Wo hingegen die verschiedenen Naturkräfte, welche vom Unendlichen ausstrahlen, sich zu einem Einklange vereinigen in einem einzelnen Wesen, da bildet sich eine Welt im Kleinen; solch höheres Daseyn steht demnach dem Unendlichen näher, und ist eine lebendigere Offenbarung desselben. — Die höchste

Naturerschöpfung ist nun die Seele. Sie entspringt als Endliches dadurch, daß die einzelnen Naturthätigkeiten einander durchdringen, und daraus das Allgemeine, Ursprüngliche hervortritt, ein einiges, ungetheiltes Seyn. Als die höchste Steigerung des Daseyns, als ein Brennpunct, welcher die verschiedenen Strahlen des Unendlichen sammelt, und in welchem das Daseyn zum Bewußtseyn wird, ist sie ein Spiegel des göttlichen Seyns, und bekennt sich als solcher durch Selbstbewußtseyn und Selbstbestimmung, welche ihr vergleichungsweise gegen die Körperwelt zukommen. Von dieser ist sie in der Weise ihrer Thätigkeit allerdings verschieden, aber nicht in ihrem Wesen. Die körperlichen Erscheinungen sind die vereinzelter, im Endlichen sich verlierenden Strahlen des Unendlichen, welche in der Seele sich sammeln zu einem einzigen, innerlichen, sich-selbst gleichen, das Unendliche in der Endlichkeit darstellenden Daseyn.

§. 456. Wenn wir nun die Seele als eine Naturerscheinung (§ 453.) anerkennen und zwar als diejenige, in welcher das Ursprüngliche und wahrhaft Wesentliche am reinsten und mächtigsten hervortritt, so müssen wir auch in unserem Selbst die Natur nach ihrer Wesenheit erkennen. Die Selbstanschauung lehrt uns nun a), daß die Thatfachen unsrer sinnlichen Erkenntniß in Einklang stehen mit dem innersten Wesen unsrer Seele. Denn die Natur erscheint uns überall als ein gesetzmäßiges Ganzes, in welchem die verschiedenen, einander widerstrebenden Kräfte so verknüpft sind, daß das Ganze dadurch besteht. Das Gesetz ist aber nichts Andres, als die Herrschaft des Gedankens über die Mannichfaltigkeit der Erscheinungen, und eine zweckmäßige Einrichtung kann nur aus dem Geiste stammen. Die Gesetze des körperlichen Daseyns sind identisch mit den Gesetzen des Denkens. Denn was der Philosoph und der Mathematiker unabhängig von der Erfahrung als nothwendig aus den Normen der Vernunft abgeleitet haben, findet sich in der Natur verwirklicht; und auf jene sich stützend, kann selbst der vermittelnde Verstand aus sich selbst Entdeckungen machen, welche die Erfahrung bestätigt. Wo aber Gleichheit der Gesetze sich findet, da muß auch Gleichheit des Wesens seyn: mithin ist Seele und Natur identisch: die Seele ist Natur als Selbstthätigkeit, Selbstanschauung, Subjectivität; die Körperwelt ist Natur als Objectivität. Die Seele lebt in der Natur, nicht einsam und wie in der Fremde, sondern in lebendigem Verkehr mit Allem, da Alles mit ihr aus gleichem Urquell fließt. In der Wahrnehmung geht das Aeußere in das Innere, das Räumliche in das Zeitliche über, und umgekehrt tritt bey dem Willen das Innere im Aeußern hervor: Inneres und Aeußeres sind also nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise verschieden. Ein absoluter Widerspruch zweyer Welten, wäre Widerspruch und also Zerrüttung der Welt überhaupt. — b) Im Selbstbewußtseyn wissen wir, ohne daß der Gegenstand unsres Wissens, der auf uns einwirkt und von uns aufgenommen wird, außer uns liegt: das Wissende und das Gewußte sind hier dasselbe Wesen; das Daseyn wird sich selbst Gegenstand; Subject und Object sind identisch. Folglich sind Subjectivität und Objectivität überhaupt bloß in einem relativen Gegensatze begriffen, an sich identisch: das Objective ist bloß Reflex des Subjectiven; ursprünglich ist reine Thätigkeit, Geist, und nur die gehemmte Thätigkeit tritt als objective Welt hervor. c) Man erkennt es an, daß die Seele ein Einiges, Ungetrenntes ist, also daß ihre mannichfaltigen Thätigkeiten nicht im Wesentlichen, sondern nur beziehungsweise verschie-

den sind. Empfindung und Vernunft sind also dem Wesen nach dasselbe, sie sind Boyde ein Erkennen. Die Vernunft ist nicht ein Hinzugekommenes, Fremdartiges, sondern nur eine durch neue Gegensatzung gewonnene höhere Entwicklung. Die Empfindung ist eine einzelne Sentienthätigkeit, eine Wahrnehmung des Einzelnen, Endlichen, Aeusseren, der Erscheinung; die Vernunft ist die innige Durchdringung aller Seelenthätigkeiten; der gemeinsame Brennpunkt derselben, das Anschauen des Ganzen, Unendlichen, Innern, des Wesens. Nun müssen die Gegenstände zweyer Erkenntniskräfte sich zu einander verhalten, wie diese selbst gegen einander. Folglich müssen Endliches und Unendliches, Aeusseres und Inneres, Erscheinung und Wesen sich zu einander verhalten, wie Einzelnes und Ganzes, im Grunde aber identisch seyn. — Somit ist denn die oben (§. 454.) aufgestellte Ansicht der Natur auch psychologisch deducirt, und wir sind durch weitere Betrachtung zu dem Satze zurückgeführt worden, von welchem wir ausgegangen waren.

§. 457. Vergleichen wir nun die Seele mit den übrigen Naturerscheinungen, um die Classe derselben, zu welcher sie gehört, zu bestimmen, so finden wir zurörderst, daß sie als Thätigkeit, als Erscheinung in der Zeit, als ununterbrochene Folgenreihe von Zuständen sich darstellt; ja sie ist reine Thätigkeit, sie kommt nicht zu einem ruhenden Seyn, sondern ist ein stetiges Werden: was wir von ihr auffassen, ist nichts, denn Wirkksamkeit; wir haben kein andres Bewußtseyn von uns, denn von einem Thätigen. In so fern steht sie denn der Körperwelt gegenüber, welche durch ein anhaltendes Seyn sich bezeichnet, und hat dagegen Ähnlichkeit mit den dynamischen Erscheinungen, Licht, Wärme, Magnetismus, Elektricität, mit welchen sie auch häufig verglichen worden ist. An diesen Erscheinungen erkennen wir nämlich, wenn wir bloß der Erfahrung folgen und nicht die Fictionsen materialistischer Physiker uns aufreden lassen, auch kein verharrendes Daseyn, sondern einen stetigen Strom der Thätigkeit. — Ehe wir weiter gehen; lassen wir uns an das Verhältniß von Kraft und Materie erinnern. Die Materie können wir für nichts Andres, denn eine stetige Raumerfüllung erklären. Dieses Erfüllen des Raumes und dies Behaupten seiner selbst im Raume ist aber offenbar Thätigkeit. Folglich setzt die Materie schon Kraft voraus, schließt sie in sich, und ist ohne sie undenkbar; mühsam sind die Kräfte das Ursprüngliche, und erst indem sie einander gegenseitig beschränken, so daß keine sich durchaus frey äussern kann, erscheinen sie in diesem Gleichgewichte als ein ruhendes, verharrendes Daseyn, als Materie. Wo aber eine Kraft sich entzweyen und in sich selbst einen Gegensatz von Thätigkeiten, welche in Spannung und lebendigem Conflict treten, bilden kann, da tritt sie frey hervor, und spricht sich in den dynamischen Erscheinungen aus. Nämlich der Gegensatz ist die nothwendige Bedingung alles Endlichen, und die Körperlichkeit entspringt aus den bis auf einen gewissen Punkt einander beschränkenden Kräften; die Kraft aber, welche in sich ein wahrhaft polares Verhältniß, ein Süd und Nord, ein Positives und Negatives, ein Gelb und Blau zu bilden, also eine innere Regsamkeit zu entwickeln vermag, hat durch sich selbst den Charakter der Endlichkeit, kann also zur Erscheinung werden und als freye Thätigkeit sich äussern. Die Seele wird demnach auch durch die ihr zukommende und als Gegensatz von Ich und Nicht-Ich sich gestaltende Polarität, an jene freyen Thätigkeiten sich anrei-

hen, — Doch die Freyheit dieser Thätigkeiten ist nur eine relative: sie beschränkt sich darauf, daß das Erscheinen derselben nicht in einer besondern Materie oder einer besondern materiellen Veränderung besteht; aber um zur Erscheinung zu kommen, muß die Thätigkeit gehemmt, gleichsam aufgefangen und getragen werden von Körpern. Wir sehen weder das Licht, noch die durchleuchteten, sondern nur die dem Lichte widerstrebenden, es reflectirenden Körper; wir percipiren nicht Elektrizität und Magnetismus; sondern elektrische und magnetische Körper. Wie die Materie auf ursprünglichen Kräften ruhet, so kann auch keine Kraft in der Endlichkeit hervortreten, ausser an einem permanenten Seyn, an der Materie. Auf gleiche Weise bedarf die endliche Seele eines Leibes, von welchem sie getragen wird. — Soviel über die Aehnlichkeit der Seele mit den dynamischen Welterscheinungen. Die unterscheidenden Merkmale ihrer Eigenthümlichkeit fallen zu sehr in die Augen, als daß wir bey ihnen zu verweilen bräuchten.

§. 458. Die Seele ist eine Lebenserscheinung, denn in ihrer Beziehung zu den übrigen Aeusserungen des Lebens finden wir alle Bedingungen (§. 458 + 461.) erfüllt, welche uns berechtigen die Einheit verschieden gearteter Erscheinungen anzuerkennen. Fürs Erste nämlich, wo zwey Erscheinungen immer gleichzeitig vorkommen, da erkennen wir eine ursachliche Verknüpfung beyder an. Kommt die Eine bald für sich allein, ohne die Andre, die Andre aber nie ohne die Erste vor, so erkennen wir Jene, als die allgemeinere, bedingende, ursachliche, welche unter bestimmten Bedingungen die Andre erzeugt, diese aber als die besondre an, welche auf der allgemeinen beruht und als eine Artung derselben hervortritt. Wo nun immer eine Seele sich verkündigt, da ist es in einem lebendigen Organismus; sie kommt nur da zum Vorschein, wo ein selbstständiges Leben sich entwickelt. Wo im Thierreiche ein Organismus in zwey selbstständig lebende Wesen sich spaltet, da zerfällt auch die Seele in zwey Seelen: so bey dem zerschnittnen, zur zwey Individuen sich ergänzenden Polypen; und hey der durch Ablösung ihrer Glieder sich fortpflanzenden Naide; so bey den höhern Formen der Zeugung. Dem Gesetze der Induction gemäß schloßten wir daraus, daß Seele und bildendes Leben ursachlich verbunden sind, und da Leben wohl ohne Seele, aber nirgends eine Seele ohne Leben in der Erfahrung uns vorkommt, so muß das Leben das Allgemeine, die Seele aber eine besondre Weise des Lebens, eine eigenthümliche Lebenserscheinung seyn.

§. 459. Zweitens, wenn zwey Erscheinungen sowohl in ihren allgemeinen Gesetzen, als auch in den Formen ihrer Abänderungen übereinstimmen, so müssen sie auch in ihrem Wesen mit einander übereinstimmen und einen gemeinsamen Grund haben. Denn da die Erscheinung auf einem Grunde beruht, so muß sie auch demselben entsprechen, und ungleichartige Erscheinungen müssen auf verschiedenen Gründen, gleichartige hingegen auf gleichem Grunde beruhen. Nun folgt die Seelenthätigkeit fürs Erste genau denselben Gesetzen, wie die leibliche Lebensthätigkeit; sie zeigt, wie diese, die Verhältnisse von Reizung und Reaction, von Consensus und Antagonismus; sie löset bald mehr, bald weniger Kraft, wirkt bald harmonisch und zweckmäßig, bald verworren, unregelmäßig und krankhaft; kurz, sie verhält sich als Erregung, wie jede andre organische Function. Sodanig sehen wir auch eine Uebereinstimmung in den Modificationen: wie das

leibliche Leben sich entwickelt, steigt und fällt, eben so entwickelt sich, steigt und fällt im Ganzen genommen die Seelenthätigkeit; und die Kraft der Seele in der Thierreihe, wie in den Lebensaltern entspricht der Vollkommenheit der Organisation und der Energie des Lebens. Wenn einzelne Ausnahmen davon Statt finden, so ist dies nur wie bey andern Lebenserscheinungen, deren einzelne zuweilen im entgegengesetzten Verhältnisse zu andern stehn.

§. 460. Wenn drittens zwey Erscheinungen mit einander Gemeinschaft haben, so setzt dies Berührungspunkte voraus, diese sind aber nur möglich bey Gleichartigkeit der Wesen. Nun steht die Seelenthätigkeit mit den plastischen Functionen in gleichem wechselseitigen Verkehr, wie die Lebensthätigkeiten überhaupt: unser Denken und Fühlen wirkt auf Athmen und Kreislauf, und wird von diesem wiederum bestimmt, so wie das Athmen selbst auf den Kreislauf und dieser umgekehrt auf jenes wirkt. Der Leib wirkt als Mittel für die Seele, indem er mittels der Nerven und des Blutes sie weckt und erregt, sie stimmt und ihre Kraft unterhält. Umgekehrt wirkt die Seele als Mittel für das leibliche Leben: indem sie mit Willkühr die Aufnahme der Nahrung und die Ausleerung, das Athmen und die Begattung bestimmt; dient sie den plastischen Functionen. Wir erkennen also hier, wie in allen Lebensverhältnissen, organische Verknüpfung und Gegenseitigkeit von Zweck und Mittel. Auch sehen wir eine spezifische Wechselwirkung zwischen bestimmten Seelenzuständen und bestimmten plastischen Lebensthätigkeiten: das Herz wirkt auf das Gefühl und das Gefühl auf das Herz; Störung des Athmens erregt Angst, und Angst stört das Athmen; die Verdauung wirkt auf die Geistes-thätigkeit, und diese auf jene; der gereizte Zustand der Leber macht zornmüthig, und der Zorn erregt die Thätigkeit der Leber; die Turgescenz der Genitalien weckt die Vorstellung der Begattung, und wird hiewiederum durch solche Vorstellungen erregt.

§. 461. Wenn endlich zwey Erscheinungen in einander übergehen, so können sie nicht schlechthin, sondern nur relativ von einander verschieden seyn. Nun sehen wir aber, daß der Lebenszustand durch das Gemeingefühl mit dem Bewußtseyn verschmilzt, denn wir erkennen ohne Ausnahme den Leib als zu uns gehörig und mit dem Ich unsere Individualität ausmachend an, und sagen eben sowohl, daß wir fahren, verdauen, bluten, als daß wir fühlen, denken und begehren. Körperlicher und geistiger Schmerz bringen den gleichen Zustand in unsrer Seele hervor; oft ist es schwer zu entscheiden, ob der Zustand der Beklommenheit von einer Sorge hervührt oder auf einer Abnormität des Blutlaufs beruht, und die Sorge sich erst aus der dadurch bewirkten Gemüthsstimmung entwickelt hat. Die plastische Function ist mit der Vorstellung derselben verknüpft: mit der Lebendigkeit eines Organs ist auch der Seele ein Trieb gegeben, dasselbe in Wirksamkeit zu setzen und zu gebrauchen, und der Instinct, welcher der materiellen Organisation entspricht, greift auf der andern Seite in die höchsten Sphären der psychischen Thätigkeit ein. Das Psychische wird, namentlich durch die Muskelbewegung, auch im Leiblichen verwirklicht, und die Vorstellung wird dadurch verkörpert. Endlich finden wir in der Thierreihe und in den Lebensaltern eine Stetigkeit der Stufenfolge und ein unmerkliches Uebergehen von seelenlosem Leben zu beseeltem. Die Seele der höhern Thiere ist der menschlichen sehr ähnlich; aber wie mag das Seelenleben eines See-

schwammig beschaffen seyn? Aber doch ist zwischen diesem und jenen eine ununterbrochne Stufenfolge ohne irgend eine bestimmte Gränzlinie. Und wann beginnt das Seelenleben bey dem menschlichen Individuum? Ohne Zweifel schon vor der Geburt, denn der Embryo giebt durch willkührliche Bewegungen unter verschiedenen Umständen die Affection seines Gemeingefühls zu erkennen; aber welcher Zeitpunkt des Embryonenlebens läßt sich als Anfang der Seele denken? Offenbar entsteht das Seelenleben so, wie es sich ausbildet; nämlich durch allmähliche Entwicklung, durch ein stetiges Fortschreiten. Auch sehen wir offenbar an dem bebrüteten Eie, wie zuerst rein plastisches Leben sich äussert, und aus ihm in unmerklichem Uebergange die psychische Lebensäusserung durch Muskelbewegung hervortritt. So zeigt sich also die Seele als eine höhere Lebenserscheinung, welche auf einer gewissen Stufe des Lebens aus dem Plastischen sich entwickelt, und die Stetigkeit oder Allmählichkeit dieser Entfaltung zeugt für die ursprüngliche Identität Beyder.

§. 462. Wie nun die Seele mit dem leiblichen Leben Eins seyn könn, wird uns nie klar werden, wenn wir nicht die Wesenheit des Lebens selbst anschauen. Die Erfahrung zeigt uns das Leben als eine in bestimmten Gränzen von Zeit und Raum abgeschlossene, ein Ganzes bildende, stetige Reihe von Thätigkeiten, welche durch den stets regen Gegensatz mannichfaltiger, in einem Wesen vereinter Kräfte hervorgerufen werden und zu Darstellung des Ganzen gemeinschaftlich wirken. Diese Merkmale finden wir nicht in irgend einem einzelnen leblosen Wesen, wohl aber in der Natur überhaupt, so weit wir sie in ihren allgemeinsten Beziehungen zu überschauen vermögen. Denn auch hier begegnet uns Mannichfaltigkeit der Erscheinungen und Kräfte, zu einem Ganzen verknüpft, unaufhörliche Thätigkeit, gegenseitiges Einwirken, Zusammenstimmen zu Darstellung des Ganzen. Wir können daher das Leben für nichts andres erklären, als für eine Wiederholung des Naturganzen in endlichen Wesen. Das Leben wirkt überall auf Individualisirung hin; es drückt dem endlichen Wesen das Gepräge eines abgeschlossenen, sich bestimmenden und durch sich bestehenden Ganzen auf; im Individuum werden die allgemeinen Weltkräfte durch den Begriff eines dem Weltall nachgebildeten Ganzen verknüpft und bestimmt.

§. 463. Wie nun diese Nachbildung überall nur eine endliche, mithin beschränkte seyn kann, so müssen diese Schranken, vermöge der Mannichfaltigkeit der Natur, bald enger, bald weiter seyn, und das Leben muß sich in größerer und geringerer Vollkommenheit in den einzelnen Wesen darstellen. Zunächst bildet sich die Erscheinungswelt, die Objectivität der Natur ab; so tritt das endliche, leibliche Leben hervor, welches nur auf äussere Wirkksamkeit, auf Bildung eines materiellen Ganzen, auf Darstellung äusserer Individualität ausgeht; die unendliche Kraft wirkt in ihm, wie in dem Weltganzen, aber bloß treibend, bestimmend, noch nicht gegenseitig bestimmt, nicht endlich. Dies leibliche, wachsthümliche oder pflanzliche Leben ist aber der Keim des Psychischen: wo nämlich in dem lebenden Wesen eine regere Spannung der Gegensätze, eine höhere innere Beweglichkeit Statt findet, da wird die Seele geboren, als der Reflex des Unendlichen; nicht bloß die Erscheinung der Welt, sondern auch ihr ewiger Grund tritt hier in die Endlichkeit ein; die Weltseele gestaltet sich als Individuum. Die Seele kann aus dem

pflanzlichen Leben sich entwickeln, denn sie hat mit diesem die wesentlichen Merkmale gemein. Man erkennt nämlich Selbstbewußtseyn und Freyheit als die eigenthümlichen Merkmale der Seele an. Nun ist das Selbstbewußtseyn nichts Andres, denn Rückwirkung der Thätigkeit auf das Thätige, und Aufnahme der eignen Thätigkeit in das Thätige selbst. Aber im pflanzlichen Leben nimmt das schaffende Princip sein Product ebenfalls in sich auf: die bildende Kraft erzeugt bestimmte Formen und Stoffe, wird aber selbst wieder durch diese unterhalten und genährt. Also sind Selbstbewußtseyn und organische Selbsterhaltung nur die verschiedenen Formen eines wesentlich gleichen Actes. — Und die Freyheit ist Selbstbestimmung; aber alles Leben ist Selbstbestimmung; ein Glied errögt das Andre; das Pflanzliche wählt sich seine Nahrung; jeder Canal, jede Faser sucht sich die ihm entsprechenden Stoffe. Also sind auch in dieser Rücksicht die Merkmale des psychischen und pflanzlichen Lebens dieselben, nur hier in überwiegender Form des Raums, dort in überwiegender Form der Zeit. — Fassen wir endlich die Merkmale der Seele, Bewußtseyn und Freyheit, in einem Gesamtbegriffe auf, so ist es ein sich selbst gleich Seyn, Einheit der Glieder, Identität in der Mannichfaltigkeit. Aber dieser Begriff paßt eben so wohl auf den leiblichen Organismus, nur mit dem Unterschiede, daß in ihm die Mannichfaltigkeit; in der Seele die Einheit verhältnißmäßig mehr vorherrscht. Die Seele hat sowohl in gleichzeitigen Bestrebungen, als in den der Zeit nach auf einander folgenden Thätigkeiten Mannichfaltigkeit, wie der organische Leib; dieser aber hat ebenfalls Einheit seiner Glieder, ist ein einziges abgeschlossenes Ganzes, dessen Einzelheiten sämmtlich auf ein gemeinsames Ziel hinwirken. Das Leben ist ein Abbild des Weltganzen im Einzelnen (§. 462); da nun das Ursprüngliche und Wesentliche der Welt ein Geistiges ist (§. 454), so trägt auch alles Leben das Gepräge des Geistigen. Die organische Proportion und Form ist das Beharrliche am Leben; also die Substanz, während die Materie im Wechsel, in stetem Entstehen und Untergehen begriffen, also das Accidens ist: ein immaterielles Lebensprincip ist also das Wesentliche, Permanente, welchem die organische Materie bloß inhärrt. Es äußert sich ferner als Selbstbestimmung und innere Erregung, und als ein zweckmäßiges Wirken in der Organisation und in den Functionen überhaupt, so wie in Verhältniß zu den jedesmaligen Umständen. Dadurch nun, daß das leibliche Leben schon einen psychischen Charakter hat, ist es geeignet, der Träger der individuellen Seele zu werden. Darum ist eben auch die Physiologie ohne Psychologie ein Baum ohne Blüthe, ein Stamm ohne volle Entwicklung seiner Bedeutung, und dagegen die Psychologie ohne Physiologie ein Reis, welches kränkelet, weil es von seinem Stamme getrennt ist.

§. 464. Nachdem wir nun das Seelenleben und das leibliche Leben als zu einer und derselben Classe gehörig erkannt haben, liegt uns ob, die specifische Differenz derselben zu bestimmen. Im Allgemeinen zuvörderst ist das leibliche Leben ein unmittelbares und ausschließlich auf die Materie sich beziehendes; auf Bildung von Massen gerichtetes, und im Aeußern durch räumliche Veränderungen unmittelbar sich offenbarendes Wirken; das psychische Leben hingegen ist ein innerliches Wirken, welches in reiner Thätigkeit besteht und bloß in der Zeit erscheint. Das leibliche Leben ist ein Bilden, das psychische Leben ein Abbilden, d. i. Vorstellen. Der lebendige Leib ist ein durch bestimmte

Grenzen gegen die Aussenwelt sich abschließendes Ganzes, aus mannichfaltigen, neben einander liegenden Gliedern bestehend, welche, einander wechselseitig dienend und bestimmend, ihren Zweck im Ganzen finden; die Seele ist Einheit, sich thätig bezeugend in verschiedenen Richtungen; welche alle in einander greifen. Der Leib ist das durch Thätigkeit bestehende äusserliche Daseyn; die Seele das auf dem Daseyn ruhende, innerlich Lebendige. — Wie das leibliche Leben in drey Momente zerfällt, indem es 1) das Fremde sich einbildet, 2) durch Thätigkeit bildet und durch Bildung thätig ist; 3) sich selbst in seinen einzelnen Gliedern erregt, so zeigt, vermöge seiner allgemeinen Gleichheit, auch das psychische Leben drey entsprechende Momente, nämlich Wahrnehmung, Bewusstseyn und Willen. Aber im Nähern finden sich wieder Gegensätze. 1) Der lebendige Leib zerstört das fremde Daseyn, löst es auf in seine Elemente, um daraus sich zu schaffen oder sein eignes Daseyn zu bereiten. Die Seele hingegen durchdringt das Fremde; nimmt es dynamisch, ohne sein Daseyn zu beeinträchtigen, in sich auf; stellt es sich bloß gegenüber, oder macht es sich zum Gegenstande. Subject und Object werden hier auf einander bezogen, bleiben jedoch gesondert; es ist ein innerliches Scheiden und Verknüpfen in einem und demselben Acte; indem das Subject die Objecte von sich trennt, erkennt es sich selbst als Subject an. Die äussern Erscheinungen treten, ihrer Leiblichkeit entkleidet, in der Vorstellung auf; die Welt spiegelt sich in der Seele, und kehrt auf diese Weise zu ihrem geistigen Ursprunge zurück: war die Welt die Verwirklichung eines Urbildes, die Verkörperung der Idee, so wird in der Wahrnehmung das Abbild der Welt in die Seele aufgenommen. 2) Im leiblichen Leben wirkt das Thätige als Bildendes, und das Gebildete wieder als Thätiges; aber diese Thätigkeit bleibt immer nur auf neues Bilden gerichtet: es ist dies die Einheit von Seyn und Thätigkeit, welche das eigentliche Wesen des Organismus ausmacht. In der Seele aber werden die Vorstellungen selbst wieder Gegenstände; die Seele schaut sich im Bewusstseyn selbst an, und Vorstellendes und Vorgestelltes sind hier dasselbe; hier erscheint also völlige Einheit von Subject und Object, und damit ist der Gipfel und das Ziel der lebendigen Schöpfung erreicht. 3) Das leibliche Leben bestimmt sich selbst bloß durch die Wechselwirkung seiner Glieder. Wodurch wird aber dieser Gliederbau gegeben, und dieses Ganze getrieben? durch die über dem Organismus schwebende Weltkraft, welche ihre Erscheinung in ihm wiederholt. In der Seele hingegen ist das Wesen der Welt real geworden; und indem so das Schöpferische, Urbildliche ihr inwohnt, erhebt sich der Wille, d. i. die Bestimmung durch Vorstellung, die Richtung der Seele durch sich selbst, die selbstbestimmende und selbstschaffende Thätigkeit.

§. 465. Die Seele ist also die höchste innerlichste Lebensthätigkeit, welche 1) ein Bild der Welt, gleichsam einen geistigen Auszug aus ihr in sich schafft; 2) die der Schöpfung zum Grunde liegende Einheit zwischen Subject und Object in dem Geschöpfe zu Stande bringt; 3) als das Selbstthätige, Herrschende sich erweist. In ihr kommt die Weltseele unter individuellen Formen zum Vorscheine. Doch ist sie nicht ein fremder Gast, welcher unmittelbar aus seiner himmlischen Heimath sich herabgelassen und in den Leib versenkt hat; sondern das organische Leben hat ihren Keim in sich getragen und sie allmählig zur Entwicklung gebracht. Diese Entwicklung kann aber, wie jede andre,

nur durch polarische Scheidung des Indifferenten erfolgen. In den Bildungen des pflanzlichen Lebens wirkt der Gedanke, aber eben bloß als materiell Bildendes, und mit dem Leiblichen verschmolzen; der Ausfluß der Weltseele ist noch Eins mit dem Körper. Indem aber die verschiedenen pflanzlichen Thätigkeiten durch eine regere Spannung (welche zunächst in einer höhern Zersetzbarkeit der thierischen Materie sich ausspricht,) zur gegenseitigen Durchdringung kommen und zu einer innigern Einheit (durch ein Nervensystem) gelangen, tritt die organische Einheit im Gegensatz zur Bildung auf, die Gesamtheit des Lebens, der Gedanke, scheidet sich von den Einzelheiten, und stellt sich selbst als eine besondere Lebensthätigkeit, ihnen gegenüber. So wird die Seele geboren, und mit ihr erhält das Leben erst seine volle Bedeutung; sie wird der Kern unsres Daseyns: das Wissen von unsrer Seele ist ein schlechthin unmittelbares, während jedes andre Wissen bloß ein vermitteltes ist. Und so ist sie auch das reichste Leben: sie trägt die größte Mannichfaltigkeit in sich, und ist ein unerschöpflicher Quell immer neuer Bildungen, während das Leibliche dagegen dürftig ist und im engen Kreise einformigen Wirkens sich herumdreht; und ihr kommt dabey die höchste Einheit zu, indem sie die Mannichfaltigkeit der Erscheinungen zur Einheit der Vorstellung zurückführt, und bey allem Wechsel in der Zeit als dasselbe Wesen sich erkennt. — Der Gegensatz ist der Charakter des Endlichen. Vielfältig wiederholt er sich im Organismus. Auch das Höhere, Wesentliche in ihm kann sich dem Niedern gegenüberstellen als ein Besondres: so widersetzt sich die heilende Naturkraft der zufälligen Beinträchtigung des Organismus. Die Seele stellt sich ebenfalls dem Leibe gegenüber, wie das Wesen der Erscheinung. Sie strebt, in sich zu bestehen, und vom leiblichen Zwange sich zu befreien, eben weil das Geistige das ursprünglich Waltende, das Leibliche bloß die Hemmung der Kräfte, und die Seele die Rückkehr der Natur zum Urwesen ist.

§. 466. Die Gründe, welche uns bestimmen, die Seele als eine Naturerscheinung, und namentlich als eine Lebensthätigkeit anzuerkennen, sind so einfach, so klar und überzeugend, daß es uns Wunder nehmen müßte, wie die entgegengesetzte dualistische Ansicht bis auf unsre Tage sich hat behaupten können, wenn wir nicht die Quellen derselben vor Augen hätten. Diese sind nämlich: 1) eine unvollkommene und beschränkte Anwendung der Denkgesetze in der Naturforschung; 2) die Erkenntniß, daß die hiebey gewonnenen Ergebnisse mit den moralischen Ansprüchen des Menschen unvereinbar sind. — Alle unsre Erkenntniß fängt damit an, daß wir unterscheiden, und jedes Einzelne als ein Eigenthümliches anerkennen; aber die fortschreitende Erkenntniß faßt die gemeinsamen Merkmale der Einzelheiten auf, und erhebt sich so von der Mannichfaltigkeit der Erscheinungen zur Einheit des Begriffes; der gemeine Sinn unterscheidet Sonne, Mond und Erde, aber erst mit den allgemeinem Begriffen von Fixsternen, Planeten und Trabanten wird ein Wissen von diesen Körpern erlangt. Eben so beginnen wir die Erkenntniß eines Wesens damit, daß wir es aus einzelnen Gesichtspunkten betrachten, und jede seiner mannichfaltigen Eigenschaften für sich betrachten; wir untersuchen an einem Krystalle jetzt seine Schwere, dann seine Cohäsion, drauf seine Durchsichtigkeit u. s. w.; aber wir sehen ein, daß diese Eigenschaften nicht eigene Wesen sind, daß wir sie bloß zum Behufe der Forschung geschieden haben und sie dann in ihrer Einheit und gegen-

seitigen Durchdringung denken müssen, um zur Anschauung des Wesens selbst zu gelangen. So schied man denn am Menschen mit vollem Rechte Leib und Seele, und Niemandem wird es in den Sinn kommen, diesen Unterschied zu leugnen; aber indem man diese Seiten des lebendigen Organismus als eigene Wesen betrachtete, und es verschmähete, den gemeinsamen Begriff dieses Gegensatzes aufzufassen, ging man, offenbar irre. — Die Bedeutung und das Wesen eines Theils wird uns nur dann klar, wenn wir ihn mit den übrigen, ihm beygeordneten Theilen vergleichen und das Ganze überschauen. Nun hängt aber in der Erscheinungswelt Alles so innig zusammen, daß wir sie als ein Ganzes anerkennen müssen. Folglich muß die Naturforschung nicht bey der Betrachtung der einzelnen Erscheinungen stehen bleiben, sondern nach allgemeinen Ansichten streben, welche hinwiederum allein das rechte Licht über die einzelnen Erscheinungen verbreiten. Indem man dies verabsäumte, sah der Physiker in der Natur ein todtcs Räderwerk, der Psycholog in der Seele eine einfache Substanz; die Natur selbst blieb Beyden fremd. — Wenn wir zwey Dinge mit einander vergleichen wollen, müssen wir Jedes derselben in allen seinen Formen und Erscheinungen auffassen, und dann Beyde aus gleichen Gesichtspuncten betrachten: nur eine nichtswürdige Sophistik gebrauchte den Kunstgriff, das Eine in seiner idealischen Reinheit, das Andre in seiner niedrigern, vereinzeltcn Erscheinungsform darzustellen. Auf diese trügerische Weise hat man aber Natur und Seele einander gegenüber gestellt, indem man Erstere in ihrer Vereinzelung, als eine todtc Schlacke, namentlich das Leben als eine Maschineneinrichtung betrachtete, bey Letzterer aber immer nur ihre höchste Potenz, die Vernunft, im Sinne hatte. Wollen wir eine richtige Vergleichung gewinnen, so müssen wir die Seele in allen ihren Formen, wie sie im Menschen und im ganzen Thierreiche sich äussert, erfassen, und die Körperwelt nicht bloß in ihren einzelnen Erscheinungen, sondern auch in ihrer Gesamtheit, nach ihren obersten Gesetzen und nach ihren Urkräften vor Augen haben. — Hatte man in der Körperwelt nichts, als todtc Materie, im Organismus nichts, als eine Maschine zu finden geglaubt, so konnte man allerdings leicht beweisen, daß die Vernunft nicht aus dem Leben hervorsprossen könne, daß sie vielmehr durch eine unübersteigliche Kluft von allen Naturerscheinungen getrennt sey. Man meynte, daß aus den mannichfaltigen organischen Functionen nicht die Einheit der Seele hervorgehen könne, und vergaß, daß die organischen Functionen selbst aus einem ideellen Principe stammen. So zerrißcn denn Materialisten und Spiritualisten die Natur, und theilten sich in die Fetzen. Die Psychologen hatten dabey die wohlthynende Ansicht, die Seele gegen den Materialismus zu vertheidigen, und während, die Naturforschung gehe immer darauf hinaus, die Materie als ein Selbstständiges zu betrachten, und aus ihr die Seele, als eine feine Maschine, entspringen zu lassen, schieden sie die Seele lieber ganz von der Materie ab. Die Physiker ihrer Seite blieben in ihrer Apparatenkammer, bey ihren Experimenten und Berechnungen, die freye Himmelsluft von Zeit zu Zeit athmend, bloß um ihr Blut zu oxydiren, und verlachten als schöngcistcrisch und phantastisch jeden Versuch, die Natur in ihren allgemeinsten Beziehungen aufzufassen. In dem Geiste unserer Zeit liegt es aber, daß man sich von solcher Beschränktheit der Tendenz, so wie von den materialistischen Ansichten immer freyer macht, und hiermit werden auch dem Dualismus die Nerven durchschnitten. Er wollte die wichtigsten Angelegenheiten der Mensch-

heit, Freyheit des Willens und Unsterblichkeit sicher stellen; aber das Heilige auf einen Wahn stützen zu wollen, ist frevelhaft; ist dasselbe wirklich, so wird es auch auf dem Standpunkte der Naturforschung zu erkennen seyn. Wenn man endlich unsrer Ansicht vorwirft, daß sie eine Apotheose der Natur sey, so erwidern wir: wer die Natur entgöttert, dem lebt auch kein unendlicher Gott, sondern ein endlicher Götze treibt im beschränkten Kreise sein Zauberwerk; es ist ein *Deus ex machina*, der im tollen Gewirre des Lebens zu seiner Zeit angerufen wird, Ordnung zu machen.

§. 467. Die Frage nach einem Organe der Seele muß von einem folgerechten Dualisten schlechthin zurück gewiesen werden, denn er erklärt die Seele für durchaus der Materie entgegen gesetzt, für eine Negation der Raumerfüllung; folglich kann er auch nicht zugeben, daß sie ein Organ habe; denn durch dieses wäre sie an das Räumliche gebunden; er glaubt, sie werde dadurch herabgewürdigt, daß man sie von einer materiellen Bedingung abhängig macht, und die gemeine organische Masse könne nie das Gefäß der vom Himmel stammenden Seelenkraft werden. Allein, wir wiederholen es, der Dualist stellt die Seele zu hoch, die Materie zu niedrig. Betrachten wir beyde als Erscheinungen, so zeigt sich auch die Seele als ein Endliches, denn sie erscheint in der Zeit; Zeit und Raum sind aber die nothwendig verknüpften Formen der Endlichkeit; das Zeitliche ist das Vergängliche, Flüchtige, Bestandlose, welches das Räumliche berescht, aber in diesem erst zu einem beherrschlichen Daseyn gelangt. Blicken wir aber auf den Ursprung Beydes, so erkennen wir auch die materielle Welt als die Aeußerung der göttlichen Kraft. So ist das Leben des Leibes nicht aus bloßer Raumerfüllung zu erklären, sondern nur aus dem unendlichen Geiste abzuleiten, wiewohl es als Erscheinung durch eine bestimmte Raumerfüllung bedingt ist; so ist die Zeugung ein schöpferischer Act, welcher neues Leben und neue Seelenthätigkeit hervorruft, gleichwohl an Organe gebunden ist. Mögen wir doch endlich von dem Dünkel lassen, als ob die Seele zu vornehm sey, um mit dem leiblichen Leben eine gemeinsame Geburtsstätte zu theilen! Mögen wir die unwürdigen Begriffe von der materiellen Welt aufgeben, um die Einheit alles Daseyns und so die Macht des Unendlichen anzuschauen! — Einen andern, scheinbar gründlichen Einwurf gegen die Annahme eines Seelenorgans macht der empirische Psycholog. Er sagt nämlich: die Seele ist bloß Gegenstand des innern Sinnes, und in so fern nur nach Zeitbedingungen bestimmbar; die Frage nach einem Organe derselben legt ihr aber ein Raumverhältniß bey, widerspricht sich also selbst. Diese Empirie ist indeß nur eine unvollständige. Das Bewußtseyn verkündigt uns nämlich auch, daß unsre Seele individuell, in einem bestimmten Leibe waltend, also in bestimmten räumlichen Grenzen eingeschlossen ist. Wir fühlen diesen Leib als zu unsrem Wesen gehörig, und erkennen, daß unsre Seele an ihn gebunden ist. Eben durch diese räumlichen Schranken kommt sie erst zur Wirklichkeit, zur Erscheinung; diese Begrenzung wird eben der Grund der Persönlichkeit, der Individualität, so wie das leibliche Leben auch nur die Verwirklichung der Uridee an einer bestimmten Raumerfüllung ist. Daher ist denn auch die Seelenthätigkeit an das Räumliche gebunden: wir nehmen nur dasjenige wahr, was unsern Körper räumlich berührt, und können nur auf Solches wirken. Dieses räumlich bedingte Erkennen und Handeln ist aber Anfang und Ende unsrer Seelenthätigkeit, und ohne Beydes ist diese selbst

nicht denkbar. Wahrnehmen und Handeln, Berührtwerden der innern Einheit des Lebens durch das Räumliche und Rückwirkung auf dasselbe, sind die ursprünglichen und wesentlichsten Merkmale der Seelenthätigkeit; das Anschauen dieser Thätigkeit im Selbstbewusstseyn und die freye Bestimmung zum Handeln sind bloß höhere Potenzen, nicht aber selbstständige Kräfte. Daß wir das durch weite Räume von uns Getrennte, ja ein Unbegrenztes, Raumloses uns zu denken vermögen, ist eben so wenig ein Beweis für die Unabhängigkeit unsrer Seele vom Raume, als das Vermögen, das in der Vergangenheit und Zukunft Enthaltene, ja das Zeitlose zu denken, als ein Beweis für die Unendlichkeit derselben und für ihre völlige Unabhängigkeit von der Zeit gelten kann. Unsrer Seele ist ein an Zeit und Raum Gebautes, Endliches, wie jede andre Wirklichkeit; aber sie ist der Punkt in der Natur, wo das Daseyn zu dem Urseyn, die Erscheinung zum Wesen, das Endliche zu dem Unendlichen, von welchem es ausgegangen ist, zurückkehrt. — Ist nun die Seele einmal geknüpft an den räumlichen Bereich des organischen Leibes, so kann sie eben so gut auch innerhalb desselben an einem bestimmten Raum insbesondere gebunden seyn. Ja, wir erkennen dies als notwendig. Denn die Seele ist zwar die höchste und herrschende, aber doch immer eine besondere Lebenserscheinung, welche von andern sich unterscheidet, mit ihnen in gegenseitiger Beziehung steht, und nicht überall vorkommt, wo Leben ist. Wo aber das Leben in besondern Richtungen sich ergiebt, ist für jede dieser Richtungen auch ein besondres Organ gegeben; der organische Leib theilt sich in so vielerley Gebilde, als es Functionen giebt. Folglich muß auch für die Seele ein besondres Organ vorhanden seyn. Die Erfahrung sagt uns auch, daß die fühllosen Knorpel, Knochen, Sehnen, Flechten, Bänder, Gefäße, Zellgewebe, Säfte, nicht zum Bereiche der Seele gehören; sind nun von diesem mehrere Organe ausgeschlossen, so müssen bestimmte andre Organe ihn ausmachen.

§. 468. Ehe wir aber zu Betrachtung derselben fortschreiten, müssen wir uns einen Begriff von dem Wesen eines Organs überhaupt verschaffen, um eine richtige Ansicht von dem Verhältnisse des Seelenorgans zur Seelenthätigkeit zu gewinnen. — Dem Materialismus zufolge ist das Organ die vollständige Ursache der Function. Die Materie mit ihren mechanischen und chemischen Eigenschaften ist das Ursprüngliche und Selbstständige; durch die Aeussere dieser Eigenschaften entstehen die Thätigkeiten in der Natur; es giebt dem Wesen nach keine Kraft, sondern diese drückt nur das Verhältniß zwischen der Materie und ihren Aeussereungen aus. Die Stoffe treten in bestimmte Mischungen und Formen zusammen, und durch deren Zusammenwirken erwachsen Combinationen von Naturerscheinungen, welche wir als Leben bezeichnen. Die Functionen sind die Produkte der Organe. — In solchem Sinne könnte es kein Organ für die Seele geben. Wäre die Materie ursprünglich und allein vorhanden, so könnte auch keine Seele zum Daseyn kommen; das bloß den Raum Erfüllende könnte in Ewigkeit nicht die Anschauung gebären, sondern aus der Materie würden immer nur neue Bewegungen und neue Mischungen sich entwickeln. Diese Ansicht widerspricht also schon unserem Selbstbewusstseyn; sie erklärt aber auch das materielle Leben nicht. Denn sie setzt die Organisation als gegeben voraus, kann aber nicht nachweisen, wie diese regelmäßigen, unter einander übereinstimmenden und im Wechselverhältnisse auf einen gemeinsamen

Zweck hinwirkenden Organe aus der bloßen Materie entstehen. — Man glaubt gewöhnlich, der Physiolog gehe, wenn er sich in die Psychologie wagt, darauf aus, die Vorstellungen aus dem Baue des Gehirns zu erklären, weil er das übrige Leben in seinen materiellen Gründen erkenne, und da man an dem Erfolge jenes Strebens zweifelt, so möchte man den Physiologen lieber ganz von der Bearbeitung der Psychologie ausschließen. Allein diese Meynung beruht entweder auf einer gänzlichen Unbekanntschaft mit der Physiologie, oder auf einer groben Selbsttäuschung. Wir vermögen allerdings die Splitter des Lebens, nicht aber das Leben selbst aus den Eigenschaften der Materie zu erklären. Wir leiten das Vorratstangehen der einzelnen Momente einer Function aus der Materie mit mehr oder weniger Sicherheit ab, und erkennen so in der That, wie das Leben vermittelt wird; aber das, was diese einzelnen Momente giebt und zusammenhält, was den Vermittelungen zum Grunde liegt, können wir in der Materie schlechterdings nicht finden. Wir können getrost sagen: Demjenigen, der die Bildung des Speyesebräys aus dem Baue und der Mischung des Magens uns vollständig erklärt, Dem wollen wir auch das Geheimniß anvertrauen, wie die Hirnfasern die Vorstellungen machen. Die Physiologie erkennt die Organe als die materiellen Bedingungen der Verwirklichung des Lebens in seinen einzelnen Momenten an: das Leben als Ganzes, in seinem Wesen und Grunde ist aus der Materie unerklärlich. — Nach der dualistischen Ansicht ist das Organ das Werkzeug der Kraft. Das Leben ist etwas Eigenes, Selbstständiges, Inneres, von der Materie ganz Geschiedenes und über sie Erhabenes; um aber zur Wirklichkeit zu kommen, bedient es sich der Materie. So hat denn auch die Seele ihre Werkzeuge, mit welchen sie arbeitet, ungeachtet sie ihr eigentlich fremd, ja ihr so entgegengesetzt sind, daß das Eine das Andre ausschließt; die Seele bedient sich des Gehirns, wie der Musiker des Claviers. — Allein wie kann sie dasselbe bestimmen, wenn sie ihm schlechthin entgegengesetzt ist? Der Gebrauch eines Werkzeugs setzt schon Uebereinstimmung des Wesens des Gebrauchenden und des Gebrauchten voraus. Die Hand kann sich der Zange, des Messers, des Hebels bedienen, weil ihre Lebendigkeit selbst in mechanischer Wirksamkeit besteht, weil sie selbst der Zange, dem Messer, dem Hebel gleich wirkt. Der Gedanke an sich macht nicht das Clavier erklingen, sondern die Finger des Musikers und die Tasten des Instruments sind die einander entsprechenden Zwischenglieder, um das, was in jenem liegt, aus diesem hervorzulocken. — Philosophen glaubten, den Knoten durch einen dogmatischen Nachspruch mit einem Schlage durchhauen zu müssen, und erklärten die Verbindung der beyden als fremdartig angenommenen Wesen aus einem physischen Einflusse, einer gelegentlichen Verkettung, einer prästabilierten Harmonie, einer Trübung der Freyheit durch Nothwendigkeit. Dies sind offenbar gewaltsame Fictionen, die im Einzelnen eben so wenig zu widerlegen, als zu beweisen sind, weil sie weder auf Thatsachen, noch auf Vernunftgesetze sich gründen, sondern rein aus der Willkühr hervorgehen, die man daher auch nur in ihrem Principe angreifen kann. Alle wissenschaftliche Physik muß ein Princip haben. Dies kann nicht in ihr selbst liegen, da sie es immer nur mit Besondrem, Mannichfödigem, zu thun hat. Nun liegt auser der Physik nur die Metaphysik: jene ist das Werk des Verstandes, diese der Vernunft; jene betrachtet das Endliche, diese hat das Unendliche zum Gegenstande.

Wie müssen also die einzige Grundlage aller Naturforschung, auf welche alle Erscheinungen am Ende zurückgeführt werden, in der Vernunftanschauung, in der mit absoluter Nothwendigkeit sich ankündigenden Idee des Unendlichen finden. Aber auch nur hier, an der Gränzmarke der Physik, dürfen wir, aus dem Kreise der Erfahrung treten. Wollen wir für einzelne empirische Gegenstände, besondre übersinnliche Gründe annehmen, so verirren wir uns vom Wege der Naturforschung in hyperphysische Fiktionen. Diese sind durchaus leer und gehaltlos, unstatthafte Nothhülfen, Pfeiler, welche von dem Gefälle, das sie stützen sollen, herabhängen und nach dem Fundamente sich ausstrecken, ohne es je zu erreichen. Die Wechselwirkung der Seele mit dem Leibe ist aber eine Thatsache, deren Kenntniß wir nur der Erfahrung verdanken; und sie ist eine besondre Thatsache, denn wir machen unzählige andre Erfahrungen in uns und in der Aussenwelt, wo keine Wechselwirkung zwischen einer Seele und einem Leibe offenbar wird. Also muß die Erscheinung auch als einzelner Gegenstand der Naturforschung behandelt und von hyperphysischen Trümereyen frey erhalten werden. — Physiologen, erkennend, daß die Seele, um das ansser ihr liegende Organ handhaben zu können, selbst wieder Organe haben müßte, nahmen wirklich auch dergleichen als Mittler, und dachten sich als solche eine äusserst subtile Materie, Nervengeist, thierische Geister, Aether. Allein diese Annahme ist 1) ganz grundlos, da wir keine solche Materie in der Erfahrung nachweisen können; sie führt also uns von dem Wege der Naturforschung ab zu hyperphysischer Taschenspielerrey, welche es sich bequem macht, und bey jeder Verlegenheit sich damit hilft, daß sie einen dienstwilligen Spiritus citirt. 2) Sie hilft aber auch durchaus nichts für die Erklärung, löset die Schwierigkeit nicht, sondern verschiebt sie nur, erreicht also ihren Zweck nicht. Denn soll die Seele etwas die Materie Ausschließendes seyn, so begreift man immer nicht, wie sie mit diesem Aether in Verbindung treten kann, der darum, daß er äusserst fein ist, doch nicht aufhört, den Raum zu erfüllen, also Materie zu seyn. Man will doch nicht in die Kinderseit der Begriffe zurückkehren und meynen, daß die Körperlichkeit in einem gewissen Grade von Dichtigkeit bestehe, das Dünne, Luftartige immateriell sey und der Stoff durch das Verdunsten aus dem Raume hinausgetrieben werde? 3) Diese Annahme führt endlich zu nichts Andreem, als zum Materialismus. Soll nämlich der Aether als Materielles darum allein im Stande seyn, auf die Seele zu wirken, weil er so zart ist, so müßte die Seele dem Aether gleich selbst materiell seyn; denn das Zarte bezeichnet ja keinen wesentlichen, sondern nur einen quantitativen Unterschied. Dieses Materialisiren der Seele entsprach ganz dem beliebten Materialisiren der Naturkräfte. Wir sehen an den Körpern eine besondre Wirkksamkeit hervortreten und wieder verschwinden, ohne daß wir eine Veränderung in ihrer Materialität, in den mechanischen und chemischen Eigenschaften ihrer Substanz als den Grund davon zu erkennen vermöchten; es werden hier Thätigkeiten frey oder gebunden, nicht als besondre Wesen, sondern als besondre Modificationen der in den Körpern enthaltenen Kraft. In dem Kreise der Erfahrung uns haltend, erkennen wir also besondre Thätigkeitsäusserungen, dynamische Erscheinungen, erforschen die Bedingungen, unter welchen sie hervortreten, die Gesetze, nach denen sie erfolgen, und die Wirkungen, welche sie hervorbringen, und abstrahiren aus dem Zusammenhellen von dem Allen den

jeder Einzelnen zum Grunde liegenden Begriff. So will es die empirische Naturforschung. Allein man begnügt sich nicht, die Erscheinungen, wie sie der Erfahrung sich darstellen, anzuerkennen, sondern nimmt einen magnetischen und elektrischen Stoff, einen Wärmestoff und einen Lichtstoff an. Es war nicht folgewidrig, wenn Einige auch einen Kältestoff und einen Dunkelheitstoff, welchen sie eine ätherische Dinte nannten, hinzuzählten; auch mit einem Schallstoffe sind wir beschenkt worden, und Mancher denkt sich wohl wenigstens im Stillen einen Cobäzionsstoff als einen Urleim der Welt, und einen Schwerstoff, der sich an die Körper als Gewicht anhängt. Bodient man sich dieser Ausdrücke bloß als solcher, um der Leichtigkeit und Boquemlichkeit der Rede willen, so ist nichts dagegen einzuwenden; will man aber damit wirkliche Wesen bezeichnen, so bevölkert man die ganze Natur mit mythologischen Stoffen, und macht die Naturlehre zu einem Märchen, wo die Jahreszeiten, die Fruchtbarkheit, die Vergänglichkeit u. s. w. personificirt erscheinen. Eine solche mythologische Person ist denn auch der Aether, welcher die Wechselwirkung zwischen der Seele und ihrem leiblichen Organe ausdrücken soll. — Die gröbere, niedrigere, an das Gehirn geknüpfte Seele, welche Einige im Gegensatz zur immateriellen Seele annehmen, ist eine fliegende Brücke, welche sich über die Kluft zwischen Materiellem und Immateriellem erstreckt, die aber, wenn sie einen Grund haben soll, ihn nur in beyden Reichen finden kann, dann aber auch das Binsseyn Beyder beweisen muß. Wozu nun erst die Kluft graben, um dann die Brücke aufzuführen? Diese niedere Seele soll als Stufenleiter Himmlisches und Irdisches verbinden; was sich aber verbinden läßt, muß Berührungspuncte haben, übereinstimmen im Wissen, und nur relativ verschieden seyn, als Höheres und Niederes. — Wie steht es denn ferner mit der gepriesenen Unabhängigkeit und Herrlichkeit der menschlichen Seele, wenn sie, um zum Daseyn und zur Wirkksamkeit zu kommen, erst einer Krücke aus einer ihr fremden Welt bedarf? Fast möchte man das Daseyn des Steins uns gediegenen dünken, der, was er ist, durch seine innere Kraft ist, ohne der Beyhülfe einer fremdartigen Natur bedürftig zu seyn. — Und: woher stammt denn endlich jenes Organ, welches von der Seele, wie das Instrument von dem Musiker, gebraucht wird? Das schaffende Princip, welchem es seinen Ursprung verdankt, muß natürlich die Musik, welche durch dasselbe hervorgebracht werden soll, selbst inne haben: es muß geistig seyn. Dieser schöpferische Geist kann nun entweder sein Material bloß von aussen her empfangen und nichts daran thun, als es verarbeiten; dann ist er abhängig, beschränkt, kein wahrhafter Schöpfer; oder er erzeugt das Material aus sich selbst; und dann sind Leib und Seele in ihrem Ursprunge aus dem Unendlichen einander gleich.

§. 469. Befriedigender ist die Ansicht des Organs als der fixirten Thätigkeit, als des Beharrlichen der Kraft. Da die Materie nur durch Thätigkeit besteht und auf ihr beruht, aber als Beharrliches sich auszeichnet, so muß sie daraus entspringen, daß die Thätigkeiten, welche allein als das Ursprüngliche anerkannt werden müssen, einander hemmen, und dadurch gleichsam zum Steha gebracht werden. Hemmung ist der Charakter des Endlichen; wo also nur eine endliche Thätigkeit sich zeigt, muß sie an der Materie hervortreten. Nun besteht das Wesen des Lebens darin, daß die aus der unendlichen Idee hervorgegangenen, im Unorganischen vereinzelt auftretenden Naturthätigkeiten, in einem

Einzelwesen zu einem Ganzen sich vereinen; welches als Abbild des Weltganzen, mithin als das Offenbarwerden des Unendlichen im Endlichen sich darstellt. Das Eintreten der unendlichen Idee in einen bestimmten Kreis der Wirklichkeit ist aber nichts Andres, als der Begriff. Folglich ist der sich zu verwirklichen strebende Begriff eines individuellen Abbildes des Weltganzen das Wesentliche und Bestimmende des Lebens, das eigentlich Schöpferische im Organismus. Die Verwirklichung dieses Begriffs ist das Ziel aller Functionen; die zu beharrlichem Seyn gelangten Functionen sind aber die Organe. Daher erscheint 1) die Lebendigkeit früher, als das organische Gebilde: sie regt sich im Wassertropfen zur Bildung des Schimmels; sie wirkt in einem Tropfen Lymphe, und schafft aus ihm einen thierischen Organismus. 2) Sie wirkt bey ihren Schöpfungen auf die Zukunft, auf die Erreichung eines fernn Ziels zweckmäßig hin. Was immer im Begriffe des Individuums liegt; was im Leben je werththätig sich entfalten soll, erscheint mit seinem ersten Entstehen: Verdauung und Athmen, Sinnesenthätigkeit und freye Bewegung, Vorstellung und Zeugung treten in dem dazu noch unreifen Embryonenleben als Ahnungen hervor, die sich als die Organe künftiger Verwirklichung gestalten. 3) Die ersten Functionen erscheinen früher, als ihre Organe: das Blut bewegt sich, ehe noch Arterien und Venen zu sehen sind, und das Gefäßsystem erscheint nur als der sich selbst begrenzende Blutlauf. 4) So zeigen sich auch die Triebe früher, als die Functionen: in den Athmungsbewegungen des Embryo regt sich der Trieb nach künftigem Athmen; das junge Thier beginnt den Gebrauch seiner Organe, ehe diese noch hinlänglich entwickelt sind; und in der Seele des Kindes verkündigt sich schon der künftige Beruf. 5) Je nachdem der Begriff einer Art von organischen Wesen verschieden ist, erscheint auch die Organisation verschieden, während die Functionen im Ganzen dieselben sind. Verdauung, Athmen, Empfindung, Bewegung, Fortpflanzung sind Lebensthätigkeiten, die dem ganzen Thierreiche zukommen, aber sie gehen vor sich bald in einer gleichförmigen thierischen Substanz, ohne irgend ein besondres Organ, bald wieder in eignen, aber ganz verschiedenen gestalteten Organen: z. B. dieselbe Absonderung, welche in einem niedern Thiere schon durch einfache Canäle vermittelt wird, kommt bey einem höhern Thiere nur durch einen drüsigen Apparat zu Stande. 6) Jede Function ist immer nur vom Gesamtleben abhängig; das einzelne Organ vermag nichts durch sich, sondern nur durch den Zusammenhang mit dem lebendigen Ganzen. Lussert es seine eigenthümliche Thätigkeit. Zum Beispiel die Nieren sind nicht das eigenmächtig Harnbildende, sondern der lebendige Organismus bildet den Harn mittels der Nieren; daher ändert sich die Harnbildung in Quantität und Qualität nach Massgabe des im Gesamtzustande des Lebens eintretenden Wechsels, ja sie dauert fort, nachdem die Nieren selbst zerstört sind. Denn das Organ, als Product des Lebens, erleidet zwar das fernere Vorstättgehen desselben in einer bestimmten Richtung, aber es kann ersterben und dennoch die Function fortsetzen, indem das Leben, wenn es im Ganzen stark genug ist, ein neues Organ sich schafft. So ist die Knochenbildung eine Function, welche in dem bestehenden Knochen als stetige Fortsetzung oder als Ernährung leicht vor sich geht, nach Zerstörung des Knochens aber als eigenmächtige, freye, zweckmäßige Bildung hervortritt, wenn die Plasticität überhaupt hinlängliche Kraft besitzt.

§. 470. Wir halten also für unsere weiteren Untersuchungen folgende Ansicht fest. Das Leben ist überall nicht aus endlichen Kräften abzuleiten, sondern aus dem Unendlichen, aus der Idee; aber es offenbart sich am Endlichen und geht durch die einzelnen Naturkräfte von Statten. Das Ursprüngliche an einem lebenden Wesen ist der Begriff desselben, oder die Beziehung der Idee auf ein bestimmtes Endliches. Dieser Begriff des lebenden Wesens ist ein Einiges; aber schließt mehrere niedere, besondere Begriffe in sich, und indem er in diesen sich verwirklicht, tritt das Leben in seinen verschiedenen Richtungen und Formen, oder in den mannichfaltigen Functionen hervor. Wie das Leben, um sich zu verwirklichen, den organischen Körper sich bildet, indem es die allgemeinen Elemente in, eigenthümliche, seinem Wesen angemessene Verbindungen bringt und der Materie sein Gepräge aufdrückt, so schaffen sich die Functionen ihre Organe, als ein Beharrliches, welches nun die materielle Bedingung ihres Vorrattengehens, oder ihr Träger wird. Das Organ stammt also aus dem Begriffe der Function, und bedingt die Verwirklichung desselben, wie dies auf eine sinnige Weise schon in dem Namen: Organ, ausgedrückt ist; der Begriff der Function aber wurzelt in dem Gesamtbegriffe des Lebens.

§. 471. Wenn wir also der Seele ein Organ beylegen, so sagen wir keinesweges damit, daß sie aus demselben hervorgehe, noch auch daß sie es als ein fremdes Werkzeug zu ihrer Arbeit handhabe, sondern daß sie einen beharrlichen Ausdruck ihrer selbst hat und ihren allgemeinen Begriff im Raume verwirklicht, da dieser immer in Verbindung mit der Zeit alles Endliche bezeichnet. In der Erscheinung tritt das Niedere, Aeusserere immer früher hervor, aber nur durch die Macht des Höhern, Innern; die organische Gestaltung ist keine rein materielle Wirkung, sondern gleich anfänglich Organ zu Verwirklichung des Begriffs. So erscheint denn das Gehirn im Leben, ehe noch die Seele wirklich sich äussert, aber es bildet sich nur dadurch, daß der Gedanke der Seele als Vorbild waldet und verwirklicht seyn will. Daß die Seele selbst späterhin auf ihren leiblichen Ausdruck wirkt und den Bildungshergang des Gehirns bestimmt (§. 384 — 389), ist nun begreiflich.

§. 472. Daß aber das Gehirn wirklich Seelenorgan sey, haben wir bis jetzt bloß nach pathologischen Erfahrungen (§. 359 — 383.) angenommen. Wiewohl es nun durch anderweitige Erfahrungen vollkommen bestätigt wird, so bleibt uns doch noch übrig, die Nothwendigkeit desselben morphologisch, d. i. in der Uebereinstimmung zwischen den Begriffen der Seele und der Gestaltung des Gehirns zu erweisen. — Die Seele ist überhaupt eine dynamische Erscheinung (§. 457.), eine innerliche Lebensfähigkeit, welche weder in materieller Bildung, noch in äusserer Bewegung, noch überhaupt in räumlicher Wirklichkeit besteht; diese Merkmale kommen nur dem Nervensystem zu (§. 7.); folglich ist in diesem einzig und allein das Organ der Seele zu sehen. — Das Nervensystem in seiner Gesamtheit kann nicht als das Seelenorgan betrachtet werden, denn die Nerven bezeichnen nur das Vertheilte, Peripherische, die Gemeinschaft der Seele mit dem Leibe und dadurch mit der Welt Vermittelnde; die Seele aber ist das Einige, Allgemeine, Central, Herrschende, der mit seinen Radien in lebendiger Beziehung stehende, aber zu eigenem Leben sich erhebende Brennpunct, in welchem 1) alles Einzelne, Geschiedene sich durchdringt zu einem Einigen; welches 2) mächtiger, als das Einzelne,

dasselbe beherrscht; 3) durch eigene Kraft über die Einzeinheiten sich erhebt, das Allgemeine erfasst, von den Erscheinungen zum Wesen, von den Wirkungen zum Grunde vordringt; 4) als das Höchste im Leben sich bewährt. Dieselben Merkmale, welche hier auf reine Thätigkeit, auf eine in der Zeit hervortretende Wirkksamkeit bezogen sind, finden wir nun räumlich dargestellt im Gehirn. Dieses nimmt nämlich 1) die für das Seelenleben wichtigsten Nerven unmittelbar, die übrigen aber insgesamt mittelbar in sich auf, indem das Rückenmark mit seinen Nerven in dasselbe übergeht; die Rumpfnerven aber sich an die Nerven des Gehirns und Rückenmarks anschließen; das Gehirn ist also das gemeinsame Centrum des Nervensystems. 2) Es überwiegt alle übrigen Theile dieses Systems an Masse und an organischer Ausbildung; die Nervensubstanz ist in ihm am reinsten, am meisten geschieden von andrer Substanz, am mächtigsten, am freiesten entwickelt. 3) Ausser der Masse, in welche zunächst die centralen Nervenenden sich einsenken, enthält es noch eigenthümliche Gebilde, welche eine vollkommene Organisation haben, mancherley Gegensätze zu einander bilden, und als höhere Entwicklungen jener Masse erscheinen. 4) Es ist unter allen Organen dasjenige, in welchem die organische Bildung am vollendetsten erscheint (§. 87.). Das Gehirn trägt also dieselben Merkmale räumlich in sich, welche der Seele zeitlich zukommen: es ist also das leibliche Abbild der Seele, die materielle Bedingung ihres Erscheinens in der Endlichkeit.

Zweiter Abschnitt.

Vom pflanzlichen Hirnleben:

§. 473. Wenn das Gehirn das Organ einer besondern Lebensthätigkeit ist, so muß ihm auch die allgemeine Lebendigkeit und die organische Beziehung überhaupt zukommen. Nach den oben (§. 222—351.) zusammengestellten Thatsachen erkennen wir auch wirklich, daß in unserem Gehirn eine Lebensthätigkeit vor sich geht, deren wir uns nicht bewußt werden, und die wir nicht willkürlich bestimmen können; eine Thätigkeit, welche, während sie durch das Leben der übrigen Organe bedingt ist, dasselbe hinwiederum bestimmt und zum Theil selbst bedingt; welche endlich theils in Bildung des Gehirns sich äußert, theils an den Bildungshergängen des übrigen Leibes Antheil nimmt: kurz, eine Thätigkeit, welche bloß den allgemeinen Charakter des organischen Lebens an sich trägt, und deshalb als ein pflanzliches bezeichnet werden kann. Es wirkt also in unserem Gehirn, so wie in unserem übrigen Leibe, ein Princip, welches nicht dasselbe mit unsrem Ich, und doch ihm zugehörig und mit ihm verbunden ist. Es ist nicht an ein besondres Gebilde geknüpft, nicht mit einer eignen Materie, welche seiner eigenthümlichen Wirkksamkeit entspräche, verbunden, also auch nicht materiell; aber es erzeugt die organische Materie, äußert sich an ihr, und wird durch sie hinwiederum bestimmt. Seine Wirkksamkeit besteht zunächst weder in einer Bewegung, noch in einer Mischungsveränderung, aber sie hat Beides zur Folge. Es läßt sich nicht zusammendrücken oder entmischen, aber seine Äusserung ist von mechanischen und chemischen Verhältnissen abhängig, und wird durch einen Druck oder eine Entmischung gestört.

Dies pflanzliche Hirnleben ruht nicht auf einem eignen Princip, sondern ist Eins mit dem allgemeinen pflanzlichen Lebensprincipe, und nur eine besondre Form desselben. Diese Einheit äussert sich als Einklang aller besondern Formen unter einander: eine Jede entspricht vermöge ihrer Qualität der Beschaffenheit der Andern, und so stellen sie vereint ein Ganzes dar, welches in der Wechselwirkung seiner Glieder fortlebt. Dieser Einklang ist an sich nicht materiell und durch ein räumliches Verhältniß gegeben, vielmehr das ursprüngliche Ziel der Bildung; aber er setzt ein Materielles, welches die Bedingung für das Bestehen seiner Aeusserung wird. So spricht sich der Einklang und die Wechselwirkung zwischen dem Gehirne und dem übrigen Leibe in den Gefäßen und Nerven aus: die Hirngefäße sind die Repräsentanten des Herzens und dadurch des ganzen Rumpfs im Gehirne, und durch seine Nerven lebt das Gehirn im übrigen Leibe. Diese vermittelnden Gebilde sind zunächst Ausläufer der Centralorgane, welche die Kraft derselben verkünden und ihre Lebendigkeit verbreiten; aber sie empfangen auch Eindrücke, welche sie auf die Organe, in welchen sie sich sammeln, übertragen: das pflanzliche Hirnleben wird im Ganzen durch das Blut mehr bestimmt, dennoch wirkt es auch durch die Veränderungen, welche es in ihm setzt, auf das Leben des Rumpfs; und es bestimmt mittels der Nerven vorzüglich das Rumpfleben, empfängt aber auch durch sie die erregende Einwirkung desselben.

§. 474. Aus dem von dem mütterlichen Körper gebildeten thierischen Wasser geht nach der Befruchtung zuerst die Fruchthülle hervor, welche die Abschneidung und individuelle Begränzung des erwachenden Lebens, die Verknüpfung mit dem Aeussern und die rein pflanzliche Thätigkeit bezeichnet: das Aeussern, Pflanzliche entsteht also früher, als das Innre, Thierische. Dieses aber beginnt sogleich mit seinem Centralorgane, dem Rückenmarke und dem Rudimente des Gehirns, so daß nun die Frucht aus zweyen Organen besteht, welche die Herde des pflanzlichen und thierischen Lebens darstellen: Das Frühere, Aeussern, Pflanzliche, die Fruchthülle, ist aber vergänglich und hinfällig, während die sensible Centralmasse den bleibenden Kern des Lebens ausmacht. Sie ist also in Bezug auf die übrigen bleibenden Gebilde das Urgan: während diese aus der Fruchthülle und dem in ihr erzeugten Blute sich entwickeln, tritt jene aus dem ursprünglichen thierischen Wasser hervor. Wenn dieses frühere Erscheinen sich darauf bezieht, daß die sensible Centralmasse den wesentlichsten Theil des künftigen Organismus ausmacht, so muß es auf der andern Seite auch einen nächsten, materiellen Grund haben, und dieser scheint darin zu liegen, daß in dem ursprünglichen thierischen Wasser vorzüglich Eyweistoff enthalten ist, welcher leicht sich abscheidet, und daß die sensible Centralmasse in Vergleich mit den übrigen festen Gebilden theils am meisten aus reinem Eyweistoffe besteht, theils am schwächsten geronnen, und am wenigsten verdichtet ist, folglich als der erste Niederschlag aus dem ursprünglichen thierischen Wasser erscheint.

§. 475. Diesen materiellen Charakter behauptet das Gehirn auch im Verlaufe des Lebens. Es empfängt in der Gesamtmasse des Bluts seinen äussern belebenden Einfluß, verwendet aber vorzüglich das Wasser desselben zu seiner Ernährung (§. 234). Oertliche Wasseranhäufung entsteht in ihm ungleich häufiger, als in einem andern Organe, und

kommt unter seinen Abnormitäten mit am häufigsten vor (nach der I. Tabelle wie 1:6, 8-); es leidet dabey zugleich an Atrophie, welche entweder die Ursache oder die Wirkung der übermäßigen Wasserbildung ist und wohbey sein Eyweissstoff festet gerinnt (§. 218.). Eben so bezeichnet sich das Gehirn durch eine schwächere Gerinnung; und eine krankhafte Erweichung kommt am häufigsten unter seinen Abnormitäten vor (nach der I. Tabelle = 1:6, 3.). Vermöge dieser Weichheit geht es häufig in eiterige Auflösung über (= 1:6, 9.), und dieselbe geringe Consistenz ist zum Theil die Ursache der öftern Blutergießung (= 1:7, 5.). Die krankhafte Erweichung entsteht besonders von einem gereizten Zustande, Entzündung und Blutergießung (§. 254.); die Verhärtung hingegen von darniederliegender Thätigkeit, Erschütterung u. s. w.

§. 476. Wie das Leben überhaupt auf einem geistigen Grunde ruht (§. 462.), so besteht der Gesamtcharakter jedes Lebendigen darin, daß in der Art seines Erscheinens der Gedanke offenbar wird, daß in seinen Theilen und Thätigkeiten, in seinen gleichzeitigen und auf einanderfolgenden Aeusserungen das Verhältniß von Zweck und Mitteln stets hervorleuchtet. Dieses Verhältniß, welches allem pflanzlichen Leben gemein ist, spricht sich auch an dem Gehirn aus. Wir finden an ihm räumliche Einrichtungen, welche, indem sie das freye Zuströmen und Abströmen des Bluts möglich machen, für das freye Vorstattengehn seiner pflanzlichen Lebensthätigkeit berechnet sind (§. 227—231.). Eben so zeigt sich ein zweckmäßiges Wirken in dem durch räumliche Einrichtungen bedingten Heilbestreben. Durch seine Bewegung hebt es eingedrückte Stellen des Schädels (§. 241.); durch die in ihm verbreiteten Gefäße regenerirt es sich an einzelnen Stellen (§. 236.); das in ihm ergossene Blut kann wieder eingesogen (§. 252.), und die dadurch entstandne Höhlung wieder durch Erzeugung neuer Substanz oder durch Verwachsung ausgefüllt werden (§. 244.); es kann eingedrungene fremde Körper umändern und unschädlich machen (§. 240.); und was ihm auf der einen Seite abgeht, wird ihm von der andern ersetzt (§. 228.).

§. 477. Wie bey Schädelwunden das Gehirn durch seine, namentlich durch das Athmen verstärkten Bewegungen fremdartige Stoffe austreibt (§. 272.); so kann es auch sonst auf organischen Wegen der krankhaften Stoffe sich entledigen. Ein solcher unmittelbarer Absatz wurde allerdings im Alterthume zu allgemein angenommen, da man von stellvertretenden und antagonistschen Absonderungen keinen Begriff hatte, sondern überall Wanderungen, krankhafter Secretionsprodukte zu sehen glaubte, und bey unzureichender Kenntniß des Banes über die Bestimmung der Wege für diese Versetzungen nicht in Verlegenheit war. Allein man ging späterhin auch auf der andern Seite zu weit, indem man die Verbreitung von Flüssigkeiten im organischen Körper auf die Heerstraße der Canäle und Gefäße einengte, jedes Häutchen als eine undurchdringliche Gränzmauer betrachtete und auf die Porosität der thierischen Substanz keine Rücksicht nahm. Erst in unsern Zeiten hat man die letztre Eigenschaft wieder mehr gewürdigt, zugleich aber auch anerkannt, daß das wirkliche Durchdringen von Flüssigkeiten durch die organische Substanz mehr von dynamischen, als von mechanischen Momenten abhängig ist. Auf diesem Standpuncte müssen wir nun auch anerkennen, daß eine an der Oberfläche des Gehirns befindliche Feuchtigkeit durch Hirnhäute, Schidel und äussere Haut hervorbringen kann, wenn wir auch zugeben, daß öfters ein dynamisches Verhältniß, eine

Steigerung der lebendigen bildenden Thätigkeit der äussern Theile, wodurch der abnorme Bildungsbergang in den innern Organen antagonistisch herabgesetzt wird, der materiellen Versetzung zum Grunde liegt. Die Erfahrungsgründe dafür sind folgende. a) Es kann Blut durch den Schädel dringen. Tulp (p. 4) sah bey einer Schusswunde, wo bloß die innre Tafel gespalten war, unzählige Blutstropfen aus dem Schädel treten, die immer von Neuem erschienen, wenn sie abgewischt worden wären. Eine solche Ausschwitzung von Blut nach dem Tode bey Blutergießung auf der festen Hirnhaut sah Bucholz (II S. 181.) an einem Ertrunkenen, und Pyl (III S. 114.) nach einer Kopfverletzung. Lestrier (VII S. 71.) beobachtete dieselbe Erscheinung auch ohne Extravasat bey einem Ersticken und bey einem Ertrunkenen. Zu bemerken ist, daß die Subjecte, an welchen diese Beobachtungen angestellt wurden, Kinder oder junge Leute waren. b) Eiter durch die Staturen schütten. In einem Falle, wo nach den Symptomen zu urtheilen, Eiterung innerhalb der Schädelhöhle in Folge einer Kopfverletzung Statt fand, beobachtete DuRoi (Journ. de med. XXX p. 17.) die Genosung, als an der hintern, untern Ecke des Scheitels Eiter in eine Geschwulst sich sammelte und ausgeleert wurde. Zweydeutiger sind die Beobachtungen von Marchettis (obs. p. 18—24.), Tulp und van der Wief (p. 32.). c) Wasser, oder Eiter und Blut dringt durch die von Nerven und Gefäßen ausgefüllten Schädellocher, und wird durch das Ohr (S. 336.) oder die Nase (S. 337.) ausgeleert, oder sieset durch den Wirbelkanal (S. 608.), oder geht durch den Darm (S. 310.) oder die Harnwege (S. 327.) ab.

§. 478. Dieses Wirken von innen nach aussen ist aber noch allgemeiner. Wie überall das Innre, Lebendigere als das Herrschende sich bezeigt und das Aeusserre, Niedre bestimmt, so zeigt sich dasselbe Verhältniß auch am Gehirne, als Vorbild seiner Bedeutung im pflanzlichen Leben. Alle Aftergebilde wirken mehr nach aussen, als nach innen (S. 258.). Die Gefäßhaut wird vom Gehirne aus regeneriert (S. 236.), und ihre Aftergebilde wirken mehr gegen die feste Hirnhaut und den Schädel, als gegen das Gehirn (S. 259.). Die feste Hirnhaut ist vom Gehirne abhängig und bestimmt den plastischen Proceß des Schädels (S. 219) und seiner Bedeckung (S. 246). Der Schädel wird in seiner Gestalt vom Gehirne bestimmt (S. 269) und übt einen vorzüglichen Einfluß auf das Pericranium aus.

§. 479. Wie im pflanzlichen Leben überhaupt der typische Wechsel herrscht, und seine Wirkksamkeit bald in dieser, bald in jener Richtung stärker hervortritt, so findet dies auch im Gehirne Statt. Nerven des Einathmens und des Ausathmens folgen an ihm und dem Rückenmarke abwechselnd auf einander (S. 298.), und da sie von ihren Centralpunkten aus abwechselnd wirken, so muß auch in den Centralpunkten selbst ein gleiches Verhältniß gegeben seyn, oder jeder Theil pulsirend, mit den zunächst angrenzenden Gliedern antagonistisch und mit den darauf folgenden consensuell wirken. Der periodische Wechsel im pflanzlichen Hirnleben äussert sich übrigens noch in andern Erscheinungen (S. 294.).

Dritter Abschnitt.

Vom pflanzlich-psychischem Hirnleben.

I. Wesentlichkeit.

1. Uebereinstimmung.

§. 480. Nachdem wir im Gehirne eine psychische und eine pflanzliche Thätigkeit anerkannt haben, so kommt es nun darauf an, das Verhältniß beyder zu bestimmen. Wenn die Seelenthätigkeit eine Lebenserscheinung ist, das Leben aber in seiner Allgemeinheit als pflanzliche Thätigkeit hervortritt, so ergibt sich schon daraus, daß beyde Thätigkeiten des Gehirns nicht schlechthin verschieden seyn können, sondern in einem gemeinsamen Begriffe zusammentreffen und relativ verschiedene Aeusserungen derselben Kraft seyn müssen. Wir erweisen dies aber aus denselben Gründen, wie die Identität der Seele und des Lebens, aus dem gemeinschaftlichen Vorkommen der pflanzlichen und psychischen Hirnthätigkeit (§. 481.), aus der Uebereinstimmung des Charakters und der Aeusserungsart beyder (§. 482-483.), aus ihrer Gemeinschaft und Wechselwirkung (§. 484.) und aus ihrem Uebergange in einander (§. 485.).

§. 481. Das Gehirn ist ein Einiges, und sein Leben muß auch ein Einiges seyn, denn ein und dasselbe Wesen kann nicht schlechthin verschiedene Arten des Wirkens haben. Mithin muß dem Gehirne eine Lebendigkeit zukommen, welche theils in pflanzlichen, theils in psychischen Erscheinungen sich äußert; diese Doppelseitigkeit gehört also mehr der Erscheinung, als dem Wesen an. Schon an den Nerven sehen wir es deutlich, daß beyderley Aeusserungen durch ein und dasselbe Organ vollzogen werden; jeder, auch der reinste Empfindungsnerve wirkt zugleich auf die Plasticität, und Keiner ist der Empfindung unfähig, wenn er auch vorzugsweise auf Plasticität oder auf Willkühr sich bezieht.

§. 482. Beyde stimmen in ihrem Charakter überein. Indem das pflanzliche Hirnleben die als besondere Function auftretende Einheit und Gesamtheit des Lebens ist, (§. 539.) stimmt es in seinem allgemeinen Begriffe mit der Seelenthätigkeit überein, und erscheint als der Ausdruck derselben in der löblichen Sphäre. Die Seelenthätigkeit selbst aber trägt den allgemein organischen Charakter an sich, in den Verhältnissen ihrer Erregung, indem diese ihre Stimmung und das Temperament geben. Nach anhaltender Anstrengung der Geistesthätigkeit fühlt sich die Seele ermattet; bey fortdauerndem Interesse für ihren Gegenstand, ja bey dem ernstesten Wunsche, durch fortgesetzte Betrachtung tiefer in ihn einzudringen, geht die Verknüpfung der Gedanken träger vor sich, die Vorstellungen verlieren an Klarheit und Lebhaftigkeit, und das Urtheil ist minder scharf; erst nach der Ruhe kehrt die vorige Kraft wieder zurück. Eben so tritt nach heftigen Gemüthsbewegungen eine Ermattung ein, welche durch Ruhe gehoben wird. Sollte nicht jene Schwächung der Kraft darauf beruhen, daß mit der Anstrengung der Seele eine überwiegende Zersetzung der Hirnsubstanz verbunden ist, und diese Echo- lung darauf,

dafs während der Ruhe die materielle Bildung freyer von Statten geht? Das damit vorhandne Verhältnifs des Bedürfnisses der Nahrung scheint dafür zu sprechen. So lange nämlich die Seele lebhaft mit einem Gegenstande beschäftigt ist, culminirt das Leben im Gehirne, und antagonistisch sind die plastischen Functionen vermindert, so dafs nur wenig oder gar keine Nahrung verlangt und verdaut wird; ist aber nochmals die Seele völlig wieder beruhigt und in das Gleichgewicht zum übrigen Organismus zurückgetreten, so bedarf der Leib einer reichlicheren oder kräftigern und dabey mehr belohnenden und leichter zu assimilirenden Nahrung, als wenn der Geist unbeschäftigt und das Gemüth bey Gleichgültigkeit der Gegenstände kalt gelieben war. Wie das Ideelle, Unbegrenzte an einem Räumlichen, Begrenzten sich äussert, wie die freye Kraft nur an einem Daseyn gehandelter Kräfte, an Materie wirksam wird, wie also auch das Leben an einem leiblichen Organismus geknüpft ist, und in jeder Lebensänderung auch eine materielle Veränderung involvirt ist: so muß auch jeder Wirksamkeit der Seele ein Act pflanzlicher Hirnthätigkeit entsprechen.

§. 483. Die Wirkungen Beyder stimmen mit einander überein. Wir haben von unserem Denken gleiches Gemeingefühl, wie von andern Functionen (§. 374.), welches auf einen materiellen Zustand hindeutet, so wie dasselbe auch wirklich materielle Abnormitäten des Gehirns ankündigt (§. 373.). Auch wirkt die Seele auf dieselbe Weise, wie das pflanzliche Hirnleben auf die Lebendigkeit der übrigen Organe, theils allgemein, und zwar bald consensuell, bald antagonistisch, theils nach specifischen Verhältnissen und Verwandtschaften zwischen bestimmten Seelenzuständen und bestimmten Organen. Der Wille und das pflanzliche Hirnleben theilen sich in die Bestimmung der Athmungsbewegung, und diese wird durch den Gemüthszustand (§. 436.) eben so modificirt, wie durch den materiellen Zustand des Gehirns (§. 282 — 299.). Beyde Arten des Athmens, das vom pflanzlichen Hirnleben, und das von der Seele bestimmte, sind einander gleich in den Mitteln, durch welche sie hervorgebracht werden, in den Erscheinungen, mit welchen sie verbunden sind, und in den Wirkungen, welche sie zur Folge haben: muß also nicht auch der Grund Beyder identisch seyn? Muß nicht der bewußte Trieb, so wie die bewußtlose Wirkung des Gemüthszustandes vermittelt des pflanzlichen Hirnlebens mit den Athmungsorganen in Berührung treten? Und müssen sie dann nicht mit demselben in einem fortdauernden innigen Verkehr seyn? — Wie der Herzschlag nur durch den Gesamtzustand des Gehirns bestimmt wird (§. 301.), so wird er auch nur durch den Gesamtzustand des Gemüths officirt (§. 431.). Die Seele wirkt ohne Bewußtseyn und Willkür auf die Verdauung: das verknüpfende Mittelglied kann nichts Andres seyn, als die pflanzliche Hirnthätigkeit. Wenn die Seelenthätigkeit ihre Beziehung zum Körper aufgibt, sey es nun dafs sie in gesteigerter Thätigkeit ihre Kräfte in sich concentrirt oder dafs ihre Kräfte selbst gesunken sind (§. 437. fgg.), so bringt dies gleiche Wirkungen auf die Verdauung hervor, wie die materielle Abnormität des Gehirns oder das Durchschneiden des zehnten Hirnnerven (§. 310. fgg.). Die Reizung des Gehirns durch Zorn (§. 440.) bewirkt eben so, wie die durch Verwundung (§. 324.) eine Affection der Leber. Wie die Nieren unter materiellen Krankheiten des Gehirns am wenigsten leiden (§. 326. fgg.), so werden sie auch vom Seelenzustande weniger, als andre Organe officirt (§. 441.). Auf der andern

Seite wird die Seele eben so, wie das pflanzliche Hirnleben, durch den Leib bestimmt. Das Athmen und der Blutlauf wirken auf den gesammten materiellen Zustand des Gehirns (§. 267—271.), und so auch auf die Spannung und Regsamkeit der Seelenthätigkeit überhaupt, welche als Phantasie und Gefühl sich ausspricht (§. 408.). Die Verdauung wirkt specifisch dynamisch auf das Gehirn (§. 276.) und auf den Geist (§. 414.). Die Zeugungsorgane wirken vorzüglich auf bestimmte Hirnthelle, aber vermittelt der Totalität der Rückenmarks (§. 277.), und geben der Seelenthätigkeit eine besondre, aber universelle Richtung (§. 421. fgg.). Haut und Nieren aber haben nur eine beschränkte Beziehung zum pflanzlichen (§. 278.) wie zum psychischen (§. 420. 424.) Hirnleben.

§. 484. Die Gemeinschaft beyder Aeusserungen des Hirnlebens ist durch die Erfahrung überall erwiesen. Indem das pflanzliche Hirnleben angegriffen wird, leidet auch das psychische (§. 352—384.), und umgekehrt wirkt auch die Seelenthätigkeit auf den materiellen Zustand des Gehirns ein (§. 385—389.). Letztrer kann der Seele Triebe aufdringen und zu Handlungen bestimmen (§. 331. 342. 383.), und die Seele kann durch den Gebrauch ihrer Freyheit die Regeneration des Gehirns befördern oder stören (§. 367. 389.).

§. 485. Die Bewegungen des Athmens und Sagens gehen noch an dem abgeschnittenen Kopfe vor sich (§. 297.) und erfolgen eben so ohne Bewusstseyn bey dem aus seinen Hüllen genommenen Embryo. Was im Embryo durch pflanzliche Hirnthätigkeit vollzogen war, wird bey entwickelter Seelenthätigkeit das Werk des bewussten Triebes; was dort organische Reizung war, wird hier Affection des Gemeingefühls; was dort Reaction des Gehirns war, entwickelt sich hier zur Vorstellung der Mittel, durch welche dem Bedürfnisse abgeholfen und dem Triebe Genüge geleistet wird. Das pflanzliche Hirnleben geht also allmählig in das psychische über. Wenn die materielle Abnormität des Gehirns zunächst in das Gemeingefühl eingreift, und die Phantasie den Erregungszustand desselben deutet und ihm entsprechende Bilder schafft; oder wenn der Zustand der Rumpforgane auf das Gehirn einwirkt, und wir uns des Resultats dieser Affection, der Stimmung der Seele bewusst werden, so geht ebenfalls das Pflanzliche in das Psychische über. — Die Seele bestimmt unwillkürlich verschiedene Modificationen des Athmens; einige derselben, namentlich Seufzen und Husten lassen sich aber auch willkürlich erregen; andre, z. B. das Gähnen, können vom Willen nur mittelbar durch die Phantasie bestimmt werden; andre, z. B. das Niesen, beruhen bloß auf einem organischen Grunde, und werden durch die Seele weder willkürlich, noch unwillkürlich erregt. Irgeod eine pflanzlich oder psychisch bedingte Modification des Athmens läßt sich, wenn anders der Reiz dazu stark genug ist, nicht durch unmittelbare Wirkung des Willens völlig unterdrücken, wohl aber durch die Richtung der geistigen Thätigkeit; ja selbst die Aufmerksamkeit auf das schon begonnene Gähnen und Niesen kann dasselbe unterbrechen. In allen diesen Erscheinungen sehen wir verschiedene Uebergangspuncte des psychischen in das pflanzliche Hirnleben. Gleicher Uebergang findet bey jeder willkürlichen Bewegung Statt, indem die Seele sich nie der Muskeln und Nerven, als der Mittel, wodurch sie ihren Zweck erreicht, bewusst ist.

9. Unterschied.

§. 486. Um nun zu den Verschiedenheiten beyder Arten des Hirnlebens überzugehen, so erkennen wir das Pflanzliche als das Frühere, als die Grundlage an, das Psychische hingegen als die höhere Entwicklung, welche auf Jenem ruht. Dort sehen wir die Richtung nach aussen, hier die nach innen relativ überwiegend. Das pflanzliche Hirnleben wirkt mit eigenthümlicher Kraft auf Centrirung des Gesamtlebens hin, indem es die verschiedenen organischen Thätigkeiten zur Einheit und Durchdringung bringt; der hierdurch in ihm selbst hervortretende lebendige Einheitspunct ist die Seele. Das pflanzliche Hirnleben ist theils auf Bildung des Gehirns, theils auf Verknüpfung und Erregung der pflanzlichen Functionen des Leibes gerichtet; es wirkt auf das Aeusserere am Gehirne, und ist den Einzelheiten zugewendet. Da aber in ihm, so wie im Leben überhaupt, ein Geistiges wirkt, nämlich die bestimmende Weltkraft, und da alle lebendige Einzelheit auf dem Gedanken beruht, der in ihm verbleibt und gebunden erscheint, so muß, indem es in sich einen Einheitspunct bildet, die innre Gesamtkraft als Vorstellung hervortreten: die Kräfte, die dort gebunden waren, werden hier frey; der Gedanke wird entbunden, kommt zur Selbstständigkeit, und diese Selbstheit giebt als innerliche Gesamtheit einen polarischen Gegensatz gegen das relativ Aeusserere und Einzelne. Auf dieser Gegensatzung beruht also die Entwicklung der Seele: es ist Scheidung in Tag und Nacht, mit welcher die chaotische Dämmerung ihr Ende erreicht. Die Seele gelangt hierdurch zur Individualität, während sie im Pflanzlichen involvirt war als Allgemeines, als die Wirkung der Weltseule. Die Hirnthätigkeit ist also eine pflanzliche, wenn sie in ihrer Allgemeinheit wirkt; eine psychische hingegen, wenn sie einen Gravitationspunct ihrer Beziehungen, ein Centrum in sich bildet, welches ihren Einzelheiten sich entgegen stellt.

§. 487. Diese Differenzirung tritt ein, wenn die pflanzliche Hirnthätigkeit zu höherer Lebendigkeit anwächst. Als Indifferentes kann jene Thätigkeit auf einer niedrigeren Stufe der Kraft für sich bestehen, und durch die Fortdauer der von ihr abhängigen Leibesfunctionen sich äussern: so bey der Hirnerschütterung, wo Athmen und Leben bey mangelndem Bewußtseyn bisweilen (Nr. 9.) 2 bis 3 Wochen besteht, bey Typhus, Apoplexie, Epilepsie, hysterischer Erstarrung, Asphyxie u. s. w. Doch ist auch hier das Athmen unmerklich, oder unvollkommen, langsam oder schwierig, und erlischt endlich, wenn das Bewußtseyn nicht zurückkehrt. Eben so ist die Verdauung bey dem neugeborenen Kinde, so wie bey Blödsinnigen und bey Apoplektischen, welche stumpfsinnig und geistesschwach geworden sind, vollkommen kräftig: das pflanzliche Hirnleben wirkt hier nach aussen und in Einzelheiten; indem es zu schwach ist, um sich psychisch zu centriren; bey noch grösserer Schwäche verliert es aber auch jene Wirksamkeit, und es erlöschen jene von ihm abhängigen Functionen.

§. 488. Das Differentie tritt aus der Entfaltung des Indifferenten hervor: die Seele verwendet das pflanzliche Hirnleben zu ihren Thätigkeiten. Sind diese gesteigert, so ist z. B. die Verdauung geschwächt; die Seele muß also das pflanzliche Hirnleben, welches sonst auf die Verdauung u. s. w. sich richtet, zu ihren Operationen verwenden, von ihm

zehren und es so absorbiren, daß es seine Wirksamkeit nicht über die Rumpforgane zu verbreiten vermag.

§. 489. Die höhere Entwicklung des Lebens wirkt auf das Niedre zurück: durch die erwachte Seelenthätigkeit wird auch das pflanzliche Hirnleben mehr erregt, und wenn jene darnieder liegt, so sinkt auch dieses.

§. 490. Das Höhere entwickelt sich selbst in Gegensätze, und führt so ein eigenes Leben, welches gestört werden kann, ohne daß die Grundlage afficirt ist. Oefters findet man im Gehirne von Menschen, deren Seelenthätigkeit abnorm gewesen war, keine materiellen Abnormitäten. Dies kann indeß keine Zweifel gegen die Anerkennung des Gehirns als Seelenorgans begründen. Denn 1) dürfte die Zahl dieser Fälle sich wohl sehr vermindern, wenn man das Gehirn immer allseitig untersucht, man weiß, wie flüchtig die pathologischen Leichenöffnungen meist gemacht werden, und wie selten Zeit und Umstände eine gründliche Untersuchung gestatten. Auch werden diese Fälle schon dann äusserst selten, wenn wir, wie wir doch müssen, die plastischen Häute des Gehirns als integrierende Theile desselben betrachten, denn in der That findet man nach den Erfahrungen von Greding, Haslam, Marshal, Rosenthal u. s. w. bey der ungleich größern Zahl von Seelenkranken diese Häute in einem abnormen Zustande. 2) Manche abnorme Zustände der organischen Materie verschwinden nach dem Tode, z. B. rothlaufartige Entzündungen der äussern Hant, welche bis zum Tode gedauert haben, sind am Leichname nicht mehr zu finden. 3) Wenn endlich auch wirklich bey Seelenkrankheiten der Hirnbau öfters völlig normal ist, so ergiebt sich doch daraus nichts, was unsern Ansichten widerspräche. Das Dynamische verkündigt sich nur durch seine eigenthümlichen Wirkungen, ohne daß es darum aufhört, an ein Materielles geknüpft zu seyn, und so ergreifen manche Veränderungen mehr das innre Wesen, das Kraftverhältniß, als das äussre Seyn. Wie wir es dem Eisen an und für sich nicht ansehen, ob es magnetisch ist oder nicht, so ist auch der Muskel, der bey der Reizung mit dem Messer noch zucken kann, dem Muskel, der diese Kraft bereits verloren hat, in seinem Aussehen ganz gleich, und wir vermögen Scheintod und wirklichen Tod nicht zu unterscheiden, ausser durch neue Lebensbewegungen oder beginnende Fäulnis: deshalb werden wir weder leugnen, daß der Muskel das Organ der Irritabilität ist, noch annehmen, daß die Lebenskraft eine fremdartige Zugabe zum organischen Körper sey. Die Function, als das Frühere und Ursprüngliche, kann in sich erkranken, ohne daß ihr bleibender Ausdruck, das Organ, davon zunächst ergriffen werden muß. Wie dynamische Krankheiten des Herzschlags, der Verdauung u. s. w. häufig ohne körperliche Veränderungen der darauf sich beziehenden Organe vorkommen, so erkennen wir auch sowohl mit Nicholl eine reine Hypersthemie (Erethismus) des Gehirns, die bald als Pyrexie (in der so genannten sensitiven Form), bald als Paralysis (in der torpiden Form), erscheint, als auch eine reine Aesthenie (Collapseus) desselben an.

§. 491. Das Höhere bildet einen Gegensatz zu dem Niedern. Im Gemeingeühle erkennt die Seele den organischen Zustand des Gehirns, sich selbst im Bewußtseyn davon unterscheidend, und der Verwundete wühlt in der Raserey im eigenen Hirne (§. 239). Wie aber das Höhere und Wesentliche bey allen organischen Wechselwirkungen un-

gleich stärker über das Niedere herrscht; so findet dies Verhältniß innerhalb gewisser Grenzen auch bey dem Gehirne Statt (§. 478.).

§. 492. Ueberall äussert sich das Leben so, daß es innerhalb gewisser Grenzen seine Normalität gegen die materielle Abnormität behauptet. Das Leben ist ein Inneres, die Organisation ein Aeußeres; Jenes ist Wesen, Dieses Erscheinung. Der Begriff der Function erzeugt die Organe, beherrscht sie, und behauptet sich bis zu einem gewissen Punkte gegen ihre Abnormitäten. So kommen denn auch Fälle vor, wo bedeutende Abnormitäten im Hirnbaue gefunden werden, ohne daß eine Störung der Seelenthätigkeit beobachtet worden ist. Haller (elem. IV. p. 338—341.) und Arsemann (S. 156—155.) haben solche Fälle gesammelt. Indessen ist 1) zu bemerken, daß die Zahl derselben verhältnißmäßig nicht groß ist: unter 1912 beobachteten Abnormitäten des Gehirns waren 113 ohne alle Störung der Seelenthätigkeit. Diese verhielten sich also zur Gesamtzahl, wie 1 zu 17, da das Verhältniß der Fälle, wo die Hirnabnormität Betäubung oder Apoplexie hervorbringt, wie 1 zu 2 ist. Bedenkt man überdies noch, daß merkwürdige und sonderbar scheinende Beobachtungen häufiger bekannt gemacht werden, als die von einem gewöhnlichen und regelmäßigen Krankheitsverlaufe, so erkennt man, daß das Verhältniß der Häufigkeit der Fälle, wo die psychischen Symptome fehlen, gewiß noch um ein Bedeutendes geringer ist. 2) Manche solcher Beobachtungen sind von der Art, daß es schwer hält, ihnen Glauben bezumessen, indem sie einen unglaublichen Leichenbefund angeben, ohne daß derselbe durch das Zeugniß von Zergliedern oder von mehreren glaubwürdigen Aerzten bestätigt wäre. Namentlich gilt dies von den Fällen, wo das Gehirn ganz gefehlt haben soll. Schon Diemerbroeck (*lib. III. c. 5. p. 347.*) zeigte, wie wenig Vertrauen solche Erzählungen verdienen. Einen ähnlichen Fall erzählte kürzlich Martel (Hufelands Journ. 1823. October S. 118.): bey einem zehnjährigen Knaben, der an Lähmung aller Glieder gelitten und alle Sinne, mit Ausnahme des Gehörs, verloren; seine Geisteskräfte aber bis zuletzt behalten hatte, so daß er den Tag vor seinem Tode noch auf das an dem heutigen Kirchenfeste zu erwartende Ritual aufmerksam machen konnte; wurde keine Spur von Gehirn, die Schädelhöhle leer, und bloß etwas blutige Feuchtigkeit auf der Grundfläche derselben gefunden. Wir müssen hier annehmen, daß die Desorganisation theils zuweilen sehr schnell sich entwickelt und fortschreitet, und erst unmittelbar vor, vielleicht zum Theil auch erst nach dem Tode die Höhe erreicht, auf welcher man sie bey der Section findet, theils von dem in Erstaunen gesetzten Beobachter emphatisch beschrieben wird. Es fehlt nicht an ähnlichen Erzählungen in Betreff anderer Organe. So erzählt z. B. Georget (Verrücktheit S. 13.), daß bey einem jungen blühenden Francenzimmer, welches den Tag nach einem Ballo, wo sie die ganze Nacht getanzt und gesungen hatte, plötzlich gestorben war, die Lungen gänzlich zerstört gefunden wurden und man anfänglich glaubte, es wären nie welche vorhanden gewesen. Wenn man aus dem Uebrigen ersieht, was der Erzähler beweisen will, so weiß man um so eher, wie man die Erzählung zu verstehen hat. Dies gilt z. B. von Martini (Kopfwunden S. 100.), wenn er berichtet, daß bey einem Menschen, dessen Verstand nicht im Geringsten gelitten hatte, das Gehirn durch und durch in mehr als tausend Balggeschwülste verwandelt gewesen sey. — Bey quantitativen Abnormitäten der Consistenz

wäre es wohl möglich, daß der augenblickliche Zustand bey dem Sterben einen Einfluß ausübte (*Bichat anatomie III. p. 68.*) 3) Für Zeichen der ungestörten Seelenkraft bey Hirnkranken nimmt man die Wahrnehmung und Erinnerung sinnlicher Ereignisse, das Bewußtseyn der körperlichen Verhältnisse, und das Vermögen, ihnen gemäß sich zu betragen: besteht denn aber darin die ganze volle Seelenthätigkeit des Menschen? Die Erzählung, z. B. daß ein Wasserköpfiger (Nr. 394.) seine Religion kannte und schenken genug war, seine Mutter öfters zu betrügen, giebt wohl keinen hinreichenden Beweis für eine vollkommene psychische Entwicklung. Die höhern Seelenkräfte können verloren gegangen seyn und die niedern bestehen: jener Verlust tritt theils nicht immer in den Kreis der ärztlichen Beobachtung, theils ist er überhaupt nicht zu spüren bey Menschen, die nie mehr Seele haben, als zum Fortkommen im gemeinen Leben nöthig ist. Die Zerstörungen, bey welchen man die ungestörte Fortdauer der niedern Seelenkräfte beobachtete, trafen meist nur den Hirnmantel; wir werden aber sehen, daß dieser eben mit den niedern Seelenthätigkeiten in geringerer Beziehung steht. 4) Wenn man zu Martels Beobachtung bemerkt: also ist das Gehirn nicht Eins mit der Seele! so stimmen wir völlig bey, setzen aber hinzu: wie der Leib nicht Eins ist mit dem Leben. Denn a) jede einmal erwachte Function strebt, sich in ihrem Typus zu erhalten, wenn auch ihr Organ bedeutend leidet; und aus dem Grundbegriffe des Lebens stammend, behauptet sie sich geraume Zeit; also die der hemmenden Gewalt unterliegt, und oft erst spät vormag die ihrem Begriffe entfremdete Bildung die Verwirklichung desselben aufzuheben. So sehen wir täglich, daß die meisten Entartungen des Bildungsorganes in den Eingeweiden die Function dieser erst dann stören, wenn ihr Product (die Callosität, der Scirrhus, die Verödung u. s. w.) den Gipfel seiner Ausbildung erreicht hat. So giebt oftmals die Leichenöffnung ganz unerwartete Resultate, zeigt Geschwüre oder Verknöcherung im Herzen, workeine Abnormität des Pulses, Verödung an Gefäßen, wo keine Blutung, Verhärtungen in der Leber, wo keine Störung der Gallenbildung sich bemerklich gemacht hat. Das Gehirn kann bey einer geringen Abnormität seine Functionen noch vollziehen; und sich, wenn sie nur langsam und allmählig zunimmt, an sie gewöhnen und sich daran fügen, so daß sie nun weniger feindselige Wirkungen hervorbringt, ja selbst eine Bedingung für das Vorrattgehen der Function wird (§. 359.). b) die Zerstörung eines Theils hebt nicht die Function des ganzen Organs auf, sondern diese dauert entweder ohne alle bemerkliche Abnahme ihrer Kraft in dem gesunden Ueberreste fort, oder ihre Störung steht doch nicht im Verhältnisse zu dem Umfange der dabey Statt findenden Desorganisation. Man findet über die Hälfte der Leber verödert, wo die Gallenabsonderung fortgedauert hatte, und bey Längensüchtigen, die noch ziemlich frey bis zu ihrem Tode athmeten hatten, sieht man hieselben nur noch einen ganz kleinen Lappen der Lungen unzerstört, so daß es bey materiellen Ansichten ganz unbegreiflich ist, wie das Leben dabey so lange hat bestehen können. So wenig dürfen wir im Leben überhaupt das Dynamische nach dem Materiellen beurtheilen; ungeachtet wir doch nicht zweifeln können, daß die Kraftäußerung von der Organisation abhängig ist. c) Die Function eines zerstörten Organs kann von einem andern, gleichzeitigen übernommen werden. Zuverlässig gilt dies von den Doppelorganen: nach Zerstörung der einen Niere dauert die Harnab-

sonderung in gleicher Quantität fort, wie zuvor, und wiewohl wir mit paarigen Sinnesorganen percipiren, besteht die Wahrnehmung doch auch, nachdem das Eine zu wirken aufgehört hat. Selten werden die gleichnamigen, einander entsprechenden Gebilde bey der Hirnhälften auf gleiche Weisß verletzt, und das unbeschädigt gebliebene kann nun allein vollziehen, was es sonst in Gemeinschaft mit dem der andern Seite vollbrachte.

d) Aber es wird auch die Function eines zerstörten besondern, Gebildes durch ein ganz andres, aber analoges vollzogen. Dies war unstreitig der Fall, wo nach Ausrottung der Pankreas und der Milz keine Störung der Verdauung und Bluthildung bemerkt wurde. So können die Membranen die Function eines abgestorbenen Secretionsorgans übernehmen: bey Verhärtung der Leber bildet die Haut Galle, und bey völlig zerstörten Nieren geht die Harnbildung in der Blase vor sich. Die ideelle Macht des Ganzen, welche die Organe erzeugt hat, ersetzt auch; was im Laufe des Lebens dem Materialen abgeht, indem sie entweder an der Stelle des abgestorbenen Organs ein neues erzeugt, oder die Thätigkeit des Erlöschenen durch ein andres niedriger stehendes Gebilde verwirklicht, so wie bey den unvollkommensten Thieren die einzelnen Functionen vor sich gehn ohne besondere Organe. Es ist ganz begreiflich, wenn diese Macht des Ideellen vorzüglich auch im Nervensysteme sich äussert. Durchschnitte und wieder verciote Nerven vermitteln wieder die willkührliche Bewegung, ungeachtet die neu erzeugte Zwischenschicht keine wirkliche Nervensubstanz ist. Der durchschnittne Magennerv pflanzt noch die Hirnthätigkeit fort (§. 310.) Rullier (*Magendie Journ. III. p. 173.*) beobachtete einen Mann, der bloß an den Aermen gelähmt war, übrigens vollkommen freye willkührliche Bewegung hatte, und bis zum Tode den bey ihm starken Geschlechtstrieb befriedigen konnte, ungeachtet das Rückenmark zwischen dem vierten Halsnerven und dem vierten Brustnerven bis auf einen dünnen, kaum 2 Linien breiten Markstreifen zerstört war. Ollivier (p. 143.) sah bey einem Kinde, welches die Beine noch etwas hatte bewegen können, daß das Rückenmark vom neunten Brustwirbel bis zum ersten Bauchwirbel, also in einer Strecke von 4 Zoll, bey Beifalls der Wirbel völlig zerstört war, so daß beyde Enden nur durch Gefäßhaut zusammenhingen. Desault (Ollivier p. 171.) beobachtete einen Soldaten, der nach einem Schusse in die Brust 25 Stunden lebte, den Harn willkührlich ausleerte, die Beine bewegen, beugen und strecken konnte, sich leicht umwendete und im Bette saß, ungeachtet die Kugel durch den zehnten Brustwirbel gegangen war und das Rückenmark daselbst völlig getheilt hatte. Janson (ebendas. p. 339.) fand bey einem Mädchen, welches die Beine bewegen konnte und selbst einige Tage vor dem Tode noch aufgestanden war, das Rückenmark im untern Theile der Brustwirbel breyig aufgeklüft und 4 bis 5 Linien lang ganz fehlend. Emmert (Mackels Archiv I. S. 181.) sah, wenn er das verlängerte Mark bis auf einen schmalen Streifen zerstört hatte, noch Athembewegungen an den Bauchmuskeln, und bey künstlichem Athmen lebhaftre Bewegungen am Rumpfe und an den Gliedmaßen. Man hat endlich Hemicaphalen (§. 343.) beobachtet, wo schon eine leise Berührung der anstatt des Gehirns vorhandenen schwammigen Masse Convulsionen erregte. So können wir denn nun wohl auch es uns als möglich denken, daß die Function von verletzten Stammganglien und Stammatrahlungen auf den Hirnstamm selbst übergetragen werden, und

daß auf diese Weise nach Zerstörung des Mantels, den man gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen des Gehirns bezeichnet, die niedern Seelenkräfte bestehen können.

§. 493. Die Normalität ist die Uebereinstimmung der Aeusserung des Lebens mit seinem Begriffe, und wie der Begriff sich überall als das Herrschende bezeigt, so regt sich in jeder Krankheit noch das normale Streben: das Wesentliche, Ursprüngliche sucht sich zu behaupten, wenn es schon durch das Zufällige, Fremdartige bedrängt wird. Solche Selbsterhaltungskraft äussert denn auch die Seele, als das höchste und eigentliche Leben (§. 494—500.).

§. 494. Bey anhaltender Abnormität setzen von Zeit zu Zeit die Krankheitsercheinungen aus wie bey Aftergebilden im Gehirne Blindheit (Nr. 993.), Doppeltsehen (Nr. 999.), Erweiterung der Pupille (Nr. 1016.) periodisch eintritt, so bleiben auch bey Seelenstörung leichte Zwischenräume. Daß der Blutandrang nach dem Gehirne, so wie dessen Turgescenz typisch wechselt, sieht man aus den periodischen Kopfschmerzen und andern Affectionen, welche von Verknöcherungen an den Hirnhäuten oder von ähnlichen Abnormitäten herrühren und nur bey stärkerem Anschwellen des Gehirns zu nehmen. Unsere geistige Kraft sinkt und steigt abwechselnd, da die Hirnthätigkeit, wie Alles im Leben, einem periodischen Wechsel unterworfen ist.

§. 495. Die materielle Abnormität kann bleiben, und die Wirkung, welche sie anfänglich auf das Leben äusserte, schwinden. Wie bey einer Blutergießung (Nr. 273.) das Extravasat resorbiert und eine Höhlung entstanden war, kehrte die Schkraft zurück; in einem andern Falle (Nr. 1005.) blieb das Aftergebilde, und die Blindheit, welche dadurch entstanden war, hörte nach einiger Zeit auf. Flourens (p. 103—107. 161.) fand bey seinen Versuchen an Thieren, daß die durch eine Hirnverletzung anfänglich aufgehobene Bewegungskraft, Schkraft und Seelenthätigkeit oft nach einiger Zeit wieder hergestellt wurde, und fügt hinzu, daß ein kleiner unverletzt gebliebener Theil der Hirnorgane hinreicht, die Function derselben zu vollziehen. Auch Rolando (p. 48.) sah öfters eine Rückkehr der nach einer Hirnverletzung aufgehobenen Bewegungskraft.

§. 496. Wenn in einem bewußtlosen Zustande die Hirnthätigkeit stärker aufgeregt wird, so erwacht das Bewußtseyn, und blickt entweder in den unfreyen Zustand herein, oder tritt, wenn die Erregung stärker ist, an dessen Stelle. So kann man auch durch Rütteln (Nr. 1051.) oder durch starkes Amreden (Nr. 5.) Betäubte zur Besinnung bringen (Nr. 11. 23. 228. 231. 419. 427. 555. 747. 1002.) bisweilen (Nr. 397.) ist das Erwachen nur unvollständig, so daß der Kranke zwar zu sprechen anfängt, aber ohne Zusammenhang. So kann die Seele zu sich gebracht werden durch äussere Einwirkungen, besonders aber durch eine verständige Zusprache, welche ihr einen Stützpunkt darbietet. Defizirende geben zuweilen (Nr. 945.) auf die ihnen vorgelegten Fragen verständige Antworten; die Macht des Verstandes, die in den Umgebungen des Seelenkranken sich ausspricht, wirkt heilsam auf ihn. Durch einen unerwarteten Anblick, oder durch ein rasches, bestimmtes, festes Benehmen kann er oft zur Besinnung gebracht werden; ein Verrückter, der seit Jahren im Irrenhause war, erblickte im Anfälle der Manie einen alten Bekannten, rief ihm zu: *gradulor tibi, nam tu sanae mentis es*, und fuhr dann in seiner Raserey fort. So kann auch die Betäubung, vermöge eines besondern Interesses, gehoben

werden: man erzählt, daß der Mathematiker Lagny, als er im Sterben schon seine Freunde nicht mehr kannte, die Frage nach einer Quadratzahl schnell beantwortete. Eben so verhält es sich mit dem unfreyen Zustande der Seele im Schlafe: träumt man von einer dringenden Gefahr, oder von einer das Herz beglückenden Erscheinung, so erwacht man plötzlich. Gleiches gilt von den wissenschaftlichen Träumen: man glaubt oft im Schlafe, einen verwickelten Gegenstand in großer Klarheit anzuschauen, bleibt dabey in behaglicher Ruhe, und indem während des Erwachens allmählig ein immer dicker werdendes Gewölk über den Gegenstand sich zieht, kann man hernach sich durchaus nicht erinnern, was man eigentlich gedacht hat; hat man dagegen im Traume einen frappanten oder bizarren wissenschaftlichen Einfall, so erwacht man darüber plötzlich, indem er die Seele in eine stärkere Erregung versetzt.

497. Im unfreyen Zustande tritt öfters ein Bewußtseyn desselben ein: wenn man im Traume in großer Verlegenheit sich befindet, so tröstet man sich damit, daß es ja nur ein Traum ist, und daß man nur zu erwachen braucht, um sich aus der unangenehmen Lage zu ziehen; und träumt man von einem Vergnügen, so begnügt man sich bisweilen, daß es nicht wirklich ist. So zeigt sich ein schüttdender Gegensatz und eine grolle Doppelseitigkeit des Lebens auch in Krankheiten. Bey Hirnabnormitäten werden sich die Kranken zuweilen der Störung des Gedankenlaufs und der innern Unruhe bewußt, sie klagen darüber und äußern die Furcht, verrückt zu werden (Nr. 279, 309, 655, 829, 1116); die Fieberkranken wissen im Anfange oft, daß sie irr reden, und suchen, dem Delirium zu widerstehn; bey der sogenannten Manie ohne Verrücktheit, und bey der Wasserscheu kämpft der Kranke oft gegen den Trieb, der sich seiner Seele heimstert; häufig stellen sich Verrückte verständig, um nur der sie heiligtenden Aufsicht zu entkommen. Selbst in der Betäubung finden sich schwache Spuren fortdauernden Bewußtseyns: es kommt nicht selten vor, daß Apoplektische in dem Momente, wo sie aus tiefer Betäubung wieder zu sich kommen, klagen, daß man sie gequält habe; ohne daß sie doch von den angewendeten Reibungen, Blasenpflastern; Aderlässen u. s. w. etwas Bestimmtes wissen; als einer Person (Nr. 56) ein Knochensplitter aus dem kleinen Hirne gezogen wurde, schlug sie die Augen auf mit den Worten: Herr Jesus! wie gehst du mit mir um! Beynahc etwas Aehnliches ist es, wenn wir bey plötzlichem Erwachen aus dem Schlafe noch die letzten Worte hören, welche zuvor gesprochen worden waren.

§. 498. Was früher im Bewußtseyn aufgefaßt und durch freye Thätigkeit gewonnen ist, hält die Seele noch im unfreyen Zustande fest. Das Delirium und der Traum entleeren den Stoff zu ihren Phantasmen großentheils aus dem früheren Zustande des Wachens und des Bewußtseyns, und nicht leicht geschieht es, daß sie den Charakter des Individuums gänzlich verlegen. Nur wagt in diesem Zustande Alles durcheinander ohne regelmäßige Verknüpfung; so mangeln Hirnkranken verschiedene Sprachen durcheinander und sagen auswendig gelernte Gebete her (Nr. 190).

§. 499. Wie das pflanzliche Leben des Gehirns gegen die materiellen Abnormitäten desselben, und das Psychische gegen die Störungen des Pflanzlichen sich behauptet, so hält sich die höhere Seelenthätigkeit aufrecht bey dem Sinken der niederen. Das Gedächtniß hält die Bezeichnung von Begriffen noch fest, während es, vermöge einer Abnormität

des Gehirns, die Namen specieller Gegenstände verloren hat (§. 384.); so kann in der Krankheit des Alters der Philosoph oder der Mathematiker seine frühern Speculationen und Berechnungen nicht wiederholen; während ihm das allgemeine Resultat derselben gegenwärtig bleibt: die Frucht lebt fort, nachdem Zweig und Stamm abgestorben sind.

§. 500. Wenn das plötzlich verdunkelte Bewußtseyn späterhin wieder erwacht, so knüpft sich dasselbe an seinen frühern Zustand an. Die ersten Vorstellungen bey der Rückkehr des Bewußtseyns nach einer Apoplexie sind zuweilen dieselben, mit denen der Kranke zuletzt vor dem Anfalle sich beschäftigt hatte; selbst bey dem Genesen vom Wahnsinne ist dies bisweilen der Fall. Die Hirnerschütterung hebt auch die Erinnerung an die zunächst vor dem Eintritte derselben erlebten Ereignisse und vollzogenen Handlungen auf, so daß die Verwundeten von der Verwundung und den sie herheyführenden Umständen nichts wissen, aber wie das Gehirn seine Normalität wieder erlangt, gewinnt auch die Seele die Erinnerung: dies geschieht bisweilen nach einigen Stunden (Nr. 56. 1054.), bisweilen später; ein Verwundeter (Nr. 533.) wurde am elften Tage träpanirt, und sechs Septiden darauf erinnerte er sich wieder aller Umstände seines Falles; ein andrer (Nr. 5.) bekam erst im zweyten Monate eine dunkle Erinnerung des Vorfalles. Die Seele kann also von Dem, was ihr verschwunden war, von Neuem Besitz nehmen.

II. Form.

1. Innere Form.

§. 501. Wenn es wesentlich nur eine einzige Hirnthätigkeit giebt, so entsteht die Frage, worin denn dieselbe eigentlich besteht, und was bey dem Empfinden, Denken, Bewegen, so wie bey dem Verdauen, Athmen u. s. w. im Gehirne vorgeht? Unser äußerer Sinn bemerkt an dem ealtbtesten lebendigen Gehirne eben so wenig, als an den Nerven (§. 7.), eine den Functionen entsprechende materielle Veränderung; durch den innern Sinn aber können wir eine solche Veränderung auch nicht erfahren, da seine Gegenstände rein innerliche Thätigkeitsverhältnisse sind. Ist also nicht die Annahme einer bestimmten materiellen Hirnthätigkeit eine hyperphysische Fiction? Müssen wir nicht vielmehr dabey stehn bleiben, anzuerkennen, daß bey der Seelenthätigkeit, eine eigenthümliche Veränderung im Gehirne vor sich geht, ohne die Modalität derselben näher bestimmen zu wollen? Wir können dies in der That um so füglich, da wir, wenn wir wahrlich seyn wollen, uns gestehen müssen, daß wir von den übrigen Functionen auch nicht mehr wissen. Wir erfahren, daß in der Leber Galle, in den Nieren Harn gebildet wird aus dem zuströmenden Blute, und sehen die Haargefäße dort als flammige Büschel, hier als Beeren gestaltet: aber warum das Blut dort in Galle, hier in Harn sich umwandelt, wird daraus nicht klar. Indessen erkennen wir doch im Allgemeinen, daß in beyden Fällen eine chemische Veränderung vor sich geht, und wir bemühen uns, einzelne Momente dieses Hergangs aufzufinden: sollten wir nicht auf gleiche Weise versuchen, den allgemeinen Ausdruck „Hirnthätigkeit“ auf eine bestimmtere Vorstellung zurückzufüh-

ren? Wir wollen dieselbe nicht erdichten, sondern aus Begriffen ableiten und durch die Erfahrung bestätigen.

§. 502. Die Bildung ist die Wurzel des Lebens, welche ihre Aderu durch alle Zweige desselben anstreckt; mit jeder Lebensäusserung ist daher ein Bildungshergang verbunden, welcher sowohl in neuer Zusammensetzung, Mischung und Gestaltung, als auch in Entmischung, Zersetzung und Auflösung besteht. Ist die Lebensthätigkeit überhaupt zu schwach, so sinkt auch die Bildung; bey bedeutender Aufregung und Anstrengung ist die Zersetzung überwiegend; in der darauf folgenden Ruhe wird die Synthesis, welche das Verlorne ersetzt, vorwaltend. — Ein gleiches Verhältniß muß im Gehirne Statt finden: aller Aeusserung der Seelenkraft muß ein plastischer Hergang entsprechen. Darum ermüdet das Denken auch den Leib, und stärkt der Schlaf Geist und Gemüth; darum zieht die Anstrengung des Geistes (§. 385.), wie die Aufregung des Gemüths (§. 387.), mehr Blut nach dem Gehirne und verschlimmert die Entzündung (§. 388.); darum entsteht abnorme Bildung im Gehirne von heftigen Gemüthsbewegungen (§. 389.), und Atrophie desselben von vermindelter Geistesthätigkeit (§. 386.). Alle diese Verhältnisse hat das Gehirn mit allen übrigen Organen gemein, so wie auch sein Bildungshergang: nicht wesentlich von dem andern verschieden ist (§. 224.); die eigenthümliche Wirksamkeit seines pflanzlichen, so wie seines psychischen Lebens muß also auf etwas Andreu beruhen.

§. 503. Dieses Andreu kann nur die Bewegung seyn. Denn a) Gehirn und Seele verhalten sich zu einander, wie Raum und Zeit, wie überwiegende Seyn und überwiegende Thätigkeit; was sie verknüpfen soll, muß diese beyden Merkmale in Gleichgewichte vereinigt enthalten. Nun ist die Bewegung ein Wechsel des Raums in der Folge der Zeit, also die eigentliche Einheit von Räumlichem und Zeitlichem. Sie wird ursprünglich nur durch Kraft bestimmt, und ist so, daß Eintreten und Offenbarwerden des Innerlichen im Aeußeren, die Ergebu der Kraft im Raume, oder das reinste Erscheinen der Thätigkeit an der Materie, und darum auch allgemeine Naturerscheinung, so wie auch die Seele einzig und allein durch organische Bewegungen, Muth, Sprache und Handlung sich verkünden kann. Folglich muß auch die Hirnthätigkeit in Bewegung bestehen. b) Descartes (p. 110.) sprach es schon aus, daß das Denkende mit dem Materiellen nicht verbunden seyn könne, ausser durch Wahrnehmen und Wollen mittels der Bewegung. Und in der That, was ist Empfindung und äusserer Wille Anders, als eine Wechselwirkung und gegenseitige Beziehung zwischen Centrum und Peripherie? Indem hier das eine Glied seinen Zustand auf das andre überträgt, oder in ihm einen, dem seinigen entsprechenden, Zustand hervorbringt, erkennen wir ein Gleichwerden des räumlich Getrennten, und dies kann nur erfolgen durch Fortpflanzung im Raume, also durch Bewegung. c) Diese Fortpflanzung geht in bestimmten Richtungen vor sich; z. B. gegen einen bestimmten Muskel, und folgt dabey der Gestalt und Lage derjenigen Substanz, welche als Vermittler und Leiter dient und der Thätigkeit ihre Bahn vorzeichnet. Die Nerven sind diese Leiter; dadurch wird eben ihre walzenförmige Gestalt, ihre Verzweigung nach verschiedenen Punkten, und der Gegensatz ihres centralen und peripherischen Endes bestimmt; und wie jeder Nerve im Ganzen einen Leiter darstellt, so kann auch jede Ner-

venfaser eine eigene Leitung bewirken. Nun ist im Gehirne gleiche Substanz, wie in den Nerven, also auch gleiche Leitung. Wir können die Fasern der Nerven eine Strecke im Gehirne verfolgen: mithin muß die durch die Nerven bewirkte Leitung sich hier fortsetzen. In der eigenthümlichen Hirnsubstanz sehen wir gleichfalls Faserungen in bestimmter Richtung, welche den Nervenfaseru in den Ganglion analog sind, indem sie theils durch graue Substanz sich hindurch ziehen, theils durch dieselbe unterbrochen; auf der andern Seite neu beginnen. Auch angegeben, daß diese Faserung im lebendigen, gesunden Zustande äusserlich nicht so scharf begränzt und fixirt sey, als im Leichname, im abnormen Zustande und nach künstlicher Härtung, so offenbart sich doch bey der dann erfolgenden Gerinnung das der Hirnsubstanz inwohnende Streben, bestimmte Richtungen anzunehmen; welches im lebendigen Zustande durch bestimmte Leitung sich aussprechen muß. Mag der Sophist seinen Voraussetzungen zu Liebe die Augen vor dem Augenscheinlichen verschließen: nie kann er im Balkenkörper Längenfaseru, im Stabkranze Ringfaseru, im Gewölbe Querfaseru nachweisen. Es sind also hier bestimmte Bahnen vorgezeichnet; die Hirnfaseru zeigen die Richtung der Seelenthätigkeit eben so, wie die Gefäße die Richtung der bildenden Kraft; und die Härtung der Hirnfasern ist für die Erkenntniß des Nervensystems dasselbe, was für die Erkenntniß des Gefäßsystems die Injection ist, welche auch nicht das im Leben wirklich Statt findende normale Verhältniß unmittelbar, Zug für Zug treu darstellt, aber wohl die Richtung und das allgemeine Verhältniß zeigt. d) Diese räumlichen Beziehungen werden nun auch durch mancherley Krankheitserscheinungen bestätigt. Wie Krämpfe und Lähmungen überhaupt (§. 348.), so pflanzen sich die Wirkungen von Abnormitäten des Gehirne nach dem Laufe seiner Faseru auf äussere Organe fort: von einem Sehhügel durch das Chiasma auf das Auge der entgegengesetzten Seite, und von einem Streifenhügel durch die Pyramidenkreuzung auf die Gliedmassen der andern Seite. Bey erhöhtem Gemeingefühle empfindet der Hirnkranke bestimmte Bewegungen in seinem Gehirne (§. 375.). Bey dem Schwindel fühlen wir einen Wirbel (§. 376.), und bey schnell auf einanderfolgenden, unzusammenhängenden, widerstreitenden Vorstellungen haben wir eine Empfindung im Gehirne, die wir mit buchstäblicher Wahrheit als Verwirrung bezeichnen. So ist es nicht unwahrscheinlich, daß die leidenschaftliche, unverständige, unharmonische Geistesthätigkeit die normalen Strömungen stört (§. 389.). So scheint endlich auch die mechanische Erschütterung des Gehirns nur dadurch das Bewußtseyn zu unterdrücken, daß sie die innerlichen Bewegungen verwirrt; ihre normalen Beziehungen unter einander hemmt und ihnen unregelmäßige Richtungen aufzwingt.

§. 504. Aber wie sollen wir uns nun diese Bewegungen denken? Gibt es im Gehirne ein eigenthümliches bewegliches Wesen? In den frühesten Zeiten blickte ein friegerischer Sinn auf das Leben, aber mit vorherrschender Richtung auf das Aeusserliche; man dachte sich die Einheit von leiblichem und psychischem Leben, aber unter sinnlichen Bildern, und erklärte die unsichtbare Materie, die Luft, für Geist, welche als Ausfluß des Weltgeistes den Leib beseelt. Als man späterhin Leib und Seele in der Abstraction schied, hatte man ein Mittel nöthig, das Getrennte zu verknüpfen, und schuf ein phantastisches Mittelding, welches Körper und Seele zugleich, und dabey doch keines recht

war. Ein anderer, Thomasius, trieb Michelitz die Gespenster aus. Aber in unsrer Zeit, wo man uns um die Frucht des Erkömpften betrügen und nicht die Jugendlichkeit, sondern nur die Schwachheiten der verfloßenen Zeiten zurückführen will, wo eine Frömmelcy überall sich geltend macht, die nur so weit um Natur und Geschichte sich kümmeret, als es gerade in ihren Kram taugt, und nicht wissen will, was schon als Irthum verworfen worden ist, fängt auch der Aether seinen Spuk wieder an. Wir haben schon (§. 468.) diesen Aether für einen Pleonasmus, für einen unnützen Umweg aus dem Reiche der Erfahrung durch das Gebiet der Phantasie erklärt. Das Gehirn selbst ist schon reif zu seinen Functionen, weil das Ideale aller lebendigen Bildung zum Grunde liegt, dieselbe bestimmt und ihrer bedarf, um an ihr in der Reihe der Erscheinungen als ein Beharrliches sich zu behaupten. Soll die bildende Kraft noch etwas Zarteres, noch ein feineres Gehirnzchen im Gehirne erzeugen? Materie bleibt es doch immer; und ist die Materie bloß, aus sich, ohne höhern Ursprung und, ohne tiefere Bedeutung, so mag sie sich verfeinern, wie sie will; sie wird niemals zur Seelenthätigkeit heraufsteigen, noch mit ihr in Verkehr treten. Die Hirngeister sind bloß Hirngespinnste.

§. 505. Mehrere Physiologen nahmen ein wirkliches Biegen und Strecken der Hirnfasern an. Schlichting glaubte, eine solche Palpitation zu fühlen; als er den Finger in ein lebendiges Hirn steckte; aber es war nur die von den Blutgefäßen herrührende Bewegung. Cabanis (I. p. 173. II. p. 357.) nimmt, wie Bonnet, eine Oscillation der Hirnfasern an, weil alle lebendige Materie Schwingungen zeigt, und weil das Gehirn sich ausdehnt und zusammenzieht: allein diese Turgescenz und dieser Collapsus werden durch das Blut und durch den plastischen Proceß vermittelt, und erfolgen nicht so momentan, daß sie dem Wechsel der Seelenzustände entsprechen könnte, und jene stetige Schwingung kommt nur den Muskelfasern zu. Rolando (p. 55. sqq.) stellt die Hirnfasern den Muskelfasern gleich, und behauptet, daß sie denselben Gesetzen der Bewegung folgen, wie denn auch ihre Verletzung gleiche Folgen habe: allein alle Thätigkeit der Muskeln ist bloß eine äußere, räumliche, und sie unterscheiden sich eben dadurch von den Nerven, an welchen keine Bewegung sich wahrnehmen läßt. Kurz, wir haben keinen Grund, eine solche äußere Bewegung der Hirnfasern anzunehmen, können sie auch kaum für möglich halten, da diese Fasern ohne Zwischenräume und fremdartige Bindemittel dicht an einander liegen, mithin gar nicht einzeln, sondern nur als Ganzes sich bewegen können, oder mit andern Worten, ihr räumliches Verhältniß nicht unter einander, sondern nur gegen andre Körper verändern können.

§. 506. Aber es giebt auch eine Bewegung ohne Verrückung der Materie, nämlich hey den dynamischen Erscheinungen, welchen keine eigene raumerfüllende Substanz zum Grunde liegt. Zum Beyspiel die Electricität oder das Licht pflanzt sich fort im Raume, oder tritt in der Zeitfolge an verschiednen räumlichen Puncten hervor: es ist hier keine Materie, welche sich bewegt, sondern ein im Raume fortschreitendes, Erwachen desjenigen Kraftverhältnisses, welches den Erscheinungen der Electricität oder des Lichts zum Grunde liegt; die im Raume an einander gränzenden Körper werden der Reihenfolge nach einander hierin ähnlich, und so tritt in derselben Folge die gleiche Erscheinung an ihnen hervor. Diese Erweckung folgt aber ganz den Gesetzen der Bewegung: die Er-

scheinung pflanzt sich fort durch die Körper, welche in gleichen Zustand sich versetzen lassen oder Leiter abgeben, und werden gehemmt oder auch zurückgeworfen von denen, welche dafür weniger empfänglich sind oder ihnen Widerstand leisten, und darum bezeichnen wir dieses Fortschreiten als Leitung und Strömung; ungeachtet keine strömende und geleitet werdende Materie vorhanden ist. Da nun die Seelenthätigkeit mit den dynamischen Naturerscheinungen zu vergleichen ist (§. 457), so dürfen wir der Analogie nach ihrem Vorstuttsgehen im Gehirn eine gleiche Bewegung zuschreiben. Wir denken uns also die mit jeder Wirkbarkeit der Seele verbundene und ihr entsprechende Hirnthätigkeit als eine Leitung und Strömung; d. i. nicht als ein wirkliches Laufen, Rinnen und Fließen, sondern als Fortpflanzung im Raume; als Gleichsetzen des räumlich Gesonderten, als Uebertragung eines innern Zustandes von einem Punkte auf den andern. Diese Leitung ist aber nicht unabänderlich an die ihr vorgezeichnete Faserung geknüpft, sondern kann auch andre Richtungen nehmen und gleich der Elektrizität auf benachbarte Fasern überschlagen. Die Erfahrung, daß der Einfluß des Gehirns auch durch getrennte Nervenmassen sich fortpflanzt (§. 310. 492), beweiset dies, so wie sie überhaupt unsere Ansicht von der Bewegung im Gehirn bestätigt. Dieser Ansicht war übrigens schon Willis ziemlich nahe: denn wiewohl er im Ganzen die Hirnthätigkeit in eine Bewegung thierischer Geister setzt (*cerebr. v. 19. p. 98. sq.*), so denkt er sich er nicht so, als ob diese hin und her gingen, sondern sie bleibe noch ihm unbeweglich auf ihrem Posten, da sie aber einander berühren und ununterbrochen durch den ganzen Körper sich erstrecken, so daß man sagen kann, die Seele selbst, deren Theile sie sind, erstrecke sich so weit, so können sie schon durch ihre Wirkung auf einander Empfindung und Bewegung vermitteln (*anima brut. c. 10. p. 33.*); und diese Leitung hat Aehnlichkeit mit einer Undulation des Wassers.

§. 507. Diese Bewegungen können nun nicht anders gehörig vor sich gehn, als bey einem bestimmten mechanischen Verhältnisse des Gehirns. Daher wirkt denn ein äußerer Druck oder eine mechanische Erschütterung feindselig auf dasselbe ein, als auf irgend ein andres Organ. Es bedarf einerseits einer gewissen Weichheit (§. 475), welche durch die seröse Secretion (§. 234.) unterhalten wird, zum Gemeingefühle, so wie zur geistigen Thätigkeit, denn bey Verhärtung des Gehirns findet sich weder Kopfschmerz (§. 375), noch Schwindel (§. 376) unter den Krankheitserscheinungen, häufiger aber, als bey irgend einer andern Abnormität, Blödsinn (§. 357). Andererseits ist eine gewisse Spannung erforderlich, welche besonders durch das Blut (§. 393), und zwar durch ein gehörig geartetes (§. 398), kräftig andringendes (§. 401—404), frey durchströmendes und stets wechselndes Blut (§. 406) hervorgebracht wird, und mit der psychischen Lebendigkeit übereinstimmend steigt und sinkt (§. 238. 266). Wenn bey der Entzündung diese Spannung abnorm erhöht und dadurch die Seelenthätigkeit krankhaft aufgeregt, oder beklommen, oder verwirrt, oder unterdrückt ist (§. 353—396), so kann die Eiterung erleichtert (§. 366), insofern sie die Spannung hebt. Mechanische Gewalt, Druck und Erschütterung stört eben sowohl das pflanzliche (§. 238. 242. 243. 251. 260. 303), als das psychische Hirnleben (§. 354—358). — Wir haben schon (§. 359) bemerkt, daß ein abnormer Druck vermöge der Spannung, welche er setzt, für die Fortdauer der Hirnfunctionen Bedürfnis werden kann. Hill (p. 72.) rath daher, seinen Beobachtungen zu-

folgt, ein großes, geronnenes Extravaasat nur stückweise abzunehmen; um das Gehirn nicht zu plötzlich von seiner Compression zu befreien. Auch Home (Meckels Archiv III. 106.) führt an, daß die plötzliche Wegnahme eines Blutgerinnsels auf der festen Hirnhaut Ohnmacht verursachte, und schließt daraus, daß ein mäßiger, anhaltender Druck zu Erhaltung der Hirnthätigkeit nöthig sey. Der seröse Pannus in den Höhlen und an der peripherischen Oberfläche des Gehirns, so wie das dicke Anliegen der festen Hirnhaut, ist in dieser Hinsicht gewiß von Bedeutung. Auch rührt wohl die Schlafrigkeit, welche bey dem Wasserkopfe häufig beobachtet wird (§. 377.), von der durch die Ergießung bewirkten Spannung her. (Vergl. §. 514.)

§. 508. Bey solcher Abhängigkeit der Hirnfunctionen von mechanischen Verhältnissen muß nun auch die Stellung von Einfluß auf dieselben seyn. Dieser zeigt sich zuvörderst im Blallaufe (§. 231.) und in der davon abhängigen Hirnbewegung. Letztere hörte nach Ravina's Beobachtungen auf, wenn er ein Thier an den Füßen aufhing, indem das Gehirn bey dieser Lage während der Systole der Arterien nicht, vermöge seiner Schwere, zurücksinken kann. Wir haben schon gesehen, daß die Stellung des Kopfs bey Hirnabnormitäten Veränderungen im Athmen (§. 294.), im Kreislaufe (§. 303.), in den Functionen der Verdauungsorgane (§. 313. 321.), in der Muskelbewegung (§. 343.) und in der Seelenthätigkeit (§. 355.) hervorbringt. Einige Hirnkranken müssen liegen, und bekommen bey'm Aufstehen Ohnmacht (Nr. 654.), oder bey'm aufrechten Sitzen (Nr. 480.) Schwindel (Nr. 558.), Betäubung (Nr. 1001.), Ohnmacht (Nr. 54.), Zuckungen (Nr. 340.), Uebelkeit (Nr. 395. 558.), unwillkürliche Ausleerungen (Nr. 367. 538.), Schwerföhmigkeit (Nr. 367. 379.). Andre hingegen können nicht liegen, sondern müssen sitzen oder stehen (Nr. 824.), sonst entsteht Betäubung (Nr. 192.), Zunahme des Schmerzes, Schwindel und Erbrechen (Nr. 708.). Einige müssen mit vorwärts gebogenem Kopfe sitzen (Nr. 598. 1002.) und bekommen bey'm Aufrichten heftigere Schmerzen (Nr. 421. 750.) oder Schwerföhmigkeit (Nr. 565.); andre hingegen können den Kopf nicht vorwärts beugen ohne Zunahme der Schmerzen (Nr. 511. 881. 927. 951.); oder ohne Druck in den Augen (Nr. 389.). Einige können nur auf der kranken Seite liegen (Nr. 389. 581. 654.) und werden betäubt, wenn sie auf der gesunden Seite liegen (Nr. 570.); Andre wieder finden nur in der Lage auf der gesunden Seite Erleichterung (Nr. 895. 1050.). Die Momente, worauf diese individuellen Verschiedenheiten beruhen, sind uns nicht ganz klar, da man sie in den einzelnen Fällen noch nicht gehörig untersucht hat. Auch setzen manche Fälle der Erklärung fast unübersteigliche Hindernisse entgegen: so der schon oben (§. 343.) angeführte (Nr. 599.), und ein anderer (Nr. 891.), wo der Kranke bey horizontaler Lage ein Bohren von innen nach aussen, in mehr sitzender Stellung, aber ein von aussen nach innen gehendes Bohren empfand.

2. A n m e r k u n g.

§. 509. Die Spannung im Gehirne ist aber mehr eine innerliche, als eine solche, wie in dem Gegensatze von Muskeln und Nerven Statt findet. Darum ist denn auch sein Gemeingefühl (§. 373.) und seine Temperatur (§. 232.) geringer, und seine Entzündung nimmt einen langsamern Verlauf (§. 239.). Wenn hierdurch die Erkenntniß der Hirn-

krankheiten erschwert wird; so trägt auch der Umstand dazu bey, daß der dem pflanzlichen Leben eigenthümliche Rhythmus im Gehirne geringer seyn muß, als in andern Organen, da theils die Seelenthätigkeit hier mit wirkt, theils auch die Sensibilität überhaupt weniger an einen rhythmischen Gang gebunden ist. So nimmt die Entzündung und Eiterung der festen Hirnhaut schon einen bestimmtern und regelmäßignern Verlauf, als die der plastischen Hirnhäute (§. 246. 249.).

§. 510. Die Schwierigkeit und Unsicherheit der Diagnose und Prognose ist eine Eigenthümlichkeit der Hirnkrankheiten, und zwar ist zuvörderst das Daseyn derselben oft schwer zu entdecken, theils wegen der Unbestimmtheit der Symptome (§. 511.), theils, weil im Gehirne, wo die dynamische Wirksamkeit am reinsten und überwiegendsten ist, die Normalität des Lebens und der Seele sich gegen eine materielle Abnormität länger behaupten kann; theils, weil hier die Plasticität verhältnismäßig gering ist und ihre Abnormität daher sich nicht so schnell fortpflanzt; theils, weil zum Theil die Wirkung besonders nach innen sich wendet. Wie das Gehirn selbst verborgen ist, so sind auch seine Krankheiten im Zeitraume ihrer Entwicklung fast immer dunkel: die örtliche Affection spricht sich nur in einer veränderten Stimmung der Seele, und in unbestimmter, geringfügiger Störung dieser oder jener plastischen Function aus, bis endlich das Gehirn als Ganzes ergriffen wird und die Krankheit in voller Kraft hervorbricht.

§. 511. Die Unbestimmtheit und Wandelbarkeit der Symptome giebt eine zweyte Schwierigkeit der Diagnose ab. Daß überhaupt nach gleich gearteten Seelenkrankheiten ganz verschiedene Abnormitäten im Gehirne gefunden werden, und daß bey derselben Abnormität des Gehirns bald diese, bald jene Art von Störung der Seele vorkommt, stimmt ganz mit den Erfahrungen in Betreff andrer Organe und Krankheitsformen überein. Es war ein arger Wahn, wenn man hoffte, für jede Art von Seelenkrankheit oder wohl gar für alle überhaupt eine besondere Veränderung im Hirnbaue entdecken zu können: nie ist eine Krankheitsform an eine eigne Abnormität des materiellen Verhältnisses unzertrennlich geknüpft. Ein und derselbe allgemeine Krankheitszustand artet sich in jedem Individuum anders, und bringt verschiedene Symptome hervor, je nachdem die individuellen Lebensverhältnisse von Ursprung an oder durch spätere Einwirkungen, durch innere oder äussere Verhältnisse, anhaltend oder vorübergehend sich verschieden gestaltet haben. Hat daher z. B. eine Abnormität des Gehirns dem Leben eine bestimmte krankhafte Richtung gegeben, und es tritt späterhin eine ganz andre Abnormität an die Stelle der Erstern, so äussert sich diese in derselben, gleichsam habituell gewordenen Richtung, und erzeugt die frühern Symptome, die ihr eigentlich ganz fremd sind: so verursachte eine Depression des Schädels mit eingedrungenen Knochensplintern (Nr. 78.) Lähmung und Blindheit auf der linken Seite; beyde Symptome verschwanden, als die deprimirten Stellen gehoben und die Splitter entfernt wurden, traten aber 3 Tage später wieder ein, als die feste Hirnhaut sich entzündete. Die Symptome bezeichnen die verschiedenen Beziehungen und Spannungen des ursprünglich Erkrankten zu den verschiedenen Seiten des Lebens: je mannichfaltiger die lebendigen Beziehungen eines Organs sind, um so vielfältiger sind auch die Erscheinungen seiner Krankheiten. Da nun das Hirnleben am reichsten ist, so zeigt es

auch in seinen Krankheiten eine viertelstündliche Mannichfaltigkeit. Denn das Gehirn ist das vielseitigste Organ, welches die mannichfaltigsten Gegensätze in sich schließt, und in den verschiedensten Beziehungen zum übrigen Organismus steht: seine Abnormität kann im Dynamischen, Chemischen oder Mechanischen, im Leiblichen oder Psychischen, in dieser oder jener Seite des leiblichen oder psychischen Lebens, in diesem oder jenem Gehirne des Gehirns vorzugsweise sich äußern. Wenn das Gehirn seine Wirksamkeit in sich concentrirt, so vermindert sich sein lebendiger Einfluß auf die Organe auf gleiche Weise, und es entstehen gleiche Symptome, wie wenn seine Kraft wirklich gesunken ist: so entsteht z. B. Muskelschwäche sowohl von Ercthinismus, als von Collapsus des Gehirns (S. 345.).

§. 512. Drittens der Gang der Hirnkrankheiten ist unbestimmter und unregelmäßiger, als der anderer Krankheiten. Denn zuvörderst ist der Gang der Krankheit nur da einfach, wo das Leben selbst einfach ist; er wird weniger gleichförmig und mehr verwickelt bey einem Reichthum in innern Kräften und bey einer Menge bestimmter Momente. Sodann setzt das Nervensystem und sein höchster Centralpunct, das Gehirn, seiner eigenthümlichen Bedeutung nach, seine Einheit in den verschiedenen Lebensthätigkeiten; bey seinem Erkranken ist also auch die Herrschaft der Einheit gestört. Endlich ist das Typische dem Pflanzlichen und Pflanzlichen im Leben vorzugsweise eigen: wie eine Lebensthätigkeit der Seele näher tritt, mildert sich die Strenge der typischen Gewalt mit der Aufnahme des Gesetzes in das eigene Wesen befreit sich das Leben von dem Gesetze der pflanzlichen Erscheinungsweise.

§. 513. Hierzu kommt die auffallende Erscheinung, daß Kopfverletzungen bisweilen in ihren Wirkungen heilsam sind. Haller (elem. IV. p. 299.) führt schon mehrere Beispiele davon an. Häufige Kopfschmerzen wurden nach einer Schußwunde am Kopfe gelinder (Blanc in Harless neuem Journ. II. 1 St. S. 139.) und hörten nach einem großen Bruche am Stirn- und Scheitelbeine, und bey einem zurückbleibenden Hohlgeschwür: (Fabricius Hildanus p. 146.); so wie nach einem großen Verluste von Hirnsubstanz durch einen Bruch des Stirnbeins und darauf entstandnen Hirnschwamm (Lamy in Repertorium II. 8. 110.) gänzlich auf. Epilepsie wurde durch eine Kopfwunde gehoben (Richter's che. Bibliothek VII. S. 325.). Ein trüger und stumpfsinniger junger Mann wurde, da er bey einer Verwundung an der Stirne und bey dem späterhin entstandnen Hirnschwamm viel Hirnsubstanz verloren hatte, viel lebhafter und gelustvoller (Nova acta Nat. Cur. II. p. 364.). — Fragen wir nach dem Grunde solcher heilsamen Wirkungen, so nimmt man 1) die Verminderung der im Verhältniß zum Schädels zu großen Masse des Gehirns dafür an, so wenig auch dies im Ganzen genommen Wahrscheinlichkeit hat, 2) In manchen Fällen kann durch die Wunde früher angesammelter Eiter ausgelockt werden: ein Mann, der durch einen Schuß auf die rechte Schläfe taub und späterhin blödsinnig geworden war, genas, als er ein Jahr darauf in Folge eines Sturzes vom Pferde einen Abgang von Blut und Eiter aus dem rechten Ohre und aus der Kieferhöhle durch eine Zahnlücke bekam. 3) In Folge der durch die Verwundung gesetzten Congestion kann die Regsamkeit des pflanzlichen Hirnlebens erhöht werden; ja es kann vielleicht eine mäßige Erschütterung unmittelbar erregend wirken, so wie sie bey dem

Niesen eine belebende und erquickende Wirksamkeit äusserte. 4) Umgekehrt kann durch Gegenreiz die erhöhte Erregung in dem Schädel und seinen Bedeckungen, der Orgasmus und die passive Congestion im Gehirne gehoben werden; so lassen sich wohl die Fälle erklären, wo die Epilepsie nach der Trepanation aufhörte und nach der Verheilung der Wunde wieder kam (*Quart. v. y. in. m. de. m. d. p. 377*). Es beobachtet sich also noch:

g. 514. Noch häufiger ist es, daß die chirurgische Hülfe tödlich wird. Wir zählen hierher nicht die Fälle einer an sich unzweckmäßigen Operation, z. B. der Ligatur um einen Hirnbruch, welche nach einigen Stunden (Nr. 298), bis nach 11 Tagen (Nr. 288.) den Tod zur Folge hat, oder den Abschneiden desselben, worauf der Tod am folgenden Tage erfolgte (Nr. 291.); noch auch die Fälle einer wegen mehrjähriger Kopfschmerzen aufs Gerathewohl unternommenen Trepanation, welche nach 8 Tagen den Tod zur Folge hatte (Nr. 411.); sondern nur diejenigen, wo eine abnorme Product entfernt oder zerstört oder eine abnorme Congestität aufgehoben wird. Ein solches Heilverfahren kann tödliche Folgen haben, 1) weil die Operation selbst einer gefährlichen Verwundung gleich zu achten ist; 2) weil durch die Wundreizung die Hirnabnormität sich verschlimmert; 3) weil durch den Zutritt der atmosphärischen Luft Entmischungen und Ausartungen veranlaßt werden; 4) weil die Abnormität habituell, und die durch sie gesetzte Spannung dem Gehirne Bedürfnis geworden ist. Die Ausleerung des Wassers bey der Hirnwassersucht durch Öffnung einer Wirbelspaltingeschwulst an der Lendengegend (Nr. 366.) tödete auf der Stelle; die durch Punetur des Kopfs verursachte den Tod, wenn 1 bis 4 Pfund mit einem male ausgeleert wurde, nach 3 Stunden (Nr. 340.) oder am folgenden Tage (Nr. 365.); wenn man aber weniger auf einmal abließen ließ, erst nach 7 Wochen (Nr. 364.) oder nach 3 Monaten (Nr. 362.). Daß hier die Entfornung des Drucks und die Verminderung der Spannung tödet, geht aus dem Umstande hervor, daß eine Compression des Kopfs durch Binden den Nachtheil der Operation einigermaßen vermindert (*Beiträge I. S. 243. fg.*). Uebrigens erfolgte auch der Tod nach einigen Tagen, wenn ein unterbündener Hirnhautwasserbruch (Nr. 357. 358.) platzte und sein Wasser ergoß. — Der Tod erfolgte am ersten Tage nach der Ausleerung von Eiter, der seit mehreren Jahren sich angesammelt hatte (Nr. 479.); am zweyten Tage, nachdem ein Löffel voll Eiter aus dem Gehirne (Nr. 336.), und am vierten Tage, nachdem eine Unze Eiter von dessen Oberfläche (Nr. 350.) entfernt worden war. — Ein Andre (Nr. 332.) starb nach zwey Stunden, nachdem durch Trepanation 3 Unzen Blut von der Oberfläche des Gehirns genommen worden waren. — Ein Mann, der 10 Jahre lang einen Knochensplitter im Gehirne gehabt hatte (Nr. 101.), starb nach Anziehung desselben am folgenden Tage; ein Andre, welchem seit 9 Jahren ein Stück Eisen im Gehirne gesteckt hatte (Nr. 83.), bekam Fieber, Delirium und Sopor, als man die Wunde wieder öffnete und Eiter abließen ließ, und da man einen Monat später das Eisen herauszog, starb er nach 4 Tagen; ein Dritter (Nr. 104.) wurde, als man eine seit 3 Monaten im Gehirne steckende Schraube herauszog, von Fieber und Schwere des Kopfs befallen, und starb 3 Monate später, — Einschnitte in Schwämme der festen Hirnhaut hatten bald darauf (Nr. 911.), an demselben Tage (Nr. 915.), nach 2 (Nr. 894.), 3 (Nr. 900. 903.), 4 (Nr. 919.), 5 (Nr. 913.), 12 (Nr. 888.) Tagen den Tod zur Folge; das Abschneiden (Nr. 896. 898.), das Öffnen mit

Aetzstein (Nr. 897) und das Auflegen von Digestivpflaster (Nr. 907) hatte dieselben Wirkungen; wenn auch zum Theil später. Auch das Abschneiden von Abzugeschneiden des Gehirns (Nr. 1007) zog nach einigen Wochen den Tod nach sich.

III. Richtung des Hirnlebens.

§. 515. Das Gehirn hat, als Kern und Centralpunkt des ganzen Organismus ein allseitiges Leben, steht, indem es das Höchste in sich schließt, auch mit dem Niedrigsten in Beziehung, und äussert sich in den mannichfaltigsten Richtungen (§. 511), welche nicht an ein einfaches Gesetz gebunden sind (§. 509, 512), sondern mit einem Schein regelloser Willkühr auftreten. Im ganzen genommen wird der Verkehr mit andern Organen und die Wirkung nach aussen leichter gestört, als das innere Leben: eine geringere Abnormität hebt eine äussere Sinnethätigkeit oder eine willkürliche Bewegung auf ohne die Seelenethätigkeit zu beeinträchtigen; ein schwacher Druck stört die Bewegung, ein stärkerer das Bewusstseyn (§. 519). Wird aber die Seele durch eine Hirnabnormität angegriffen, so leidet eher ihre höhere Thätigkeit, als ihre niedere Stammfunction: während wir bey den meisten Krankheiten zu tieferm Nachdenken unfähig sind, können wir noch Gegenstände des gemeinen Lebens gehörig hemthalten; eine leichtere Erschütterung schwächt die Urtheilskraft; eine stärkere das Gedächtniss; eine noch stärkere hebt das Bewusstseyn auf, und die stärkste vernichtet die pflanzliche Hirnethätigkeit und das Gesamtleben (§. 553). Das Gehirn kann mit jedem Organe in Beziehung treten, und auf jede Function einen Einfluss ausüben; mit einigen steht es in näherem Verkehr, und diese leiden bey seinen Abnormitäten häufiger und stärker. Es wirkt auf dieselben allein, und bestimmt sowohl die Reizempfindlichkeit, und die Bewegung, als auch die Secretion und Ernährung, z. B. des Magens (§. 311 — 314), oder des Auges (§. 334, 335). Es wirkt auf den Bildungshergang und die Qualität der Mischung in dem einen Organe durch Bestimmung der Bewegung (§. 386), in dem andern unmittelbar dynamisch (§. 393). Die nächste Wirkung des Gehirns hat wieder andre zur Folge, so daß dadurch eine Verkettung der Wirkungen durch den ganzen Bereich des Lebens sich erstreckt: wenn z. B. das Gehirn durch Erregung von Athmungsbegehren die Umwandlung des venösen in arterielles Blut vermittelt, so wird dadurch wieder sowohl der gesamte Bildungshergang, als auch die normale Thätigkeit des Herzens, und die Erregung des Gehirns durch rothes Blut zu Wege gebracht. Eben so sind die verschiedenartigen Richtungen der Seele verknüpft; die höhere Seelenethätigkeit wirkt mittels des pflanzlichen Hirnlebens eben so, wie die niedere; idealisches und sinnliches Gefühl wirken auf gleiche Weise auf die Organe (§. 431, 442).

1. Beziehung zum pflanzlichen Leben, a) überhaupt.

§. 516. Wie die Blüte ein Theil der Pflanze ist, und doch wieder die ganze Pflanze in sich schließt, indem sie theils alle Elementarorgane in veredelter Gestalt enthält, theils die Wiederholung des Lebens in einem neuen Individuum vorbereitet, so ist das Gehirn der Gipfel theistischer Bildung; in welchem die Weisheit des Lebens zur eigenen Func-

tion wird als Seele und als allseitige Beziehung zum übrigen Organismus. Indem das Gehirn durch seine pflanzliche Thätigkeit die einzelnen Strahlen des Lebens centriert, dadurch aber die Weisheit, dasselben als innere Erscheinung hervorzuweisen läßt, sind Seele und Leib in gegenseitiger Durchdringung; die Seele ist allgegenwärtig im Leibe, und ist auf der andern Seite des Reflex des Leiblichen Lebens.

§. 517. Das leibliche Leben ist das Vorbild des Psychischen, indem es der Ausdruck der Ideen ist, und der Charakter der Individualität und Selbstbestimmung an sich trägt. Es nährt und erhält das pflanzliche Hirnleben (§. 279); errögt und stützt durch dieses die Seele, und erhält in seinem Gegensatze zu derselben das normale Gleichgewicht ihrer Kräfte. Ein kräftiges Leben des Leibes kommt zunächst dem pflanzlichen Hirnleben zu Statten, wird aber auch dadurch eine feste Stütze psychischer Kraft. Bey stärkerer Lebensconstitution, bey breiter und gewölbter Brust und kräftigerem Pulse findet sich unter übrigen gleichen Umständen auch mehr Ausdauer im Denken, mehr Fassung und gleichmäßige Gemüthsstimmung, mehr Entschlossenheit und Festigkeit des Willens. Wie der Leib schwächlich wird, so verändern sich diese Eigenschaften der Seele, wenn diese nicht durch Uebung und Selbstbewußtseyn so verstärkt ist, daß sie bis auf einen gewissen Punkt ihre Selbstständigkeit behauptet.

§. 518. Sehr starke Veränderungen im Leibesleben wirken aber antagonistisch auf die Seele und bringen in ihr die entgegengesetzten Veränderungen hervor. Wie Plastizität und Irrabilität eine solche Uebermacht gewinnen können, daß gleichsam keine Kraft mehr übrig bleibt für das höhere Leben, so können sie auch durch ihr Sinken so veranlassen, daß dieses in gleichem Verhältnisse steigt. In den letztern Fällen besteht diese Steigerung oft nur in einem Zustande der Aufregung und erhöhten Empfindlichkeit, z. B. bey der Abzehrung, bey welcher das Gehirn dadurch des Uebergewicht gewinnt, daß es vermöge seiner Selbstständigkeit (§. 224.) vermöge seiner schwichern Plastizität, welche des Blutes mehr zur Erregung, als zur Massenbildung bedarf (§. 226. 234.); an Masse nicht abnimmt, während die andern weichen Gebilde oft $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ ihres Gewichts verlieren (*Desmoulins in Journ. complém. XIII. p. 208.*). So ist auch mit angebörner körperlicher Schwächlichkeit oftmals eine große Lebendigkeit des Geistes verbunden, die mehr in Regsamkeit, als in wahrer Energie, oder mehr in einselligen Talenten, als in voller Gesundheit der Seele besteht. In andern Fällen tritt eine wirkliche Erhöhung der Seelenkraft ein, indem das Leibesleben sinkt. Die Zersetzung der organischen Substanz durch Scorbüt kann die lebendige Seele frey machen. Ein Mann, der durch verachtetes Unglück in sinnlose Raserey verfallen war, und so Jahre lang in Ketten auf faulem Stroh und Koth in einer dampfenden Kammer des Irrenhauses unbeachtet gelegen hatte, erlangte seine volle Besonnenheit, als er durch den höchsten Grad des Scorbüts der allgemeinen Fäulniß nahe gebracht worden war. So kann man in einzelnen Fällen durch absichtlich, mittels der Quecksilbercur hervorgebrachten Scorbüt den Wahnsinn heilen. Aber die Gegensatzung von leiblichem und psychischem Leben ist nicht absolut, sondern bedingt, und von besondern Umständen abhängig: manche Bäume beginnen ihr Sterben damit, daß sie aufhören, Blüthen zu tragen, während Andre, die schon im Sterben begriffen sind, eben deshalb noch einmal um so mehr Blüthen erzeugen. So ist es keine allge-

meine Heilmethode des Wahnsians, den Leib, herunter zu bringen und sein Leben zu zerrütten, denn diese Zerrüttung kann auch über das Gehirn selbst sich ausbreiten, und der Seelthätigkeit oder die Quacksilberkrankheit kann Wahnsinn erzeugen. Nur wo die Zerrüttung auf den übrigen Leib beschränkt bleibt, kann die im frühern Zustande kräftig gewesene Seele dadurch ihre Freyheit wieder gewinnen. — Wenn in einem entzündeten Eingeweide der Brand eintritt, so hört nicht nur der Schmerz auf, sondern es wird bisweilen auch die Seelenthätigkeit dabey exaltirt. Auch bey andern Krankheiten bemerkt man zuweilen kurz vor dem Tode einen höhern Schwung der Gedanken. Bey Abnormitäten des Gehirns bekommen Wahnsianige nicht selten kurz vor dem Tode den Gebrauch ihrer Verstandeskkräfte wieder: so bey Ergießung von Blut (Nr. 33, 137.) und Wasser (Nr. 514.), bey Eitarung (Nr. 480, 593.), Erweichung (Nr. 817.), Verhärtung (Marshal p. 151, 156, 181.), Hypertrophie (Nr. 693.), Hydrotiden (Nr. 1063.) und Aftergebilden (Nr. 782, 1036.), und zwar so, daß entweder die Verwirrung in dem Maasse, als die Kräfte sinken, allmählig abnimmt (Nr. 693.), oder plötzlich die volle Besinnung eintritt und noch an demselben Tage der Tod erfolgt (Nr. 137, 480, 817.). Dies kann sich ereignen entweder indem durch das Sinken der Plasticität die Uebermacht des Blutes beschränkt, die Congestion gehoben und das Gehirn befreyt wird, oder indem im Gegensatze zum übrigen Leibe ein Erethismus des Gehirns, gleichsam eine *Plethora ad spatium* entsteht.

§. 519. Die Seele ist das höchste Ziel des Lebens, in welchem dessen Sinn als eigenthümliche, selbstständige Function auftritt. Sie begeleitet das Leben und lenkt es nach individuellen Zwecken, so, wie das pflanzliche Hirnleben die Macht des Ganzen auf die einzelnen Functionen zurückstrahlt, durch höhere Einheit sie verknüpft, durch Gegensatz eine allgemeine Spannung in ihnen hervorbringt, eine Bedingung für das Gesamtleben wird (§. 333.), und auf die allgemeine Ernährung Einfluß hat (§. 309.). Am unmittelbarsten bestimmt es, die beyden Pole der materiellen Aneignung, Magenverdauung und Athmen, so, daß diese bey seiner Lähmung für immer, wenn auch in verschiednem Grade, gestört sind, während die Affection andrer Organe nicht so allgemein ist. Da die Seele nicht wirkt ohne eine ihr entsprechende organische Hirnthätigkeit, so muß sie nun auch durch diese den übrigen Leib unwillkürlich bestimmen. In der That wirkt keine Potenz, keine Function so mächtig auf das gesammte Leben, als die Seelenthätigkeit. Frohsinn vervollkommet Verdauung und Athmen, erhöht die Muskelkraft und die allgemeine lebendige Spannung. Selbst die sittliche Macht verkündet sich im Aeußern des Menschen: im Augenblicke einer schönen Handlung ist die Gestalt verklärt. Lähmungen und Fieber werden plötzlich gehoben durch eine lebhafte Wirksamkeit der Phantasie, durch eine kräftige Anstrengung des Willens; und durch Gemüthsbewegungen. Umgekehrt können Letztre augenblicklich lähmen und töden. Bey Seelenkrankheiten liegt meist die gesammte Plasticität darnieder. Ruhe des Geistes und des Gemüths ist die Bedingung jeder Heilung; wird die Seele beunruhigt, so werden die Wunden trocken, oder geben übelartigen, wässerigen, fauchichen Eitern, oder brechen, wenn sie schon vernarbt waren, wieder auf.

§. 520. Wo die Hirnthätigkeit zu stark hervortritt und sich mehr auf ihre eigenthümliche Sphäre beschränkt, vermindert sie durch Ableitung das übrige Leben, und die

ses erlangt seine volle Kraft erst dann wieder, wenn jene verhältnißmäßig zurück tritt. Angestrenzte Studien und heftige Gemüthsbewegungen verursachen Abmagerung und Schwäche; Ruhe der Seele giebt die verlorne körperliche Kraft wieder; Wachen und Schlaf sind Schwankungen und wechselseitig erfolgende Uebertragungen des Uebergewichts auf das Hirnleben und auf das Leibesleben, welche nur in ihrer Verbindung das Gleichgewicht geben. Umgekehrt ist die unvollkommene Entwicklung des Gehirns mit üppiger Ernährung des übrigen Leibs verbunden.

§. 521. Wir haben nun das quantitative Verhältniß des Gehirns zum übrigen Leibe in der Thierreihe näher zu betrachten, indem wir eingedenk sind, daß Maas und Gewicht auch zu berücksichtigende Momente im Leben sind, obgleich dieses nicht einzig darnach zu beurtheilen ist. — Aristoteles (*hist. anim. lib. I. c. 16. p. 477.*) behauptete zuerst, daß der Mensch in Verhältniß zu seinem Körper das größte Gehirn habe, und erklärte dies (*de part. animal. lib. II. c. 7. p. 605.*) daraus, daß sein Herz wärmer sey, als das der Thiere; und einer stärkern Abkühlung bedürfe. Nachmals wurde, als man das Gehirn als Seelenorgan erkannte, dieser vermythliche Erfahrungssatz auf die reichlichere Bildung thierischer Geister (*Carpus fol. 624.*) und auf die vollkommnere Sensation (*Varole p. 6.*) bezogen. Indes zeigte van der Linden (*Diemerbrosch lib. III. c. 3. p. 34.*) daß die Singvögel im Verhältniß zum Körper ein größeres Gehirn haben, als der Mensch. Nachdem dies sich bestätigt hatte, machte Sommering (*Hierlehre S. 20. tabula basica p. 8.*) auf das Mißliche bey diesen Vergleichen aufmerksam, indem das Verhältniß verschieden ausfallen muß, je nachdem das Individuum, welches man in dieser Hinsicht untersucht, jünger oder älter, stärker oder schwächer genährt ist, und je nachdem man die Gränzen des Gehirns gegen das Rückenmark mehr nach oben, oder weiter nach unten annimmt. Doch würde es eine ungeduldige Uebersetzung seyn, wenn wir deshalb die Beobachtungen über dies Verhältniß, welches gewiß nicht ohne Bedeutung ist, ganz vernachlässigen wollten. Ich stelle die Angaben nach Haller, Cuvier, Tiedemann, Carus, Wenzel und Meckel in folgender Uebersicht zusammen, in welcher die Zahl des Verhältniß des Körpers zum Gehirne, wenn dieses als Einheit angenommen wird, ausgedrückt.

I. Fische:		Seeschildkröte		2. Wasservogel.	
1. Knorpelfische.		Landeschildkröte	5688	Gans	360
Stör	44800		2240	Ente	257
<i>Squalus carcharias</i>	2496	2. Schlangen		Meerschwalbe	65
<i>— galus</i>	1453	Natter	752	3. Sumpfvogel.	
2. Knochenfische.		3. Frösche		Reiher	112
Thunfisch	57440	Salmander	380	Kiebitz	105
Wels	1837	Frosch	172	Grünflüßiger Moorhuhn	91
Hecht	1305	III. Vögel.		Rothflüßiger Wasserläufer	62
Aalraupe	720	1. Hühner		Regenpfeifer	40
Karpfen	560	Hochhuhn	443	4. Raubvögel.	
II. Amphibien.		Pfau	300	Adler	160
1. Schildkröten		Rebhuhn	193		
		2. Taube	91		

Falke	102	Bisamschwein	176	Mus.	
Nachteule	54	3. Einhufer		Wanderratze	156
Thurmfalke	51	Pferd	700	Ratze	76
5. Kletterfögel.		Esel	254	Maus	43
Papagey	42	4. Raubthiere.		Feldmaus	31
Buntspecht	31	a) Zehngänger.		Myomys	
Grünspecht	28	Canis.		Siebenschläfer	49
6. Sperlingsartige Vögel.		Hyäne	307	Gartenschläfer	37
Thurmschwalbe	71	Wolf	230	Eichhörnchen	40
Amsel	67	Fuchs	205	Fliegendes Eichhörn-	
Kreuzschnabel	38	Hund	47—305	chen	34
Rothkehlchen	32	Felis		6. Zahnlose.	
Wiedehopf	30	Löwe	615	Zweyzähliger Ameisen-	
Buchfink	27	Panther	249	fresser	115
Sperling	25	Luchs	137	7. Fledermäuse	80—100
Erlenfink	23	Katze	82—166	8. Cetaceen.	
Grünfink	14	Mustela.		Braunfisch	60—90
Zeisig	14	Marder	365	Delphin	36—100
Canarienvogel	14	Frettchen	138	9. Vierhänder.	
IV. Säugethiere.		Otter	127	Magot.	105
1. Wiederkäuer.		Zibeththier	105	Parian	104
Camelus.		b) Sohlengänger.		Makia	
Kamel	1073	Bär	261	Makia	96
Dromedar	387	Igel	168	Mokoko	61
Bos.		Waschbär	160	Orang	
Büffel	1001	Dachs	120	Gibbon	48
Ochs	960	Spitzmaus	60	Guerone.	
Capra.		Maulwurf	36	Mangabey	48
Schaf	352	5. Nager.		Mona	41
Ziege	250	Beber	290	Subasa	41
Muffelthier	251	Lepus.		Patas	41
Cervus.		Hase	232	Faunus	24
Apishirsch	308	Kaninchen	136	Sapajous.	
Edelhirsch	290	Murmeltier	264	Coata	41
Reh	263	Cavia.		Talapoula	35
Damhirsch	252	Meerschweinchen	157	Ouisiti	28
2. Dickhäuter.		Aguti	122	Sol	25
Elephant	500	Zibetmaus	124	Malbrout	24
Sus.		Hamster	97	Saipiri	22
Wildes Schwein	672	Lemmus.		Sajou	11
Zahmes Schwein	462	Wassergeist	103	10. Mensch	40—50.
Schwein von Siam	452	Feldgeist	40		

§. 522. So sehr auch diese Angaben theils der Vervollständigung, theils der Berichtigung bedürfen mögen, so geben sie uns doch schon einige Resultate. Im Ganzen genommen nimmt mit der fortschreitenden Entwicklung des Lebens in der Thierreihe auch das Gehirn im Verhältnisse zum Leibe zu. Das allgemeine Gesetz der fortschreitenden Lebensentwicklung ist Unterordnung der Plasticität unter die Sensibilität, oder allmähliche Zunahme dieser und Abnahme jener. Aber die Natur verfährt nirgends nach einem einfachen Maassstabe, sondern bringt in die Erfüllung des einzigen Gesetzes überall Mannichfaltigkeit. Daher spricht sich denn 1) jene Steigerung der Sensibilität und jenes Zurücktreten der Plasticität bald absolut, bald relativ, bald intensiv, bald extensiv, bald in dieser, bald in jener Richtung aus. 2) Die Steigerung des Lebens entspricht der nach ihrer Verwandtschaft sich ordnenden Reihe der Thierformen zwar im Allgemeinen, aber nicht einformig: jede Classe, Ordnung und Familie hat ihren bestimmten Charakter und ihren eigenen Standpunct im Thierreiche, faßt aber wieder neue Gegensätze und Stufenfolgen in sich, stellt einen eigenen Cyklus dar, und bildet ein Ganzes mit mannichfaltigen Gliedern.

§. 523. Die extensive Stärke der Sensibilität zeigt sich in höherer Empfindlichkeit und Regsamkeit, in regerem Sinnenleben, in sinken, raschen, mannichfaltigen, unermüden Bewegungen und in einer gewissen Gelehrigkeit. Diese receptive Seite der Sensibilität, diese Richtung derselben nach aussen steht in keinem bestimmten Verhältnisse zur Spontaneität, zur Intensität der psychischen Kraft. Wie wir sehen, daß magere Menschen bey übrigens gleichen Umständen empfindlicher und regsamer sind, als fette, ohne daß darum ihre Geisteskraft grösser ist, so ist das Gehirn bey den Klettervögeln, den meisten Singvögeln, den *Quercus* und den *Sapajous* verhältnissmässig grösser, als bey dem Menschen, weil ihm diese Thiere in extensiver Stärke der Sensibilität übertreffen. Bey den Fischen ist das eben erst auftretende Gehirn noch winzig gegen die Körpermasse. Zwar zeigen sie eine große Beweglichkeit, aber nicht für Sinnenenthätigkeit und freye Bestimmung äusserer Körper, sondern nur für Schlägen und Ortsbewegung, und Letztere ist ein bloßes Schwimmen, eine verhältnissmässig mehr passive, nur durch unvollkommene Gliedmaßen bestimmte Bewegung. Unter den Amphibien ist das Gehirn am kleinsten bey den trägen, stumpfsinnigen, schwärzlichen Schildkröten; es wächst in den beweglichen Schlangen, und wird bey vollständigerer Gliederbildung in Frosche am grössten. Die innere Aufregung des Lebens, die unermüdete Thätigkeit, die Empfindlichkeit und Abhängigkeit bey geringer Körpermassa erreicht bey den Vögeln ihren Gipfel. Die Extreme in dieser Classe bilden die verhältnissmässig trägen, schwärzlichen Land- und Wasservögel mit vorwaltender Plasticität und Massenbildung, und die zarten, empfindlichen, regsamen, gelehrigen, kunstreichen Singvögel, deren vorherrschende Sensibilität eben im Gesänge sich kund gibt; mitten inna stehen aber mit überwiegender Irritabilität die Raubvögel, welche durch die Sumpfvögel an die Wasservögel und durch die Kletterer an die Singvögel sich anschliessen. Auf gleiche Weise bilden sich in der Sinfenleiter der Säugethiere die Gegensätze vorherrschender Plasticität in den Wiederkäuern und Dickhäutern, und höchster Sensibilität in den Nagern und Vierhändlern, während die überwiegende Irritabilität in den Raubthieren das Mittelglied bildet.

§. 524. Die extensive Stärke der Plasticität äussert sich durch die Größe des Körpers, durch die Quantität der organischen Masse. So wie menschliche Accephalen und Hemicephalen eine üppige Ernährung zeigen und fast ohne Ausnahme breitschulterig und fest sind, auf gleiche Weise ist bey den Thieren mit kleinem Gehirn der übrige Leib sehr groß. Kleine Thiere haben verhältnißmäßig mehr Gehirn, als große, indem dasselbe bey schwacher Entwicklung des Leibes stärker hervortritt, oder durch die Bildung eines räumlichen Gehirns das Wachsthum des übrigen Leibes gehemmt wird; sie sind, wie Pflanzen, an welchen die Stammbildung unvollkommen ist, und deren Bildungskraft vorzüglich nur auf Blüthenzeugung sich richtet. Dies Gesetz ist aber nicht das allein Bestimmende; denn wir sehen bey gleicher Quantität der Leibessmasse nicht überall das gleiche Verhältniß des Gehirns: z. B. bey Thieren, welche desselbe Gewicht haben, wie der menschliche Körper, wiegt das Gehirn nur ein Pfund, und bey denen, welche dem Menschen im Verhältnisse des Gehirns zum Körper gleich kommen, wiegt der Leib nur zwey bis vier Unzen.

§. 525. Eine andre Aeusserungsweise starker Plasticität bezieht sich auf die Schnelligkeit des Wachstums und auf die Ergiebigkeit der Regeneration. Bey verhältnißmäßig größtem Gehirn ist das Wachsthum langsamer und die Regeneration beschränkter, und insofern kann auch bey größerem Körper doch die plastische Kraft geringer seyn.

§. 526. Die Vergleichung des zahmen Schweins mit dem wilden zeigt, wie die bloße Verwelschung als Folge einer Entziehung der Freyheit, eines von selbst sich darbietenden Ueberflusses von Nahrung und eines Schutzes gegen die Witterung, theils auf Muskeln und Knochen verkümmend, theils auf die Hirnbildung fördernd einwirkt, ohne daß die Seelenthätigkeit dabey gewinnt.

§. 527. Ausser der verhältnißmäßigen Größe des Gehirns kommt es unstreitig wohl auch auf die absolute an. Bey den Thieren, deren Gehirn das menschliche in Hinsicht auf relative Größe übertrifft, wiegt dasselbe höchstens drey Unzen, beträgt also ungefähr den sechzehnten Theil des menschlichen. Auf der andern Seite kann das absolut größere Gehirn der Sensibilität nicht das Uebergewicht geben, wenn in Vergleich zu demselben der übrige Leib zu stark ist: so hat der Elephant ein dreymal größeres Gehirn, aber auch einen dreysigmal größern Leib, als der Mensch.

§. 528. Vorzüglich aber kommt es auf die innere Bildung des Gehirns an. Diese ist bey kleinern Thieren meist geringer, als bey den größern, welche ihnen verwandt sind und mit ihnen verglichen werden können. Wie die vollkommensten, am individuellsten ausgebildeten, d. h. solchen Blüten vorzüglich an solchen Gewächsen vorkommen, wo die Stammbildung mächtigst und die Masse der Blüten verhältnißmäßig geringer ist, so finden wir bey vielen größern Thieren das Gehirn zwar in Verhältniß zum Leibe kleiner, aber in sich vollkommener ausgebildet, als bey kleinern. Cuvier (Gehirn S. 220.) erklärt dies Verhältniß bey den Letztern für eine Annäherung an den Embryonenzustand, wo der Kopf das Uebergewicht hat, bis er durch Entwicklung der Gliedmaßen mehr beschränkt wird: allein wir sehen eher umgekehrt, daß in der Thierreihe parallel mit der Entwicklung der Gliedmaßen die relative Größe des Gehirns zunimmt.

§. 529. Endlich sehen wir, eine gewisse Proportion zwischen der Masse des Leibes und der des Gehirns: dieses wiegt bey dem Elephanten 10. Pfund, und bey dem Canarienvogel 13 Gran, indem der Körper des Erstern 6000 Pfund, der des Letztern 3 Drachmen wiegt. Für einen grossen Körper ist also auch ein grosses Gehirn gegeben, und da dies nicht dem Verhältnisse der Seelenkräfte entspricht, so muß es sich auf die Verknüpfung der pflanzlichen Hirnthätigkeit mit dem Leibesleben beziehen.

§. 530. Was die qualitativen Verhältnisse betrifft, so sehen wir zuvörderst eine Uebereinstimmung zwischen dem Charakter der Bildung des Gehirns und des übrigen Leibes. Die Schmalheit und vorherrschende Länge im Gehirne der Schlangen, und die bedeutende Breite im Gehirne der Seehunde giebt das deutlichste Bild von der entsprechenden Totalform des Gehirns und des Körpers.

§. 531. Der qualitative Einfluß des Leibes auf das Hirnleben äussert sich vorzüglich in einer gewissen Stimmung, d. h. in einer Geneigtheit der Seele zu einer besondern Richtung und Form ihres Lebens, in einer vorherrschenden Weise, zu wirken, die Dinge aufzufassen und zu beurtheilen, so wie sich zu Handlungen zu bestimmen. Diese Stimmung äussert sich theils in den Verhältnissen der Zeitfolge der Thätigkeiten, in der Regsamkeit oder Trägheit, in der vorherrschenden Receptivität oder Spontaneität, theils in der Gattung von Vorstellungen, zu deren Bildung sie geneigt ist. Sie entwickelt sich aber aus dem organischen Zustande des Gehirns, welcher wieder von dem übrigen leiblichen Leben bestimmt wird. 1) Dies zeigt sich bey dem Wechsel der Zustände relativer Gesundheit. Das leichte, rasche Vorstattgehen der Functionen giebt eine heitere, fröhliche Stimmung; große Beweglichkeit und Lebendigkeit im Körperlichen ruft die Phantasie stärker hervor; bey Schwierigkeiten und Hemmungen im leiblichen Leben stellt sich Trägheit und Trübsinn ein; bey unharmonischen, hastigen Actionen entsteht Verdrüsslichkeit; bey dem Sinken der Lebenskräfte Niedergeschlagenheit, und bey zunehmender Kraft Muth. 2) So wirken denn auch die organischen Verhältnisse auf die Stimmung der Seele. Nur einseitige Versachtung des Leiblichen, nur Dünkel und Hoffarth der Seele kann dies verkennen; dem unbefangenen Beobachter entgeht es nicht. Lichtenberg (Schriften I S. 23.) sagt: „ich habe es sehr deutlich bemerkt, daß ich oft eine andre Meynung habe, wenn ich liege, und eine andre, wenn ich stehe, zumal wenn ich wenig gegessen habe und matt bin.“ Und wer hat nicht bemerkt, daß man des Morgens und des Abends, nüchtern und nach einer reichlichen Mahlzeit anders empfindet, urtheilt und begehrt? Die Seele kann sich an gewisse, an sich gleichgültige Verhältnisse, Bewegungen, Umgebungen u. s. w. gewöhnen, welche endlich Bedingungen ihrer freyen Thätigkeit werden: so blieb jener gewandte Redner, von welchem Addison erzählt, stecken, da man ihm bey dem Anfange seiner Rede den Bindfaden entwendet hatte, mit welchem er dabey zu spielen pflegte. 3) Unter manchen Umständen kann das Aeußere zugleich als Stoff für die Seele und durch Erweckung bestimmter Vorstellungen wirken, z. B. der Anblick einer heitern Landschaft im Frühlinge, und einer düstern im Herbste, wobey jedoch die Einwirkung der mannichfaltigen, buntfarbigen oder der einförmigen, trüben Gegenstände auf die Erregung des Auges, der reinen, milden, warmen, oder der feuchten, rauhen Luft auf die Haut u. s. w. nicht gleichgültig ist. Aber andre Einflüsse wür-

ken auch rein organisch. Wer von Trauben und Feigen lebt, hat eine andre Stimmung, als der, welcher mit Mehlklößen und Speck, oder mit Roastbeef und Porter sich nährt. Wasserstoffgas macht Frohsinn und unwiderstehliche Neigung zum Lachen; Belladonna erzeugt Wuth; Opium berauscht und exaltirt die Phantasie; und Salpeter macht verzagt und kleinmüthig. 4) Je nachdem die Mischung, die Textur, und das gegenseitige Verhältniß der organischen Gebilde verschieden ist, muß auch das Gemeingefühl, dieser Keim des psychischen Lebens, anders sich arten. Die gesammte Organisation giebt somit die erste Bestimmung des psychischen Lebens ab. Je reicher sie ist, je mannichfaltiger die organischen Glieder, und je individueller die einzelnen Gebilde sind, je zarter die Substanz und je reicher sie an Nerven ist, um so vollkommener, schärfer, bestimmter muß das Gemeingefühl seyn, und um so mehr muß mit ihm das Innerliche, Geistige herrschend werden. Das Temperament ist die in entsprechenden Formen psychischer Thätigkeit sich spiegelnde Eigenthümlichkeit der leiblichen Lebensverhältnisse; daher ändert es sich denn auch bey veränderter Lebensweise und nach körperlichen Krankheiten: 5) Häufig entstehen Entzündungen des Gehirns und seiner Häute, als Folge von Leibeskrankheiten, und zwar entweder so, daß eine bisher bestandene Entzündung in Pneumonie, Peritonitis, Scharlach u. s. w. bey weiterer Zunahme auch über das Gehirn sich ausbreitet, oder so, daß nach Unterdrückung eines entzündlichen Zustandes in Rheumatismus, Exanthem, Rothlauf, Ruhr, Lungensucht u. s. w. oder irgend einer bestimmten plastischen Thätigkeit, einer normalen oder abnormen Absonderung u. s. w., das Gehirn ergriffen wird. So giebt auch die Unterdrückung von Krätze, Syphilis, Skropheln zu Entstehung von Geschwülsten im Gehirne Anlaß (Nasse zu Abercrombie S. 183). Indem die abnorme Plasticität, die Cachexie vom übrigen Leibe auch über das Gehirn sich verbreitet (§. 233. 258. 260. 263. v. s. w.), greift sie auch störend in die psychische Sphäre ein. Gans allgemein ist aber die Wirkung der Krankheiten auf die Stimmung der Seele. Jede fieberhafte Störung der leiblichen Gesundheit bewirkt Verstimmung, Gleichgültigkeit gegen das, was sonst interessiert, oder erhöhte Empfindlichkeit und Verdrüßlichkeit, Unvermögen zum freyen Nachdenken, oft auch Kopfschmerz, gestörten Schlaf u. s. w. Indels steht hierin das Gehirn den übrigen Hauptorganen ganz gleich: die Organe des Blutlaufs, des Athmens, der Verdauung und der Absonderung werden eben so ergriffen, wie das Gehirn, und die über alle sich verbreitende Affection constituit eben das Fieber. Zweifeln kann aber auch Entkräftung, Abzehrung, körperlicher Schmerz und Schlaflosigkeit, der Seele in einer bestimmten Richtung einen höhern Schwung geben. So wurde z. B. das Dichtertalent bey Daniel Schönmann geweckt: bey drückendem Mangel, unmäßigen Studiren und Nachtwachen versiel er in eine abzehrende Krankheit, wobey er in einem dem Schlafwachen ähnlichen Zustande in Versen sprach: und späterhin behielt er auch die Fertigkeit zu improvisiren. Rutger Ouwers litt 25 Jahre lang an Krämpfen; in den schlaflosen Nächten kam ihm Alles in den Sinn, was er früher gelesen hatte, und erinnerte er sich einzelner Worte nicht genau, so wiederholte er die, welche er wußte, so lange, bis jene ihm einfelen, oft 1000 mal. Er stellte Betrachtungen darüber an, und verfaßte Gedichte, aber nach jedem, noch so leisen Schlafe war die Erinnerung von Allem verschwunden, wiewohl er glaubte, damit zufrieden seyn zu können. Er fing

also an, seine Gedanken aufzuschreiben, und fand, daß dies seine besten Arbeiten waren (*Owens noctes Haganas, sive observationes, in quibus multi veterum scriptorum loci explicantur, vindicantur, emendantur. Franeg. 1760. 8.*). Freyherr von Sockendorf (dramatische Arbeiten, Leipzig 1822. 8.) verlor in seinem 53sten Jahre binnen 3 Tagen 14 Pfund Blut durch die Nase, und wurde durch die darauf folgende höchste Schwäche in eine überaus heitre Laune versetzt, bey welcher er dem Drange nicht widerstehen konnte, zum erstenmale dramatische Arbeiten zu liefern, ungeachtet nach seiner Versicherung seine frühern Beschäftigungen durchaus nur das Gepräge des Ernstes trugen. Arnoldine Weissel (Gedichte der Arnoldine Wolf, geb. Weissel. 1817.) suchte in schlaflosen Nächten die folternden Schmerzen durch Singen zu bekämpfen, und sang, wenn sie mit den answendig gelernten zu Ende war, Lieder aus dem Stegreife, wobey es ihr vorkam, als ob sie sie von der Wand ablöse; nach ihrer endlichen Genesung dachte sie nicht mehr an das Dichten, sobald sie aber von etwas lebhaft ergriffen war, wurde Alles, was sie dachte und schrieb, zu Versen. 6) Alle diese Einwirkungen des Leibes sind aber keinesweges absolut, sondern können mehr oder weniger durch die sich selbst bestimmende Seele beschränkt werden. Bey großer Körperkraft ist man frey, wenn man dem sinnlichen Wohlbehagen ergeben ist, und wenn ein Ideal oder ein Phantom die Seele erfüllt; wird auch der körperlich Schwache zum Helden. Die Seele erhält ihre Stimmung nicht bloß von aussen her, sondern auch durch sich selbst; ihre frühern Thätigkeiten lassen einen Eindruck zurück, der ihren künftigen Zustand bestimmt; durch sie wird eine bestimmte Stufe der Lebendigkeit oder eine bestimmte Richtung der Anschauung habituell, welche auf jede neue Thätigkeit ihren Einfluß ausübt und sie modificirt. Wie nun diese erworbene Stimmung dem Einflusse des Leibes widerstreben kann, so vermag dies auch der Geist durch freye Gegensatzung: er vermag nämlich die sich ihm aufdringende Stimmung als ein Fremdartiges anzuerkennen und durch Selbsterkenntniß, d. i. durch Vergleichung seines momentanen Zustandes mit seiner bleibenden Wesenheit zu besiegen.

§. 53a. Die Seele giebt dem Leibe seine Stimmung. 1) Man sieht in der ärztlichen Praxis, daß bey Personen, die sich bloß von Launen regieren lassen, den Gesetzen der Vernunft nicht gehorchen und in der Thorheit sich gefallen, ohne gerade eine ausschweifende Lebensart zu führen, auch das leibliche Leben der Caprice unterthan ist, die Krankheiten regellos verlaufen, und die Heilmittel eine ganz verkehrte Wirkung haben. Die Heilkraft der Natur schafft das Nöthige nach Maaßgabe der Umstände, und ist ein Verstand des Leibes: sie zeigt sich daher in ihrer Macht auch nur bey verständigen Menschen, welche dem Gesetze sich unterwerfen und in solcher Selbstbeschränkung zur Freyheit gelangen; die Krankheit ist hier geordneter, regelmäßiger, einfacher, und läßt sich leichter beseitigen, auch wenn die früher gewohnte, leibliche Diät nicht die einfachste und regelmäßigste gewesen ist. 2) Bestimmte Gemüthszustände erregen bestimmte Abnormitäten im plastischen Leben, nsgender Kummer und Gram veranlaßt Scirrhen und Krebs; die abmattende Furcht bey einformiger, langwieriger Gefahr in belagerten Städten und auf gefährlichen Seereisen erzeugt neben den materiellen Ursachen vorzüglich den Scorbut. 3) Es ist eine Verknüpfung zwischen bestimmten Vorstellungen und bestimmten leiblichen Zuständen. Wenn wir auf irgend eine schmerzhaft Stelle absichtlich unsere

Aufmerksamkeit richten, so nimmt der Schmerz bedeutend zu. Bey einer gewissen Empfindlichkeit und Regsamkeit der Phantasie bekommt man bey'm Anblicke eines körperlichen Uebels an einem andern Menschen unangenehme Empfindungen in den entsprechenden, man sieht Bechwerden des Lungenauswurfs, und muß, gleichsam zur Hülfe, husten, man sieht Würgen, und bekommt Uebelkeit; man sieht einen Katheter mit Mühe einbringen, und fühlt eine kramphafte Zusammenschnüfung in der Harnröhre. Auch wirkt die Vorstellung auf die wirklichen Functionen der Organe. Der Anblick von Krämpfen kann Krämpfe erzeugen. Ein junger Mann bekam einen Fieberanfall, da er die lebhafteste Schilderung desselben mit großer Spannung angehört hatte. Eingebildete Krankheiten werden wirklicher: einfache Drüseneschwülsche werden durch Besorgnisse einer Schreihosität zu wirklichen Steinheln; ungeachtet die anderweitigen Bedingungen fehlen. In Theilen, an welchen man sich einbildete, verletzt worden zu seyn, sind Blutrindungen und Blutaustretzungen entstanden. Bey einer Frau trat eine Secretion von Milch ein, so oft sie ein Kind schreyen hörte, und eine Andre bekam Wehen aus dem Wahne einer jetzt zu Ende gebenden Schwangerschaft (Treviranus Biologie, VI. S. 29. fgg.). Körperliche Krankheiten werden durch die Phantasie geheilt: Furcht, durch Drohungen, erregt, kann Krämpfe selbst Fieber heben; die sichere Hoffnung der Genesung unterstützt alles Heilen körperlicher Krankheiten, und ist allein hinreichend, Lähmungen und dergleichen zu beseitigen. Besonders merkwürdig ist die thatsächlich unleugbare Heilung von Wunden durch alleinend unsinnige Mittel und sympathetische Curen. Der auf Hexerey oder Prophezeeyung sich gründende Wahn, sterben zu müssen, kann töden. Aber auch bey Gebildeten bestimmt die Phantasie zuweilen die Todesstunde: ich war Zeuge, daß eine geistvolle, phantasiereiche Frau, die an einem schleichenden Nervenleiden litt, an demselben Tage und in derselben Stunde, wie vor 21 Jahren ihr Gatte, verschied, da sie, nach einer frühern Ausserrung zu schliefen, sich diese Todesstunde gewählt hatte, wie denn auch eine solche Herrschaft des Geistes über das Leben ihrem ganzen Wesen entsprach.

b) Beziehung zum Rumpfe.

§. 533. Das Materielle ist die Wirkung und das Erscheinen eines Ideellen, und die organische Bildung ist die Verwirklichung des Begriffs des Lebens. So ist denn das räumliche Verhältniß der Ausdruck und das Abbild eines innern, auf einem Gedanken beruhenden Verhältnisses: die Veränderungen des Seelenzustandes sind von Bewegungen der Rumpfgane begleitet, welche in ihrem allgemeinen Charakter denselben genau entsprechen, und in einem räumlichen Bilde darstellen, was dort als Psychisches auftritt (§. 431. 436. 438.). So haben wir denn das Wesen der Functionen anzuschäuen, um ihre Beziehung zum Hirnleben zu erkennen. Man versteht unter Bedeutung der Organe die Uebereinstimmung ihres Begriffs mit ihren Erscheinungen, wie diese im individuellen Organismus und in ihrer Beziehung zu andern Functionen, im Laufe des Lebens und im ganzen Reiche der organischen Wesen sich darstellen. Wenn wir nun anerkennen, daß das Leben auf einem geistigen Grunde beruht, daß darum eben die Seele aus ihm sich entwickeln kann und, bloß relativ verschieden, in ihrem Wesen mit dem leiblichen Leben einig ist, so werden wir auch die Aufgabe haben, die psychische Bedeutung der Or-

gane zu untersuchen; sie als leibliche Reflexe der Seelenthätigkeiten zu betrachten, und die Uebereinstimmung Beyder aufzufassen.

§. 534. Die Bedeutung des Rumpfs wird uns in der Entwicklung des Embryo klar. Dieser besteht ursprünglich bloß aus Gehirn und Rückenmark; als der Quintessenz des Thiers, in welcher innres Leben und selbstständiges, um seiner selbst willen bestehendes Daseyn sich verwirklicht. Diese wesentlichen Organe sprechen hier ihren Charakter auch dadurch aus, daß sie nicht mit dem Aeussern zusammenhängen, sondern in sich abgeschlossen sind und frey in der Flüssigkeit schweben. Aber die notwendige Bedingung ihres Daseyns ist ein Aeusseres, Umgebendes, Bildendes: die Fruchthüllen. Diese drücken die Beziehung zur Aussenwelt aus, indem sie gegen das Aeusserre begränzen, und aus dem Aeussern Stoff bilden. In sich selbst keinen Endzweck findend, sondern bloß als die Mittel des innerlichen Lebens dienend, werden sie mit der fortschreitenden Entwicklung des Embryo allmählig dem Gehirn und Rückenmarke mehr unterworfen, und von demselben angezogen. Die Rumpfgane erscheinen theils als Entwicklungen aus den Fruchthüllen und ihren Gefäßen, aus ihnen hervorsprossend; theils als Umwandlungen der wesentlichen Theile derselben. Die so entstandenen Organe rücken theils dem Gehirn und Rückenmarke näher, und lagern sich an dasselbe, theils schliessen sie es immer mehr gegen das Aeusserre ab, und schaffen eine bestimmtere Begränzung, geben also eine Individualität, welche innre Lebendigkeit und äusseres Daseyn vereinigt; sie übernehmen die Function der Fruchthüllen, indem sie das Blut zur Ernährung und Erregung des Gehirns schaffen. So trägt nun der Mensch während seines ganzen Lebens in der Rumpfhöhle sein Ey mit sich herum. Die hier befindlichen Organe geben sein excentrisches, pflanzliches Leben: die Verdauungs- und Athmungsorgane sind die Wurzeln, die in den Planeten sich senken, und die Blätter, die in den Lufkreis sich ausstrecken, um Stoff für das äussere Bestehen aufzusaugen und die vernichte Materie wieder nach aussen abzusetzen; Herz und Gefäßsystem sind der Stamm leiblicher Erregung und Bildung, aus dessen Endzweigen die drüsenartigen Eingeweide sich entwickeln. Wie nun überall das Höhere, um in der Erscheinung hervortreten zu können, einer niedern Grundlage bedarf, so bedarf auch das centrale Leben des Gehirns fortdauernd der leiblichen Stützung durch den Rumpf, namentlich durch das in diesem gebildete Blut: der Kopf erscheint aufgeproßt auf den Rumpf, und durch ihn bedingt. Jedes Gehirn muß seinen Rumpf haben, um leben zu können (§. 425. fg.), während ein Rumpf ohne Gehirn (§. 250.), so wie die Fruchthülle ohne eine Frucht, als taube Hulse erscheinen kann.

§. 535. Wie die Fruchthülle und der ihr analoge Rumpf das Gehirn ernährt, erregt und begründet, so wirkt auch der Leib auf die Seele. Indem er das Gehirn ernährt, macht er die Seele, welche in ihrer Allgemeinheit allem Leben zum Grunde liegt, zu einem Concreten: er bringt sie, die zuvor als Abstraktes in den Erscheinungen eingeschlossen war, nun selbst zur Erscheinung, giebt ihr Persönlichkeit und Individualität. Er erregt sie ferner, indem er theils durch seine Lebendigkeit auf das gesammte Hirn einwirkt, theils seine besondern Zustände der Seele fühlbar macht, und bestimmte Vorstellungen weckt, an welche andre, verwandte und doch zu einer höhern Ordnung

gehörige sich anschließen, so, daß die psychische Gesamtkraft dadurch entwickelt und gesteigert wird (§. 413. 421.); das leibliche Leben ist die Elementarschule der Seele, diese würde unentwickelt bleiben, wenn nicht der Leib den Trieb nach Nahrung, nach Wärme, nach Begattung in ihr weckte. Der Leib dient endlich als hemmendes Gegengewicht, als Regulator (§. 414.), damit die Seele nicht in einem Endlosen sich verliere, sondern in begrenzter Wirksamkeit alle ihre individuellen Kräfte entfalte (§. 607.).

§. 536. Der Einfluß des Rumpfs auf das Hirnleben wird vornehmlich durch das Blut vermittelt, welches theils chemisch, leiblich, als Stoff der Bildung, theils mechanisch durch Bewegung und Erschütterung, theils dynamisch als lebendiger Impuls einwirkt. Denn es ist der flüssige Leib, welcher die Allgemeinheit der thierischen Substanz in sich trägt, und seine Bewegung ist strömendes organisches Leben, welches in ununterbrochenem Fluße alle einzelnen Gehäute verknüpft, bewegt und belebt. Das Gehirn entwickelt sich durch Anziehung von Blut (§. 265.) und in gleichen Verhältnisse mit derselben (§. 392.), wird durch dasselbe bewegt (§. 267. 270. 271.) und zieht es stärker an, bey gesteigerter Thätigkeit seines pflanzlichen (§. 305.) und psychischen Lebens (§. 214. 385.); die Seelen-thätigkeit wird durch die Quantität (§. 397. 406.) und Qualität des Bluts (§. 398. 1g.) bestimmt. Als das herrschende Organ empfängt aber das Gehirn ein lebendigeres Blut (§. 225.) und lebendigere Arterien (§. 225. 385.), und seine Gefäße sind so organisirt, daß es seine Selbstständigkeit gegen die Gewalt des Bluts im Normalzustande behaupten kann (§. 226—229. 406.). — Weniger in die Augen springend, ist der Einfluß des Rumpfs mittels der Nerven, welche vorzüglich die spezifische Beziehung einzelner Organe verwirklichen, während das Blut mehr den Zustand des gesammten plastischen Lebens auf das Gehirn überträgt.

§. 537. Im organischen Kreise wird jedes bedingte Glied wieder Bedingung für die Wirksamkeit der übrigen: und so übt denn auch das Gehirn einen Einfluß auf den Leib aus, welcher aber auf den verschiedenen Stufen des Lebens von verschiedner Stärke ist. Das mannichfaltige Leben im Rumpfe ist um so freyer und selbstständiger, jedes Organ von dem Zustande des andern um so unabhängiger, und daher das Leben überhaupt um so züher, um so mehr den Angriffen auf seine Einzelheiten trotzend, je niedriger die Stufe der Organisation im Ganzen, ferner je schwächer die Sensibilität, und endlich je ohnmächtiger der Centralpuncte, im Nervensysteme, das Gehirn, kurz, je beschränkter noch die Herrschaft der Einheit im Leben ist. Bey den niedern Wirbelthieren stellt das Gehirn gewissermaßen noch ein abgesondertes Organ dar, welches seine eigenthümlichen Vorrichtungen hat und in einer gewissen Abgeschlossenheit vom übrigen Organismus lebt; bey den höhern Thieren hingegen ist bey mehr entwickeltem Gehirne der Consensus größer, namentlich der Rumpf vom Zustande des Gehirns mehr abhängig: das ganze Leben ist in Hirnthätigkeit aufgenommen und durch sie bedingt. Dies Verhältniß wird näher bestimmt durch die Stufe der Sensibilität: wenn bey einer im Ganzen genommen höhern Organisation, die Lebendigkeit mehr in andern Richtungen, als in der sensibeln Sphäre sich äussert, so ist auch das Rumpfleben vom Gehirne weniger abhängig, als bey einer verhältnißmäßig niedrigeren Organisation. Was aber die Zeiträume des Lebens betrifft, so ist das Gehirn bey dem Embryo und bey dem neugebörnen Thiere von so be-

schränkter Wirksamkeit, wie Hoden und Fruchthälter vor dem Eintritte der Geschlechtsreife, und daher für das Gesammleben mehr gleichgültig: der Embryo und das neugeborene Thier oder Kind ist noch nicht hierfür, und erst im Fortschreiten des Lebens gewinnt allmählig das Gehirn sowohl die innere Kraft, als die ihm bestimmte Macht über das Leben der andern Organe. Daher sind Hirnkrankheiten um so weniger tödlich, je früher im Leben sie eintreten (§. 353.) — Bildlich ausgedrückt, können wir es mit Castet (*Jour. compl. L. p. 193*) so ansehen, als ob die Nervenmasse bey größter Selbstständigkeit der Einzelheiten mehr gleichförmig durch den Körper vertheilt, bey größerer Abhängigkeit vom Gehirne hingegen mehr in diesem concentrirt sey. Oder wir können uns den Organismus als eine Ellipse denken, und das Gehirn als den zwischen ihren beyden realen Brennpuncten liegenden gemeinschaftlichen idealen Brennpunct: Je mehr die Ellipse dem Kreise sich nähert, um so stärker ist die gemeinsame Centricität, je mehr sie von dieser Form abweicht, um so freyer sind die realen Brennpuncte, um so grösser ist die Selbstständigkeit der Einzelheiten, und um so geringer die Einheit des Ganzen.

§. 358. Nach diesen Ansichten haben wir also die einzelnen Thatssachen in Betreff der Abhängigkeit des Rumpfes vom Gehirne (§. 353.) zu beurtheilen. Hirnwunden haben leichter einen tödlichen Ausgang oder töden schneller bey Menschen, als bey Thieren; mehr bey höhern Thieren, als bey niedern; mehr bey sensibeln, als bey tritublern Individuen; mehr im Zeitraume psychischer Entwicklung, als vor demselben. — Nach Arneemanns (*S. 170*.): Beobachtungen vertrugen Hühner den Verlust von $\frac{1}{4}$ ihres Gehirns (10 bis 12 Gran); Hunde nur den von $\frac{1}{4}$ (50 bis 70 Gran); Kaninchen nicht einmal den von $\frac{1}{4}$ (8 Gran); die Tödllichkeit der Hirnwunden entsprach also dem Grade der Sensibilität. — Die Enthauptung vernichtet bey niedern, bey wenig sensibeln und bey neugeborenen Thieren das Leben des Rumpfes nur langsam, beynahe nicht schneller, als die Hinwegnahme einer gleich großen Masse irgend welcher organischen Substanz. Die sensible Centralmasse bey Fischen und Amphibien verhält sich zu der bey Vögeln und Säugethieren, wie der Verdauungsganglienring (§. 27.) zum Schlundganglienringe (§. 56) bey den Wirbellosen, das heisst sie erstreckt sich bey Erstern gleichförmig in der Länge des ganzen Körpers; das Gehirn hat noch nicht seine volle Bedeutung als eigentlicher Brennpunct gewonnen, sondern ist nur eine mäßige Verstärkung der beynahe eben so mächtigen Rückenmarks, und das Leben kann nach der Enthauptung geraume Zeit fortauern, wenn seine Basis, der Rumpf mit seinen Eingeweiden unverletzt bleibt. Hüller (*elem. IV. p. 352, sq.*) führt eine ganze Reihe von Beobachtungen dieser Art an, die an Amphibien angestellt wurden; am bekanntesten ist die von Redi, wo eine Schildkröte, welcher das ganze (?) Gehirn ausgeschnitten worden war, noch ein helbes Jahr lebte und hin und wieder kroch, und die von Kaul, wo eine Viper, nachdem ihr der Kopf abgeschnitten, auch die Eingeweide ausgenommen worden waren, in ihren gewöhnlichen Schlafwinkel entflo. Es scheint, daß bey diesen Thieren, auch während des normalen Lebens, die Ortsbewegung weniger im Bewußtseyn, als vielmehr in einer organischen Reaction des Rückenmarks begründet ist, oder daß die dunkeln Willensvorstellungen mehr im Rückenmarke, als im Gehirne erzeugt werden. Anders ist es bey den Vögeln;

war laufen, springen und saltiren sie noch, nachdem ihnen der Kopf abgeschnitten worden ist, aber diese Bewegungen haben weder einen äussern Anlaß, noch eine bestimmte zweckmäßige Richtung. Mir scheint bloß der im Rückenmark noch übrige Eindruck der Hirnthätigkeit in Pausen nachzuwirken, ohne daß Vorstellung und Wille dabey fortduern. Diese Fortdauer der vom Gehirn begonnener Thätigkeit des Rückenmarks kann sich bey dem Menschen nur so zeigen, daß er, wenn er unterbrocht und geleitet wird, die vor der Enthauptung begonnenen, willkürlichen Bewegungen nach der selben einige Secunden fortsetzt, wenn anders die hierher gehörigen Erzählungen Glauben verdienen. — Bey der hemicephalen Misbildung lebt der Rumpf während des Embryonalalters um so üppiger und wird um so feister, je mehr die bildende Kraft sich auf ihn beschlägt, aber bald nach der Geburt stirbt er nothwendig, auch wenn er athmen und verdauen kann, weil er in den Zeitraum einrückt, wo das Hirnleben erwachen sollte, um den Begriff der Gattung zu verwirklichen; denn wie das Einzelne im Begriffe des Ganzen wurzelt, so muß das Individuum untergehn, wenn es schlechthin unvernünftig ist, den wesentlichen Charakter seiner Gattung zu behaupten.

§3g. Das Gehirn wirkt sowohl pflanzlich, als psychisch auf das Rumpfleben ein. Durch bewußtlose Thätigkeit und unabhängig vom Willen bestimmt es die eigentliche Bildung (Mischungsveränderung, Absonderung, Ernährung), so wie die mit ihr verbundenen, so bedingenden dynamischen (Reizempfänglichkeit, Wärmezeugung) und mechanischen (Bewegungen) Lebenserscheinungen. Es wirkt als Glied des gesammten Lebens in Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen und Thätigkeiten der Rumpforgane, selbst noch, wenn der mechanische Zusammenhang mit denselben aufgehoben ist (S. 294.). Dieser Einfluß ist vornehmlich dynamisch und durch die Nerven vermittelt. Auf solche Weise wirkt das Gehirn zuvörderst specifisch auf einzelne ihm vorzüglich verwandte Organe; je unmittelbarer diese durch Nerven mit ihm verbunden sind, und je grösser die Fläche desselben ist, von welchem jene Nerven ausgehn, um so mächtiger ist der Einfluß des Gehirns. Der Rumpf zehrt hier gleichsam am Gehirn, oder consumirt bey seiner Thätigkeit Hirnkraft. Ferner wirkt das Gehirn allgemein und als ein Moment der gesammten Lebensthätigkeiten, oder als eine bestimmte lebendige Grösse, welche das Gemeinleben verstärkt und die übrigen lebendigen Potenzen zur Thätigkeit erregt. Ausserdem hat sein allgemeiner Einfluß aber noch einen eigenthümlichen Charakter, nämlich die Tendenz, die Einheit im plastischen Leben zu verwirklichen. Dies gelte daraus hervor, daß die Symptome seiner Krankheiten vorzüglich durch den Charakter des Widerspruchs und der Regellosigkeit sich bezeichnen: im typhösen und encephalischen Zustande ist der Gang der Krankheit statisch; Besserung und Verschlimmerung treten ein, und wechseln ab, ohne daß man in der Folgereihe der Erscheinungen einen Grund dazu entdecken kann; die Temperatur ist in den verschiedenen Gegenden des Körpers ungleich, und das Gefühl von Hitze und Fröst steht im Widerspruche mit dem thermometrischen Zustande; Verstopfung und Durchfall, langsamer und schneller Puls wechseln mit einander ab u. s. w. Endlich muß das Gehirn auch einigermaßen auf die Plasticität unmittelbar einwirken: durch die eigenthümliche Qualität seiner Selbstbildung müssen nämlich dem Blute bestimmte Stoffe entzogen und gegeben, also Mischungsveränderun-

gen in demselben hervorgebracht werden, die, nicht ohne Einfluß auf den Bildungsgang im übrigen Leibe bleiben können. Manche Veränderungen in den Absonderungen (§. 328.) scheinen auf ein solches Verhältniß hin zu deuten, und vielleicht hat es eben darauf Bezug, wenn man das Blut in den Blutleitern geringbares gefunden hat, als in den Arterien (§. 357.). — Wie das Gehirn am stärksten auf das Empirische wirkt, so bestimmt es im Gefäßsysteme, vorzüglich die Haargefäße (§. 300, 303.), und wird dadurch das sensible Moment der Wärmeerzeugung (§. 23, 307.); während die Lungen das plastische und die Muskelfasern das irritable Moment dazu darstellen. Wenn es die Wirkungen seiner Abnormität auf ein einzelnes Glied wendet, so kann es auch die Arterien desselben mit den Muskeln oder auch ohne dieselben lähmen (§. 304.). Wie aber der Pulschlag überhaupt, theils den Charakter der vorhandenen Abnormität ausdrückt, theils bey Entzündungen auf eine dem Wesen des leidenden Gebildes entsprechende Weise sich artet, so treten auch bey den verschiedenen Krankheiten des Hirns oder seiner Häute eigne Modificationen des Pulses ein (§. 303.).

§. 540. Die Seele übernimmt ferner die Vormundschaft des Leibes. Seine Bedürfnisse werden ihr fühlbar, und für sie selbst thätig, und sein Streben sich zu erhalten, gestaltet sich in allen seinen Verzweigungen zu entsprechenden Trieben, welche nun anrichten, was sonst bloß durch pflanzliche Thätigkeit erlangt wird (§. 421.). Die Willkühr steht hier im Dienste des Leibes, und die Seele wirkt, wie irgend eine andre Function, mit für die organischen Zwecke, oder wird ein Mittel des Lebens. So ist sie denn auch verschiedentlich geartet, wie die besondre Richtung des leiblichen Lebens es heischt (§. 413.), und steht mit den plastischen Functionen in näherem Verkehr.

§. 541. Der Hals bezeichnet die Scheidung, und den Gegensatz von Rumpf und Kopf. Er fehlt bey den Fischen, da ihr Gehirn bloß als vordres Ende des Rückenmarks erscheint, und zu wenig entwickelt ist, um sein eigenthümliches Gebiet gegen den Rumpf schärfer begrenzen zu können. Wo der Hals in den höhern Thierclassen eine größere Länge gewinnt, erhält er auch die Bedeutung eines Gliedmaßes, und dient der willkührlichen Bewegung, namentlich beym Aufheben des Futters, während er das Gehirn dem Rumpfe zu weit entrückt, als daß es von diesem aus durch das Blut stärker erregt werden könnte. Bey dem menschlichen Embryo ist der Kopf anfänglich vom Rumpfe gar nicht geschieden, und erst allmählig schnürt er sich von demselben ab. Bey den Hemicephalen sitzt der Kopf durchgängig dicht auf dem Rumpfe, indem er entweder von diesem gar nicht getrennt ist und mit ihm seine fortlaufende Fläche bildet, oder nur einen kurzen Hals hat, so daß das Kinn dicht auf der Brust ruht. Die unmittelbare Ursache dieser Kürze des Halses liegt in der unvollkommenen Entwicklung des obersten Theils des Rückenmarks und der obersten Halswirbel, indem diese entweder zusammengedrückt (Nr. 639.) oder verwachsen sind, oder fehlen. Namentlich zeigt sich eine nähere Beziehung der drey obersten Halswirbel und des in ihnen enthaltenen Rückenmarks zu dem Schädel, und dem Gehirne; denn wo der obre Theil des Rückenmarks fehlt, ist es am häufigsten in diesen drey Wirbeln, und wo Halswirbel fehlen, sind es meist drey (Nr. 606, 610, 611, 624, 635.). — Bey Menschen mit zu kurzem Halse hat das Herz einen zu mächtigen Einfluß auf das Gehirn, welcher in Leidenschaftlichkeit und in Neigung zur

Apoplexie sich ausspricht; bey längerem Halse ist die Stimmung mehr kühl und gelassen, so daß sich Erhabenheit der Gesinnung und Freyheit des Willens eher entwickeln kann, während bey zu großer Entfernung des Kopfs vom Rumpfe der Geist in Regsamkeit und Kraft verliert (3. 4. 7.).

§. 542. Was das Verhältniß zwischen dem Herzen und dem Gehirne betrifft, so erkennen wir diese Organe als die beyden Brennpuncte des thierischen Lebens an, welche die übrigen Organe beherrschen, mit denen sie durch strahlige Leiter verbunden sind; und als den Kern der Organisation, welches in der Geschichte des Lebens zuerst auftritt, indem der Embryo in einem Zeitpuncte bloß aus Herz und Gehirn mit Rückenmark besteht. Diese beyden Organe müssen den obersten und allgemeinsten Gegensatz der im thierischen Leben enthalten ist; bezeichnen dies: aber kein andrer, als der von Leib und Seele. Nun sind Herz und Gehirn doch selbst zum Leibe gehörig; wenn also dieser durch sie den allgemeinen Gegensatz verwirklicht; so wird auch die Seele Kräfte in sich schließen, welche in ihrer Sphäre denselben Gegensatz darstellen, und welche mit den ihnen entsprechenden Gliedern des Leibes in näherer Verwandtschaft stehen. Diesen psychischen Gegensatz können wir nur in der Erkenntniß finden; da diese den Kern und den Mittelpunct aller Seelenbätigkeit ausmacht. Hier aber stellen sich uns zwey Glieder dar, Intelligenz und Gefühl, welche wir mit den beyden Brennpuncten des thierischen Leibes, Gehirn und Herz, zu vergleichen haben.

§. 543. Das Herz ist dem leiblichen Bestehen zugewendet; und der Centralpunct für den Organismus als ein Raum Erfüllendes; das Gehirn ist für das innerliche Seyn, für den Organismus als Einiges, Untheilbares, in sich und bloß in der Zeit Wirkendes. Jenes steht auf dem Gipfel räumlichen Lebens und Wirkens; und theilt unter Zuführung von Stoffen den Gebilden äusserer Leben, d. i. Bewegung mit; dieses, die Fesseln des Raumes lösend, bestimmt bloß das innerliche Kraftverhältniß und die dynamische Spannung der Organe. — Betrachten wir den Gegensatz von Intelligenz und Gefühl, so finden wir, daß dieses dem leiblichen Leben, oder dem Pflanzlichen unseres Wesens näher verwandt ist und in inniger Beziehung zu ihm steht, als jene. Der Geist auf seiner untersten Stufe, oder das äussere Wahrnehmungsvermögen steht mit den Sinnesorganen in Beziehung, und ist durch sie bedingt; aber diese sind bloß Durchgangspuncte der Aussenwelt zur Innenwelt; nicht die Organe, sondern die ihrer Leiblichkeit entkleideten; der Vergeistigung näher gebrachten Aussendungen werden vom Sinne aufgefaßt. Die niedrigste Stufe des Gemüths hingegen; welche in allmählicher Steigerung und in unmerklichen Uebergängen zu den höhern Wirksamkeiten fortschreitet, ist das Gemüthsgefühl, und dieses faßt den eignen Leib und seine Zustände selbst auf; es wird von diesem seinem materiellen Objecte unmittelbar berührt, und ist mit ihm in näherem Verkehr. Die Reaction im Geiste ist nur eine innerliche; ein Fassen der Vorstellung; die dem Gefühle entsprechende Reaction hingegen wendet sich gegen den Leib, indem die Begehrung sich des Muskels bemächtigt und ihn als ihr Organ gebraucht. Gegen die Klarheit der geistigen Anschauung verhält sich das dunkle Gefühl, wie das Leben des Leibes, welches die Nachseite des Menschen darstellt, gegen den Wandel der Seele im Lichte des Bewusstseyns. Wie der Leib der gegebenen Nothwendigkeit gehorcht, die Seele aber dieselbe in sich findet,

so ist die geistige Erkenntniß freythätig und schöpferisch, die Gefühlskenntniß hingegen gegeben, aufgedrungen und abhängig; und wie der Leib im Dienste der Seele der blinden Nothwendigkeit entzückt wird, so wird die dem Gefühle entsprechende Begierde erst durch die geistige Erkenntniß zum freyen Willen. Das Gefühl wird auf der höhern Stufe seiner Entwicklung von dem Göttlichen erfüllt und bewegt, aber nicht anders, wie der Leib, dessen wachsthümliches Leben ebenfalls nicht aus dem Bewußtseyn und der Freyheit des Individuums, sondern aus der allgemeinen Weltkraft stammt; in der Intelligenz aber ist ein göttliches Streben des Individuums selbst wirksam: zu den Ursachen, wie zu dem Ur- oder Ursachen anstehend, fixirt sie das Unendliche, als ihr Object. (S. 544.) In jedem der beyden Centralorgane stellt sich die zweifache Richtung des Lebens, die sammelnde und die zertheilende dar; aber das Herz zeigt überwiegende Anstrahlung und sammelt das Blut bloß, um es nach allen Richtungen hin auszusenden; im Gehirn hingegen ist das Sammeln allen Strahlen in einen Lichtpunkt das Wesentliche, und das Wirken nach aussen ist hier vornehmlich schwacher Widerschein des innerlichen Lebens. Das Hervortreten der Kraft im Aeußern, in Mannichfaltigkeit und in Gegensätzen, bezeichnet schlechthin genommen, alles Endliche, und, vergleichungsweise betrachtet, das Leibliche des Lebens; das Wirken der Kraft in sich und in Einem, ist an sich der Charakter des Ideellen, des Unendlichen, und, beziehungsweise genommen, der Psychische im Leben. Im Buse des Gehirns erkennen wir den Ausdruck vorwaltender Einheits; zwar arten sich seine Stammpfaserungen überall anders, und treten in eigenthümlichen Gestaltungen hervor, aber durch alle verschiedenen Sphären schreiten sie in Stetigkeit fort; was noch geschieden ist, wird durch Belegungsfasern verknüpft, und Alles schließt sich zu einem einigen Ganzen ab. Dem entsprechend strebt der Geist nach innerlicher Einheits auf dem Principe der Quantität ruhend, führt er, wenn auch auf verschiedenen Stufen und in verschiedenen Kreisen wirkend, die Mannichfaltigkeit der Erscheinungen auf Begriffe, Urtheile und Ideen zurück. Dagegen besteht das Wesen des Herzens im Gegensatze von Diastole und Systole, von Venensack und Arterienkammer, von rechter und linker Hälfte. In Uebereinstimmung mit ihm strebt das Gefühl, der Qualität angewendet nach Wechsel und Mannichfaltigkeit, es lebt einzig in dem Gegensatze von Lust und Unlust, von Sinnlichkeit und Idealität; jeder dieser Zustände ist durch seinen Gegensatz bedingt, und kann nicht hervortreten ohne dessen Voraussetzung. Wie der Leib als die äussere Erscheinung des Lebens das stets Wechselnde, immer Untergehende und immer neu sich Gestaltende ist, während die Seele als das sich selbst Gleiche verharrt, so besteht das Leben des Herzens in stetem Wechsel, in Bewegung, und bloß in Bewegung, während das Hirn bey seinen Functionen in völliger Ruhe verharrt, bloß vom Herzen aus erschüttert, und eben so ist im Gefühle ein stetes Wogen und Schwanken, indeß der Geist mit ununterbrochener Stetigkeit wüthet, und auf gerader Bahn ruhig und gemessen seinem Ziele entgegen schreitet. — Die barometrische Messung findet das Gehirn um einige Grade kühler, als das Herz (S. 233); so ist die Geistesthätigkeit, weil sie in Einheit besteht und in gerader Richtung sich bewegt, in sich unverrückt, während sie die Objecte beherrscht; das Gemüth hingegen wird, bey seiner Thätigkeit verhältnismäßig mehr afficirt und durch

die Reibung der in ihm enthaltenen Gegensätze in einen Zustand innerlicher Aufregung versetzt, welcher nun die Betrachtungsweise der Dinge bestimmt, und dieser Zustand hat nicht allein Aehnlichkeit mit körperlicher Erhitzung, sondern bewirkt sie auch, und wird wiederum durch sie begünstigt, während die Kühle dem Geiste entspricht.

§. 545. Das Leibliche, Pflanzliche ist das allgemeine Leben; die Seele, wiewohl das Höchste und Wesentlichste, tritt in der Erscheinung nur als eine einzelne Aeusserungsweise des Lebens hervor, als eine besondre Function, welche dem einen Organismus fehlt, dem Andern zukommt. So zeigt sich auch in der Wirkbarkeit, und in dem Punkte, von welchem der Leib und die Seele ausgeht, der Gegensatz von Allgemeinheit und Besonderheit: im Kreise des leiblichen Lebens tritt die Uridee aus der Universalität in die Beschränktheit, und die allgemeine Weltkraft ist es, was in dem Leibe lebt und wirkt; in der Seele hingegen zeigt sich allein wahre Individualität, aber eine solche, die das Ganze in sich aufnehmen will, und die Idee tritt aus den leiblichen Schranken wieder hervor, zur Universalität aufstrebend. — Das Herz zeigt nun in seiner Wirkungsart den Charakter der Gesamtheit und Allgemeinheit, denn es giebt das Blut, als das Gesamtzerzeugniß sämtlicher einzelner Bildungshergänge, namentlich der Verdauung und des Athmens; es wirkt ferner auf alle Organe, und zwar auf eine umfassende Weise, Stoff gebend, bewegend und lebendig erregend; es wirkt endlich nicht auf einzelne Punkte des Gehirns, sondern bestimmt dasselbe in seiner Gesamtheit und als Ganzes. Das Gehirn aber hat nur auf einzelne Organe Einfluß, und zwar nur einen dynamischen. — Auf eine entsprechende Weise stellt sich nun auch das Verhältniß zwischen Gefühl und Geist. Nur in wenigen, einzelnen Stellen verklärt sich der Leib zu Sinnesorganen, und thun sich die Pforten der Wahrnehmung auf. Das Gemeingefühl hingegen durchdringt die ganze lebendige Masse, ist daher schon rege, wo noch keine Sinnesorgane vorhanden oder wirksam sind, und giebt somit das erste Erwachen der Seele, die erste Wiedergeburt derselben aus dem leiblichen Leben, in welches sie versenkt war. — Die Intelligenz ist die objective Thätigkeit der Seele, welche in der Vorstellung ein scharf gezeichnetes, bestimmt begränztes Bild des Gegenständlichen erschafft, so der Welt sich bemisst, und, wenn auch zur Universalität aufstrebend, doch immer von Individualität ausgeht und begränzend wirkt. Das Gefühl hingegen beruht sich bloß auf einem allgemeinen Zustand: der Qualität entsprechend, giebt es keine bestimmten Gestaltungen, sondern nur ein Colorit, keine eigenthümlichen Laute, sondern nur einen allgemeinen Ton. Die geistige Thätigkeit beruht auf partieller Erregung der Seele und ist ein Eindringen in bestimmte Punkte der Objecte; das Gefühl gründet sich auf eine Flächenwirkung und ist ein Durchdrungenwerden der Seele, wobei dieselbe in der Gesamtheit ihrer Kräfte ergriffen ist.

§. 546. So gewinnen wir nun eine befriedigende Ansicht von den Verhältnissen zwischen Herz und Gehirn. Das Denken geht auf innerliche Gestaltung und Einheit aus; hey ihm concentrirt sich die Seele in sich, und ihre Wirkbarkeit verharrt in ihrem Organe, dem Gehirne. Im Gefühle herrscht Qualität, Mannichfältigkeit, Allgemeinheit, Verwandtschaft zum pflanzlichen Leben: in ihm verbreitet sich die Seele vom Gehirne aus (§. 433.) über den Leib und ergreift das Centralorgan desselben, das Herz. Darum wirkt

dem das Gefühl auf den Herzschlag (§. 432.) und darum wird es durch die Beschaffenheit von diesem verschiedentlich gestimmt (§. 408.); darum wirkt eine solche materielle Affection des Gehirns, welche dasselbe in seiner Gesamtheit ergreift, seine Substanz durchdringt und seinen Bau erschüttert, welche also das materielle Abbild der Gemüthsbewegung ist, unmittelbar auf den Herzschlag (§. 301.). Da aber die Seele überhaupt eine Entwicklung des allgemeinen Lebens ist, so muß ihr Organ, das Gehirn, von dem Brennpunkte des leiblichen Lebens, dem Herzen, Stoff der Bildung und Impuls zur Thätigkeit (§. 266—271. 391—407.) erhalten, und so von ihm abhängig seyn. Da nun auf einer höhern Stufe des organischen Daseyns die Gegensätze in größerer Schärfe und Bestimmtheit einander gegenüber stehn, und dabey durch Vermittlungsglieder inniger unter einander verknüpft sind, so muß bey dem vollkommenen Thierleben jeder der zwey Brennpunkte seine eigenthümliche Wesenheit bestimmter aussprechen, das Herz also stärker auf das Gehirn (§. 402.) und das Gefühl stärker auf das Herz wirken.

§. 547. Wie das Herz das allgemeine Blutorgan ist, so gesellen sich ihm, als die wichtigsten Organe der Blutbildung, Magen und Lungen bey, und bilden mit ihm ein Ganzes, welches als das Herrschende im Rumpfe sich äußert und durch den herum-schweifenden Nerven mit dem Gehirn in unmittelbarer Verbindung steht, so daß diese drey Gebilde gewissermaassen als in den Rumpf versenkte Kopforgane betrachtet werden können, wie sie denn wirklich auch bey niedern Thieren zum Theil in unmittelbarer Nähe des Kopfs liegen. Wie wir nun im Herzen eine spezifische Beziehung zur Seele erkannt haben, so wird eine solche auch in Lungen und Magen zu finden seyn, und zwar eine polarische, da diese Organe selbst einen Gegensatz unter einander bilden. Lungen und Magen verhalten sich aber zum Herzen wie Peripherie zum Centrum, indem sie das Blut durch einen Verkehr mit der Aussenwelt bilden, während das Herz bloß mit dem eignen Organismus in Gemeinschaft steht, gebildetes und auszubildendes Blut empfangend und an die Organe versendend. Da nun das Herz, als Centrales, mit dem Centralen der Seele (§. 546.), namentlich mit dem Gefühle näher verknüpft ist, so werden jene peripherischen Organe auch in einer spezifischen Beziehung zu den peripherischen Seiten der Seelenthätigkeit, zu Sinn und Willen, stehn. Eine vergleichende Gegenüberstellung beyder Organe und ihrer Functionen wird uns zu Erkenntniß ihrer psychischen Bedeutung fähren.

§. 548. Im Verdauungssysteme finden wir bestimmte Verschiedenheiten der Formen und eine scharfe Scheidung der organischen Factoren: das obre polare Ende ist bloß ingestiv, zeigt vorwaltende Sensibilität, und steht unter alleiniger und unmittelbarer Herrschaft des Gehirns; das untre Ende ist rein egestiv, zeigt vorherrschende Irritabilität und wird zunächst vom Rückenmarke beherrscht; mitten inne liegen als Indifferenzpunkt die eigentlichen Organe der Verdauung, welche, durch einen vielfachern Apparat vermittelt, unter dem vereinten Einflusse des Rumpfnervens, des Rückenmarks und des Gehirns vor sich geht, während Ingestion und Egestion pассивen. In den Athmungsorganen stellt sich mehr eine allgemeine Bildung und eine Verschmelzung der Elemente des Lebens dar: dieselben Organe dienen der Ingestion, wie der Egestion; beyderley Bewegungen werden durch eine eigene Verknüpfung von Thierischem und Pflanzlichem, von Will-

küher und organischer Nothwendigkeit bestimmt, und mit ihnen gleichzeitig erfolgt der mitten inne liegende Bildungsproceß, da er ein einfacherer chemischer Act und eine Blatfunction ist, welche nur vollendet, was durch die Wurzelfunction der Verdauungsorgane gebildet und durch die Stammfunction des Herzens überbracht worden ist. Die Verdauung ist eine specifische, lebendige Bildung; das Athmen eine universelle, ein Wechsel der Stoffe, wie er uns überall begegnet. Nun ist der Geist als die besondere, das Gemüth als die universelle Thätigkeit der Seele zu betrachten: folglich entspricht Jener der Verdauung, dieses dem Athmen. — Die Verdauung ist ein stetiges Fortschreiten der Bildung, gleich der geistigen Thätigkeit, und der Magen, der den zu assimilirenden Stoff aufnimmt, steht dem Sinne gegenüber. Beym Athmen wird die Luft eingezo-gen und ausgestoßen, und indem sie an der organischen Substanz sich bricht, giebt diese Function ein Bild von der Gemüthsseite, wo die Eindrücke an der Subjectivität sich brechen und der Wille als Reaction hervortritt.

§. 549. Bey der Verdauung geht der erste Reiz von der Peripherie aus: erst wenn der Magen leer ist, erwacht der Trieb nach Nahrung, und der abgeschnittne Kopf saugt nur, wenn ein Körper in seine Mundhöhle gebracht wird. Dagegen geht der Impuls zum Athmen vom Gehirne aus; ohne äussern Anlaß gehen die Athembewegungen noch am abgeschnittnen Kopfe in einem regelmäßigen Wechsel vor sich, wie sie auch schon hey dem von der atmosphärischen Luft ausgeschlossnen Embryo erfolgen. Da nun die Verdauung auf den Geist, das Athmen auf das Gemüth sich bezieht (§. 548.), so wird das nähere Verhältniß so zu fassen seyn, daß die Verdauung dem mit peripherischer Thätigkeit beginnenden Sinne, das Athmen aber dem von innen nach aussen wirkenden Willen ver-wandt ist.

§. 550. In der That sehen wir, daß das Athmen mehr durch einen pflanzlichen Trieb erfolgt, die Verdauung hingegen durch stauische Wahrnehmung bedingt wird. Denn die Aufnahme der Nahrung setzt Bewußtseyn voraus, und ist im Scheintode, im Koma, bey'm Schlagflusse, bey der Hirnerschütterung u. s. w. unmöglich, während das Athmen fortdauert. Sie ist ferner nicht so eng an die Zeit gebunden, und hat deshalb mehr den Charakter der Freyheit, als das Athmen, da der Rhythmus der Function um so bestimmter und unbedingter mit der Weltzeit zusammentrifft, je mehr das Pflanzliche oder die organische Nothwendigkeit herrscht. Ohne zu wissen, was es thut, athmet das Thier, und ohne daß ihm eine Wahl frey steht, muß es die ihm dargebotene, überall sich gleiche Luft einsaugen; dagegen bieten sich seinen Sinnen mancherley Nahrungsmittel dar, über welche es zu urtheilen und unter welchen es zu wählen hat, und wo sie sich nicht vorfinden, muß es mit seinen Sinnen ihnen nachspüren, und die zu ihrer Erlangung dienlichen Mittel sich vorstellen und beurtheilen: so trägt das Bedürfniß der Nahrung, nicht aber das der Luft, zur Uebung des Verstandes und zur Entwicklung der Geisteskraft bey (§. 413.). Endlich ist der den Verdauungsorganen beygegebene Geschmack, sinn einzig und innig mit dieser Function verbunden, während der Geruchssinn weniger die Athembarkheit, als vielmehr die zufälligen Beymischungen der Luft erkennt, die zum Theil auf andre Functionen sich beziehen.

§. 551. Die Thätigkeit des Magens bezieht sich bloß auf Ingestion, die der Lungen mehr auf Egestion, da die Ausstoßung von Wasserdunst und kohlensaurem Gas einen wesentlichen Theil derselben ausmacht, und die durch den herumschweifenden Nerven vermittelte Einwirkung des Gehirns auf die Lungen, in Zusammensziehung derselben und in Austreibung der Luft besteht (§. 288.). In der psychischen Sphäre entspricht aber der Ingestion die Sinnesthätigkeit, und der Egestion die Willensbestimmung.

§. 552. Der Magen ist mit dem zu ihm gehörigen Zwölffingerdarme das Centralorgan der Verdauung: hier werden die Stoffe der Aussenwelt aufgenommen, in ihre Bestandtheile zerlegt und dem Organismus in den ihm entsprechenden Formen angeeignet und einverleibt; aus den mannichfaltigen, nährenden Körpern wird eine gleichartige organische Flüssigkeit gebildet, welche den Stoff des ganzen Organismus und die Grundlage seines Bestehens ausmacht. So nimmt der Sinn die Eindrücke der Aussenwelt auf, entkleidet sie von ihrer Materialität, und bildet den Stoff, welcher, angeeignet, in das Wesen, gleichsam in die Substanz des Geistes übergeht, in ihm fortlebt, und durch weitere Thätigkeit mannichfaltig sich gestaltet. Wie der Sinn im psychischen Reiche, so wirkt der Magen im Materiellen auf Aneignung, Einheit, Individualität. In ihm ist der zehnte Hirnnerve, welcher hier seine letzten Verzweigungen ausbreitet, am meisten vorherrschend, denn wir sehen es z. B. an den Gliedmaßen; daß die Nerven, da sie überhaupt das Periphere in der Sensibilität darstellen, auch gerade in ihren äussersten Zweigen am lebendigsten sind, und die kräftigste Wechselwirkung zwischen der Seele und den Organen, so wie den sie berührenden Aussendungen vermitteln. So zeichnet sich überhaupt auch der Magen durch höhere Sensibilität vor andern plastischen Organen aus. Aber da unter den verschiedenen Richtungen der Seelenthätigkeit der Geist es gerade ist, welcher am meisten über die Materialität sich erhebt, so steht auch dieser im strengsten Gegensatz zu der durch Massenbildung wirkenden Verdauung, und wir erkennen das zwischen Beiden bestehende Verhältniß, als in Polarität gegründet, an.

§. 553. Das Athmen hat die meisten Berührungspuncte mit dem Willen, wie sich dies schon dadurch ausspricht, daß die Rückenmarksnerven verhältnißmäßig in ihm vorherrschend sind. Willkürliche Bewegung und Plasticität coincidiren im Athmen, und wie im gleichen Maße mit demselben die Entwicklung der Bewegungsorgane fortschreitet und die Muskelkraft zunimmt, so wächst auch in gleicher Proportion die Energie des Willens. In der Wechselwirkung mit dem Luftmeere tritt das Individuum in nähere Gemeinschaft mit dem Erdganzen; der Organismus empfängt hier die irdischen Elemente als solche in ihrer reinern Gestalt, noch nicht verkörpert, in ihrer Allgemeinheit und noch nicht in besondern Combinationen; und das mit diesen Geistern des Ganzen geschwängerte Blut bedingt die freye Entwicklung aller in der Natur des Gehirns liegenden Kräfte (§. 409—411.). Nun finden wir aber, daß die Freyheit des Willens gegeben wird durch den Gegensatz des Partiellen und Universalen, des zeitlichen Impulses und der ewigen Norm, des Ichs als einer Einzelheit und des Ichs als eines Lebens im Ganzen. Somit hängen denn Freyheit und Athmen innig zusammen, ja wir können das Athmen als den Ausdruck der Freyheit im Plastischen bezeichnen. Um das Wechselverhältniß zwischen dem Gehirne und den drey Hauptorganen des Kampfes näher zu he-

stimmen, betrachten wir noch, auf welche Weise (§. 554. 557.), von wo aus (§. 555. 558.) und wohin (§. 556. 559.) die Wirkung vor sich geht.

§. 554. Die Rumpfforgane wirken auf das Gehirn 1) am stärksten durch Bewegung; hier steht das Herz oben an, welches allein die Hirnbewegung unmittelbar hervorbringt (§. 267—270.); hierauf folgen die Lungen, welche diese Bewegung vermittelt des Herzschlags modificiren (§. 272—275.); noch schwächer und seltner vermag der Magen auf sie einzuwirken (§. 276.). 2) Die Qualität des Bluts, vermöge deren dieses die Hirnthätigkeit zu erregen und zu unterhalten im Stande ist, hängt unmittelbar ab von dem Athmen (§. 409.); demnachst von dem Herzschlage und der Beschaffenheit des Kreislaufs; auf entferntere Weise von der Verdauung. 3) Dynamisch, oder ohne Dazwischenkunft eines mechanischen oder chemischen Moments, und ausschließlich durch die Nerven wirkt der Magen auf das Gehirn (§. 276. 413—415.), weniger Lungen (§. 410.) und Herz.

§. 555. Unter den Rumpffunctionen wirkt 1) der Herzschlag am mächtigsten und allgemeinsten auf das Gehirn, vermittelt des Bluts. 2) Das Athmen wirkt nicht so unmittelbar ein, und nicht allein durch das Blut, sondern zum Theil auch specifisch—dynamisch durch den herumerschweifenden Nerven. 3) Die Verdauung hat den schwächsten Einfluß, der aber ausschließlich durch jenen Nerven zu Stande gebracht wird.

§. 556. Was die Richtung auf die Seelenthätigkeiten betrifft, so wird 1) das Gefühl am meisten bestimmt durch den Zustand des Herzens (§. 408.), weniger durch den der Lungen (§. 412.), und noch weniger durch den des Magens (§. 414. fg.). 2) Die Energie des Willens hat seine körperliche Stütze vornehmlich in der Beschaffenheit des Athmens (§. 412.), dann in der der Verdauung und des Herzschlags. 3) Dagegen steht die Sinnenthätigkeit und die Denkkraft am meisten unter dem Einflusse der Verdauung (§. 414—416.), weniger unter dem des Herzschlags, und noch weniger unter dem des Athmens.

§. 557. Das Gehirn vereint die Seelenthätigkeit, als die höchste Lebenserscheinung, mit pflanzlichem Leben, und sein Einfluß auf den übrigen Leib, oder auf das Räumliche im Leben, äußert sich 1) vornehmlich in räumlichen Veränderungen, d. i. in Bewegungen. Das pflanzliche Hirnleben muß demnach am unmittelbarsten diejenige plastische Function bestimmen, in welcher das Materielle durch den universellen Einfluß des Elementaren zu seiner größten Höhe gebracht, und gleichsam besetzt wird; in welcher ferner Pflanzliches und Thierisches am innigsten verschmolzen sind; und in welcher Plastizität und Bewegung am meisten zusammentreffen: dies ist aber das Athmen (§. 282—299.). Schwächer ist die Einwirkung auf die Bewegung des Herzens und des Magens. 2) Dynamisch wirkt das pflanzliche Hirnleben am stärksten auf den der Ingestion und der Bildung der stoffigen Basis gewidmeten Magen, dessen Sensibilität sie vorzüglich bestimmt (§. 311.). 3) Am schwächsten wirkt es durch Mischungsveränderung.

§. 558. Die Seele wirkt in verschiedenen Richtungen auf die Rumpfforgane. 1) Die Erregung des Gefühls im Affecte ergreift am stärksten das Herz; denn bey jeder auch der lebester und in keiner andern körperlichen Erscheinung offenbar werdenden Gemüthsbeziehung wird dessen Thätigkeit verändert (§. 431.); etwas weniger wirkt sie auf die

Lungen (§. 436.); noch beschränkter auf den Magen (§. 438.). 2) Der Wille bestimmt am entschiedensten die Lungen, wenn auch vorzüglich nur durch ihre äussern Umgebungen (§. 436.). Die Athembewegungen entsprechen dem Charakter des Gemüthszustandes und namentlich des Willenszustandes, von welchem sie ausgehen, und geben im Räumlichen kein treues Bild des Innerlichen, Psychischen: bey dem Schrecke erstarrt der Wille, jeder freyen Aeusserung unfähig und stockt; der Athem; bey der Furcht ist der Wille bewegt, ohne Haltung, und heben die Athmungsorgane; bey der Betrübniß ist das Gemüth in sich zurückgedrängt, nach aussen zu wirken unvernünftig, und tritt ein überwiegendes, convulsivisches Einathmen, als Weinen und Schluchzen ein; bey der Freude wiegt sich das Gefühl in mannichfaltigen Empfindungen, ergeht sich der Wille in leichten, wechselnden Bewegungen, und erfolgt ein Hüpfen der Lungen, als Lachen; im Zorne bricht die Thätigkeit des Willens energisch hervor, und zeigt sich ein überwiegendes, gewaltiges Ausathmen als Schnauben. Demnächst bestimmt der Wille die Verdauung, sowohl bey Aufnahme der Nahrung, als auch durch Zwerchfell und Bauchmuskeln. Auf das Herz aber kann er nur unmittelbar durch das Athmen wirken. 3) Angestrengte sinnliche Wahrnehmung, besonders aber das scharfe Nachdenken stört am meisten die Verdauung, so wie eine leichte Beschäftigung des Geistes dieselbe am meisten begünstigt (§. 437.). Der Ekel, bey welchem das pflanzliche Hirnleben, um der Ingestion dessen, was ihn erregt, zu weichen, sich in sich selbst zurück zieht, und dadurch die peripherischen Enden des zehnten Nerven in einen klümmungsartigen Zustand versetzt, welcher Erbrechen zur Folge hat, beruht zwar auf einem Gefühle, welches aber mit einer bestimmten Vorstellung wesentlich verbunden ist. Darum wird auch das der Seele Widerliche dem leiblich Ekelhaften gleich gesetzt, und wie nicht die Vorstellung eines zerstörenden Giftes oder einer mechanischen Gewalt, sondern die Vorstellung des Schmutzigen Uebelkeit erregt, so entsteht eine ähnliche Empfindung, nicht bey Betrachtung eines großen Verbrechens, sondern einer gemeinen Nichtswürdigkeit. Geringer ist der Einfluß der Geistesthätigkeit auf den Herzschlag (§. 431.) und auf das Athmen (§. 435.). Nur bey dem Gähnen zeigt sich ein näherer Zusammenhang, aber theils ist dies ein gewaltsames Einathmen durch den Mund mittels der Organe des Kausens und Schlingens, und also gewissermaßen als eine Darmathmung zu betrachten, theils scheint die Langeweile und geistige Leere, wodurch es herbeygeführt wird, mit einem Sinken des pflanzlichen Hirnlebens verbunden zu seyn und nur hierdurch auf das Athmen zu wirken.

§. 559. Am stärksten ist 1) der Einfluß des Hirnlebens auf das Athmen; indem es unmittelbar durch das X., und als Beyhilfe durch das V., VII., IX., XI., XII. Paar seiner Nerven, mittelbar durch fast alle Nerven des Rückenmarks die Bewegungen des Athmens in stetigem Rhythmus, und dadurch den chemischen Hergang desselben schlechthin bedingt. 2) Der Einfluß auf die Verdauung folgt zunächst, und wird dadurch vollbracht, daß das Gehirn unmittelbar durch das V., VII., IX., X., XII. Nervenpaar auf Ingestion, Reizempfänglichkeit, Verdauungsbewegung und Secretion, mittelbar durch die untersten Rückenmarksnerven auf die Egestion, entfernter und ungleich schwächer durch die Rumpfnerven auf Verdauungsbewegung und Secretion wirkt. Ein direct plastischer Einfluß tritt nur in einzelnen Erscheinungen hervor (§. 320.). 3) Der Blutlauf wird

durch das Gesammtleben des Gehirns modificirt, vornehmlich mittelbar durch den Rumpfnerven.

§. 560. Wir erkennen also, um nun das Ganze zusammenzufassen, daß dem leiblichen und dem psychischen Leben, wie im Ganzen, so auch in ihren einzelnen Richtungen ein gemeinsamer Begriff zum Grunde liegt, vermöge dessen bestimmte Seelenthätigkeiten und bestimmte plastische Functionen in näherer Beziehung und gegenseitigem Verkehre stehen, während sie alle mit einander im Allgemeinen verknüpft sind. Während also Herz, Lungen und Magen mit allen drey Abtheilungen des Nervensystems zusammenhängen, und durch ihre Functionen mit der Seelenthätigkeit überhaupt, so wie mit dem pflanzlichen Hirnleben in Verbindung stehen, unterscheiden sie sich von einander durch das Mehr oder Weniger dieser Beziehungen. Namentlich ist eine vorwaltende Beziehung des Herzschlages zum Rumpfnerven, zur Plasticität und zum Gefühle; des Athmens zum Rückenmarke, zu der Irritabilität und dem Willen; der Verdauung zum Gehirne, zu der Sensibilität und dem Geiste. Wir stellen die Ergebnisse unserer Untersuchung in folgendem Schema zusammen:

Einfluß der Seele				des Rumpfs		
durch	Gefühl	Wille	Gesamtheit	1. Herzs Schlag 2. Athmen 3. Verdauung	1. Athmen 2. Verdauung 3. Herzs Schlag	1. Verdauung 2. Herzs Schlag 3. Athmen
vermittelt	Rumpfnerven	Rückenmarksnerven	Hirnnerven	Bewegung	Mischung	Kraft
auf	1. Herzs Schlag 2. Athmen 3. Verdauung	1. Athmen 2. Verdauung 3. Herzs Schlag	1. Verdauung 2. Herzs Schlag 3. Athmen	Gefühl	Willen	Gelteskraft.

Einfluß des pflanzlichen Hirnlebens			des Rumpfs		
durch			1. Herzs Schlag 2. Athmen 3. Verdauung	1. Athmen 2. Verdauung 3. Herzs Schlag	1. Verdauung 2. Herzs Schlag 3. Athmen
vermittelt			Bewegung	Mischung	Kraft
auf		1. Athmen 2. Verdauung 3. Herzs Schlag	pflanzliches Hirnleben.		

§. 564. Bey Betrachtung dieses Schönes bieten sich folgende Bemerkungen dar.

1) Das pflanzliche Hirnleben wirkt auf die Rumpfforgane in demselben Maasstabe, wie der Wille, also verhält sich die psychische Reaction des Gehirns eben so wie die leibliche. 2) Dem Willen entspricht die Mischung, also wie dem Gefühle die Bewegung und dem Geiste die Kraft. 3) Wie die Kraft Receptivität und Spontaneität in sich schließt, so umfaßt der Geist Sinn und Intelligenz; aber im Geiste, so wie in der Kraft, ist die Einheit vorherrschend, und daher ist in den Verhältnissen des Sinnes und des Denkvermögens zu den Rumpfforganen kein Unterschied, während im Gemüthe der Gegensatz vorwaltet und deshalb Gefühl und Wille zu den Rumpfforganen verschieden sich verhalten, obschon auch hier eine allgemeine Uebereinstimmung und Verwandtschaft sich zeigt, wie denn auch Herzschlag und Athmen unter einander näher verbunden sind, als mit der Verdauung. 4) Der Geist entspricht der Verdauung, insofern er das eigentlich Bildende, und dabey die Radicalfunction der Seele ist, welche aber zunächst nur in die Endlichkeit eindringt und die Einzelheiten des Planetarischen in sich aufnimmt. Der Wille steht in Beziehung zum Athmen, weil er die freye Einwirkung auf die Aussenwelt darstellt, ein in der Erkenntniß Gegebenes voraussetzt, in dem gestaltlosen Elemente sich bewegt und so die Blattfunction der Seele darstellt. Das Gefühl aber ist der Stamm der Seele; bloß auf das Subjective gerichtet, nimmt es zunächst den Zustand der Individualität auf, da aber in dieser die allgemeine Weltkraft wirkt und sich verkündet, offenbart sich ihm auch das Unendliche, so dals die höchste Steigerung der Intelligenz, die Vernunft, so wie die höchste Staffel des Willens, die Freyheit, auf ihm beruht: und somit entspricht es dem Herzen. 5) Gefühl und Wille stehn mit den leiblichen Functionen mehr in einem consensuellen Verhältnisse: gewöhnlich werden sie mit ihnen gesteigert, und verstärken dieselben, wenn sie selbst in höherer Thätigkeit begriffen sind; nur bey einer übermäßigen Wirksamkeit treten sie in Antagonismus zu ihnen. Ein solch antagonistisches Verhältniß zeigt sich in Vergleich mit Jenein viel stärker zwischen Geist und Leib, indem die Geistesthätigkeit früher das leibliche Leben stört und leichter von ihm niedergedrückt wird.

§. 562. Die Leber steht in offenbarem Gegensatze zu den Lungen: während diese locker, schwammig, leicht, und der Allgemeinheit des Planeten, dem Luftkreise, zugewendet sind, ist jene das dichteste, schwerste, alle übrigen an Masse übertreffende, mit dem Irdischen und den besondern, gröbern Stoffen in näherer Gemeinschaft stehende Organ. Die Leber ist eine Vorstufe und ein Vorherz: sie empfängt das von den Fruchtkuchen und den Verdauungsorganen kommende, mit fremdartigen Stoffen beladene Blut, wandelt es um und bildet es in gewissem Grade aus, um es dann durch das Herz an die Lungen zu senden. In ihrer psychischen Bedeutung muß sie den vereinten Charakter von Herz und Lungen, also von Gefühl und Willen darstellen, aber als im Irdischen und im Reiche der Einzelheit befangen: sie wird das Organ des Egoismus, des Gefühls der Seele in ihrer Getrenntheit vom Ganzen, und des Triches derselben, sich in ihrer individuell begränzten Selbstständigkeit zu behaupten, seyn. Sie bewirkt jene Metamorphose des Bluts durch Gallenbildung: selbst brennbar, bereitet sie in ihrem, in flammige Büschel verwickelten Haargefäßen eine scharfe, entzündliche Lauge, welche, theils die Muskeln des

Darum zu kräftigern Bewegungen aufreizend, theils die matte Säure des Speisebreys überwältigend, die Anzögerung irdischer Masse befördert und die Magenverdauung vollendet. So steht denn die Leber in Beziehung sowohl zu der in abnormer Aufregung sich aufreißenden organischen Hirnthätigkeit (§. 324), als auch zur Entrüstung der Subjectivität, zu dem Brennahren der Seele, welches entweder in sprühendem Zorne aufflammt, oder im stillen Braude des Aergers, des Neides, der Eifersucht sich verzehrt; oder in hypochondrischem Streite von Lebensmüde und Lebensüberdruß senkt (§. 418, 440). Wie die Leidenschaft im Egoismus wurzelt, und von jenen egoistischen Gemüthsbewegungen begleitet wird, so ist auch die Leber mit der Leidenschaftlichkeit überhaupt verwandt, und wie sie durch Gallenbildung in den Verdauungsproceß eingreift, so stört sie, da hier wieder das antagonistische Verhältniß sich zeigt (§. 572, 585) die Geistesthätigkeit; indem sie durch das egoistische Gefühl die Anschauung verunklart und durch die Leidenschaftlichkeit die Richtungspuncte verriecht. — Uebrigens dürfen wir wohl fragen, ob nicht vielleicht das Hirnfest mit dem Gallenstoffe, so wie mit der Spannung der pflanzlichen Hirnthätigkeit und mit der Leidenschaftlichkeit des Charakters in einem gewissen Verhältnisse steht?

§. 565. Die Haut ist das Grenzorgan für den gesammten Organismus und die individualisirende Schranke (§. 54 — 57), die aber mit dem Universellen der Natur, mit dem Luftkreise in Berührung und Wechselwirkung steht. In so fern sie der eigenmächtigen Bewegung ermangelt und nur eine Entwicklung von Gefäßen darstellt, ist sie dem Gefühle verwandt, und wie die Scham das lebendige Gefühl der zu Tage tretenden Unvollkommenheit, der individuellen Beschränkung, im Gegensatz zur Vorstellung allgemeiner Vollkommenheit ist, so bezeichnet die Schamröthe die psychische Bedeutung des Hautorgans (§. 444). Dasselbe steht auch mit Muth, Furcht und Schreck, als Beziehungen des individuellen Gefühls an einer fremden Gewalt, in näherer Beziehung (§. 424, 444). Eine Beziehung zum pflanzlichen Hirnleben findet Statt (§. 278, 332), ohne sich durch Besonderheiten auszuzeichnen.

§. 566. Keine andre Function steht in so unmittelbarer Beziehung zur Vorstellung ihres Objectes und ihrer Vollziehung näher (§. 421, 442, ffg.), als die Geschlechtsfunction; keine andre hat so mächtigen Einfluß auf die Seele, kann sie so ganz erfüllen; so hoch heben und so tief stürzen; keine wirkt in gleichem Umlange auf alle Seelenkräfte, und bemächtigt sich so der Gesammtheit derselben (§. 453). Die Seelenkraft steht also mit der Zeugungskraft in dem nächsten Verkehr; stimmt also im Begriffe mit dieser mehr überein, als mit irgend einer andern organischen Kraft. Bei Beiden ist nämlich Idee und Materie eng verknüpft: die Idee als das Wesentliche, Urfängliche, Allgemeine, Freye, Treibende, Schaffende; die Materie als das Erscheinende und die Erscheinung Bedingende, als das Vereinzelte, Bildsame und Gebildete. In der Seele taucht die Idee aus der Materie hervor, und in der Zeugung senkt sich die Idee in die Materie ein; dort tritt die lebendige Universalität hervor, indem der Gedanke des Ganzen im Individuum erwacht, und hier erscheint die lebendige Individualität, indem das Ganze der Gattung durch ein neues Individuum sich verwirklicht. *Conceptus* und *conceptus*, Beide sind, wie der geistvolle Harvey bemerkt, ein göttliches Schaffen, und in der Zeugung spricht sich die Seele des pflanzlichen Lebens in ihrer schöpferischen Kraft an bestimm-

testen und deutlichsten aus. Daher giebt es denn auch im Grunde nur eine und dieselbe Productionskraft, welche sowohl geistig, als auch leiblich wirkt. Wie bey dem Thiere mit dem Zeugungstriebe auch der Kunsttrieb erwacht und Beyde gemeinschaftlich den Culminationspunkt des Lebens bezeichnen, so entwickelt sich bey dem Menschen mit der Geschlechtsreife das originelle Talent und der Erfindungsgeist, und die Liebe hat die Poesie zur Begleiterin. Man weiß, wie schon Georg Forster bemerkt, daß bey den größten Genies im Reiche der Wissenschaft und der schönen Künste, der Politik und der Kriegskunst, die Richtung auf das geschlechtsverhältniß sehr stark hervortrat. Kennen wir wohl eine originelle und geistvolle Dichtung oder Composition, oder irgend eine große Entdeckung, eine wichtige Erfindung, die von einem Castraten oder von einem der Liebe unfähigen Menschen herrührte? — Damit ist nun keinesweges gesagt, daß beyderley Aeusserungen immer in durchaus gleichem Verhältnisse stünden, denn nirgends ist das Leben an ein einförmiges Verhältniß gebunden: während die Stammkraft in Allem ist, was schafft, tritt ihre Aeusserung bald in dieser, bald in jener Richtung stärker hervor. So ist der Kunsttrieb der Arbeitsbiene bloß ein Zweig des Zeugungstribs: während sie Zellen für die Eyer baut, Honig bildet und sammelt, und die Jungen nährt und pflegt, überläßt sie den materiellen Zeugungsact selbst der Königin und den Drohnen. So ist in dem einen Menschen die geistige Schöpfungskraft überwiegend, in dem Andern die leibliche Zeugungskraft, während, wie Plato sagt, Beyde auf ihre Weise nach Unsterblichkeit streben.

§. 565. Dies Streben nach Unsterblichkeit, diese Erhebung zu dem Unendlichen bezeichnet das Wesen des Geschlechtslebens näher. Wie die Begattung die leibliche Vereinigung des Lebens zweyer Individuen zu Erhaltung der Gattung durch gemeinsame Erzeugung eines neuen Individuums ist, so ist die Liebe ihr geistiges Vorbild, als das Einsseyn zweyer Gemüther, welche den Egoismus besiegt haben, um in der Gemeinschaft und gegenseitigen Ergänzung den Begriff der Gattung zu verwirklichen, welcher in der Individualität nur einseitig und unvollkommen ausgedrückt ist. So hat denn die Geschlechtsfunction eine nähere Beziehung zur höhern, universellen Richtung des Gefühls, und dadurch der Seele überhaupt: die Liebe, die menschliche Gestaltung, die Religiosität, und hierdurch die geistige Schöpfungskraft, also überhaupt das Edelste im Menschen, sein Streben nach dem Unendlichen hängt mit der Geschlechtsfunction innig zusammen, und bekommt durch diese sogar den ersten Impuls (§. 422). — Es sind aber die Zeugungsorgane der strengste Gegensatz zum Gehirn: die untersten Zweige vom Rumpfnerven und von den Rückenmarksnerven empfangend, bilden sie den universell plastischen Pol des Lebens, und indem sie wirken, ergreifen sie das ganze Rumpfnervensystem und Rückenmark.

§. 566. Die chemisch-dynamische Einwirkung der Aussenwelt trifft zunächst auf Magen, Lungen und Haut, und breitet sich von da aus über das pflanzliche Hirnleben (§. 295), hierdurch aber auch über die psychische Sphäre aus. Diese Affection des Gehirns wird vermittelt entweder dynamisch durch Veränderung der Lebensthätigkeit der berührten Organe, welche theils unmittelbar, theils durch ihren Einfluß auf den Kreislauf des Gehirns bestimmen: der zehnte Hirnnerv ist der vorzüglichste Leiter solcher Eindrücke (§. 311);

oder materiell, sey es nun durch Uebergang fremder Stoffe in das Blut, oder durch Umänderung der Proportion seiner Elemente (§. 400). Auf beyderley Weise wirken gewisse Stoffe specifisch auf das Gehirn, und von hier aus reflectirt sich diese Wirkung wieder auf die Rumpforgane: Wein, Optüm u. s. w. wirkt auf die Blutseite, des Gehirns oder auf seine Beziehung zum Blute (§. 244); und durch Reflex von ihm auf das Herz (§. 302); brennstoffige Luftarten und Dämpfe, und rein narkotische Substanzen wirken zuerst auf die sensible Seite des Gehirns, und von da aus erst auf die Lungen, denn sie verursachen zuerst Schwindel, Kopfschmerz, Schwäche der Besinnung, Dunkelheit der Vorstellungen; dann erst Asphyxie, und wenn diese vorübergegangen ist, bleiben jene Zufälle noch eine Zeitlang zurück. Die Macht des specifischen Verhältnisses äussert sich selbst bey unmittelbarer Application verschiedner Stoffe auf das Gehirn: Alkohol und Opium wirken von da aus auf den Kreislauf, Säuren hingegen auf die willkürlichen Muskeln (§. 301.)

2. *Leben der Seele im Leibe*

§. 567. Empfindung und Bewegung sind die äussersten Glieder der Seele, welche die Berührbarkeit mit der Aussenwelt geben, und die directe Einwirkung des Leiblichen auf die Seele, und des Psychischen auf den Leib darstellen. Sie drücken die Einheit des materiellen und psychischen Lebens aus, indem sie die Thätigkeit des einen Gebietes in eine entsprechende Thätigkeit des andern Gebietes umwandeln. Die Organe der Empfindung und Bewegung sind Gebilde, welche ihrem Wesen nach nicht auf Plasticität sich beziehen, sondern nur im Dienste der Seele stehen, die Aussenwerke derselben, und gleichsam den psychischen Leib darstellen. Mit der Sensibilität innig verknüpft, und zwar an die Peripherie des Nervensystems gelagert und nach aussen hin ihre Thätigkeit richtend, bilden sie einen directen Gegensatz zum centralen Gehirne.

§. 568. Empfindung und Bewegung giebt die äusserste und niedrigste Sphäre der Seele; aber, wie überall in der Erscheinungswelt das Höhere durch ein Niederes und das Innre durch ein Aeusseres bedingt wird, so ist es diese Sphäre, was dem Menschen in der Realität fixirt und die Grundlage seines innern, höhern, selbstständigen Lebens wird. Dies erkennen wir in dem Beispiele des Schlafs: denn indem hier die Seele sich isolirt, und ihre Beziehung zur Aussenwelt, die Wahrnehmung und willkürliche Bewegung aufhebt, verliert sie zugleich auch die Klarheit des Selbstbewusstseyns und die Freyheit. Der Schlaf beruht darauf, dass theils die Spannung zwischen dem Gehirne und dessen Aussenwerken, Muskeln und Sinnesorganen, theils die mit dem Bewusstseyn und der Selbstbestimmung gegebene, auf innerlichen Gegensätzen beruhende Spannung in der Seele selbst gelöst wird: Indem so Alles sich scheidet, und jedes Element seiner eignen Natur sich überlässt, und in sich zurück geht, gewinnt es durch das fortgehende pflanzliche Leben die im Conflicte geschwächte eigenthümliche Kraft wieder: die Gegensätze treten nachmals wieder schärfer und lebendiger hervor, um in neuem Zusammenwirken die Gesamtkraft zu offenbaren, und so wird die geistige Arbeit nach dem Schafe leicht, die vorher mühsam gewesen war. — Die krankhafte Schläfrigkeit bey Abnormitäten des Gehirns ist das Symptom der beginnenden Auflösung des psychischen Lebens, welche

allmählig zur Betäubung und völligen Indifferenz anwächst, indem die Kraft des pflanzlichen Lebens nicht mehr hinreicht, die normale Differenz hervorzurufen.

a) *Empfindung.*

§. 569. Die Empfindung ist die lebendige Beziehung der Peripherie zum Centrum des Nervensystems, so daß sie dort ihren ersten Anstoß, hier ihre Vollendung findet. Sie ist die mit Bewußtseyn und thätiger Aufnahme verbundene Veränderung des Seelenzustandes durch den Leib (§. 427.), die erste Erkenntniß des Aeussern, welche auf Gegensetzung des afficirten Ichs gegen den Eindruck des Nicht-Ichs beruht. Bey der Empfindung percipirt aber die Seele ihr eignes Gehirn (§. 339.), und so erblickt sie im Spiegel der Aussen Dinge sich selbst, zunächst nemlich ihre Affection, dann aber auch ihre Thätigkeit und ihr Wesen. Daher beruht denn auch das Bewußtseyn und alle psychische Entwicklung auf Empfindung, und diese wird durch die Seele bestimmt (§. 445.), so wie sie andererseits von einer gewissen Weichheit des Gehirns, als einer Fundamentalqualität desselben (§. 475.), abhängig ist (§. 375.).

§. 570. Die Empfindung tritt zuerst hervor als Gemeingefühl, welches als die überwiegende Subjectivität (§. 498.) und als unmittelbare Anschauung vom Zustande unseres leiblichen Daseyns und Wirkens die Geburtsstätte der Seele wird. Denn wie diese aus dem pflanzlichen Leben, in welchem sie als eingekullter Keim und ohne Individualität enthalten ist, sich entwickelt, so ist ihr erstes Erwachen ein Gefühl des organischen Lebens und Daseyns, indem die verschiedenen Lebensthätigkeiten in einen Brennpunct zusammenschlagen und das Leben sich selbst Erscheinung wird. Die Seele fühlt ihr Gehirn, und diese Empfindung muß um so stärker seyn, je reger in ihm oder in einzelnen Theilen desselben die Lebensspannung ist. Eben so wird das Gemeingefühl des Körpers vom Gehirne (§. 339.) und von der Seele bestimmt.

§. 571. Die Sinnenthätigkeit ist eine Steigerung des Gemeingefühls, welche von diesem dadurch sich unterscheidet, daß sie nicht sowohl den durch die Objecte erregten subjectiven Zustand des Organismus, als vielmehr die Qualität der Objecte selbst zur Anschauung bringt. Also ist nur eine relative Verschiedenheit, welche darin besteht, daß dort die Erkenntniß des eignen Körpers, hier die der Aussenwelt überwiegt, während diese dort, und jene hier nicht gänzlich fehlt. Wenn der Sinn mit einem klaren, farblosen, ebenen und dünnen Glase zu vergleichen ist, welches die Lichtstrahlen, ohne ihr Verhältniß merklich zu ändern, hindurch gehen läßt, so giebt das Gemeingefühl, als ein Glas von den entgegengesetzten Eigenschaften, nur ein trübes Bild, welches mehr dem Organe, als dem Objecte entspricht. Wenn diese beyden Lebensthätigkeiten schon in dieser Hinsicht sich zu einander verhalten, wie Denken und Fühlen, so spricht sich dies Verhältniß auch darin aus, daß das Gemeingefühl gleich dem psychischen Gefühle ein Allgemeines ist, und eine Beziehung des ganzen Organismus darstellt, die Sinnenthätigkeit hingegen, wie das Denken, ein Besondres, scharf Begrenztes ist, welches nur durch besondere Organe vermittelt wird. Diese Organe zeigen die höchste Entwicklung peripherischer Sensibilität, und verhalten sich zu dem Gehirne, als dem Organe centraler Sensibilität, wie die Vielheit zur Einheit, wie die Einzelheit zum Ganzen. Bey un-

vollkommener Entwicklung des Centralen wird das Periphere überwiegend: so ist bey den Hemicephalen die Gesamtheit der Kopfsinne oder das Antlitz entweder absolut, oder doch relativ stärker entwickelt.

§. 572. Die Sinnenthätigkeit ist für die Seele, was die Aufnahme Auserer Stoffe, die Einsaugung und Aneignung für das leibliche Leben ist. Daher sind denn auch die Sinnesorgane den plastischen Organen verwandt, so daß sie entweder sich an sie anlagern und eine nähere oder entferntere Verbindung mit ihnen eingehn oder doch den allgemeinen Typus derselben wiederholen. Wie nämlich vor dem Rückenmarke in der Höhle des Rumpfs besondere Organe liegen, welche, Jedes auf eigene Weise, zu Erhaltung des Lebens, wirken, Matria der Aussenwelt aneignend, daraus Blut bildend und durch dieses das Rückenmark bewegend und belebend, so lagern sich vor und unter dem Gehirne die Sinnesorgane als Kopfeingeweide (§. 48.), welche auf gleiche Weise dem Seelenleben dienen. Die Sinnesorgane des Kopfs sind also vergeistigte Eingeweide, wie der Kopf eine Steigerung des Rumpfs und der Schädel eine Potenzierung der Wirbelsäule ist. Wenn in den Rumpfeingeweiden die Gefäße vorherrschen und die Nerven ihnen bloß zur Erregung und Verknüpfung beygegeben sind, so sind in den Kopfeingeweiden die Nerven das Wesentliche, und die Gefäße, als Mittel der Erhaltung, das Untergeordnete. Im Rumpfe liegen die verschiedenartigen Organe in einer gemeinschaftlichen Höhle beisammen; die Kopfeingeweide hingegen sind mehr individualisirt, strenger von einander geschieden, und die Knochenwand ist daher hier mehr zersplittert und in einzelne Blasen auseinander gegangen. Aber auch dieser Unterschied ist bloß relativ; auch die Sinnesorgane bilden im Grunde eine gemeinschaftliche Höhle, welche nur durch Zusammenschiebung der Uebergangspuncte abgeschnürt ist: so hängt das Auge mit der Nase durch die Thränenwege, die Nase mit der Mundhöhle durch die Gaumenlöcher und den Rachen, der Rachen aber durch die Eustachische Röhre mit dem Ohre zusammen. Auch in dem Verhältnisse der Nerven zeigt sich ein relativer Unterschied. Die Rumpfeingeweide haben ganz eigentlich Zweige des sympathischen Nerven, aber diesen gesellen sich einzelne Fäden von Rückenmarksnerven bey, und es treten der zehnte Hirnnerv, der Zwerchfellnerv und die untern Kreislauffnerven hinzu. In den Kopfeingeweiden sind die Hirnnerven das Vorherrschende, aber der Rumpfaerve schickt zu jedem derselben einige Fäden.

§. 573. Es giebt nur Eine Natur und nur Eine Erkenntniß: so bilden auch die Sinnesorgane, einzig in ihrem Wesen als Zugänge der Natur zur Seele, ein eignes zusammenhängendes System. Die einzelnen können also nur Metamorphosen einer und derselben Grundgestalt seyn, und es kann bloß eine relative Verschiedenheit unter ihnen Statt finden. Da sie nun überhaupt die Mittler zwischen der Natur und der Seele sind, so müssen diese ihre eigenthümlichen Umgestaltungen auch den verschiednen Seiten der Natur und der Seele entsprechen: jede einzelne Sinnesart kann nichts Andres seyn, als die Beziehung eines bestimmten Punctes der Leibesoberfläche zu einem bestimmten Puncte des Gehirns, vermittelst deren eine besondere Richtung der allgemeinen Weltkraft mit einer besondern Richtung der Seelenthätigkeit in Verkehr tritt. Einen Sinn erkennen, heißt: seine Eigenthümlichkeit in diesen vier Verhältnissen auffassen.

§. 574: Dieser Gedanke läßt sich in folgende Sätze auflösen. 1) Jedes Sinnesorgan stimmt vermöge seiner Substanz und Organisation mit derjenigen Welterscheinung, zu deren Perception es bestimmt ist, überein, so daß es dieselbe durch eigene Kraft hervorrufen kann. Das Auge ist nicht bloß ein Spiegel, welcher die Lichtstrahlen aufnimmt und zu einem Bilde sammelt, sondern es leuchtet auch selbst, wenn es sich im Zustande erhöhter Erregung befindet; das Ohr ist zu Schallschwingungen geeignet, und empfängt sie nicht nur von aussen, sondern erzeugt sie auch selbst; eben so entstehen Empfindungen des Geschmacks oder des Geruchs, wenn die im Salzwasser des Speichels schwimmende Zunge oder die in Dunst sich badende Schleimhaut der Nase in ihrer Lebensfähigkeit ungestört wird, ohne daß schmeckende und riechende Stoffe vorhanden sind. Diese Uebereinstimmung haben die Physiologen von Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 7. p. 167. de odoratus instrumento c. 3. p. 110*) an bis zu Magendie (*l. p. 140*) anerkannt. — 2) In der Gesamtheit der Sinne muß sich die Gesamtheit der Weltkräfte oder der verschiedenen Formen des allgemeinen Daseyns spiegeln. Dies anerkennend, faßte man zuerst das Verhältniß zu den Elementen der Körperwelt an: so lehrte z. B. Aristoteles (*de anim. lib. III. c. 2. p. 399*), das Wasser entspreche dem Auge, die Luft dem Ohre, die Erde dem Tastorgane, die Luft und das Wasser der Nase, das Feuer aber gehöre keinem Sinne an. Ein andres mal wurden, um eine allgemeiner Ansicht zu gewinnen, mit den körperlichen Elementen zugleich die ihnen entsprechenden Elementarkräfte berücksichtigt: so nahm Oken (*Abriss der Naturphilosophie S. 106*) an, das Gefühl entspreche der Erde und der Cohäsion, das Gesicht der Luft und dem Feuer, das Getaste dem Wasser und der Schwere, das Gehör dem Metalle und dem Magnetismus, der Geruch dem Schwefel und der Electricität, der Geschmack dem Salze und dem Chemismus. Endlich wurden von Troxler (*Versuche in der organischen Physik S. 114*) die verschiedenen Dimensionen von Raum und Zeit als die eigenthümlichen Bedeutungen der Sinne aufgestellt. Es giebt nach ihm dreß: Raumsinne, welche elektrischer Natur sind: das Getaste entspricht der Länge, das Gefühl der Breite, das Gesicht der Tiefe; und von den Zeitsinnen, welche der Potenz des Magnetismus zufallen, gehört der Geruch der Zukunft, der Geschmack der Gegenwart, das Gehör der Vergangenheit. — 3) Die Sinnesorgane entsprechen dem Gehirn. Selbst in der Structur ist einige Aehnlichkeit zu bemerken: nicht nur sind alle Sinnesorgane des Kopfs Ausbreitungen von Nervensubstanz um mit Flüssigkeit gefüllte Höhlen her, wie das Gehirn (*Autenrieth S. 109*), sondern es finden sich auch Spuren von Uebereinstimmung der einzelnen Sinnesorgane mit den Hirntheilen, welche das Centralende ihrer Nerven enthalten, namentlich bey Thieren, wo die höhere Bedeutung dieser Hirntheile noch nicht entwickelt ist: so sind die Sehhügel der Vögel und Fische hohle Kugeln, wie Augen; die Sitzfortsätze ähneln der Nase; die Centralenden der Hörnerven zeigen theils Wülstchen, theils bogenförmige Streifen, welche an das Labyrinth erinnern. — 4) Die Sinnesthätigkeiten entsprechen bestimmten Seelenthätigkeiten. Die Sinne sind die Vermittler zwischen Seele und Welt; das, was sie vermitteln, muß eine bestimmte Verwandtschaft und innere Aehnlichkeit haben: wenn nun verschiedene Formen des äussern Seyns oder der Welt vorhanden sind, welchen eben so viele verschiedene Sinne entsprechen, so müssen dem gemäß

auch bestimmte Formen des innern Lebens oder der Seele ihnen gegenüberstehn. So haben wir denn bey jedem besondern Sinne seine Verwandtschaft mit besondern Kräften sowohl der Welt, als der Seele aufzufassen. Man hat daher auch längst einzelne Sinne mit bestimmten Seelenthätigkeiten verglichen, aber erst in unserer Zeit systematische Ansichten davon versucht. So stellt Troxler (a. a. O. S. 205; fgg.) die Seelenthätigkeiten als höhere Potenzen der Sinnesthätigkeiten dar. Die Zeitsinne geben die Geistes-thätigkeiten: der Geruch die Abnung und Erinnerung; der Geschmack die Ueberlegung, die Verstandesfunction, Vergleichung, Urtheil und Schluß; das Gehör giebt das eigentliche Erkennen, den Tiefinn. Die Raumsinne hingegen entsprechen der Gemüths-thätigkeit: das Getaste dem Triebe; der Gefühlsinn der Leidenschaft, und das Gesicht dem Willen.

§. 575. Die Idea solcher Uebereinstimmung (§i 573.) ist also vielseitig anerkannt, aber wohl noch nicht ganz befriedigend durchgeführt worden. Da sie nun ein vorzüglich wichtiges Moment für die Erkenntniß des Hirnlebens abgiebt, so können wir es nicht ablehnen, einen neuen Versuch zur Lösung dieser Aufgabe zu wagen. Mißtraulich gegen die Phantasie, unternehmen wir es nicht, die Wahrheit im Fluge zu erreichen, sondern suchen, umsichtig, Schritt für Schritt uns ihr zu nähern. Wir vergleichen also zuvörderst die Sinne nach ihren Einzelheiten unter einander. Da wir aber bald gewahr werden, daß sie nicht nach einem einzigen Maasstabe beurtheilt werden können, so müssen wir sie aus verschiednen Gesichtspuncten betrachten, von wo aus ihre mannichfaltigen Combinationen uns erscheinen. Gehen wir nun bloß empirisch um unsern Gegenstand herum, so erlangen wir nie die gewisse Ueberzeugung, daß wir alle mögliche Seiten desselben wirklich aufgefaßt haben: diese wird uns vielmehr erst dann zu Theil, wenn wir sehen, daß die bestimmten Standpuncte, die wir empirisch ergriffen haben, in dem Wesen unres Erkenntnißvermögens nothwendig begründet, und daß außer ihnen keine andern gedenkbar sind. So mögen uns denn die Kategorien, die wir sie als die allgemeinen Formen der Erscheinung im Gebiete der Seele, so wie der Natur, anerkennen, bey Betrachtung der Sinne aus einzelnen Gesichtspuncten leiten.

§. 576. Die innere Quantität oder die Intensität der Lebendigkeit ist verschieden in den einzelnen Gliedern eines Organismus, und diese charakterisiren sich durch solche Verschiedenheit, jedoch so, daß durch allmähliche Abstufung das Eine in das Andre übergeht oder an dasselbe angränzt, und dadurch Alle als zu einem Ganzen gehörig sich erweisen. So bilden nun auch die Sinnesorgane ein gegliedertes System, welches durch eine niedere, mittlere und höhere Stufe sich bezeichnet, und eine stetige Reihe von Formen, welche die fortschreitende Entwicklung und Umbildung einer und derselben Grundgestalt darstellt: a) Vermöge der Gemeinschaftlichkeit ihres Begriffs mit dem der Aneignungsorgane (§. 572.) stimmen sie mit diesen auch in der Entwicklung überein. Bey den niedrigsten Thieren wird die Wechselwirkung mit der Aussenwelt bloß durch die gleichförmige Oberfläche der Haut vollzogen. Eigne Organe der Verdauung und des Athmens erscheinen bey weiterer Entwicklung des Lebens, und zwar so, daß die äussere Oberfläche zuerst in Knospen, Wärschen, Vorrägungen und Anhänge sich erhebt, hierauf in eine einfache Höhle sich einstülpt, welche sodann in mannichfaltige Höhlun-

gen zerfällt und endlich in einzelne Blasen sich abschnürt, welche neben jenen Vorragungen und Vertiefungen bestehen. Nach demselben Typus schreitet das Sinnesorgan als eine Entwicklung der Haut fort, sich immer mehr vervielfachend, abschüddend und nach innen ziehend. Die Haut ist das Begränzende der Individualität, und doch das Angrenzende an die Welt: so ist in ihr das Gemeingefühl, als die Wurzel der Sinnethätigkeit; das Selbstgefühl, auf welchem die Empfindung des Aeussern beruht, gesteigert, und diese tritt in ihrer ersten Form, als Gefühlsinn, auf den Zustand des Gränzgebildes erkennend, erkennen wir das, was diesen Zustand erregt, das Aeusserre. Diese allgemeine Wirksamkeit modificirt und entwickelt sich mit dem Erscheinen spezifischer Gestaltungen. Die erste derselben ist die tastende Hervorragung, deren Form bey niedern Thieren selbst noch im Auge und Ohre sich erhält, wie man denn schon seit langer Zeit alle übrigen Sinne als weitere Ausbildungen des Tastsinnes betrachtet hat (*Cassellius pin. savatillon p. 2. Virensana cecili p. 153*). Dahin folgt die Mundhöhle mit ihrer Zunge, als einer grossen Papille, welche durch Muskeln und eine Duplirung der Schleimhaut gebildet wird, und kleinere Papillen, gleichsam als Wiederholungen der ursprünglichen Krystallisationsform, trägt. Hierauf bildet die in mehrere Vertiefungen und Abtheilungen sich zusammenschiebende Schleimhaut das Gerchorgan. Endlich schließt sich das eigentliche Sinnesorgan im Auge und Ohre in eigene Blasen ab, welche von der einen Seite der Aussenwelt, dem Lichte und dem Schalle, auf der andern der Innenwelt, dem Gehör, zugewendet sind, und schafft sich in seiner Umgebung eigene, die Schall- und Vorbereitende und vermittelnde Sphären; Einstülpungen und Vorragungen bilden nun den äussern Bezirk dieser am individuellsten ausgebildeten Sinnesorgane. b) Die Mannichfaltigkeit und Zartheit der Gebilde nimmt in dieser Reihe fortschreitend zu, so daß sie im Auge ihre höchste Stufe erreicht. c) Dem entspricht auch die Gemeinschaft mit dem Gehirn vermittelt der Arterien: das Geschmackorgan erhält bloß zwey, von der äussern Kopfarterie; das Gerchorgan bekommt seine Hauptzweige von derselben, aber zu diesen treten schon einige Zweige von der Gehirnarterie; das Auge und das Ohr endlich empfangen ihre Hauptzweige von den Gehirnarterien, und bloß in ihrem äussern Bezirke kleine Zweige von der äussern Kopfarterie. d) Wir sehen ferner in dieser Reihe eine stetige Zunahme der Nervensubstanz und eine fortschreitende Vereinfachung der Nervenstämme. Die Haut des Rumpfs ist verhältnißmäßig am ärmsten an Nerven, aber dieselbe gehen von da aus in alle Nervenpaare des Rückenmarks ein; die Fingerspitzen haben mehr Nerven, und diese vereinen sich mit fünf Paaren der Rückenmarksnerven; das Geschmackorgan hat noch mehr, und sie sammeln sich von da aus in zwey Paare (den fünften und neunten Hirnnerven), stärker treten die Nerven im Gerchorgane hervor, und sie vereinen sich in zwey Paare (das erste und fünfte des Gehirns); sie werden noch mehr überwiegend in der sensibeln Sphäre des Hörorgans, und sammeln sich zunächst in zwey Aeste, welche endlich in einen Stamm verschmelzen; das entschiedenste Übergewicht haben sie endlich in der sensibeln Sphäre des Auges; und sie treten von da aus sogleich in einen einzigen Stamm zusammen. Wir erkennen also ein Fortschreiten sowohl in der Mannichfaltigkeit der äussern Gebilde, als auch in der Macht und Einheit der Nerven. — Auch in der Natur der Sinnesgegenstände bemerken wir eine entsprechende Stufenfolge, und

zwar e) eine fortschreitende Abnahme der Körperlichkeit. Für das Getaste ist das Feste, Geronnene, Starre das eigentliche Object; für den Geschmack das Schmelzende, sich Lösende, sich Verflüssigende; für den Geruch das Dünfte, Flüchtige; für das Gehör die bloße Bewegung der Materie; für das Gesicht eine Welterscheinung; die mit palpablen Stoffen nichts gemein hat. f) So bedürfen auch die niedern Sinne der unmittelbaren Berührung der Objecte: der tastbare und schmeckende Körper muß in räumlicher Nähe liegen, und wir erkennen ihn unmittelbar; der riechende, schallende und leuchtende Körper sendet seine Wirksamkeit aus, und wir erkennen ihn mittelbar durch: Duft, Schall und Licht: der Schall reicht weiter, als der Duft, das Licht weiter, als der Schall. Und deutlich gesehen zu werden, muß der sichtbare Körper in einer gewissen Entfernung vom Auge seyn. Der Abnahme der Körperlichkeit entspricht Zunahme des Umfanges der Wirksamkeit.

§. 577. Wenn wir so die Sinne und ihre Objecte als eine fortlaufende Reihe erkannt haben, so gewinnt diese Ansicht an Festigkeit, wenn wir bemerken, daß je zwey an einander gränzende Glieder dieser Reihe in ihrer allgemeinen Qualität mit einander übereinstimmen und daß dadurch drey qualitativ verschiedene Stufen bezeichnet werden. a) Das Object für Gefühl und Getast ist das Aeußere der Leiblichkeit, die erscheinende Raumerfüllung, die mechanische Qualität der Körper. Wir percipiren durch das Gefühl die Cohäsion und die Gestalt der Körper, insofern sie widerstehend, drückend, stechend u. s. w. gegen unsern Körper andringen, die Schwere derselben, insofern sie ihn zusammenrücken, und die Wärme, insofern sie ihn expandiren; das Getaste aber ist nur eine schärfere Perception der Cohäsion und der Gestalt. — Im Geschmacke und Geruche wird das Innere der Leiblichkeit, das Verhältniß der Stoffe, die Verschiedenartigkeit der in einer gemeinschaftlichen Raumerfüllung begriffenen Elemente, die chemische Natur aufgefaßt. Jedes Element ist an sich weder riechbar, noch schmeckbar, sondern wird es erst in seiner Verbindung mit einem andern; und eben so entstehen diese Sensationen erst im chemischen Gegensatze des Schmeckbaren und Riechbaren gegen das schmeckende und riechende Organ. Die Cohäsion hat Einfluß darauf, insofern sie die chemische Wechselwirkung bedingt, ist aber nicht das Wesentliche: auch Steine und Metalle sind riechbar und schmeckbar, insofern sie einer chemischen Wechselwirkung mit unsern Organen fähig sind. — Im Sehen und Hören werden Thätigkeiten der Körper aufgefaßt, welche durch mechanische und chemische Eigenschaften bestimmt sind, auch dergleichen Veränderungen herbeiführen, aber doch nicht mit ihnen identisch sind, vielmehr in einem dynamischen Zustande der Materie bestehen. — b) Diese Abtheilung findet sich im Baue der Sinnesorgane wieder. Die mechanischen Sinnesorgane liegen offen auf der äussern Haut; die chemischen sind aus Schleimhaut gebildet, und stellen Höhlen mit zwey Oeffnungen dar, durch welche die Stoffe hindurchgehen; die dynamischen bestehen aus häutigen Ausbreitungen der Nerven in Form von Blasen, welche die äussern Eindrücke nur mittelbar durch vorliegende äussere Gebilde empfangen. Die Dimension der Länge bezeichnet die Gestaltung der Tastorgane, die der Breite die Flächen der chemischen Sinnesorgane, die der Tiefe die Kugelform der dynamischen; in den erstern erscheint die Form des Magnetismus, in den zweyten die der Elektricität und der chemischen Wechselwirkung, in

den dritten die des Schalles, des Lichtes, der Wärme. Vermöge ihrer grössern Zartheit und ihrer zusammengesetzten Organisation wird die Thätigkeit der dynamischen Sinne leichter gestört, und kommt ihr Verlust häufiger vor. — (c) Die chemischen Sinne beziehen sich unmittelbar auf die plastische Thätigkeit der Rumpforgane, auf die leibliche Assimilation; und ihre Organe sind wirkliche Fortsetzungen der Rumpfhöhlen. Die dynamischen Sinne stehen nicht in unmittelbarem Dienste der Plasticität, sondern vielmehr in dem der Seele, und werden daher auch mehr durch den Zustand des Gehirns bestimmt. — (d) Die chemischen Sinne stehen dem Gemeingefühle näher; die dynamischen dem Bewußtseyn; das Erkennen des Letztern beginnt mit Verdunkelung und Aufhebung des Gehörs und Gesichts. Die Erstern geben mehr subjective Vorstellungen, mehr Erkenntnisse der Veränderungen, welche die Körper in unsrer Substanz hervorbringen; sie sind die Wächter des Rumpfs und seines plastischen Lebens; darum sind sie auch dunkler, verworrener, nicht so bestimmt anzufassen, und so scharf zu bezeichnen; bey ihnen ist mehr Idiosynkrasie, weniger Uebereinstimmung des Urtheils, als bey den höhern Sinnen. Die dynamischen Sinne geben mehr objective Erkenntnisse und bestimmte Vorstellungen von der Natur der Gegenstände; sie empfangen nicht bloß einen Gesamteindruck, wie die chemischen, sondern fassen auch die verschiedenen Momente auf, die Gestalt, die Farbe, die Größe, die Entfernung, oder den Klang, den Ton, die Harmonie und den Rhythmus. — Die chemischen Sinne errögen demnach auch bloß das Gemeingefühl als thierische Lust oder Unlust; ihre Objecte sind bloß angenehm oder widrig. Die dynamischen Sinne hängen mit der Anschauung des Ideals zusammen; und durch sie sucht die Seele die Verwirklichung der in der Idee ihr vorschwebenden Schönheit. In Mund und Nase spricht sich die Sinnlichkeit aus, im Auge und Gehöre die Geistigkeit. — Das Tasten beruht bloß auf willkürlicher Bewegung; die chemischen Sinne werden durch die Ingestionsbewegungen des Einathmens, Kauens und Schluckens vermittelt; bey den dynamischen Sinnen wirkt der Wille mehr als Aufmerksamkeith.

§. 578. Nach der Kategorie der Modalität theilen sich die Sinne in zwey Abtheilungen: in active, welche mit der Selbstbestimmung mit der wollenden Kraft in näherer Verbindung stehen, und in passive, welche mehr der Receptivität der Seele und dem pflanzlichen Hirnleben verwandt sind. (a) Gestalt, Geschmack, Gesicht sind willkürliche Sinne; es hängt von uns ab, ob wir sie wollen wirken lassen, oder ob wir sie von den Objecten zurückstoßen und diesen den Zugang zu ihnen verschließen wollen; so behandeln diese Sinne ihre Objecte nicht mit einer gewissen Freyheit, und unteruchen sie durch Selbstthätigkeit, indem sie bald auf dieselben bald auf jenen Punkt derselben sich richten, und vor die Einschnitten nach einander aufsteigend, endlich vom Ganzen Besitz nehmen. Dagegen drögen sich die Objecte dem Gefühle, dem Gerüche und dem Gehöre auf, da die Organe dieser Sinne weder durch den Willen bestimmt unmittelbar und durch eigene Thätigkeit ihre Objecte aufsuchen, noch auf mannichfaltige Weise mit ihnen in Berührung treten, noch auch gegen dieselben sich verschließen können, sondern willenlos aufnehmen und bey der Perception passiv sich verhalten; die Thätigkeit anderer Bewegungsorgane, namentlich des Kopfs und der Glieder, muß ihnen zu Hülfe kommen;

um die Annäherung, Untersuchung oder Zurückziehung zu vermitteln. Das passive Gehör dauert häufig in der Ohnmacht und im Scheinlande fort; wo die Wirkung nach außen aufgehoben ist. — b) Die activen Sinne offenbaren viel lebhafter, als die passiven, den Zustand der Hirnthätigkeit und des psychischen Lebens. Nur bey Thieren, wo die Sinne sich noch nicht ganz differenzirt und geschieden, also auch noch nicht ihre volle Bedeutung und ganze Eigenthümlichkeit erlangt haben, verkündigen Haut, Nase und Ohr die inneren Empfindungen deutlicher; bey dem Menschen geben sie theils gar keinen, theils nur einen schwachen Ausdruck des augenblicklichen Seelenzustandes. Dagegen werden hier die obern Gliedmaßen mit den Tastorganen die willkürlichen und unwillkürlichen Verkündiger der Empfindung und des Verlangens; sie geben die Zeichen der Räumlichkeit; indem sie durch ihre Bewegungen in den Raum hinein zeichnen oder auf die räumlichen Beziehungen der Körper hindeuten, und bilden so den sprechendsten Theil der Pantomime. Die Atizmuskeln, welche die eigentliche Mimik geben, gehören bloß dem Munde zu: dieser ist das Centrum, welches sie ringförmig umlagern, und in welches sie als convergirende Strahlen von allen Seiten her zusammenstrenzen. Noch mehr, als dieser Vorhof des Geschmackorgans verkündigt Letztes selbst den innern Zustand: die Zunge wird das Organ der Tonsprache, welche in bestimmten Symbolen die Vorstellungen, ihren Gang und ihre Verknüpfung bezeichnet. Im Auge aber spricht die Seele unmittelbar zu uns; schon das Thier blickt instinctmäßig mehr nach dem Auge seiner Feinde, als nach seinen Waffen, und der Mensch tauscht in Wechselblicken seine Gefühle um. Betrachten wir mit Aufmerksamkeit, um von dem Auge eines Leichnams oder eines Blödsinnigen zu schweigen, das Auge eines neugebarnen Kindes, so finden wir hier bey aller Lebendigkeit eine unbeschreibliche Leere, Unbedeutendheit und Seelenlosigkeit; bey jeder regern und lebendigen Seelenthätigkeit ändert sich der Ausdruck des Auges. Bey Thieren leuchtet und blüht es wirklich, wenn sie von einer heftigen Begierde ergriffen oder zornig sind. Aber es hat auch bey den verschiednen Gemüthszuständen, abgesehen von seinen Bewegungen und von seiner Feuchtigkeit, einen Ausdruck, den wir Alle verstehen, und den wir doch nicht auf bestimmte kühliche Veränderungen zurückführen, also auch nicht mit Worten bezeichnen können. Und wie hier die Sprache zu schwach ist, den Sinn des Auges wieder zu geben, so verkündigt auch die Seele durch dasselbe die Gefühle, welche zu tief, zu innig sind, als daß sie in Worte sich fassen ließen: Blicke sprechen, wo die Zunge verstummen muß. — Das Feuer des Auges bezeichnet aber nicht sowohl die Stärke, als vielmehr die Regsamkeit und Beweglichkeit der Seele, und somit auch das pflanzliche Hirnleben. Bey der Manie wird das Auge wild, blitzend, fankelnd, vorgequollen, starr oder rollend, roth und entzündet. — Uebrigens bemerken wir noch, daß bey den activen Sinnesorganen die Drüsenbildung stärker hervortritt, als bey den passiven: schon unter den Nägeln findet eine stärkere, talgige Absonderung Statt, als in der übrigen Haut, und während Ohr und Nase bloß Talggruben in ihrem Umkreise haben, lagern sich an das Auge und an die Zunge die Thränen- und Speicheldrüsen, deren Absonderung durch bestimmte momentane Gemüthszustände verstärkt wird und dadurch ein psychisches Zeichen abgibt. — Da nun die activen Sinne zugleich die mimischen sind, so werden wir in ihnen überhaupt

ein stärkeres Hervortreten nach aussen anerkennen müssen; welches sich theils als grössere Freyheit, theils als stärkere anwillkürliche Verkündigung des Sedenzustandes oder des Hirnlebens offenbart, und sowohl auf unsre Erkenntniß der Welt, als auch auf die Erkennbarkeit unsres innern Lebens sich bezieht. — c) Eine Eigenthümlichkeit der passiven Hirnsinne ist ihre unmittelbare Nähe am Gehirne. Während der Sehnerv und die Geschmacksnerven aus den Schädelknochen hervortreten, um in Höhlen, welche größtentheils von Antlitzknochen gebildet werden, sich auszubreiten, verharren Riechnerven und Hörnerven innerhalb der ihnen entsprechenden Schädelknochen: die äussere und innere Tafel dieser Knochen weichen von einander, und innerhalb der so entstandenen Zwischenräume entwickeln sich die Sinnesorgane; die Schädelknochen werden hier zu Riechbeinen und Hörbeinen. Auf eine ähnliche Weise ist auch der Tastsinn dem Rückenmarke mehr entrückt, während das Gemeingefühl mit dem Rumpfnerven mehr zusammenstrift. — d) Bey solcher räumlichen Nähe wirken die passiven Sinne auch stärker, als die activen, auf das Unwillkürliche der Seele, auf den Grad ihrer Lebendigkeit und auf ihre Stimmung, mithin auf das pflanzliche Hirnleben ein. Nichts wirkt so mächtig auf dieses, als der Geruch. Die Riechstoffe beleben die gesammte Nerventhätigkeit, stellen bey Ohnmachten, Krämpfen, Nervenlebern das erloschene Bewußtseyn wieder her, und bewirken durch zu starke Reizung Kopfschmerz, Schwindel, Betäubung, Schlagfluß. Der Schnupfback erregt die Sedenthätigkeit, belebt die Phantasie, beschleunigt den Gang der Vorstellungen, schärft das Urtheil und erheitert. Verrückte sind gierig nach ihm, so lange sie noch das Bedürfnis dunkel fühlen, ihre psychische Thätigkeit zu steigern. Bey stark entwickeltem Geruchsinne ist gewöhnlich die Seele sehr reizbar und lebendig. Ja es scheint, als ob die Luft selbst nach ihrer Mischung, unabhängig vom Dufte, durch die Nasennerven auf das Gehirn wücke, und als ob die Nase eine Hirnlunge oder Hirnklemme sey, und ihre Nerven in Luft sich baden, um das Gehirn zu erquickern. Bey verstopfter Nase athmet man eben so viel Luft durch den Mund ein; doch diese Mundathmung ersetzt die Nasenathmung zwar für die Lungen, aber nicht für das Gehirn: der Kopf wird dabey schwer, und die Denkraft träge und stumpf. Wenn man, ruhig sitzend, eine geraume Zeitlang bünig und stark bloß durch die Nase gesthmet hat, so bekommt man ein eignes Gefühl im Kopfe, fast wie Schwindel, und eine Neigung zum Gähnen. Die Belebung, die wir an Thieren, z. B. Pferden, wahrnehmen, wenn sie aus Stall und Stadt ins freye kommen, beruht vorzüglich auf dem Kitzel, welchen die Luft in der Nase hervorbringt, wie man theils aus ihren Bewegungen von Nase und Kopf, theils aus dem Einflusse erkennt, welchen die Beschaffenheit der Luft und die Richtung gegen den Wind dabey zeigt. Man hat gesehen, daß nach Ausrottung von Nasenpolypen die plötzlich wieder hergestellte Einwirkung der Luft eine Ohnmacht verursachte, die nicht eher aufhörte, als bis das Nasenloch mit Cherpie verstopft worden war (*Scorpa adnotatt. p. 52.*). — Auch das Gehör hat eine ähnliche Wirkung auf das Hirnleben, die zwar nicht so mächtig ist, als die des Geruchs, aber sich nicht verkennen läßt, besonders wenn wir sie mit der des Gesichts vergleichen. Schlüfrigkeit und Trägheit, so wie auch die auf Abnormitäten des Gehirns beruhende Betäubung, wird weniger durch starke Beleuchtung, als durch starken Schall verscheucht; die laute Rede ermuntert, und setzt, unabhängig

von ihrem Inhalte, den Zuhörer in eine ihm wohlthuende Spannung und Erregung, vermöge deren er den Sinn leichter faßt und in seinen Empfindungen leichter folgt. Im stumpfsinnigen Typhus wirkt es allemal wohlthätig, wenn der Arzt den Kranken mit lauter, kräftiger Stimme anredet, und ihn dadurch aus seiner Betäubung oder aus seinen Phantasieen aufstört und zu sich bringt, während das Licht ungleich weniger leistet. Die Blendung, welche ein zu starkes Licht hervorbringt, beschränkt sich auf das Auge; dagegen der zu starke Schall afficirt nicht bloß das Gehör, sondern wirkt gleich einer Hirnerschütterung, macht ein Gefühl von Sausen im ganzen Kopfe, eine Verwirrung der Vorstellungen und eine Verdunklung des Bewusstseyns: daher bezeichnet auch der Sprachgebrauch die Bewußtlosigkeit als Betäubung. Eine Störung des pflanzlichen Hirnlebens afficirt auch das Gehör, so wie auch der Schwerhörige von jedem Verdruß oder von jeder Geistesanstrengung Nachtheil für sein Gehör empfindet, und die Blödsinnigen meist schwerhörig sind. — Auch der passive Fühlsinn steht mit dem pflanzlichen Hirnleben in einer nähern Verbindung, weshalb denn auch das Schütteln zu den wirksamsten Mitteln gehört, um aus dem Schlafe und der Betäubung zu wecken. Eben so macht der Druck mäßig knapp anliegender Kleidungsstücke mantror, heitrer, thätiger, mothiger, und stört den Schlaf. — e) Raum und Zeit sind die nothwendigen Formen alles Endlichen, Sinnlichen; doch ist an der einen Erscheinung das Räumliche, an der andern das Zeitliche überwiegend. Bey den activen Sinnen ist der Conflict von der Art, daß das beharrliche Seyn die Räumlichkeit, auf die Seite der Aussenwelt, die Thätigkeit oder die Erscheinung in der Zeit auf die Seite des Organismus fällt. Wie die activen Sinne mit dem eigentlich räumlichen Leben des Organismus, mit der willkürlichen Bewegung, näher zusammenhängen, und wie sie selbst mehr offen liegen, ihren Mechanismus klärer zeigen, und dabey den Zustand ihrer Lebensthätigkeit, so wie den der Seele, äusserlich offenbaren, so sind sie mit dem vorzüglich Aeussern, mit dem Räumlichen an den Dingen beschäftigt: sie sind vorzugsweise Raumsinne. Das Tastbare, Sichtbare kündigt sich uns zunächst als eine Hemmung unsrer Thätigkeit, als Raumerfüllendes, Materielles an; Gestalt, Geschmack und Gesicht erkennen also ganz eigentlich das Leibliche und Räumliche. Das Gegentheil findet bey den passiven Sinnen Statt: dem offenen, durchsichtigen, klaren Auge steht das nach innen versenkte, verborgene, dunkle Gehörorgan gegenüber; in Vergleich gegen die frey hervortretende Zunge ist das Geruchorgan mehr versteckt; und während im Tastorgane die Nerven über die Fläche der Haut in Papillen hervorragen, bleiben sie da, wo bloß der Gefühlsinn waltet, mehr in der Tiefe. Die Objecte der passiven Sinne, Wärme, Ausdünstung, Schall, sind untastbar und unsichtbar; sie sind bloße Zustände, Thätigkeiten, also Erscheinungen in der Zeit. Die passiven Sinne sind also Zeitsinne: sie erkennen nicht das Leibliche selbst, sondern das Zeitliche, den thätigen Zustand am Leiblichen. — Vergleichen wir nun die Zeitsinne unter einander, so bemerken wir, daß wir durch den Schall die Kunde von einer Begebenheit erlangen: wir erfahren dadurch etwas Geschehenes, eine Bewegung, welche Statt gefunden hat, welche in dem Momente, wo wir den Schall percipiren, schon vergangen ist und bloß in ihren Wirkungen noch fortdauert. Durch den Duft verkündigen sich die Körper aus der Ferne; ehe wir in ihre unmittelbare Nähe gelangen, und sie sehen, tasten, schmecken können,

tritt der Duft als ihr Vorbote an uns. Das Gefühl aber erkennt, was mit unsrem Körper in diesem Momente in wirklicher Wechselwirkung steht. Sonach entsprechen die Zeitsinne auch den drey Formen der Zeit: das Gefühl der Gegenwart, der Geruch der Zukunft, das Gehör der Vergangenheit. — In den Raumsinnen finden sich die drey Dimensionen des Raums sowohl in der Gestalt der Organe, als auch in der Form der Erkenntniß ausgedrückt. Im Tastorgane ist die Länge überwiegend, und ihm wird das Auser einander Liegen der Dinge die Ausdehnung offenbar. Das Geschmackorgan ist nach der Dimension der Breite gestaltet und erkennt durch Flächenwirkung das an einander der Dinge, das Verhältniß der Stoffe in chemischer Wechselwirkung. Das Auge endlich ist nach der Dimension der Tiefe gebildet; es durchdringt die Körper, welche als durchsichtige Mittel seine Thätigkeit schlechthin bedingen und erkennt erst den dem Lichte widerstrebenden Hintergrund; es nimmt also die Dinge wahr, wie sie in einander und zugleich auser einander bestehen.

§. 579. Wie die Quantität bloß den allgemeinsten Charakter der Sinne ausdrückt, so bezeichnet die Relation die Eigenthümlichkeit derselben am schärfsten, indem sie die Richtung auf eine bestimmte Welterscheinung, so wie auf eine bestimmte Seite des Lebens, und zwar theils auf eine Rampffunction, theils auf eine psychische Kraft darstellt. Unsere Aufgabe wird es demnach seyn, diese drey empirisch aufgefassen Beziehungen unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunct zu stellen, und die Uebereinstimmung derselben zu erkennen. Wir wollen daher die Sinne in dieser Hinsicht einzeln betrachten (§. 580—585.), dann aber die vierte Beziehung, nämlich die Verwandtschaft der Sinne unter einander nach ihren Centralpuncten untersuchen (§. 586—589.). Die empirische Auffassung ihrer verwaltenden Beziehungen wird uns nur dann gelingen, wenn wir die nach dem Charakter der Quantität einander zunächst stehenden Sinne vergleichen. Zur Erfahrung, in Betreff der psychischen Beziehung, rechnen wir auch den Sprachgebrauch. Die Sprache entlehnt nämlich die Bezeichnung der Geistesthätigkeiten und Gemüthszustände von den Sinnesthätigkeiten und Bewegungen, und in der Wahl dieser Vergleichen spricht sich die Vorstellungsweise der Völker von dem Zusammenhange zwischen Innem und Aeußrem aus. So finden wir denn in der Uebersicht dieser Bezeichnungen verschiedener Sprachen Thatfachen aus der Geschichte des menschlichen Geistes, welche es wohl verdienen, mit den Ergebnissen unsrer anderweitigen Forschungen zusammengestellt zu werden. Denn wenn auch die Sprachen zu einer Zeit, wo die Einsicht in die Welterscheinungen, und die Sonderung der Seelenzustände sehr unvollkommen war, sich bildeten, und im Munde der Völker mancherley zufällige Richtungen erhielten, so verkündet sich in ihnen doch auch eine Ahnung der Wahrheit, und wenn gleich kein Abwägen der Bestimmungsgründe mit hellem Bewußtseyn Statt fand, so führte doch das unbefangene Gefühl durch solches Dunkel oft sicher genug zur Wahl des Passenden und Richtigen.

§. 580. Der Fühlsinn erkennt das fremde Daseyn, insofern es eine Veränderung im Zustande unsres Körpers hervorbringt, und nach seinen allgemeinsten Eigenschaften, nach seiner Schwere, Festigkeit, Wärme, kurz, nach seiner bewegenden Kraft und nach der Expansion oder Contraction, welche diese im Organismus erregt. Die bewegende

Kraft ist die erste und elementarische Aeusserung der Materie, und der Fühl sinn, welcher den Charakter der Passivität und Subjectivität hat, steht unter den Sinnen zu unterst und macht den Uebergang vom Gemeingefühle zu denselben aus. Er giebt mehr eine Stimmung, indem er bald einen Zustand der Belebung und Rüstigkeit, bald der Trägheit und Schlafheit hervorruft, aber verschafft nur eine vage und unbestimmte Kenntniß der Objecte. So entspricht er denn der Receptivität der Seele, insofern dieselbe die Einzelheiten aufsaugt, und auf die eigne Subjectivität sich bezieht. Die allgemeine Fähigkeit, psychisch afficirt zu werden, hat gar keine andre Benennung, als die von diesem Sinne entlehnte. Wie er denn nun die allgemeine Empfänglichkeit der Seele von Seiten ihrer individuellen Subjectivität bezeichnet, so steht er in näherem Verkehr auch nur mit demjenigen Organe, welches bey der Allgemeinheit seines Baues und seines Lebens die Begrenztheit unsres Leibes, die Individualität unsres Organismus ausdrückt und die pflanzliche Wechselwirkung mit der Aussenwelt vermittelt, nämlich dem gesammten Hautorgane, und namentlich der äussern Haut.

§. 581. Der Tastsinn dagegen ist activ, durch willkührliche Bewegung vermittelt, und mischlich: Bey ihm ist das Gefühl der Lust und Unlust geringer, eine subjective Aenderung des psychischen Zustandes kaum bemerklich, und dagegen die Beziehung zur objectiven Erkenntniß überwiegend. Ganz in Selbstthätigkeit bestehend, hängt er gar nicht mit Rumpfeingeweiden, sondern nur mit Gliedmassen und Bewegungsorganen zusammen, und so wird er auch mit der psychischen Spontanität in Verbindung stehn. Sein Object ist nicht Expansion und Contraction, sondern Expandirtes und Contrahirtes, nicht die thätige, sondern die gehemmte Bewegung, das Fixirte, Begränzte; wie nun das Begränzte das eigenthümliche Geschäft des Geistes ist, so wird er diesem angehören. Da aber das Tastthare die individuelle Begrenztheit der Körper darstellt, so wird der Tastsinn der die Einzelheiten der Dinge sich unterwerfenden und beherrschenden Spontanität des Geistes, dem Vermögen, die Erscheinungen nach ihrer Besonderheit zu erkennen, entsprechen. Die Ausdrücke, die man von den Bewegungen der Gliedmassen und Tastorgane auf Seelenthätigkeiten überträgt, deuten theils auf eine Selbstthätigkeit der Seele in der Erkenntniß, welche ihres Gegenstandes sich heimetert, theils auf die Beschaffenheit eines Gegenstandes, vermöge deren er als Einzelnes und bestimmt Begränztes von allen Seiten sich erkennen, nach seinen Ursachen und Wirkungen sich übersehen, und so von der freyen Seelenthätigkeit sich behandeln läßt. Dieser Sinn liegt in dem deutschen „Fassen“ und „Begreifen“; nur das Einzelne aber können wir in seinem Ursprünge und seinen Folgen; in seinen Ursachen und Wirkungen erkennen, können wir fassen und begreifen. Aehnliches liegt in den Ausdrücken „auslaupfern“, *capere, condipere, comprehendere*. Der „Begriff“ ist die Gesammtheit der Eigenschaften eines Wesens, in einem Gedanken zusammengefaßt. „Sich fassen, *auslaupfern*“ das *lavoy, se repaier*“ heisst: seine Freyheit und Selbstthätigkeit im Andrange stürmischer Gefühle behaupten. „Intelligiren“ ist ursprünglich ein auf Unterscheiden sich stützendes freyes Auslesen. „Lapfen“ ist ursprünglich ein Sammeln und Verknüpfen, und „stellen“ (von *statu*) eine selbstthätige Bewegung im Gehen und Sammeln. Ueber etwas „stehen“, einer Sache „vorsitzen“, so wie eine Sache zu „stellen“ und mit andern in Verbindung zu setzen

vermögen, ist dem Begreifen und Innegreifen verwandt. „*Emetere*“ ursprünglich: ich stehe an oder über etwas, heißt dann: ich bin einer Sache kundig, und weiß sie zu handhaben. „*Conferre*“, ursprünglich: ich stelle zusammen, heißt dann: ich begreife, verstehe. „Verstehen“ selbst bedeutet eine Sache inne haben, ihrer Maister geworden seyn und sie zu behandeln vermögen, dann die Bedeutung eines Zeichens, sey es Rede oder Bild u. s. w., fassen und so sich der Erscheinung bemächtigen. Hatte man eine Zeitlang, dem Namen, wie der That nach, den Verstand dem gesammten Erkenntnisvermögen gleich gesetzt, so hat man ihn gegenwärtig auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückgeführt, und ihn auf den Kreis des Begreifens verwiesen, über welchen er sich nicht zu erheben vermag. — Nehmen ist eine Activität der Tastorgane, jedoch nicht ganz in gleichem Grade activ, als das Ergreifen und Fassen, sondern zum Theil mehr das Empfangen eines Gegebenen. „Vernehmen“ hieß im Deutschen anfänglich überhaupt: Eindrücke aufnehmen, wie *percepere*, und wurde für alle Sinneswahrnehmungen ohne Unterschied gebraucht. Auf das Geistige übergetragen, bezeichnet es aber, mit dem Verstehen verglichen, weniger ein selbstthätiges Erfassen, als vielmehr das Empfangen eines Gegebenen in der Erkenntniß; weniger ein deutliches Kennen des Ursprungs und Zusammenhangs, als vielmehr ein Anschauen des aus entlegenerer Quelle Hervorgegangenen. Darum war es denn auch sehr treffend, wenn sinnrige Deutsche das Vermögen der Urgedanken, die Kraft, die Wurzel alles Seyns und den letzten Grund der Erscheinungen anzuschauen, als Vernunft bezeichneten, während der Sprachgebrauch des gemeinen Lebens darunter nur die Kraft versteht, mit Bewußtseyn seiner Individualität und mit Ueberlegung der einzelnen Umstände zu erkennen, und dadurch sich zum Handeln zu bestimmen. So drückt man mit „*Benennen*“ die Art aus, wie wir unsre Individualität den gegenwärtigen einzelnen Umständen gegenüber stellen und anpassen.

§. 582. Der Geschmack ist ein potenziertes Tasten, und erkennt nicht die Acuslichkeit, sondern die Innerlichkeit der Materie, die Proportion ihrer Elemente, die Mischung, und muß vermöge seiner Activität auch der Spontaneität der Seele zugewendet seyn. Aber auf der andern Seite ist er subjectiv, faßt nicht die Mischung an sich auf, sondern die chemische Wechselwirkung mit dem Organismus: subjective Spontaneität bezeichnet aber die Sphäre des Willens. Alle Mischung ist ein Zusammentreten verschiedenartiger Stoffe nach ihrer Verwandtschaft, in bestimmten Proportionen, zu einer gemeinsamen Raumerfüllung. Der chemische Proceß ist ein Anziehen und Abstoßen, Verknüpfen und Trennen, nach den Gesetzen der Verwandtschaft zur Darstellung eines besondern Seyns: so entspricht er der Thätigkeit der Seele, welche die Verhältnisse anschaut und zu bestimmten Zwecken gestaltet. Der Geschmack ist der eigentlich wählende Sinn: er prüft die Nahrung, sofern sie zur Mischung unsres Körpers paßt, und demnach entweder völlig aufzunehmen, oder zu verwerfen ist, und giebt in seiner allgemeinen Bedeutung ein Vorbild der begehrenden Selbstthätigkeit der Seele, welche entweder unmittelbar durch die sinnlichen Eindrücke aufgeregt wird, oder auf ein Urtheil über die Verhältnisse sich gründet, und entweder auf Aneignung oder auf Abstoßung sich richtet. Daher tritt bey der heftigen Begehrung, sey sie Lüsternheit nach Speisen, oder heftiger Geschlechtstrieb, oder Zorn und Wuth, eine erhöhte Aufreizung und Thätigkeit in der Zunge, den Lippen

und den Speicheldrüsen ein; und die überwiegende Ausbildung dieser Organe ist mit starker Sinnlichkeit und Geilheit verbunden. Haendorf (Nassa Zeitschrift I. S. 294. 404.) führt Fälle an, wo die von nicht befriedigter sehnüchlicher Begehrung entstandene Schwermuth durch einen von selbst entstandenen Speichelfluß gehoben wurde. — Die vom Geschmacksinne hergenommenen Bezeichnungen für Seelenthätigkeiten bedeuten 1) ein Erfahren, oder ein Erkennen, welches zugleich unsere Persönlichkeit berührt, vorzüglich auf eine angenehme Weise, also ein Genießen. So gebraucht der Griechen *γευσθαι*, der Letziner *gustare*, der Deutsche „Schmecken“ und vormalig „Koren“ der Pole *kosować*. 2) Sie drücken eine Beurtheilung der Verhältnisse und eine durch das Urtheil bestimmte Wahl aus. „Sapere“ bezeichnet nicht sowohl die Weisheit, welche sich auf den letzten Grund der Dinge bezieht, als vielmehr die Schätzung derselben nach ihrem wahren Werthe, die Lebensweisheit. Die altheutschen Wörter „Koren“ und „Kiesen“ bedeuten sowohl Schmecken, als Wählen. Da das Schmecken als Erfahren vorzüglich auf das Angenehme sich bezieht, so haben es die neuern Sprachen gewählt, um damit die Beurtheilungskraft in Beziehung auf das Schöne, das Erkennen der Verhältnisse, so fern sie zu einem ästhetischen Ganzen sich eignen, zu bezeichnen: so „Geschmack“ im Deutschen, und „оцѣна“ im Russischen. 3) Dieselben Ausdrücke heißen endlich so viel, als mit Aufmerksamkeit und Selbstthätigkeit einen Gegenstand auffassen, um ihn darnach beurtheilen zu können; so heißt das griechische *γευσθαι*, das deutsche „Kosten“, das russische „опробовать“, das polnische „próbować“, soviel als versuchen; „Kiesen“ und „Koren“ etwas prüfen, worauf achten. — Der Geschmack ist zunächst der Verdauung beygegeben, und die Perception der Wassersersetzung, welche den Anfang der Verdauung begleitet. In seinem Organe erkennen wir daher auch eine Potenzierung der Verdauungsorgane; die Zunge ist eine Duplicität der Schleimhaut des Verdauungssystems, welche statt der plastischen Muskeln willkürliche in sich aufgenommen, und die Zotten in Würzchen, d. h. die mit Nerven versehenen Vorrägen der Gefäße in mit Gefäßen versehene Vorrägen der Nerven verwandelt hat; die Speicheldrüsen entsprechen dem Pankreas; und die Mundhöhle mit ihrer Gaumendecke, ihrem muskulösen Boden und ihren theils knöchernen, theils muskulösen Seitenwänden erscheint als der Bauch des Kopfes. — Die Geschlechtsfunctionen stehen mit allen Sinnesthätigkeiten in Verkehr. Der Geschlechtstrieb kann durch jeden Sinn hervorgerufen werden, wie er dann namentlich bey dem einen Thiere mehr durch den Ruf, bey dem andern mehr durch den Geruch geweckt wird; so sucht er dann auch seines Gegenstandes mit allen Sinnen sich zu bemächtigen, und verkündigt sich im Auge, insofern dies überall den innern Zustand am klärten ausdrückt. Specifisch scheint aber nur seine Verbindung mit dem Geschmacksinne zu seyn. Eine starke Entwicklung der Lippen und der Zunge ist meist mit starkem Geschlechtstribe verbunden, und die Spaltung der Zunge oder die knorpelige Anlage an ihrer Wurzel kommt, wie Bnamoser (a. a. O. S. 86.) bemerkt, gleichzeitig mit Spaltung oder Knochen des Zeugungsgliedes und der Clitoris vor. Bey der Begierde sind die Speicheldrüsen in einem Zustande des Eruthismus, und dadurch bald Trockenheit des Mundes, bald ein öfters Verschlucken des Speichels nöthig; brünstige Thiere speicheln stark. Bey Onanisten und andern Wollüstigen ist anfangs die Speichelschön-

rung vermehrt, im Zustande der Erschöpfung vermindert: Bey der Menstruation entsteht zuweilen ein vermehrter Speichelfluss in Form eines Katarrhs (Haindorf in Nasse's Zeitschrift I. S. 405.). Die Syphilis wandert von den Geschlechtstheilen zuerst zum Rachen, und die Entzündung der Speicheldrüsen erregt häufig eine Entzündung der Hoden.

§. 583. Der Geruch ist gleich dem Geschmacke ein chemischer, subjectiver, thei- rische Lust und Unlust weckender Sinn. Aber er ist dabey passiv, die gegen sein Orga- anströmenden Dünste aufnehmend, und so der Receptivität der Seele verwandt. Der Duft, durch das Entweichen der Stoffe aus concreten Körpern in das gemeinschaftliche Medium der Luft gegeben, stellt die Einzelheit in der Allgemeinheit dar, und zeich- net sich dadurch aus, daß er allen andern Sinnen unerkennbar ist; ein unsichtbarer Bote, welchen die Körper ihrer Annäherung voraus senden, und welcher jeder weitere Unters- suchung sich entzieht. Unwillkürlich erkennt so der Geruch das Dunkle aus der Ferne; seine Erkenntniß bleibt dunkel, und verursacht eine unbestimmte Aufregung der Phantasie. Da- bey wirkt er, unabhängig von der Erkenntniß, am mächtigsten auf die Gesamtheit des pflanzlichen Hirnlebens ein. In dem Allen finden wir das Vorbild der Ahnung, und die Beziehung zu dem durch dieselbe bestimmten Instincte. Daher ist der Geruch und sein Centralpunct im Gehirne bey den Thieren stärker entwickelt, als bey dem Menschen; er weckt bey ihnen den Nahrungstrieb, und die Geschlechtslust, und leitet sie auf ihren Wanderungen. So gebraucht auch die Sprache vom Geruche entlehnte Ausdrücke für das kennen des Dunkeln, noch Verborgenen das deutsche „Riechen“ und „Wittern“, d. i. das Duftige, das Wetter wahrnehmen, das lateinische „olfacere“ und „odorari“, das polnische „węcham“ das russische „moxam“ bedeutet „Anspüren, Eindringen in ein Geheim- nes. Die „feine Nase“, so wie der „*homo emunctae naris*“ drückt die Schlaubeit und Verschlä- genheit aus. Unser „Ahnung“ scheint von dem alten nordischen „*anda*“, Athem und Geist; abzustammen; welches mit dem griechischen „*aeer*“ verwandt ist. Wie die Ahnung theils für Erkenntniß wirkt, theils den Willen bestimmt; so steht auch der Ge- ruch in Beziehung zu den Rumpfforganen, deren Leben mit der geistigen und mit der wollenden Kraft näher verwandt sind. Er ist der Luftsin, und daher auch im Ganzen genommen in demselben Maasse entwickelt, als die Beziehung zur Luft stärker ist. Sein Organ ist Köpflange, und zeigt in seiner schwammigen aufgelockerten Substanz, in seiner zelligen und blasigen Structur seine Uebereinstimmung mit den Lungen. In den Cetaceen ist das Säugethier zum Wasserthiere geworden, und wie das Herabsteigen aus einer höhern Sphäre in eine niedere selbst ein Fallen unterhalb dieser mit sich führt, so sind sie auch in Hinsicht auf den Luftsin tiefer als die Fische gesunken, indem ihnen der Riechnerve und die Nasenhöhle fehlt. Ihre Sprützröcke bezeichnen die Mittelstufe zwi- schen Wasserathmung und Luftperception: sie erscheinen als hervorgetriebene, häufig knorpelige Nasenmuscheln, aber haben dabey Aehnlichkeit mit Kiemen. Die Knorpel- streifen, an welche ihre zusammengefaltete, mit schwärzlichem Pigment bedeckte Haut angeheftet ist, sind den Kiemenbogen analog; das Ausstrützen des Wassers ist nichts Andres, als das Bransen und Schnauben der Luftthiere, tritt theils bey erhöhtem Lebens- gefühle und gesteigerter Athmung, theils bey sinkender Lebenskraft und erschwertem Athmen ein, und wird durch den fünften Hirnnerven, als einen Ausathmungsnerven (§. 298.) vermittelt. — Der Geruch steht in der innigsten Verbindung mit dem Ge-

schmacke, so daß er denselben bedingt und den Nahrungstrieb bestimmt, wie denn die Gerüche bald Ekstase erregen, bald Uebelkeit und Erbrechen hervorbringen können.

§. 584. Das Gehör als ein höherer, dynamischer Sinn kann nur mit dem Gesichte verglichen werden. In dieser Parallele es erscheint als passiv und als bezogen auf die Subjectivität, auf die von aussen her bestimmte Innerlichkeit, also auf das Gefühl, wie es denn auch mit dem Fühlen zusammenhängt (§. 583.). Bey dem Hören wird der Organismus selbst erschüttert, gerührt, bewegt; wie der Schall auf innerlicher Bewegung beruht, so setzt er auch das Innerliche des Organismus in Bewegung; und wirkt mehr subjectiv, während das Auge die Dinge ausser einander erkennt und mehr die Objectivität auffaßt. Ein starker Schall erschüttert an sich die Seele, setzt in Schrecken, ob eine bestimmte Vorstellung sich bilden kann; das Sichtbare hingegen erschreckt nur vermöge der Vorstellungen, welche es erregt. Auch der Physiker erhebt mehr beym Donner, als beym Blitze, wenn er gleich weiß, daß der Donner nur der Nachhall der schon vorübergegangenen Gefahr ist. Daher deutet auch die Beweglichkeit des Ohrs, bey Thieren auf Furchtsamkeit, Besorglichkeit, Vorsicht. So scharf auch die Töne in ihrer Eigenthümlichkeit aufgefaßt werden, so erkennt doch das Gehör sie nur als die gegebene Wirkung, deren Ursache ihm ewig fremd bleibt, während das Gesicht die Bewegung als das Ursachliche unmittelbar anschaut. Wie das Hörgen dunkel und verborgen ist, so bewirkt auch das Gehör nur eine dunkle Erkenntnis und mehr Affection der Subjectivität: gewisse Töne erregen an sich eine besondre Stimmung der Seele, eine Gemüths-bewegung, aus welcher sich erst in der Folge bestimmte Vorstellungen entwickeln, während bey dem Sehen die Gemüths-bewegung bloß durch Vorstellungen hervorgerufen wird. So erregt die Musik bloß allgemeine, dunkle Gefühle, bey welchen entweder gar nichts gedacht wird, oder bey welchen Jeder nach seiner Individualität ein Andres sich denken kann; die Objectivität, welche beym Sehen vorwaltet und in bestimmten Vorstellungen sich ausspricht, tritt hier zurück. Um so tiefer greift aber das Hörbare in das Gemüth ein, und daher wirkt vor Allem mächtig das lebendige Wort. Die Rede giebt allerdings unmittelbar die bestimmtesten Vorstellungen; aber sie ist doch ihrem Wesen nach nur ein Symbol, welches wir erst zu deuten haben, und theilt uns die Erkenntnis mit, wie sie sich in andern Individuen gestaltet hat. Das Auge erfafst selbstthätig die Wahrheit des Daseyns; das Ohr empfängt passiv das Menschenwerk, Wahrheit mit Trug, Weisheit mit Thorheit gemischt. Insofern wir Glieder des Menschengeschlechts sind, mit andern Individuen in Wechselwirkung stehen, ihre Erfahrungen, Ansichten und Gedanken uns anzuzeigen haben, hat das Gehör den höchsten Werth für uns; insofern wir dagegen Glieder des Weltalls sind, selbstständig uns zu bewegen, und durch eigene Kraft die Schöpfung und ihren Grund zu erforschen haben, ist das Licht des Auges unser edelster Besitz. Das Gehör ist der Nachtsehn, der nur das Irdische erkennt, und wenn das Höhere zu ihm tritt, es doch nur durch ein Irdisches Medium empfängt; das Gesicht ist der Tagesehn, welcher die Himmelskörper, und durch sie erst die irdischen Gestalten, aber durch die Beziehung auf das Ganze auch in ihrem vollsten Seyn erblickt. Der Taube ist gelähmt für das gesellige Leben, der Blinde für das Leben in der Natur; Jener, der den passiven Sinn verloren hat, behauptet seine Selbstständigkeit

und Freyheit, findet sich nur isolirt gegen die Menschheit, und wird geneigt zum Argwohn und zu einer gewissen Härte des Gemüths; Dieser, der des activen Sinnes ermangelt, wird durch den Verlust seines freyen Verkehrs mit der Schöpfung zur Schwermuth geneigt, welche durch das Gefühl seiner steten Abhängigkeit von Menschen mit einem milden Sinne und einer weichen Gemüthsart gepaart zu werden pflegt. — Durch das Gehör wird besonders das sympathetische Gefühl, das Mitleiden erregt: standhaft sehen wir es an, wie ein Thier, welches wir lebendig zergliedern, hinter den Qualen sich sträubt und windet; fängt es aber an zu wimmern, so kann nur das rege wissenschaftliche Interesse uns abhalten, das Messer wegzurufen und der Qual durch einen schnellen Tod ein Ende zu machen. In dem Augenblicke, wo wir durch einen Schall erschreckt werden, ändert sich auch der Schlag unsres Herzens; dieses Reboanzhodens des Gefühls. Bey Taubstummen ist die Empfindlichkeit des Körpers gewöhnlich gering; sie werden meist von Arzneymitteln wenig angegriffen und halten Operationen, z. B. das Brennen mit der Moxa, mit großer Gleichgültigkeit aus. Vorzüglich aber fehlt es ihnen an Zartheit und Innigkeit des Gefühls; nach Itards Schilderung sind sie im Ganzen genommen egoistisch, fühllos, ohne Mitleiden; einer innigen Freundschaft, einer geistigen Liebe; einer lebhaften Dankbarkeit unfähig. — Das Gehör steht in Beziehung zum Athmen: die Schnecke ist das Percptionsorgan für die Schwingungen der aus den Athmungsorganen durch die Eustachische Röhre in die Trommelhöhle geführten Luft, und noch bey den Fischen verbindet sich das Labyrinth durch häutige Canäle oder durch Gehörknochen mit dem Luftorgane, der Schwimmblase. Auf der andern Seite ist der Zusammenhang des Gehörs mit der Stimme, als der psychischen Activität der Luftathmungsorgane offenbar: wo kein Gehör ist, fehlt auch die Stimme; diese ist Reactivität, Jenes Receptivität; sie bildet nach, was Jenes aufgenommen hatte. — Am innigsten hängt aber das Gehör mit dem Blute, und mit dem Repräsentanten des Gefühls im Rumpfe, dem Herzen, zusammen. Das Schläfessein giebt die Oeffnungen für die Carotis und für die Jugularvene; und das Gehör leidet sehr bey blutigen Ergießungen in die Schädelhöhle, wenig bey serösen. Es wird ferner durch allgemeine Störung des Kreislaufs, wie schon Ennemoser (Nasse Zeitschrift 1821. 3. Heft 8. u. 9.) bemerkt, mehr als irgend ein andrer Sinn afficirt; Klängen und Sausen der Ohren ist bey eintretenden Ohnmachten, bey Herzpochen und bey heftigen Fieberbewegungen ein gewöhnliches Symptom. Abercrombie (S. 145.) erzählt, daß ein Mann, welcher an großer Schwäche litt und taub geworden war, gut hörte, so lange er sich bückte oder mit dem Kopfe tiefer lag und davon sein Gesicht roth war. — Wie nun dies Alles auf die Beziehung dieses Sinnes zum Gefühle hindeutet, so ist es denn auch keinesweges zufällig; sondern von tieferer Bedeutung, daß keine Sprache Bezeichnungen für das wirkliche Erkennen vom Gehöre entlehnt. Selbst das active Auffassen des Hörbaren nach seinem Klange und seiner Bedeutung bezeichnen wir als „Vernehmen“ und „Verstehen“; also durch Ausdrücke, welche von Gliederbewegungen hergenommen sind. Dagegen deuten die vom Gehör entnommenen Bezeichnungen von Seelenthätigkeiten sämmtlich auf ein Bestimmwerden des Gemüths hin, welches bald als Gewähren und Nachgeben, als gerührt und geneigt werden; bald als dem Geheiß Folge leisten sich darstellt. Dieser Sinn liegt im Griechi-

Lichtausdrucks in verschiedenen Redensarten bald Forschen, bald Erkennen, bald Urtheilen, bald Schließen. „*Perceptio*“ drückt ein deutliches Erkennen aus. Das Wort „Sinn“ selbst ist vom Sehen abgeleitet, und bedeutet nicht bloß des Auffassens äusserer Eindrücke, sondern auch die innere, eigenthümliche Thätigkeit der Seele: Bewußtseyn, Verstand, Urtheilskraft, Weisheit, Geist; Willen, Kunst und Seele überhaupt, so wie andrerseits das innere Wesen und die Bedeutung der äussern Erscheinungen. — „Ansicht“ bezeichnet den besondern Standpunkt, welchen der Geist in der Erkenntniß eines Gegenstandes sich wählt; „Einsicht“ hingegen ist die tiefere Erkenntniß und richtigere Beurtheilung des Zusammenhanges der Dinge. — Unsere Sprache unterscheidet die Klarheit und das Licht: Jene bezieht sich auf das Verhältniß der Dinge, Dieses auf die Wesenheit; Jene gehört in das Gebiet des Verstandes, Dieses fällt der Vernunft anheim. So verstehen wir unter „Aufklärung“ die Berichtigung der Begriffe und Urtheile, unter „Erleuchtung“ hingegen das Aufgehen einer tiefern Erkenntniß der höchsten Angelegenheiten der Menschheit. „Theorie“ und „Speculation“ ist ursprünglich ein Herabsehen von der Höhe, „*Empiris*“ und „*speculari*“ „Schauen“ scheint ursprünglich ein gesteigertes, schärferes Sehen zu bezeichnen, wie es denn die ältesten Schriftsteller für Forschen gebrauchten. Daher wird in unsern Zeiten durch „Anschauung“ theils das unmittelbare Vorstellen ohne vermittelnde Zeichen, theils das Inwerden des Höchsten im Geiste, das Bewußtseyn des Urfänglichen richtig bezeichnet. Wie unser Blick erreicht, was dem Gesteht ewig sich entzieht, wie er durch das irdische Medium zu den Himmelskörpern dringt, so schauen wir das Unbegreifliche an. — Die offenbare Beziehung des Gesichts zur geistigen Thätigkeit zeigt sich auch in der Theilnahme des Auges am Denken: die Empfindung, welche wir bey scharfem Nachdenken im untern Theile der Stirne heben, beruht zum Theil auf einer Spannung der Augenmuskeln, und hört auf, wenn wir das Auge mit der Hand schließen und fest halten. Am deutlichsten zeigt sich dieses Verhältniß bey dem Blinden; wenn er geistig beschäftigt ist, z. B. einen Vortrag hält, so gerathen seine Augen in lebhafte Bewegungen und rollen umher. — Wie endlich die Verdenkung mit der Denkraft in Beziehung steht, so äussert sie auch zu keinem andern Sinne einen so auffallenden Consensus, als zum Gesichte. Während der Magenverdenkung ist das Gesicht minder scharf; bey Uebelkeit entsteht Flimmern und Dunkelheit vor den Augen; die Entzündung und andre Krankheiten der Augen beruhen oft auf gastrischer Abnormität, oder werden doch durch die gastrische Heilmethode gehoben; die Anhäufung von Schleim und Würmern in den Verdauungsorganen bringt häufig Krämpfe der Augenmuskeln, Schielen, Doppeltsehen, Erweiterung der Pupille, Augentzündung und schwarzen Star hervor; Depression der Linse erregt zuweilen Uebelkeit und Erbrechen u. s. w. — Insofern das Gesicht ein activer, mimischer, und dabey der höchste Sinn ist, wird die ihm beygegebene Thränendrüse die Verkündigerin des Gemüths, wenn es am innigsten ergriffen ist. Daß das Auge durch Ausschweifungen in der Geschlechtslust vorzüglich geschwächt wird, scheint bloß auf einem allgemeinen Verhältnisse, auf der Sensibilität überhaupt angreifenden Wirkung der Wollust, und auf der höchsten Entwicklung der Sensibilität im Auge zu beruhen.

§. 586. Nach ihrer Verknüpfung unter einander und mit den sensibeln Centralpunkten beurtheilt, ordnen sich die Sinne in drey verschiedne Sphären, deren jede aus zwey Gliedern, einem niedern und einem höhern, einem activen und einem passiven, einem Raum- und einem Zeitsinne besteht. Jedes Sinnesorgan aber steht mit verschiedenen Abtheilungen des Centralorgans in Verbindung.

§. 587. Die unterste Sphäre begreift den Fühlsinn und den Tastsinn in sich. Beyde haben mit einander gemein sowohl das peripherische Gehörde, in welchem sie wirken, nämlich die Haut, als auch das Centralorgan ihrer Nerven, nämlich das Rückenmark bis zum Brückenhirnstamme. Der Fühlsinn hat seinen Sitz in allen den Punkten des Organismus, welche der Aussenwelt offen stehn und mit fremden Stoffen in Berührung treten: er zeigt sich also zuerst in den Schleimbäuten, wo er mehr an das Gemeingegefühl gränzt, und erreicht seine höhere Entwicklung in der äussern Haut. Der Tastsinn dagegen tritt in seiner unvollkommenen Form in der Haut überhaupt auf, concentrirt sich aber bey seiner weitern Ausbildung in besonders organisirten und unter dem Einflusse der freystehenden Irritabilität stehenden Stellen an den Endspitzen der Extremitäten. Während er im Thierreiche bald auf die Bauchglieder, bald auf die Brustglieder, bald wieder auf die Kopfglieder (Lippen, Nase, Zungenspitze) gepflanzt ist, nimmt er bey dem Menschen vorzugsweise die mittlere Stelle ein, ohne jedoch an den Bauch- und Kopfgliedern gänzlich zu mangeln. — Was aber die Centralpunkte selbst so sehen wir, daß der Fühlsinn in den Theilen der Schleimbäute, welche bloß Rumpfnerven haben, nur schwach und dunkel ist, dagegen an den Endpunkten derselben, wo Hirn- und Rückenmarksnerven hinzutreten, so wie in der Haut vollkommen entwickelt ist, und wir schließen daraus, daß der Rumpfnerv eigentlich nur Gemeingegefühl vermittelt, der Fühlsinn aber von den untersten Rückenmarksnerven an bis zum fünften Hirnnerven herauf, also durch das ganze Rückenmark herauf bis zum Brückenhirnstamme seinen Bereich findet. Die Tastorgane des Kopfs bey Thieren (Schnauze, Rüssel, Schnabel, Barthare, Cirrhen) bekommen, so wie die Lippen, Zühne, Nase und Zungenspitze immer Zweige vom fünften Hirnnerven; dieser scheint also der eigentliche Kopfnerv zu seyn, während der Antlitznerv mehr untergeordnet, aber, insofern das Tasten durch willkührliche Bewegung vermittelt wird, auch dabey thätig ist. Der eigentliche Tastnerv der Finger ist der Medianus, zu welchem noch der oberflächliche Handtellersweig des Ellenbogenerven tritt. Der Tastnerv der Zehen ist vorzüglich der innre, weniger der äussere Fußsohlenweig des Schienbeinerven. Somit sind denn die Centralpunkte des Tastsinns 1) die obere Hälfte der Beckenportion und der untre Theil der Bauchportion des Rückenmarks; 2) das obere Ende des Brusttheils und die untre Hälfte des Halsheils desselben; 3) das obere Ende des verlängerten Marks und die untre Hälfte des Brückenhirnstamms. Wir sehen also, daß die Centralpunkte dieses Sinns allemal da sind, wo zwey Abtheilungen des Centralorgans an einander gränzen; indem er auf beyde sich bezieht. Ferner hat im Ganzen genommen die obere Abtheilung immer mehr Antheil an den Tastnerven, als die untre, und dies Verhältniß nimmt von den Bauchastorganen bis zu den Kopfastorganen fortschreitend zu: der Hüftnerv bildet sich aus Zweigen dreier Kreuzbeinerven, aber aus dem ganzen fünften Lendenerven und aus Zweigen des vierten; der Medianus dagegen bloß aus einem

Brustnerven und aus vier Halsnerven; der Antlitznerv endlich, als der untere Tastnerv des Kopfs wirkt nur als Beynerve zu dem obern oder dem fünften Nervenpaare. — Als die niedrigsten Sinne in sich schließend, bildet diese Sphäre den stärksten Gegensatz zu den beyden höchsten Sinnen. Sie ist der Keim und das Vorbild von diesen, vervollständigt deren Erkenntniß, und ersetzt ihre mangelnde Thätigkeit, und zwar so, daß der Fühlsinn dem Gehöre, der Tastsinn dem Gesichte entspricht. Der Taube erfährt den Schall, insofern dieser auf irgend einem Punkte seiner Oberfläche eine Erschütterung hervorbringt; der Blinde erkennt die räumlichen Verhältnisse durch Tasten. Das Hören ist ein Fühlen der innerlichen Bewegungen der Körper durch das Ohr; das Sehen ist ein Tasten in der Ferné, im lichterfüllten Raume. Also die activen Sinne der niedrigsten und der höchsten Sphäre sind einander verwandt; so wie die passiven Sinne ihrerseits. So hat diese unterste Sphäre auch ein ähnliches Verhältniß zu den auf der mittleren Stufe stehenden Sinnen: das Riechen ist mehr ein Fühlen, das Schmecken mehr ein Tasten. Die Erkenntniß, welche durch den Tastsinn vermittelt wird, ist gerade die sicherste; den subjectiven Täuschungen am wenigsten unterworfen, weil hier das Räumliche selbst dem Organismus entgegen tritt und Masse gegen Masse wirkt; aber zugleich ist sie die langsamste und einsichtigste, indem sie immer nur auf eine kleine Fläche sich bezieht, nur allmählig von Punkt zu Punkt fortschreitet und bloß die mechanische Aussenseite der Körper erfasst. — Vergleichen wir nun die beyden untersten Sinne mit einander, um das, was ihnen gemeinschaftlich ist, zu finden, so erscheint uns diese Sphäre als die Erkenntniß der Einzelheit der Dinge. Sie faßt in der Zeit den gegenwärtigen Augenblick (§. 578, e), im Raume die einzelnen Punkte der Oberfläche, die Vielheit, die Vereinzelung auf. Der niedere, passive Sinn vermittelt die Erkenntniß im Gefühle, der höhere, active die im Geiste.

§. 588. In der zweyten Sphäre stehen Geschmack und Gehör beysammen. Beyde Sinnesorgane haben die Centralenden ihrer Nerven im Bereiche des kleinen Hirns, und zwar das des Geschmacksinnes vom untern Theile des verlängerten Marks bis zur untern Hälfte des Brückenhirnstamms, das des Gehörs aber vom obern Theile des verlängerten Marks bis zur untern Hälfte des Brückenhirnstamms. Denn der eigentliche Geschmacksnerv ist ein Zweig des fünften Paares; ihm gesellt sich der neunte Hirnnerv hey, welcher auch zu Wurzeln der Zunge geht; der zwölfte Nerve mit ihnen genau verbunden, wirkt durch die Bewegungen, welche er erregt, mit für die Geschmacksempfindung; eine untergeordnete Stelle nimmt der siebente Nerve ein, insofern er Zweige an die Parotis und an die Lippen giebt. Der Hörnerv geht allein zur eigentlich sensitiven Sphäre des Ohrs, aber die Zweige vom fünften, siebenten und neunten Paare, welche zur Trommelhöhle, zur Eustachischen Röhre, zum Gehörgange und zum äußern Ohre gehn, vermitteln die Perception und bereiten sie vor. — Auch die peripetischen Organe sind unter einander verbunden: die Paukencapsel verknüpft die Trommelhöhle mit der Zunge, so wie die Eustachische Röhre dieselbe mit dem Rachen in Verbindung setzt; auch ist die räumliche Nähe des Kiefergelenks und der Parotis am äußern Ohre nicht ohne Einfluß auf dessen Thätigkeit. — Der Geschmack ist ein activer, räumlicher, das Gehör ein passiver, zeitlicher Sinn. Aber dieser Gegensatz wird modificirt durch den gleichzeitigen

Gegensatz in der Stufenfolge: der Geschmack ist ein chemischer, subjectiver Sinn, das Gehör ein dynamischer und in Vergleich zu jenem objectiver Sinn. Der active Sinn ist hier ein niederer, der passive ein höherer; der niedere steht in unmittelbarer Verbindung mit der Verdauung, der höhere mit dem Athmen. — Die zweyte Sphäre bezeichnet sich dadurch, daß sie die innern Verhältnisse und Momente an den einzelnen Wesen, den Wechsel und die Wechselwirkung erkennt. Die Schmackhaftigkeit beruht auf den Bestandtheilen eines Körpers, sofern sie einen gemeinschaftlichen Raum einnehmen, also nicht äusserlich als getrennt erscheinen; der Schall aber besteht in innerlichen Bewegungen bey äusserlicher Ruhe, oder in Veränderung des Verhältnisses der Theile unter einander. Dort ist die Proportion der Stoffe das Bestimmende, hier die Proportion der Bewegungen. In beyden Sinnen und ihren Objecten ist Wechselwirkung und Kampf: bey'm Geschmacks erfolgt eine Schmelzung und Zersetzung, und die schmeckende Fläche tritt in einen chemischen Conflict mit der zu schmeckenden Substanz; der Schall aber ist ein Wechsel der Expansion und Contraction, welcher dem Gehörgange sich mittheilt und vermöge dieser Fortpflanzung gehört wird. So werden denn diese Sinne derjenigen Seite der Seele entsprechen, welche das Verhältniß der Dinge unter einander auffaßt. Das Gehör faßt als passiver Sinn im Gefühl; aber da es der höchste unter den passiven Sinnen ist, und das Wesen des Gefühls ganz eigentlich auf Erkenntniß der Beziehungen, der Qualität beruht, so ist es dem höhern und innersten Gefühle verwandt. Der Geschmack besteht sich als activer Sinn auf Spontaneität der Seele, aber auf subjectiver Spontaneität, da er selbst das Gepräge der Subjectivität trägt, also auf die Begehrung. Im Ganzen überwiegt in dieser Sphäre die Gemüthsthatigkeit, die Subjectivität der Seele. Die Receptivität, das Gefühl, ist das Herrschende, und das Wollen das Untergeordnete, während in der untern Sphäre das Gefühl niedriger und die Spontaneität höher steht.

§. 589. Die dritte Sphäre begreift Gesicht und Geruch. Beyde gehören dem großen Hirne wesentlich an. Das Auge hat in seiner sensibeln Sphäre den zweyten Hirnnerven; in seinem Gefäßkreise Zweige vom dritten und fünften Paare, als unmittelbare Hülfsnerven der Sensation; in seinen Richtungs- und Oeffnungsmuskeln das vierte und sechste mit den übrigen Zweigen des dritten, so wie in seiner Hautbekleidung und dem beygegebenen Thränensysteme Zweige des fünften als mittelbare Hülfsnerven; endlich in seinem Schließmuskeln Zweige vom fünften und siebenten Paare: die Centralpunkte dieses Organs erstrecken sich demnach vom obersten Theile des verlängerten Marks bis zur Mitte des Großhirnstammes. Das Riechorgan empfangt das erste Nervenpaar mit Zweigen von den zwey ersten Aesten des fünften Paares; die äussere Nase hat Zweige vom fünften und siebenten Paare: der Bereich dieses Sinnes geht also vom obersten Theile des verlängerten Marks bis zum vordern Ende des Großhirnstammes. — Eine peripherische Verknüpfung beyder Organe wird bewirkt theils durch den Nasenblindungsnerven, theils durch die Thränenwege. — Hier ist wieder ein höherer, dynamischer, objectiver Sinn mit einem niedern, plastischen, subjectiven Sinne verbunden, wie in der mittlern Sphäre, aber der höhere ist activ, der niedere passiv. Auch diese Sphäre hängt ferner, wie die mittlere, mit den beyden Grundfunctionen der Bildung zusammen, aber in umgekehrtem Verhältnisse: die directe Beziehung des niedern Sinnes, des Geruchs, ist auf das

Athmen gerichtet; die consensuelle des höhern, des Geichts, auf die Verdauung. — Beide Sinne haben das mit einander gemein, daß sie in den allgemeinen Elementen, Luft und Licht sich bewegen. Während es keine allgemeine, sondern nur in vielfältigen besondern Formen und getrennten Räumen erscheinende Erde giebt, auch das Wasser noch keine höhere Einheit und Allgemeinheit erreicht, ist die Luft ein ununterbrochenes Continuum, welches den Erdkörper als ein Ganzes umgiebt, alle Theile desselben unter einander verknüpft, ihn durch unmittelbaren Uebergang in den allgemeinen Weltraum mit dem Weltganzen in Verbindung setzt, und überall dieselben Bestandtheile, Proportionen und Eigenschaften besitzt. So ist das Licht ein noch allgemeineres Band, indem es auch die Himmelskörper in Verbindung bringt, aber von den centralen Himmelskörpern selbst ausgeht, und überall nicht bloß als dasselbe, sondern auch als das Einzige, Ungetheilte sich erweist. Was wir in Luft und Licht erkennen, das erkennen wir in seiner Beziehung zum Ganzen. Der Geruchsinne entspricht der niedern, subjectiven, passiven Erkenntniß im Ganzen, also der Ahnung; der Gesichtssinn ist der activen Erkenntniß im Ganzen, der Intelligenz verwandt, welche auf Einheit und Quantität gerichtet ist, und ist das Vorherrschende in dieser Sphäre. Hier ist also, wie in der untersten Sphäre (§. 587.), die geistige Spontaneität vorwaltend, nur in der Richtung auf das Ganze, und auf die Einheit, während dort in der Richtung auf die Einzelheiten und die Vielheit; nur in der mittlern Sphäre walitet die Beziehung, das Wechselverhältniß und das Gefühl vor. Die Ahnung gehört zur receptiven Seite des Geistes, welche wir als Sinn bezeichnen; und da sie sowohl am frühesten, in niederer Form auftritt, als auch zum höchsten sich erhebt, so können wir sie als Repräsentanten des Sinnes überhaupt betrachten.

§. 590. So weit es möglich ist, die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen tabellarisch auszudrücken, stellen wir sie in Folgendem zusammen:

	Rückenmarksinne.		Kleinhirnsinne.		Großhirnsinne.	
	Fühlen.	Testen.	Gebühren.	Geschmacksin.	Gesichtsin.	Geruchsin.
Hauptfachlicher Centralpunkt.			Vorfingertes Mark.	Rückenmarksinne.	Mitte des Großhirnsinns.	Vordere Ende des Großhirnsinns.
Qualität	(dynamisch) mechanisch.	mechanisch.	(mechanisch) dynamisch.	chemisch.	(dynamisch) chemisch.	dynamisch.
Passivität und Activität	passiv.	activ.	passiv.	activ.	activ.	passiv.
Beziehung auf physisches Handeln und Mithen.	physisch.	mithen.	physisch.	mithen.	mithen.	physisch.
Directe Verbindung mit	Plasticität.	Instabilität.	Athmen.	Verdauung.		Athmen.
Consensuelle Verbindung mit			Hernschlag.	Geschlechtsfunction.	Verdauung.	Verdauung.
Raum und Zeit	Zeit.	Raum.	Zeit.	Raum.	Raum.	Zeit.
Richtungen des Bewusstseins und Zeitlichen.	Gegenwart.	Vielheit.	Vergangenheit.	Wechselwirkung.	Einheit.	Zukunft.
Psychische Beziehung	Gefühl.	Intelligenz.	Gefühl.	Wille.	Intelligenz.	Sinn.
Psychischer Charakter	Einzelheit.		Verhältniß.		Ganzes.	

b) Bewegung.

§. 591. Die Bewegung überhaupt ist die äussere Verkündigung innerer Kraft, das Hervortreten des Zeitlichen im Räumlichen. Somit kann denn auch die Seele sich nicht anders offenbaren als durch Bewegung, und das Muskelsystem wird das Organ der nach aussen hervortretenden Seelenkraft. Die Muskelthätigkeit ist demnach der Egestion zu vergleichen, wie denn auch die ersten Gliedmaassen bey den Seeigeln aus Röhren bestehen, in welche ein Saft herangetrieben wird. Während die Sinnesorgane einen polaren Gegensatz des Analogen gegen das Gehirn darstellen, bilden die Muskeln den Gegensatz des Fremdartigen; nach aussen wirkend, im räumlichen Leben befangen, die peripherische Seite des thierischen Lebens darstellend, und somit auch die pflanzlichen Eingeweide wie eine Rinde sich ausbreitend, sind sie dem Gehirn am meisten heterogen, ohne Zusammenhang unter einander, und am meisten abhängig und dienend.

§. 592. Die Bewegung erscheint zunächst als der Reflex des pflanzlichen Hirnlebens: der von der Peripherie ausgehenden Einwirkung entspricht eine Reaction, welche durch die vermittelnden Nerven gegen die Peripherie sich richtet und als Bewegung hervortritt. Sie wird also durch den Zustand des Peripherischen, durch den Zustand des Gehirns und durch die Wechselwirkung beyder bestimmt. Daher zieht denn die Abnormität des Gehirns Abnormitäten der Bewegung nach sich (§. 340. fgg.). Der Magen, die Lungen u. s. w. wirken durch ihre Nerven auf das Hirnleben ein, und die Rückwirkung desselben bringt die unwillkürlichen, pflanzlichen Bewegungen der Verdauung, des Athmens u. s. w. hervor. Wenn die Lebendigkeit der willkürlichen Muskeln oder des Gehirns gesteigert, also die Spannung zwischen Peripherie und Centrum verstärkt ist, so treten Bewegungen hervor, die bloß um der Bewegung willen entstehen und keinen andern Zweck haben, als die Spannung zu lösen und eine Indifferenz, eine Ausgleichung herbeizuführen. Die vorhandene Spannung giebt sich dem Gefühle kund, und dieses weckt den Trieb: Gefühl und Trieb sind also hier Durchgangspuncte des pflanzlichen Hirnlebens durch die Seele. So treten denn die zwecklosen, scheinbar willkürlichen Bewegungen hervor, welche um so häufiger sind, je aufgeregter der innere Zustand, das pflanzliche Hirnleben oder das Gemüth ist.

§. 593. Auf Eindrücke des Gemeingefühls wirkt das pflanzliche Hirnleben mittels der willkürlichen Muskeln ohne Willkür zurück: wir verschlucken die in den Rachen gekommene Mundfeuchtigkeit, ohne es zu wollen; wir verengern die Augenspalte bey starkem Lichte, ohne uns dessen bewußt zu werden; wir zucken unwillkürlich bey jeder schmerzhaften Berührung, und äudern, ohne es zu wissen, unsre Lage, wenn sie beschwerlich wird. Dergleichen Bewegungen geschehen zuerst da, wo ausser dem Gemeingefühle noch keine andre Seelenkraft entwickelt ist, wie bey den niedern Thieren, bey dem Embryo, bey dem neugeborenen Kinde und im Zustande der Betäubung. Dann erfolgen sie auch da, wo die höhere Seelenthätigkeit mit Bewußtseyn und Willen in andern Richtungen beschäftigt ist: es ist, als ob hier zwey Seelen wirkten, die eine z. B. im Nachdenken versunken, die andre auf die körperlichen Verhältnisse aufmerksam und sie bestimmend. Die bewegende Reaction des pflanzlichen Hirnlebens erweist sich demnach als Wille des Gemeingefühls wirksam, unabhängig von dem Verstande, theils ehe

dieser noch erwacht ist, theils während er mit andern Gegenständen sich beschäftigt. Diese Bewegungen sind dabey nicht minder zweckmäßig, als wenn wir sie ganz frey und im Bewußtseyn des bestimmten Zwecks vollzögen, haben also den psychischen Charakter, deshalb weil allem Leben der Gedanke zum Grunde liegt, und alles Pflanzliche auf einen bestimmten Zweck hinwürt. Aber auch da, wo eine leibliche Gefahr erst sich nähert und bloß in der Vorstellung aufgefaßt werden kann, entstehen theils bewußtlos, theils mit Bewußtseyn gegen unsern Willen dergleichen Bewegungen: so blinken wir mit den Augenlidern, wenn ein Körper in der Richtung gegen die Augen sich bewegt; wir bücken uns gegen unsern Willen, wenn eine Gefahr für den obern Theil unsers Körpers droht; in Gefahr zu fallen, strengen wir die Muskeln der entgegengesetzten Seite an, und suchen durch allerley Bewegungen das Gleichgewicht herzustellen. Hier finden wir also Vorstellungen, deren wir uns nicht bewußt sind, und einen Willen, der ohne unsern Verstandswillen, ja gegen dessen Zwecke würt; wir erkennen demnach ein Mittelglied zwischen der selbstständigen Seelenthätigkeit und dem eigentlich organischen oder pflanzlichen Wüken: ein pflanzliches Seeleuleben, welches den Uebergangspanct beyder Sphären abgibt.

§. 594. Die Bewegungen zeigen sich aber auch als der Reflex des psychischen Lebens oder mimisch: sie werden der lebendige Ausdruck der Seelenzustände, indem sie den diesen zum Grunde liegenden Begriff im Raume verwirklichen und vernünlichen. Die ganze Mimik ruht auf der Verwandtschaft zwischen bestimmten Zuständen der Seele und Bewegungen des Leibes, und diese Verwandtschaft besteht in der Einheit der Begriffe eines psychischen und eines leiblichen Verhältnisses, und überhaupt in der ursprünglichen Identität des Zeitlichen und Räumlichen. Dieselbe Einheit wird von der Sprache ausgedrückt: indem der Seele Aufrichtung, Erhebung und Aufschwung, oder Niederbeugung, Herabsinken und Fall, starre Festigkeit oder unsichres Schwanken, Ruhe und Frieden oder Sturm und Aufruhr zugeschrieben wird, werden uns Bilder gegeben, welche eben so deutlich den innern Zustand bezeichnen, als die denselben begleitenden Bewegungen des Körpers ausdrücken. Nun verräth aber die Seele ihren Zustand durch diese Bewegungen, ohne sich dessen bewußt zu seyn, und ohne es zu wollen, ja selbst wider ihren Willen. Somit müssen wir denn annehmen, daß die Seele das pflanzliche Hirnleben in einen ihr entsprechenden Zustand versetzt, und daß dieses dann bewußtlos und unwillkürlich auf die Muskeln würt. Dies wird dadurch bestätigt, daß die organischen Abnormitäten des Gehirns einen entsprechenden mimischen Ausdruck herbeyführen: bey der Hirnentzündung äussert sich eine unbindige Muskelwirkung mit ungemeiner Stärke und Ausdauer, wie in der Raserey der Leidenschaft; in der Hirnwassersucht oder nach der Hirnerschütterung sind die Muskeln weik und kraftlos, wie bey dem Kleinmüthigen und Verzagten; bey der Encephalitis ist der Blick wild und verstört, wie bey der schrankenlosen, verwirrten Gemüthsbewegung; in der Arachnitis zeigt sich der Ausdruck des Staunens oder der Dummheit, kurz, des gefesselten Geistes; die Schlafsucht giebt ein heitres Aussehen, die Mimik des aufgehobenen Gegensatzes und der gelöseten Spannung.

§. 595. Die Thätigkeit der Streckmuskeln enthält die Glieder, stellt sie in ihrer ganzen eigenthümlichen Form; in ihrer freyen Entwicklung dar, und bezeichnet überall die

eigenmächtige Reaction. So tritt sie denn hervor bey erhöhtem Lebensgeföhle und starker Muskelkraft, aber auch bey kräftigem Selbstgeföhle der Seele, bey Stolz und Muth. Und nicht bloß das Bewußtseyn der sinnlichen Macht durch bürgerliche Stellung und äussern Besitz, sondern auch das der geistigen Ueberlegenheit und der sittlichen Lauterkeit richtet den ganzen Leib auf, und erhebt das Haupt; nicht allein das Vertrauen auf die Körperkraft, auch das auf die ewige Gerechtigkeit streckt den Nacken. Die organische Kraft des Gehirns und der Muskeln wirkt also gleich mit der Vorstellung sinnlichen Vermögens so wie der psychische Kraft. Die Beugemuskeln drücken das Unentfaltete, Ruhende, der freyen Kraft Ermangelnde aus. So sind sie vorwaltend im Embryo in der Ruhe, während des Schlags, bey Muskelschwäche und Ermattung; so auch bey der Vorstellung unsrer Unvollkommenheit und Beschränktheit, im Gegensatze einer fremden Größe und Macht, bey der Furcht und dem Grame, so wie bey der Blödsinnigkeit und der Demuth. Und wie eine dieser entgegengesetzten Arten von Muskeln durch ihr absolutes Uebergewicht die Harmonie der Bewegungen stört und einen widernatürlichen Zustand herbeiführt, dort das Leben in Starrheit vernichtet, hier die Glieder in Contracturen entstaltet, so zeigen sich die Extreme in dem psychischen Zustande und dessen mimischen Ausdrücke: das sich überhebende Selbstgeföhle wird zum Opisthotonus des Hochmuths, und die sich wegwerfende Persönlichkeit wird zum Emprosthotonus der sklavischen Gesinnung. — Muth und Vertrauen tritt festen Schrittes einher, während Hoffungslosigkeit mit schlaff herabhängenden Armen und knickenden Knien schleicht. Vorwärts beugt sich der Körper bey dem Streben nach Aufnahme, bey Wohlwollen und Liebe, bey Verlangen und Neugier, indeß bey dem Abscheu der Körper zurückführt und nach hinten sich überbeugt. Das Entsetzen hemmt den Lauf der Vorstellungen, und verursacht ein krampfhaftes Erstarren; die Freude hingegen, welche eine bunte Reihe mehr lebhafter, als deutlicher Vorstellungen hervorruft, macht sich in Springen und Hüpfen Luft. Wie der Zorn den Willen, das Unrecht zu strafen, in sich schließt, und auch da, wo kein Gedanke an körperliche Züchtigung Statt findet, die Faust krampfhaft ballt, so raubt die Furcht der Seele ihre Haltung, und macht zugleich die Glieder beben. — Während das Gemüthsleben als das Bewegliche und nach aussen hin Wirkende der Seele in lebhaftern Bewegungen sich ausspricht, finden wir einen Gegensatz auf der geistigen Seite. Das Denken ist nach innen gewendet; bey dem Sinnen über einen gegebenen Gegenstand, bey dem Suchen der Seele nach einer Ansicht und einem Urtheile sind die Muskeln in Ruhe und in überwiegender Beugung, einwärts gezogen, die Arme verschränkt; der Leib ist gebogen; Alles in sich concentrirt. Wenn hingegen die Phantasie frey sich ergötzt und schafft, bemächtigt sich Unruhe der Muskeln, erfolgt ein unwillkürliches Aufspringen und wird die Streckung verhältnißmäßig vorherrschend.

§. 596. Wir haben gefunden, daß die Bewegungen der willkürlichen Muskeln von dem pflanzlichen Hirnleben, und durch dieses von der bewußtlosen und unfreyen Seelenthätigkeit bestimmt werden. Nun ist die sich selbst klare und freye Seelenthätigkeit zwar ein Inseits, aber nur eine weitere Entwicklung des in dem pflanzlichen Liegenden Keims: mithin dürfen wir schließen, daß sie zunächst nur auf das pflanzliche Hirnleben und vermittelt dessen erst auf die Muskeln wirkt. Diese Ansicht wird durch folgende Gründe (§. 597 — 601.) bestätigt.

§. 597. Wir finden eine Uebereinstimmung zwischen dem Zustande des pflanzlichen Hirnlebens, der Sedenthätigkeit und der willkürlichen Bewegungen. Wenn bey der Meningitis Krämpfe und Lähmungen entstehen, so ist auch das Bewußtseyn aufgehoben, und allgemeine Convulsionen, welche von irgend einer Abnormität des Gehirns ausgehen, sind mit Bewußtlosigkeit verbunden. Der Zustand der Muskeln, der zunächst nur auf das Materielle des Gehirns wirken kann (§. 281), bestimmt auch die Seele (§. 430); die Epilepsie führt allmählig eine bis zu völligem Blödsinne steigende Schwäche des Geistes, oder eine bis zur Manie oder Melancholie gehende Verstimmung und Verwirrung der Seele herbey. Selbst specifische Verhältnisse sprechen sich in dieser Richtung aus: wie die Streckmuskeln ein rüstigeres Hervortreten der eigenen Kraft bezeichnen, so wirkt das Dehnen und Strecken des Körpers auch ermunternd und belebend, und wenn man die Gebärden eines Affects nachahmt, so fühlt man selbst eine Geneigtheit zu demselben. Das wehrlose oder schwerbewegliche Thier ist schon; das leichtbewegliche oder das muskelkräftige ist kühn und sorglos.

§. 598. Vermöge des Zusammenhanges mit dem Pflanzlichen bleiben die Mittel, durch welche die mit Bewußtseyn und Willen vollzogene Bewegung eigentlich zu Stande gebracht wird, unerkant; die eigentlichen, nähern Momente dieses Actes kommen gar nicht zur Anschauung, sondern bleiben dem organischen Wirken überlassen. Unsere Bewegungen sind vielfach und verwickelt, indem bloß bestimmte Partien einzelner Muskeln, oder bestimmte Muskeln in Verbindung, mit bestimmter Kraft, in bestimmter Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge wirken: nie aber werden wir uns dieser Elemente der Bewegung bewußt, immer nur des gemeinsamen Resultats. Durch eine genaue Kenntniß unsrer Muskeln und Nerven werden unsere Bewegungen nicht um das Mindeste vollkommener; ja nicht einmal die Glieder brauchen wir zu kennen, durch welche wir ein gewisses Resultat der Bewegung hervorbringen: ohne zu wissen, welche Laute mit der Zunge, oder dem Gaumen, oder den Lippen gebildet werden, lernt das Kind vollkommen sprechen, und wenn es über den Hergang der Lautbildung unterrichtet worden ist, spricht es darum nicht besser, ja es vergißt diese Theorie während der Praxis. Das Einmischen der Aufmerksamkeit auf die einzelnen Bewegungen stört sogar dieselben, und verfehlt den Zweck: wir wollen z. B. schnell eine steile Treppe ersteigen, und mit andern Vorstellungen beschäftigt, laufen wir behend und sicher hinauf; so wie uns aber die Gefahr einfällt und wir uns denken, wie wir, um dieser zu entgehen, den Schwerpunkt unsres Körpers verlegen und eine hinreichende Unterlage suchen müssen, werden unsere Bewegungen schwerfällig, unsicher, unzusammenstimmend, und wir fallen leicht. Der Schlafwandler, dessen Seele ganz im pflanzlichen Leben versunken ist, geht sicher auf der gefährlichsten Bahn, und nur mit der Rückkehr des Bewußtseyns kommt er in Gefahr zu fallen.

§. 599. Es giebt keine scharf bestimmten Gränzen zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Bewegung, sondern sie gehn unmerklich in einander über. Wenn z. B. bey der Aufnahme der Nahrung Kiefer, Lippen, Backen und Zunge vollkommen willkürlich wirken, so wird der Antheil der Willkühr an den Bewegungen des Kehlkopfs, Gaumensegels und Speiseröhrenkopfs schwächer, und erlischt in der Speiseröhre gänzlich. Nun geht der zehnte Hirnnerv mit andern Nerven zum Speiseröhrenkopfe, wo er mit beschränkter Willkühr wirkt: nach seiner Durchschneidung wird zuweilen das Schlingen

beschwerlich (*Haller elem. III. p. 409.* Arneemann *Regeneration* 63 Vers.). Er geht ferner allein zu den eigenthümlichen Muskeln des Kehlkopfs, und wirkt hier bald unwillkürlich bey'm Athmen, bald mit der vollkommensten Willkühr bey der Stimme. Er geht endlich zur Speiseröhre, deren Bewegung ganz unwillkürlich ist; nach seiner Durchschneidung hört die Speiseröhre auf, sich zu heben (*Dupuy in Meckels Archiv IV. S. 108.*) und wird, so wie bey Vögeln der Kropf (nach *Blainville*), von stecken gebliebenem Futter ausgedehnt (*Wilson S. 131.*); bey seiner Reizung aber zieht sie sich in ihrer ganzen Länge zusammen (*Cruikshank in Reils Archiv II. S. 70*). Hieraus ergibt sich denn, daß die Abhängigkeit eines Muskels vom Willen oder vom pflanzlichen Hirnleben nicht allein durch die Beschaffenheit seines Nerven und des Centralendes desselben bestimmt wird, sondern auch theils durch die Natur des Muskels und der Organe, zu welchen er gehört, theils durch die Art des die Bewegung erregenden Impulses. Von dem erstern dieser zwey Bestimmungsgründe ist schon oben (I. Band §. 36. und 58 Anmerkung) die Rede gewesen. Was den Letztern betrifft, so erkennen wir, daß die Bewegung unwillkürlich erfolgt, wenn ein äusserer Reiz auf die peripherischen Nervenenden einwirkt, die im Rachen angesammelte Flüssigkeit schlucken wir unwillkürlich hinab; im spätern Zeitraume der Hirnwassersucht verschlingen die Kranken, ohne sonst eine Spur von Willensthätigkeit zu zeigen, die ihnen in den Mund gebrachten Speisen mit Hastigkeit; Sterbende, bey welchen die willkürliche Bewegung schon erloschen ist, schlucken das ihnen eingeflossene Getränk; der abgeschnittne Kopf einer jungen Katze saugt, wenn man ihm einen Finger ins Maul steckt, neun Minuten lang (*Mayer in med. chir. Ztg. 1815 III. S. 192*). Die äussere Reizung pflanzt sich also hier auf den Hirnstamm fort, und dessen durch pflanzliches Leben erfolgende Reaction bringt die unwillkürliche Bewegung hervor. Die unwillkürliche Athmungsbewegung beruht zwar auf einem innern Triebe des pflanzlichen Hirnlebens, dieser aber musz, um sich äussern zu können, durch den Eindruck der atmosphärischen Luft auf die Athmungsorgane erregt werden. Bey der willkürlichen Bewegung geht der Impuls vom Centralende der Nerven aus, als die Reaction auf eine im Centralorgane wirkende Vorstellung. Das unwillkürliche Athmen beruht darauf, daß der zehnte Hirnnerve, dessen peripherische Enden von der Atmosphäre gereizt sind, primär wirkt und die Rückenmarksnerven consensuell in Thätigkeit versetzt werden; bey dem willkürlichen Athmen wirken Letztere primär, und Ersterer consensuell.

§. 800. Die verschiedenen Bewegungsorgane können sowohl willkürlich als unwillkürlich wirken, aber einige wirken verhältnismässig mehr auf die, andre mehr auf die andre Weise. An den Gliedmaßen und an der Zunge tritt die Herrschaft des Willens am stärksten hervor; die Muskeln des Auges und des Gesichts werden mehr vom Gemüthsstande bestimmt, und sind verhältnismässig weniger vom Willen abhängig; noch beschränkter ist diese Abhängigkeit an dem Kiefer und dem Speiseröhrenkopfe, wo die Beziehung zur Plastizität stärker ist. Nun sehen wir aber, und namentlich auch nach der vor uns liegenden Sammlung pathologischer Beobachtungen, daß bey Abnormalitäten des Gehirns am häufigsten die Glieder gelähmt werden, und nächst ihnen die Zunge, seltner die Muskeln des Auges und des Antlitzes, am seltensten der Kiefer und der Spei-

seröhrenkopf. Die Herrschaft des Willens und die des pflanzlichen Hirnlebens stehn also einander gleich, und stimmen mit einander überein.

§. 601. Der körperliche Wille beruht also darauf, daß die Seele des pflanzlichen Hirnlebens sich bemächtigt und durch dasselbe mit den Aussenwerken des Leibes in Berührung tritt. Daher erscheint er denn eben auch zuerst im Dienste der Plasticität, in organischer Beziehung zum leiblichen Leben, und als Mittel der Selbsterhaltung. Am deutlichsten sehen wir dies, wenn wir die verschiedenen Organisationen unter einander vergleichen. Die Zeugung ist zuerst ein rein pflanzlicher Hergang; dann tritt in einer unvollkommenen Begattung, ein Antheil von Willkühr auf, und endlich wird dieser Act ganz der Willkühr unterworfen. Wo der Magen durch seine Muskelkraft und durch seine Absonderung die rohen Nahrungsmittel vollkommen zu verdauen vermag, werden diese ungekaut verschluckt; wo er dies nicht im Stande ist, wird die Nahrung durch die willkührliche Bewegung des Kauens erst dazu vorbereitet.

§. 602. Mit ihrer Entwicklung lernt die Seele immer mehr die Bewegung beherrschen, die anfangs unwillkührlich war. Die Bewegungen der Excretion erfolgen bey dem Kinde anfanglich bloß auf die Reizung des Gemeingefühls, und werden erst allmählig dem Willen unterthan. Bewußtlos und unwillkührlich bricht die Stimme und jeder mimische Ausdruck hervor; die Reflexion fßt diese Erscheinungen auf, und der Wille bemächtigt sich ihrer, sie bald zur verständlichen Mittheilung, bald zur Verstellung, bald zur mimischen Kunst gestaltend. Der Wille kann die dringendste Forderung des pflanzlichen Trieb's unterdrücken, und seine Herrschaft bis zum willkührlichen Aufhören des Athmens treiben. — Wenn wir eine sehr zusammengesetzte Bewegung, die anfangs schwierig war, öfters wiederholen, so verketteten sich die dazu nöthigen einzelnen Muskelthätigkeiten durch die Uebung so, daß sie nun leicht und wie durch einen Mechanismus gleichzeitig oder in bestimmter Reihenfolge vor sich gehn, ohne daß wir uns der einzelnen Acte bewußt werden: wir treffen die Taste oder Saite bey'm Anblicke der Note, und spielen die Melodie, die unsrer Phantasie vorschwebt, ohne des Anschlagens der einzelnen Töne uns bewußt zu werden. So nimmt die Seele allmählig Besitz vom Körper, und unterwirft ihn dem Gedanken, ohne die Einzelheiten der Verwirklichung anzuschauen; alle Glieder sind dann besetzt, und vollbringen wie treue Diener ihre untergeordneten Geschäfte selbstthätig im Sinne des Herrschers, auf daß dieser, ohne durch Einzelheiten gestört zu werden, sein Werk im Ganzen betreiben könne.

§. 603. Die willkührlichen Muskeln haben mit dem Herzen den Charakter der polarischen Gegenetzung, des Strebens nach Wechsel, der Bewegung, und dadurch die Verwandtschaft mit dem Gemüthe gemein. Aber das Herz ist der allgemeine Muskel, dessen Lebensbewegung über alle Organe sich erstreckt, und die Muskeln ihrerseits sind als durch Vervielfältigung gegebene Localherzen zu betrachten. So lange die Gemüths-thätigkeit innerlich bleibt und im Gefühle verharret, afficirt sie daher das Herz, als den allgemeinen Muskel, denn das Gefühl ist eben ein allgemeines Durchdrungenseyn. Der körperliche Wille hingegen ist die äussere Localbeziehung der Spontanität des Gemüths, und hierdurch den Muskeln als den Localherzen verwandt. Daher bewirkt denn besonders eine mechanische Gesamtaffection oder eine chemische Reizung des Gehirns Ver-

Änderungen im Herzschlage; hingegen eine örtliche mechanische Reizung des Hirnstamms und seiner Nerven Bewegungen in den willkürlichen Muskeln (§. 301.)

§. 604. Die Gliedmaßen sind dasjenige am Rumpfe, was der Seele zunächst untergeordnet ist; und somit werden auch sie vorzüglich afficirt, wenn die Wirkungen einer Abnormität des Gehirns die Irritabilität ergreifen. Aus gleicher Ursache bringt eine solche Abnormität häufiger in den obern, als in den untern Gliedmaßen Krämpfe oder Lähmungen hervor (XXI, XXIII Tabelle), wie schon von Lallemand (l. p. 11) bemerkt worden ist.

§. 605. Die Gesichtsmuskeln bilden zunächst die irritable Wandung für den Anfang der Athmungs- und Verdauungsorgane. Während sie so zu den plastischen Functionen mitwirken; treten sie zugleich in den Dienst der Seele; indem sie auf die Sinnesorgane wirken, sie richten, spannen, öffnen und schließen, und werden durch den siebenten Hirnnerven bestimmt. Dadurch sind sie denn auch geeignet, den klarsten Widerschein des Seelenzustandes, und namentlich der Gemüthsthiätigkeit, zu geben. Bey den Thieren ist im Ganzen genommen das Rückenmark noch überwiegend; der mimische Ausdruck an der Oberfläche ist verhältnißmäßig mehr auf die Haut des Rumpfs beschränkt, während das Gesicht mehr stereotypisch ist, und vorzüglich für Atmen und Verdauung wirkt. Bey dem Menschen ist mit dem Gehirne auch dessen siebenter Nerve mehr entwickelt; die Muskeln des Antlitzes sind zarter, beweglicher, und wirken auf die Haut, die an andern Stellen des Körpers dem Einflusse der Irritabilität fast gänzlich entzogen ist. So wird denn das Antlitz mit seiner zarten, weichen Haut psychisch durchsichtig, und zwar zeigt sich im Ganzen hier wieder das allgemeine Verhältniß des mimischen Ausdrucks (§. 595); wenn man mit gesammelter Aufmerksamkeit innerlich arbeitet, und zusammenfassend, vergleichend, vereinend, nachdenkt, zieht sich das Antlitz zusammen, das Auge wird halb bedeckt, die Stirnhaut legt sich in Längenfalten zusammen; bey der freyen Thätigkeit der Phantasie, bey dem Ergötzen nach außen, bey der Gedankenjagd entfaltet sich dagegen das Antlitz, das Auge wird geöffnet und die Stirnhaut gelöst oder in Querrunzeln gespannt. —

606. Die Stimme ist das Zusammentreffen von Seelenthätigkeit, willkürlicher Bewegung und Atmen; sie beruht auf einer willkürlichen Bewegung der Athmungsorgane, wobey die Ingestionsorgane der Verdauung als Hilfslieder wirken, und welche nicht dem Atmen selbst dient, sondern den psychischen Zustand ausdrückt. Sie tritt nur bey entwickelter Luftathmung hervor: schon vorgebildet bey den Insecten als Luftthieren, äußert sich die Stimme und die Lust am freyen Spiele der Luftorgane um so stärker, je mehr das Thier in der Luft lebt. Die Athmungsorgane sind derjenige Punkt, wo Plasticität und Bewegung am innigsten in einander greifen, und somit eignen sie sich denn auch im Reiche der Plasticität am meisten, den innern Zustand zu offenbaren. Sie äußern aber denselben in hörbaren Zeichen, wie die Mimik in sichtbaren Bewegungen, und somit bildet die Stimme den irritablen Gegensatz zum Gehöre. — Sie hängt mehr mit dem Gemüthe zusammen, als mit dem Geiste, und ist bey den Thieren bloß der unwillkürliche Ausdruck des innern Zustandes. Auch bey dem Menschen ist sie ursprünglich unfrey; so tritt sie hervor, wenn der innere Zustand lebhaft ergriffen ist, als der

Schrey des Schmerzes oder des Schrecks, als der Gesang der Freude, als Anbruch des Zorns, Ausdruck der Lebenslust u. s. w. Sie beruht hier auf einem Gemeingefühle, welches zu Aeusserungen nöthigt, und ist eine hohle Reaction um ihrer selbst willen, ohne weitern Zweck. Ihre Modificationen in Hinsicht auf Stärke oder Schwäche, Festigkeit oder Unsicherheit, Raubheit oder Weichheit, Steigen oder Sinken, Schnelligkeit oder Langsamkeit u. s. w. drückt theils den Grad der Lebendigkeit überhaupt aus, theils den Zustand des Gefühls, sein Ergrißenseyn oder sein selbstthätiges Ergreifen, den Grad seiner Aufregung, seiner Stärke und Innigkeit u. s. w. Erst allmählig unterwirft der Wille die Stimme und ihre Modificationen seiner Herrschaft. Uebrigens wirkt sie, wie jeder Ausbruch freyer Kraft und wie jede andre Bewegung, auf die Seele zurück, und wie die Aeusserung gerade die Kraft, von welcher sie ausgeht, noch mehr belebt, so wird der Affect durch den ihr entsprechenden Ausdruck der Stimme verstärkt, unterhalten, dadurch aber auch in seinem regelmässigen Verlaufe befördert und zu Ende gebracht.

§. 607. Wenn die Stimme durch das Gefühl gegeben und unwillkürlich ist, so entspringt dagegen die Sprache aus dem Verstande und der freyen Willensthätigkeit, und ist die vergeistigte Stimme. Sie wurzelt in dem Vermögen der Seele, die Einheit in der Vielheit zu erkennen, in der Vernunft, wie dieselbe auf den Verstand einwirkt. Wir fangen damit an, unsere Vorstellungen in ihre Elemente aufzulösen und jedes Element zu bezeichnen durch eine äusserliche Production, durch ein Wort, welches als Merkzeichen, als Symbol dient. Wir bezeichnen damit nicht bloß das Subjective, die Stimmung, sondern das Wort wird zugleich das Echo der Objecte und ihrer Verhältnisse; es ist ein Laut oder eine Verbindung von Lauten, als Ausdruck eines Begriffs, setzt also voraus, daß Begriffe gebildet, als Gegenstand des Ausdrucks angeschaut, und die hierzu dienlichen Mittel gewählt werden. So haben denn die Thiere keine Sprache, sondern nur eine die Stelle derselben ersetzende Stimme, welche als ein Vorbild jener, bey geselligen Thieren schon zur Verständigung, zum Locken, Rufen, Warnen, Herausfordern dient, indem sie in den Andern einen entsprechenden Zustand hervorbringt und dadurch verstanden wird. Die Thiere lernen die Worte des Menschen, die etwas Sinnliches bezeichnen, verstehen: das Pferd in der Reitbahn lernt bald die Bedeutung der dem Lehrlinge zugerufenen Worte kennen, und macht von selbst die befohlenen Bewegungen; gleichwohl kann der sprechende Vogel die erlernten Worte nicht als freyen Ausdruck seines Innern benutzen. — Da jedes Wort einen eignen Begriff bezeichnet, so ist die Sprache um Vieles reichhaltiger, mannichfaltiger und bestimmter, als die Pantomime, aber künstlich, während diese natürlich ist: sie ist nicht gegeben, sondern erfunden, durch Willkühr geschaffen, indem das Streben, Innerliches oder Aeusserliches durch ihrer Natur nach verwandte oder natürliche Zeichen (Onomatopoeie) auszudrücken, ursprünglich mit wirkt. Die Rede ist die verständig geregelte Verknüpfung der Worte, welche dem Gange der Gedanken folgt. — Die Sprache wirkt auf den Geist zurück, aus welchem sie stammt: sie ist eine Aeusserung der Spontanität, durch welche er erst von den Objecten eigentlich Besitz nimmt und die Natur sich unterwirft. Der Verstand gebraucht die Worte, welche er gebildet hat, als Mittel für seine Operationen bey dem Combiniren der Vorstellungen oder bey dem Denken. Indem wir in Worten denken, wird der Fluß der Gedanken in ein bestimmtes Bett aufgenommen: diese

testen in bestimmterer Gestaltung, in schärfern Umrissen vor unsre Seele; und durch solche Begränzung werden die Vorstellungen und Verknüpfungen klarer. Selbat dadurch, daß die Tonworte in ihre Elemente zerlegt und in Schriftzügen ausgedrückt, also die zeitlichen Symbole in räumliche verwandelt werden, gewinnt der Gedanke an Bestimmtheit und Schärfe. — Wo keine Sprache ist, da ist auch keine Klarheit der Vorstellung. Die in der Wildniß unter Thieren aufgewachsenen Kinder hatten, als sie nachmal's in der Gesellschaft menschliche Bildung erhielten, keine deutliche Vorstellung von ihrem frühern Zustande und konnten sich der damaligen Ereignisse und Empfindungen durchaus nicht erinnern. Bey den Taubstammen ist zwar nicht ganz derselbe Fall, da sie fast immer schon der Zeichensprache sich bedienen, welche Jeder sich willkürlich gestaltet, während allgemeine, natürliche Zeichen die Grundlage ausmachen. Wie sie allmählich die Wortsprache durch Schrift oder durch sichtbare Bewegung der Sprachorgane erlernen, und allmählich in Worten zu denken sich gewöhnen, werden die Vorstellungen klarer, und die rohe Begier tritt mehr zurück. Gleichwohl vermögen sie bey alter Entwicklung des Bewußtseyns und der Denkkraft keine hinlängliche Rechenschaft zu geben von ihrem frühern Zustande, von der Weise ihrer Vorstellungen, von der Art, wie sie sich die Mittheilungen der Sprechenden gedacht, und wie sie den ersten Unterricht in der Wortsprache aufgefaßt haben, so lehrreich es auch in jeder Beziehung seyn würde, gerade über diese Gegenstände von ihnen Auskunft zu erhalten. — Die dem Gemüthe und namentlich dem Willen verwandten Athmungsorgane (§. 553) sind bey Stimme und Sprache das Stoffgehende, das Klingende; die der Verdauung, einer dem Geiste entsprechenden Function (§. 552) gewidmete Mundhöhle wird das Bildende, Gestaltgebende, und zwar wird die Zunge, deren Sinn dem Tische, der Spontanität und dem Urtheile verwandt ist (§. 582) hier das Hauptorgan. Dem zehnten Hirnnerven gesellt sich also der fünfte, siebente, neunte und zwölfte bey.

IV. Vom Leben der Vermittlungsorgane.

1. Vom Rückenmark.

§. 608. Das Rückenmark ist ein sensibiles Centralorgan, in welchem zahlreiche Nerven sich vereinigen, deren Thätigkeiten hier einander durchdringen zu einem innerlichen Daseyn. Aber, es ist nur ein Glied der gesammten Centralmasse und macht mit dem Gehirne ein Ganzes aus, denn 1) es setzt sich mit vollkommener Stetigkeit in das Gehirn fort, und stimmt mit ihm in der Substanz, so wie in den allgemeinen Merkmalen der Bildung überein; seine Nerven bilden mit denen des Gehirns einen vollständigen Kranz von Strahlen (§. 631.); 2) es verbindet sich durch die peripherischen Verzweigungen seiner Nerven auf gleiche Weise, wie das Gehirn, mit sensibeln, irritablen und plastischen Organen, stimmt also auch in den Functionen mit ihm überein, Eindrücke aufnehmend, inneres Leben erzeugend, auf Bildung und Bewegung zurück wirkend. Somit erscheinen denn Beyde im Embryo zuerst als die wesentlichen Organe des thierischen Lebens, und zeigen eine Uebereinstimmung in ihrer Entwicklung: bey Acephalen fehlt oft das Rückenmark, oder es ist dünn; bey unvollkommener Ausbildung des Gehirns fehlt öfters der Bogen au

den obern Halswirbeln (Nr. 287.), oder an den Hals- und Brustwirbeln (Nr. 613. 615. 651.), oder an den Brust- und Bauchwirbeln (Nr. 355.), oder an der ganzen Wirbelsäule (Nr. 292. 604. 605. 610. 611. 614. 629.). Auch zeigt sich der organische Zusammenhang in den Lebensthätigkeiten: bey einer Hirnhautwassersucht (Nr. 338.) entstand eine Geschwulst am Schwanzbeine, aus welcher, da sie geöffnet war, bey einem Drucke auf das Hinterhaupt Wasser abfloß, worauf der Kopf kleiner wurde und die Genesung erfolgte; als Geschwülste der Wirbelspalte an den Bauchwirbeln (Nr. 344.) oder am Kreuzbeine (Nr. 367.) aufhörten, Wasser zu geben, oder comprimirt wurden, trat eine Anschwellung des Kopfs und Betäubung ein; als eine Geschwulst der Wirbelspalte an den untern Bauchwirbeln (Nr. 366.) geöffnet wurde, erfolgte Schlafsucht.

§. 609. Gehirn und Rückenmark sind aber nicht gleich bedeutende Theile, sondern polarisch entgegengesetzte Glieder eines Ganzen. In der Gestaltung verhalten sie sich wie Kugel und Stab, also wie negative und positive Elektricität; im Gehirne ist die Beziehung zu Sinnesorganen, im Rückenmarke die zu den Bewegungsorganen vorherrschend, also in jenem mehr Sensibilität, Innerlichkeit, Einheit, in diesem mehr Irritabilität, Aeusserlichkeit, Mannichfaltigkeit (§. 61.). Die dem Gehirne untergeordneten Sinne beziehen sich auf chemische und dynamische Verhältnisse und geben eine tiefere Erkenntniß; der dem Rückenmarke beygegebene wird bloß durch Bewegung vermittelt, und erkennt allein das Aeusserliche, Räumliche, die Ausdehnung. Die plastischen Organe im Reiche des Gehirns zeigen vorwaltende Ingestion und Sensibilität, die im Bezirke des Rückenmarks überwiegende Egestion und Beziehung auf Irritabilität. Die Muskeln im Bereiche des Gehirns wirken mehr für den unmittelbaren Ausdruck der Seele, für chemisch-dynamische Sinne und ingestive Plasticität; die vom Rückenmarke beherrschten wirken ausschließlich für das Räumliche, für Ortsbewegung, Bewegung des eignen Körpers und fremder Körper, und für solche Sinnenthätigkeit und plastische Function, welche auf Bewegung beruht.

§. 610. Nun ist aber das Innerliche wesentlich, das Aeusserliche abhängig. Die Einheit steht höher, als die Mannichfaltigkeit: sie ist Ursprung und Ende, entwickelt aus sich die Mannichfaltigkeit, und nimmt sie wieder in sich auf. So muß denn das Gehirn zum Rückenmarke sich verhalten, wie Herrschendes zum Untergeordneten. Daher ist dema das Gehirn so überwiegend an Masse, so wie in innerer Ausbildung und Mannichfaltigkeit der Organisation; daher wird das Rückenmark mit fortschreitender Entwicklung mehr gegen das Gehirn gezogen, und seine Nerven müssen mehr oder weniger heraufsteigen, ehe sie es erreichen; daher bezeichnet denn auch die aufrechte Stellung durch das Supremat des Gehirns die höhere Entwicklung des geistigen Lebens. Auf einer niedern Bildungsstufe in der Thierreihe, wie im Lebensalter ist das Rückenmark dem Gehirne mehr gleich und weniger von ihm abhängig; je höher das psychische Leben sich ausbildet, desto mehr wird das Rückenmark untergeordnet, ein bloßer Vorhof des Gehirns, nur empfangend und gebend, nicht selbstthätig central wirkend. (Vgl. §. 32.)

§. 611. Das Rückenmark wird demnach ein Leiter, welcher das, was von den peripherischen Organen ihm überliefert worden ist, auf das Gehirn überträgt. Die von der Peripherie empfangenen Impulse werden in ihm durch eine Strömung nach oben fortge-

pflanzt die sensible Stimmung in jedem seiner Punkte ist das Product der Summe von Thätigkeiten in den darunter liegenden Punkten; je höher aufwärts, desto größer ist die Summe von Thätigkeiten, die hier umfasst wird; jeder neue Nervenfaden bringt neuen Zuwachs des Lebens. Das Gehirn empfängt schon concentrirte, assimilirte Eindrücke vom Rückenmark, weshalb denn auch die von dem untern Bereiche desselben weniger klar werden, als die von den obern Gegenden. Die Eindrücke des Tastens und des Gefühlens, als Grundlagen der höhern Sinne, werden erst im Gehirn zur Anschauung gebracht; ist der Zusammenhang des Rückenmarks mit dem Gehirn an einer Stelle gestört durch Druck oder völlig aufgehoben, so werden die auf den darunter liegenden Theil des Rückenmarks von der Peripherie fortgepflanzten Eindrücke nicht percipirt. So trägt das Rückenmark auch die Regungen des Gemüthsgefühls von den Muskeln und der Haut des Rumpfs und der Glieder, so wie vom Zwerchfelle und von den Eingeweiden des Beckens unmittelbar von den übrigen Rumpfsingeweiden aber nur mittelbar auf das Gehirn über. Endlich wird es der Mittler, durch welche alle diese Organe das pflanzliche Leben des Gehirns beleben und mittelbar die Temperatur der Seelenthätigkeit bestimmen; so wird auch bey Verletzung des obern Theils des Rückenmarks öfters Schwäche und Stumpfheit der Geisteskräfte beobachtet.

§. 612. Das Rückenmark pflanzt in entgegengesetzter Richtung vom Gehirn empfangene Eindrücke auf seinen peripherischen Bereich fort. Die Impulse zur willkürlichen Bewegung gehn vom Gehirn aus; leidet dieses an Druck oder an abnormer Reizung, so entsteht auch bey unverletztem Rückenmark Lähmung oder Krampf in den zu dessen Bereiche gehörenden Muskeln. Eben so wirkt auch die belebende Kraft des Gehirns durch das Rückenmark auf das organische Leben des Rumpfs und der Gliedmaßen; geistige Anstrengung hat Müdigkeit zur Folge; welche besonders in dem polarischen Gegensatze des Gehirns in den Verzweigungen des Rückenmarkfadens am Schwanzbeine bemerklich wird; und Gemüthsbewegungen, Kummer und Schreck, verursachen zuweilen Entzündung des Rückenmarks.

§. 613. Hat ein Ganzes in polarisch gegenüberstehenden Gliedern sich entwickelt, so ist jedes derselben von dem andern abhängig. Somit wird denn auch die Hirnthätigkeit durch die Verbindung mit dem Leben des Rückenmarks bedingt; jene zeigt überwiegende Sensation, Innerlichkeit, dieses vorwältende Beziehung auf Bewegung, Aeußerlichkeit. Das centrale Gehirn bedarf zu seinem Leben des peripherischen Rückenmarks. Wenn wir ein polarisches Ganzes (einen Magnet oder eine galvanische Säule) gerade im Indifferenzpunkte theilen, so behauptet der übrig gebliebene Pol seine frühere Polarität, aber nur in geringerem Grade, als vorher, und nur dadurch, daß an dem vormaligen Indifferenzpunkte die entgegen gesetzte Polarität sich entwickelt. Ein ähnliches Verhältniß wird nun auch zwischen Gehirn und Rückenmark Statt finden. 1) Das Rückenmark entwickelt sich früher, als das Gehirn, aber es hat von Anfang an eine kolbige Anschwellung an seinem obern Ende, welche das Gehirn repräsentirt; eben so ist es bey Acephalen und Henicephalen. Und wenn das Rückenmark nach der Trennung vom Gehirn zu leben fortfährt, so geschieht es nur dadurch, daß an der Trennungsstelle Gehirnpolarität hervortritt. 2) Auf gleiche Weise kann das Gehirn bis auf einen gewissen

Punct einige Unabhängigkeit vom Rückenmarke zeigen. Dieses kann fehlen (Nr. 604, 605, 607); dann ersetzt das verlängerte Mark seine Stelle, aber das Gehirn ist zugleich unvollkommen entwickelt, und an ein psychisches Leben nicht zu denken, so wie auf der andern Seite Hemicephalie auch bey normalen Rückenmarke vorkommt (Nr. 35a, 354, 63a.) und Letzteres bisweilen auch bey Acephalen vollkommen entwickelt ist. Das Rückenmark kann ferner erkranken ohne bedeutende Störung der Seelenthätigkeit; aber diese bleibt nur dann aus, wenn es in seinem untersten Theile abnorm ist, wie die Inkes (Froriep's Notizen Nr. 34.) bey einem neunzehnjährigen Mädchen beobachtete, bey welchem eine angeborene und zu einer 2½ Zoll im Umfange haltenden Geschwulst angewachsene *spina bifida* über dem Kreuzbeine die Bewegung der unteren Gliedmaßen, die Menstruation und die Verdauung, aber nicht die geistige Entwicklung störte; bey dem Leiden einer höhern Stelle, oder bey allgemeiner Affection des Rückenmarks, wieder die Seelenthätigkeit für immer, wenigstens etwas geschwächt. Endlich kann auch bey bedeutender Verletzung des obern Theils des Rückenmarks das Bewußtseyn so lange bestehen, bis das am Rumpfe begonnene Absterben allmählig bis zum Kopfe heraufsteigt. Solche Beispiele führt Haller (*elementa II. p. 35, sq. 365*) an. Pyl (Aufsätze und Beobachtg VIII. S. 68. fgg.) erzählt einen Fall, wo ein Mädchen nach Zerschmetterung des dritten und vierten Halswirbels noch einen Tag lebte, und völliges Bewußtseyn bis kurz vor dem Tode behielt. Nach Verrenkungen des zweyten Halswirbels, wo der Zerschnitt des Rückenmarks zusammengedrückt, behauptet sich Bewußtseyn und volle Geisteskraft, während der Rumpf, der Empfindung und Bewegung beraubt, abstirbt. Radechetti führt einen Fall an, wo ein Mann mit verrenktem Halse und zerrissenem Rückenmarke kurz vor seinem Tode den Aerzten, die ihm seinen nahen Tod ankündigten, scherzend erwiderte, er sey zwar ein Hauptmann, dem die Soldaten den Gehorsam ankündigten, darum aber doch so vergnügt, als wenn er zu einem frohen Mahle geladen wäre. Autenrieth (Tübinger Blätter II. S. 345) beobachtete einen Mann, bey welchem das Rückenmark zwischen dem fünften und sechsten Halswirbel ganz abgerissen war, und der zwey Stunden mit Bewußtseyn lebte, hörte, sah, den Kopf bewegte, Wein verlangte, um seiner Schwäche zu helfen, auch noch eine halbe Stunde vor dem Tode um Schnupftaback bat, während der ganze übrige Körper gelähmt und fühllos war, und wenn er sich anstrangte, den Arm zu bewegen, bloß eine Bewegung der Schulter und ein leises Zucken der Flechten erfolgte. Wir müssen bedenken, daß in diesen Fällen das verlängerte Mark und der obere Theil des Rückenmarks vicariirte; daß ferner durch die Anastomosen oberer und unterer Rückenmarksnerven doch noch einige Verbindung mit dem unterhalb der Compression oder der Zerreißung liegenden Theile des Rückenmarks Statt fand; daß endlich die Fortdauer des Bewußtseyns nur sehr kurz war.

3. Von Rumpfnerven.

§. 614. Wir haben die Rumpfnerven als ein eigenhümliches System anerkannt, welches seine Centralenden in sich hat (§. 43.), aber Verbindungen mit den Rückenmarksnerven eingeht, so daß theils aus den Geflechten an den Rumpfeingeweiden einzelne Fäden von den Rumpfnerven sich ablösen und zum Rückenmarke gehen, theils aus den

Verzweigungen der Rückenmarksnerven einzelne Fäden zum Gangliensysteme laufen (§. 41. 61.). Wir haben ferner die Sinnesorgane als Kopfeingeweide anerkannt (§. 48. 57.); was für den Rumpf oder für den Bereich des Rückenmarks Lungen, Magen u. s. w. sind, das sind für den Kopf oder für den Bereich des Gehirns Mund, Nase, Ohr und Auge. Diesen Organen, als Kopfeingeweiden, kommt denn auch der Rumpfnerv zu, nur mit dem Unterschiede, daß das Gehirn mächtiger ist, mehr Nerven von der Peripherie an sich zieht und dem Rumpfnerven weniger überläßt. Aus der innersten eigentlich sensibeln Sphäre der Kopfsinne treten die Sinnesnerven, und zwar aus der Netzhaut und dem Labyrinth ohne eine Verhinderung einzugehen, aus der Nase hingegen nach einiger peripherischen Verbindung mit Hilfsnerven. Aus den irritablen und plastischen Sphären hingegen treten theils Nerven, welche mit Zweigen von Haut und Muskeln vereint zum Gehirn fortgehn; theils welche, die in Ganglien sich scheiden in stärkere Zweige, die den Hirnnerven angehören, und in schwächere Reiser, welche gegen den Gangliensbaum sich herabsenken. Hier findet also das entgegen gesetzte Verhältniß Statt, als im Rumpfe, wo von den Eingeweiden starke Zweige zum Gangliensysteme und bloß einzelne Fäden zum Rückenmarke gehn. Diese Uebermacht des Gehirns bezeichnet den höchsten, den Sinnen gehörigen Umkreis des Rumpfnerven in polarischem Gegensatz zu dessen unterstem Umkreise in den Beckeneingeweiden; wo das Rückenmark waltet und die Beziehung zur Bewegung am stärksten hervortritt an beyden Endpuncten gehet das Pflanzliche im Thierischen auf. Es ist möglich und der Analogie nach wahrscheinlich, daß in den Anastomosen der übrigen Hirnnerven mit dem Rumpfnerven Leitstrahlen auch Fäden bekommt, die ihr peripherisches Ende in Haut und Muskeln des Kopfs haben. Aber es scheint gewiß, daß die Fäden des Rumpfnerven, wo sie sich mit einem Hirnnerven verbinden, mit diesen zu den peripherischen Organen, nicht aber zum Gehirn fortgehn. Die Richtigkeit dieser zuerst von Petit nach den unten angeführten Versuchen aufgestellten Ansicht hat von Bergen (*Haller's Disputat. II. p. 854*) erwiesen. Daß nämlich der sympathische Nerve nicht vom Gehirn her oder aus dem Stamme des fünften und sechsten Paares kommt, sondern vielmehr mit denselben ein gemeinschaftliches peripherisches Ende hat, und von ihrem Zweigen sich ablöst nur zu seinem Stamme heranzusteigen, erhält 1) aus der Richtung, indem er mit diesen Zweigen einen nicht nach dem Gehirn, sondern nach den peripherischen Enden zu gerichteten spitzen Winkel bildet; 2) daraus, daß das sechste Paar von dieser Stelle aus nicht gegen das Gehirn, sondern gegen sein peripherisches Ende zu dicker ist, oder mit andern Worten, daß er in seinem Verlaufe gegen das Gehirn nach Abgabe des Zweigs zum sympathischen Nerven dünner wird; 3) aus dem Augenscheine, indem man unter dem Mikroskope deutlich Fäden von den Zweigen, nicht von den Stämmen des fünften und sechsten Paares, zum sympathischen Nerven abwärts gehn sieht; 4) wenn der sympathische Nerve nach Art der Hirnnerven sich vertheilt und durch das fünfte und sechste Paar in das Gehirn sich einsenkte, also der Halstheil sein Stamm wäre, so müßte dieser unten schwächer, oben stärker seyn, da doch gerade das Umgekehrte Statt findet; 5) er begleitet die Carotis; hätte er nun sein centrales Ende im Gehirn, so müßte sein Stamm an den Verzweigungen der Carotis, und seine Verzweigung im Stamme derselben liegen: dies widerspricht

aber aller Analogie, denn nirgends läuft ein Nerve in der der Arterie gerade entgegengesetzten Richtung, vielmehr sind die peripherischen Enden von Arterien und Nerven immer beisammen. — Somit ist unter Andern Ackermann (*de syst. nerv. p. 87. 89. 97*) welcher den Rumpfnerven als Wurzeln des Gehirns selbst ansieht, hinlänglich widerlegt.

§. 615. Die physiologischen Erscheinungen, welche vermöge dieses Verhältnisses hervortreten, bestätigen zugleich die Wahrheit desselben. Nämlich der Rumpfnerv wirkt auf die Sinnesorgane, und trägt seinen durch die Rumpfeingeweide bestimmten Zustand auf dieselben über; durch Setzen von Einheit, durch Verknüpfung mit dem übrigen Organismus theilt er ihnen lebendige Kraft mit, bestimmt ihr pflanzliches Leben; und begründet so die Sinnesfähigkeit. Die darauf sich beziehenden Erscheinungen im krankhaften Zustande hat besonders Rahn (*Ludwig script. near. II. p. 278. 285. 290. 292*) zusammengestellt. 1) Bey Ausartung der Magen- und Darmsäfte, Darmwürmern u. s. w. wird die Sensibilität, wie die Absonderung in der Mundhöhle, abnorm, indem die Zunge sich belegt, Speichel zusammenfließt, der Geschmack unrein wird, Krampf in den Kau-muskeln eintritt u. s. w.; auch zeigt sich deutlich der Zusammenhang mit dem Gefäßsysteme; mir ist ein Fall bekannt, wo bey wahrhaft asthenischem Fieber nach einem Aderlasse die vorher reine Zunge plötzlich sich belegte. 2) Abnormitäten des Geruchs und Schnupfen sind oftmals die Folge eines krankhaften Zustandes der Verdauungsorgane, einer Anhäufung von Würmern oder einer atonischen Anschwellung der Eingeweide. 3) Eben so beruht Ohrensausen, Schwerhörigkeit und Taubheit zuweilen auf gastrischen Abnormitäten. 4) Dals Krämpfe der Augenmuskeln, Augenentzündung, Erweiterung des Schlochs und schwarzer Staar oftmals von Krankheiten der Unterleibsorgane abhängen, ist allgemein anerkannt. Im Auge spiegelt sich nicht allein die Seele, sondern auch der Zustand des Gefäßsystems und der Rumpfeingeweide. Bestimmter wird der Einfluß des Rumpfnerven auf das Auge durch folgende Thatfachen nachgewiesen. Van der Wiel beobachtete, dals ein Mensch, dem bey einer Brustwunde der sympathische Nerve verletzt worden war, anasarotisch wurde. Petit (*academie de Paris 1727. p. 16 179*) durchschnitt den sympathischen Nerven bey Hunden, ohne jedoch den damit verwachsenen herumschweifenden Nerven davon trennen zu können, bezog aber mit Recht die darauf folgenden Erscheinungen an den Augen auf die Verletzung des erstern, da er die Verbindungsäden zwischen denselben und dem Ciliarganglion schon kannte. Das Ergebnis der von ihm erzählten zwölf Versuche ist Folgendes. Eine Viertelstunde, spätestens eine Stunde nach der Durchschneidung wurde das Auge trübe und glandlos; die Blinzhaut trat bis zur Hornhaut vor; die Pupille verengerte sich, doch in dem einen Falle erweiterte sie sich; die Bindehaut entzündete sich zuweilen, und es erfolgte eine reichliche wässrige und eitrige Absonderung; die Hornhaut wurde flach, und das ganze Auge kleiner; einmal nahm die Störung im Auge so weit zu, dals das Thier zuletzt fast gar nicht sehen konnte. Starb das Thier, so fand Petit den Augapfel kleiner und die Flüssigkeit in demselben verringert; blieb es heym Leben, so kehrte nach einigen Wochen Glanz und Fülle des Auges allmählig zurück; doch blieb die Blinzhaut vorhängend. Molinelli (*acad. Bonon. III. p. 280*) beobachtete nach Unterbindung des herumschweifenden und sympathischen Nerven dieselben Veränderungen am Auge. Dur-

puy (*Bulletin de la société d'émulation* 1816. Decbr.) sah nach Durchschneidung des obern Halsstammganglions bey einem Pferde Verengerung des Schlochs und Röthung der Bindehaut. Arneemann beschreibt mehrere Versuche, wo er bey Hunden das sechste Paar allein durchschnitten haben wollte, und worauf das Auge thürend, empfindlich, entzündet, die Hornhaut trückerig, dunkel, wie mit Schleim belegt wurde (66, 90, 91, 92, 94, 104, 107, 108, 110ter Versuch). Aber ohne Zweifel irrte er sich, und durchschnitt zugleich den sympathischen Nerven, denn erstlich läßt sich bey einem lebenden Hunde die Verbindung beyder Nerven äusserst schwer trennen; zweytens war der Erfolg ganz derselbe in den Versuchen, wo er beyder Nerven durchschnitten zu haben erkannte (68, 105, 110ter Versuch); endlich hatte die Durchschneidung des herumschweifenden Nerven bey Kaninchen (4, 5, 6, 7, 10ter Versuch), wo derselbe mit dem sympathischen Nerven nicht verwachsen ist, nie Einfluß auf das Auge, welchen Arneemann gewiß nicht übersehen haben würde. Uebrigens will er einmal (106 Versuch) bey einem Hunde den sympathischen Nerven der rechten Seite allein durchschnitten und darauf eine heftige Entzündung beyder Augen beobachtet haben. — Wenn Zink in die Mundhöhle und Silber in den Mastdarm gebracht wird, so entstehen hellere Blitze vor den Augen, als von irgend einer andern Anwendung des Galvanismus (Humboldt die gereizte Muskelfaser, I. Seite 334.).

4, 616. Das Rumpfnervensystem muß nun durch seine vielfache Verbindung mit Hirnnerven auch auf das Gehirn wirken und dem Zustande der Rumpforgane entsprechende Eindrücke auf die Seele machen können. Diese Einwirkung ist aber im gewöhnlichen Zustande nur gering, denn der Rumpfnerv ist überhaupt ein trüger Leiter, und ehe er dem Kreise des Gehirns näher rückt, durchkreuzen sich seine Fäden vielfach in Geflechten, und verschmelzen in Ganglien, so daß nur der Gesamteindruck auf das Gehirn übertragen und zur Wahrnehmung gebracht werden kann. So erhält der Gesunde keine Vorstellung von der Einzelheit seiner Rumpforgane, und so lange das Normale in der Gesamtheit überwiegt, wird das allmählig entstehende und ohne bedeutende Spannung entwickelte Uebelbefinden eines einzelnen Gliedes nicht wahrgenommen; ja selbst äussere Verletzung bewirkt nur stumpfe Empfindung. Erst wo in einem einzelnen Eingeweide eine höhere Spannung, und ein stärkerer Gegensatz gegen die übrigen, namentlich Entzündung sich entwickelt, da ist auch der Eindruck auf den Rumpfnerven mächtiger, die Leitung vollkommener und die Empfindung schärfer. — So kann auch eine sehr starke Erschütterung des Oberbauchgeflechtes, namentlich durch einen Stoß gegen den vollen Magen bewirkt, gleich einer Hirnerschütterung wirken, Betäubung und augenblicklichen Tod herbeyführend. — Ein andrer Umstand, wegen dessen die Wahrnehmung mittels des Rumpfnerven beschränkt ist, liegt in den Gestaltungsverhältnissen seines obern Endes. Da seine Fäden vom obern Halsstammganglion aus vielmehr zu den Hirnnerven und mit diesen zu deren peripherischen Enden, als gegen das Gehirn zu, gehen, so kann nur ein matter Wiederhall von ihnen in das Gehirn und zum Bewusstseyn gelangen. Also die Eindrücke von den Abnormalitäten der Eingeweide, sofern sie durch den Rumpfnerven geleitet werden, müssen zunächst auf die Kopfeingeweide, Sinnesorgane, Gehörkopf und Speiseröhrenkopf, Muskeln und Haut des Kopfes wirken, und hier Störun-

gen veranlassen, welche denn auch wirklich dem Arzte als Zeichen vom Zustande der Rumpfeingeweide dienen; erst durch Reflexion von diesen peripherischen Organen, folglich auch mit gebrochener Kraft, gelangen die Eindrücke zum Gehirne; und erregen hier dunkle Empfindungen von Unwohlseyn, Beklemmung, Angst, oder mächtige, und doch unbestimmte Triebe zu gewaltsamen Handlungen. Ein Gefühl von Zusammenschürung in dem Oberbauchgeflechte, Hitze im Unterleibe, Heißhunger oder Abscheu gegen Nahrung sind gewöhnliche Symptome der Verrücktheit, welche aus dem Unterleibe stammt. — Wo aber die Sinnesorgane in ihrer Gesamtheit gegen die Aussenwelt geschlossen und isolirt sind, treten die Leitungen des Rumpfnerven ungestörter zum Gehirne. So gelangen im Traume die Zustände der Eingeweide zum Bewußtseyn; aber, weil die Leitung durch die Sinnesorgane vermittelt wird, unter der Form von Sinnesindrücken, und vermöge der Herrschaft des Auges besonders in sichtbarer Gestaltung; der hemmende Blutandrang nach Herz und Lungen erscheint dann als ein die Brust drückender schwarzer Gnom; die Reizung des Magens erscheint als eine reich besetzte Tafel u. s. w. Auch im wachen Zustande können bisweilen Abnormitäten der Rumpfeingeweide bestimmend auf die Sinne wirken und ihrem Verkehre mit der Aussenwelt eigene Trugbilder unter-schieben: so kann der Eindruck von dem hämorrhoidali-schen Wellen des Blutes, durch den Rumpfnerven fortgepflanzt, eine zweyte Pata Morgana erregen und einen langen Zug auf- und abwandelnder Gestalten erblicken lassen; der Typhuskränke sieht in der wilden Bewegung seines Blutes das Toben eines Volksanfalls, und in dem Zwiespalte seiner organischen Thätigkeiten eine fremde Person, die sich ihm aufgedrängt hat. Die höchste Scheidung von der Aussenwelt findet auf den höhern Stufen des Schlafwandels Statt: hier gehen die Leitungen von den Rumpfnerven durch alle Sinnesorgane zum Gehirne, ohne daß sinnliche Bilder sich brymischen, und es kommt zu reinerer Anschauung des Zustandes der Eingeweide, als einem beginnenden Aufgehen der innern Welt. In Betreff der Leitung zu den Augen ist vielleicht die Aussage der von von Gheert (Kiezers Archiv II. Bd. 2. St. S. 26.) beobachteten Somaambulie nicht ohne Bedeutung: „wenn sich mein Bewußtseyn neben dem Magen, auf der Stelle, wo die Nerven zusammenkommen, sammelt, so sehe ich durch nichts Andres, als durch die kleinen Nerven, welche unter den Augen liegen, und die mit der Stelle am Magen in Verbindung stehen, wo alle die Nerven in einander laufen.“ Wenigstens würde diese Angabe Bedeutung haben, wenn der Magnetiseur sich erklärt hätte, daß ihm die von mir aufgestellte physiologische Ansicht fremd gewesen sey.

§. 617. Was die Wirkung der Rumpfeingeweide auf Gemüthsstimmung und Phantasie betrifft, so dringt sich uns besonders der scheidende Gegensatz zwischen den Wirkungen der Stockung im Pfortadensysteme und der Lungensucht auf. Mit jener ist die Einbildung alles Uebels, Kleinmuth, Trostlosigkeit, Furchtsamkeit, Lebensüberdruß, mit dieser rege Lebenslust und nie versiegende Hoffnung verbunden. Allerdings wird dieser Gegensatz zum Theil durch die verschiedene Art des Leidens der Rumpfgeweide bestimmt, indem dort ein lähmungsartiger Zustand der Gefäße, hier ein gereizter Zustand der Luftorgane; dort Stockung und ein die Hirnthätigkeit fesselndes Uebergewicht der Masse, hier Auflösung, Abnahme der Materie und ihrer hemmenden Macht; dort Vor-

herrschen des schwarzen, hier des hellrothen Blutes Statt findet. Eben so mag die Eigenthümlichkeit des Gewebes der leidenden Organe daran Theil haben. Indess scheint auch der Gegensatz zwischen obern und untern Rumpfnerven nicht ohne Einfluß zu seyn. Denn wenn auch Leiden des Herzens und der Lungen eine ängstliche Stimmung bewirken, und Abnormitäten des Hersens, Manie und Melancholie veranlassen können, so ist es doch den Eingewekeln des Unterleibes besonders eigen, die freye Seelenthätigkeit zu stören oder zu fesseln, und Melancholie zu veranlassen. Hierbey zeigt es sich, aber wieder, daß der Rumpfnerve kein Centralende im Gehirne hat und nicht auf geradem Wege, sondern nur durch Reflexion auf dasselbe wirkt. Denn wenn das Erkranken der Leber, der Milz, des Darmcanals, des Hämorrhoidalsystems und des Fruchthälters, in welchen Organen theils das zehnte Hirnnervenspaar, theils die untern Rückenmarksnerven wurzeln, so häufig die Seelenthätigkeit stört, so ist es dagegen äusserst selten, daß Organe, welche ausschließlich Rumpfnerven besitzen, namentlich die Nieren, zu Entstehung von Seelenkrankheiten Anlaß geben. — Zum Theil kann der Rumpfnerve vielleicht auch dadurch auf die Phantasie wirken, daß er die Hirngefäße erregt. Endlich ist noch zu erwähnen, daß ein antagonistischer Zustand zwischen dem Systeme der Rumpfnerven und dem des Gehirns und Rückenmarks Statt finden kann, so daß das Wuchern des Erstern ein Darben des Letztern, oder dieses Jenes zur Folge hat. Pinel der Jüngere (Nasse Zeitschrift 1821. L. Heft 8. 215 — 220) fand bey neun Blödsinnigen die Nerven des Gehirns und Rückenmarks dünn, wie atrophisch, von dichtem Zellgewebe umgeben, den sympathischen Nerven aber im entgegengesetzten Zustande, und in seinen Ganglien sowohl, als in seinen Zweigen stark entwickelt; Lobstein (*de nervo sympathico* p. 53) beobachtete dasselbe. Uebrigens ist der Rumpfnerve bey Acephalen vorhanden und bey Hemicephalen normal.

§. 618. Die Thätigkeit der Sinnesorgane und übrigen Kopfeingeweide pflanzt sich theils durch die Hirnnerven, theils durch die Rumpfnerven fort. Vermöge dieser letztern Richtung kann denn das, was die Sinne erregt, auch das plastische Leben im Rumpfe steigern. So erfährt man schon eine allgemeine Erquickung, wenn man nach Anstrengung und Entbehrung ein erfrischendes Getränk nur in den Mund bringt, und bey Verringerung der Speiseröhre bewirkt Wein, in den Mund gehalten, eine allgemeine Belohnung. Die Gerüche wirken auf das Herz, indem sie bald durch Ueberreizung Ohnmacht bewirken, bald dieselbe durch ihre belebende Wirkung aufheben. Ein zu starkes Geräusch stört die Verdauung, und man hat Menschen beobachtet, welche bey gewissen Berührungen des äussern Ohrs, bey starkem Schalle oder beym Klänge gewisser musikalischer Instrumente sich erbrechen oder harnen mußten (*Ludwig script. neurop. IV. p. 295*). Das Licht wirkt belebend auf den gesammten plastischen Proceß, und zwar wahrscheinlich nicht allein durch seinen Einfluß auf die Haut, sondern auch durch Erregung des Auges.

§. 619. Auch vom Gehirne ist das Rumpfnervensystem nur einigermaßen abhängig, es hat verhältnißmäßig mehr ein eigenes und isolirtes Leben, und ist der centralen Einheit und Gesammtheit der Sensibilität weniger unterthan, daher auch vorzüglich nur von den nächsten Stellen des Rückenmarks abhängig (§. 316). Nur vorzüglich stark und

anhaltende Veränderungen der Hirnthätigkeit können durch Reflex von den Hirnnerven auf die Rumpfnerven wirken. Phantasie und Gemüth wirken auf Herz, Lungen, Magen, Leber, Mastdarm, Harnblase und Zeugungstheile vorzüglich wohl nur direct durch das zehnte Hirnnervenpaar und durch die untern Rückenmarksnerven; aber sie scheinen doch auch Organe, deren Nerven nicht dem Gehirn oder Rückenmark, sondern dem Rumpfnervensysteme angehören, namentlich Nieren und Ovarien zu afficiren. Furcht und Schreck erregen reichliche, wässerige Harnabsonderung, und wollüstige Phantasie giebt zu Aftergebilden in den Ovarien Anlaß. Freylich ist immer noch die Frage, ob nicht im erstern Falle bloß die Entleerung der Blase beschleunigt ist, und ob nicht im zweyten Falle eine wollüstige Reizung der äussern Geschlechtstheile Anlaß gab. Sticherer scheint die Bemerkung, daß durch Hirnerschütterung eine Entkräftung des Plästchens in seiner Gesamtheit erfolgt, indem bey einem sonst blühenden und festen Körper das aus der Ader geflossene Blut ganz flüssig und ohne Bindung erscheint, Afterbildungen leicht empor wuchern und Entartungen der organischen Substanz mit sonst ungewöhnlicher Schnelligkeit eintreten.

3. Von den Hirnnerven.

§. 620. Die Ausenwerke der Seele, Sinnesorgane und willkürliche Muskeln, und die verschiedenen Eingeweide als Organe des schlechthin äussern pflanzlichen Lebens bilden Gegensätze zum Gehirne. Damit nun eine Wechselwirkung möglich werde, müssen Zwischenglieder der Gegensätze auftreten, welche als bloße Momente einer Gesamtfunktion nur die Beziehung ausdrücken, und die Vermittelung bewerkstelligen. Es giebt aber überhaupt zweyerley Züge dieser Art, welche in Stetigkeit des Zusammenhangs durch den ganzen Organismus sich erstrecken, das Leben jedes Organs mit dem Ganzen verknüpfen, und den Verkehr der einzelnen Glieder unter einander, so wie ihren Zusammenhang mit dem Ganzen vermitteln: Nerven und Gefäße. Während die übrigen Organe an Zweigen der Nerven und Gefäße hängen, ist die Wurzel der Gefäße im Herzen und der Nerven im Gehirn. Wie nun diese beyden Centralorgane ihre Radien in alle Theile ausbreiten, so senden sie auch einander dieselben zu. Durch das Blut wirkt das Herz als Repräsentant des Leibes materiell und erregend auf das Gehirn; der dynamische Verkehr zwischen dem Gehirn und dem Leibe wird durch das Rückenmark und die Rumpfnerven mittelbar, unmittelbar aber durch die Hirnnerven bewerkstelligt.

§. 621. Gehirn und Nerven bestehen gegenseitig durch einander, wie Mittelpunkt und Umkreis: in Jenem ist der Gesamtbegriff verwirklicht, während in Diesem die Momente vereinzelt auftreten. Die Nerven sind die einzelnen Beziehungen zwischen der Seele einerseits, und dem Leben des übrigen Leibes, so wie der Außenwelt andererseits. — Ein organisches Glied belebt das andre, indem es das von ihm selbst Gebildete dem andern mittheilt und vermöge seiner eignen Lebendigkeit eine gleiche in dem andern erregt: so stehen die Nerven und die Organe, in welchen sie ihr peripherisches Ende haben, zu dem Gehirn im Verhältnisse gegenseitiger Erregung.

§. 622. Somit können wir die Nerven zunächst betrachten als Ausläufer der verschiedenen Organe des Leibs, durch welche diese aus ihrer Einzelheit hervorgehn, hö-

here Einheit suchend, dem Gehirne entgegenstreben und diesen ihre dynamischen Zustände einbilden. Die Lebendigkeit der Organe gegen den Centralpunct richtend, vermögen sie die Seele zu wecken, anzufachen und zu erregen, und sind mit dem Blute die Elementarbedingungen des Hirnlebens. Sie wirken aber entweder unmittelbar auf die Seele, indem sie ihr bestimmte Objecte darbieten, und das, was sie zum Gehirne geleitet haben, zur Anschauung bringen als Gemeingefühl und Sinneswahrnehmung; oder sie wirken mehr mittelbar, und geben der Seele bloß eine allgemeine Stimmung, indem sie zunächst das pflanzliche Leben des Gehirns, nicht das Bewußtseyn afficiren. — Ihr plastischer, so wie ihr dynamischer Zustand kann sich auf das Gehirn fortpflanzen. Wenn die äussern Spähren des Auges zerstört sind, so welken mit den Nerven auch die Sehhügel (§. 280.). Eine um die aneurismatische rechte Achselarterie gelegte Ligatur verursachte eine Entzündung des dritten Halsnerven der rechten Seite, worauf eine Entzündung in der linken Hemisphäre des großen Hirns erfolgte (Lallemand l. p. 125.). Da bey der Wasserschen ein entzündlicher Zustand sowohl in der Bisswunde und in den benachbarten Nerven (nach Metzger, Gherardini, Autenrieth, Renner n. s. w.), als auch an den plastischen Häuten des Gehirns und Rückenmarks (nach Morgagni, Ferriar, Marshal u. s. w.) nicht selten beobachtet wird, so stellte ich (Russische Sammlung l. 8. 34. fg.) den Krankheitserscheinungen zufolge die Vermuthung auf, daß eine vermöge der specifischen Natur des Wuthgiftes auf den fünften und zehnten Hirnnerven übergetragene Entzündung das Wesen dieser Krankheit ausmache. Mag auch die Entzündung sich nicht ausbilden, soviel ist gewiß, daß die Wasserschen eine Alienation der Sensibilität ist, welche von der Peripherie ausgeht und von da über das Gehirn sich verbreitet: daher behauptet sich hier auch die centrale Thätigkeit, das Bewußtseyn so lange im Kampfe gegen die andringende Verwirrung, gegen die Sehnen für die Elemente, Wasser, Luft und Licht, und gegen den Trieb zu beißen, wie denn auch die bey übrigen ungestörtem Bewußtseyn bestehende fixe Sucht nicht auf einer idiopathischen Hirnkrankheit, sondern auf einer Abnormität in den Unterleibsorganen beruht.

ANMERKUNG

§. 623. Wenn der Leib durch Blut und Nerven, materiell und dynamisch auf das Gehirn wirkt, so ist dagegen der Einfluß des Letztern auf Erstern mehr rein-dynamisch und durch Nerven vermittelt. Diese zeigen sich hier als Ausstrahlungen des Gehirns; durch sie wirkt das pflanzliche Leben desselben, wie es theils durch leibliche, theils durch psychische Momente bestimmt ist, belebend auf die Organe, in welchen sie ihr peripherisches Ende haben, denn Alles bedarf der Kräftigung durch das Wesentliche im Leben, durch das Centrum: das Auge glänzt bey gesteigerter Gefäßthätigkeit des Gehirns; wie bey erhöhter Seelenthätigkeit, und das Glied, dessen sämtliche Nerven durchschnitten sind, magert ab. Blut und Nerven haben Spannung und Lebendigkeit im Gehirne erzeugt; was davon im Gehirne selbst nicht consumirt wird, strahlt von ihm durch die Nerven auf den übrigen Körper zurück; so wird der Leib gestärkt durch den Schlaf, und ermattet bey Aufregung der Seele. Ausserdem vermitteln die Nerven die Gemeinschaft des Willens mit dem irribeln Leben. Sie durchdringen solchergestalt den Leib mit der Kraft des Gehirns, werden die Repräsentanten desselben in den Organen, mit

welchen sie, ihre Hüllen ablegend, eine nähere Gemeinschaft eingehen, und vermitteln die Allgegenwart der Seele im Leibe:

§. 614. Als Mittler zwischen dem Gehirne und den übrigen Organen, werden sie bey dem Embryo erst nach weiterer Ausbildung dieser Polarität sichtbar, und zwar, wie es scheint, zuerst in denjenigen Organen, welche dem Gehirne am nächsten verwandt sind: so erkanntet Wenzels (*geschr. p. 278 299.*) bey dem Hühnchen zuerst den Schnerven am 16ten, dann das fünfte und sechste Paar am 17ten, hierauf das dritte und siebente am 18ten Tage des Brütens. — Das Streben der Organe, eine höhere Einheit zu finden, zeigt sich auch bey gehemmter Entwicklung des Gehirns. Bey Hemicephalen nämlich sind die Nerven des Kopfs und seiner Sinnesorgane mit ihrem peripherischen Theile vorhanden, aber entweder erlöschen sie schon in der Staumbildung und es ist z. B. bey normaler Netzhaut, der Sehnerv nicht als ein rother, hohler Cylinder (Nr. 638), oder sie bilden Stämme, welche vor dem Eintritte in die Schädelhöhle aufhören und in häutige Röhren sich umwandeln (Nr. 606. 618), oder diese Stämme endigen frey in dem Zellgewebe innerhalb der Schädelhöhle (Nr. 607. 611. 617), oder sie gehen in die schwammige Masse über, welche die Stelle des Gehirns einnimmt (Nr. 612. 621. 637), oder sie endigen in einzelne Markklumpchen, welche die Rudimente des Hirnstamms darstellen (Nr. 645. 651). Serres behauptet geradezu, daß die Nerven von den peripherischen Organen aus; und endlich in das Gehirn einwachsen; indeß ist es nach andern Thatsachen der Entwicklungsgeschichte wahrscheinlicher, daß von beyden Punkten ausgehende Strömungen einander begegnen; auch fand Rudolphi (Berliner Akademie 1815) bey einer Mißgeburt, wo der rechte Augapfel fehlte, das Rudiment eines rechten Schnerven am Gehirne. — Auf der andern Seite hat man auch Sinnesorgane, selbst das Auge, in dergleichen Fällen, ohne alle Nerven gesehen (*Klinkosch Diss. Prag. p. 204.*). Nie hat man dagegen ein ausgebildetes Gehirn ohne alle Nerven gefunden. Die Nerven sind also mehr abhängig von den peripherischen Organen, als vom Gehirne. Dies erhellt auch daraus, daß sie oftmals welken, wenn die Sinnesorgane oder Muskeln zerstört sind, und dagegen nach der Durchschneidung zu ihrem untern, mit dem Gehirne nicht mehr zusammenhängenden Theile so stark und wohl genährt bleiben, als zuvor (Monro p. 27.). Und wie es eine Peripherie ohne Centrum, Nerven ohne Gehirn, aber kein Centrum ohne Peripherie, kein Gehirn ohne Nerven giebt, so ist die Empfindung früher, als die Willkühr, und wir können uns eine Seele denken ohne Macht, den Körper zu bestimmen, aber nicht ohne Fähigkeit, äussere Eindrücke aufzunehmen. Wo aber der Begriff eines belebten Organismus vollständig sich verwirklicht, erscheint der Nerve in seinem normalen Verhältnisse durch gegenseitige Beziehung von Mittelpunct und Umkreis, und die Wechselwirkung wird bedingt theils durch die Lebendigkeit des Gehirns, theils durch die Lebendigkeit der übrigen Organe, theils durch die ungethemmte, thätige Gemeinschaft zwischen centralm und peripherischem Ende der Nerven. Diese Vermittlung, Leitung und Uebertragung erfolgt bisweilen langsamer, indem das eine Glied seine Eigenthümlichkeit und seinen bisherigen Lebenszustand behauptet, ehe es sich dem Einflusse seines Gegenseitiges dahin giebt: so entsteht z. B. eine Lähmung in den Gliedern erst, nachdem schon eine Zeitlang ein abnormer Zustand im Gehirne vorhanden war, und sie dauert noch eine Zeitlang fort,

nachdem dieser schon beseitigt ist. Uebrigens geht die Leitung nicht immer in einfacher Richtung vor sich, weil sie eben dynamisch (§. 24) ist. Abnormitäten im Gehirne verursachen oft Schmerz in den Gliedern (§. 33g); hier ist eine Leitung nach der Peripherie, wodurch eine abnorme Stimmung in den Gliedern gesetzt wird, und gleichzeitig eine Leitung nach dem Centrum, welche die Perception jener Wirkung vermittelt. So bewirkt eine Abnormität im Gehirne Krampf oder Lähmung bisweilen zuerst in den äussersten Punkten, und von da aus fortschreitend immer näher nach dem Gehirne zu.

§. 625. Daß der polare Gegensatz das Wesen dieser Wechselwirkung ausmacht, geht unter Andreem auch daraus hervor, daß gerade in den Gebilden, welche die letzten Nervenspitzen enthalten, die lebhafteste Sensibilität erscheint; so behalten die Zähne ungeachtet des häufigen Druckes bey'm Gehen und Stehen immer eine bedeutende Empfindlichkeit. — Die Zahl der verschiedenen Nervenpaare, mit welchen ein Gebilde in Verbindung steht, drückt die mannichfaltigen Beziehungen desselben zur Seele aus, und entspricht dem Grade seiner Lebendigkeit. Der Verkehr des Gehirns mit den Organen ist aber bald so, daß diese bloß auf das pflanzliche Leben des Gehirns wirken, bloß Gemeingefühl in der Seele erregend, und dieses nur die plastische Thätigkeit und unwillkürliche Bewegung derselben bestimmt; bald so, daß ihre Thätigkeit im Sinne angeschaut und von dem Willen gelenkt wird. Wovon hängt nun diese Verschiedenheit des durch Nerven vermittelten Verkehrs ab? 1) Wir können sie in der Verschiedenheit der Nervenstämme und ihrer Centralenden suchen: jeder Gehirnthheil kann seine Eigenthümlichkeit haben; vermöge deren er dem plastischen Leben, oder der Sinnesthätigkeit, oder der willkürlichen Bewegung verwandt ist, und er kann diese seine Beziehung auf die in ihm wurzelnden Nerven übertragen. So ist es unstreitig mit den drey reinen Sinnesnerven des Gehirns. Aber bey den übrigen Paaren gehen von demselben Nervenstamme, ja von demselben Aste und Zweige einige Reiser zur Haut, andre zu willkürlichen Muskeln, noch andre zu Drüsen. 2) Die Reiser können nach Verschiedenheit der Function eine verschiedene Beschaffenheit annehmen. Sie können durch Ganglienbildung; durch Verbindung mit den Rumpfnerven, und dadurch, daß sie diesen gleich werden, die Verbindung mit der Hirnthätigkeit beschränken und auf einen bloß plastischen Verkehr herabsetzen; so bildet sich das Ciliarganglion, das Kieferdrüseganglion, und so erscheint der *sphenopalatinus* weich und röthlich, einem Rumpfnerven ähnlich. Allein nicht überall findet dies Statt: die Reiser des *lacrimalis*, welche zur Thränendrüse gehn, bilden weder Ganglien, noch eine Verbindung mit dem *Sympathicus*, noch unterscheiden sie sich in ihrer Textur von den übrigen Reisern desselben Zweigs, die zu Augenmuskeln und zur Haut gehn; der *sphenopalatinus* verbreitet sich ungeachtet seiner Verwandtschaft mit dem Rumpfnerven auch an die Muskeln des Rachens und des Gaumensegels. 3) Also muß zu diesen allerdings wirksamen Momenten als Drittes, Wesentliches noch hinzutreten die eigenthümliche Beschaffenheit des peripherischen Organs (vgl. §. 36): jedes Gebilde steht durch seine Wesenheit entweder mit dem pflanzlichen oder mit dem psychischen Leben des Gehirns in Beziehung, und widerstrebt oder unterwirft sich dem unmittelbaren Dienste der Seele. Somit haben wir denn das wichtigste Moment für die Anschauung des Hirnnervensystems gewonnen, indem wir jedes Nervenpaar be-

trachten als die Summe der Beziehungen, welche er zwischen dem Gehirn und andern Organen vermittelt. Der Bezirk, in welchem es sich als Vermittler aufstellt, der Umkreis mannichfaltiger Gebilde, deren innere Lebendigkeit es zur Einheit des Gehirns zurückführt, bestimmt seinen Charakter.

§. 626. Wenn die räumliche Verknüpfung überhaupt die innere Wechselwirkung ausdrückt, so kann die Länge des Nervenstamms oder die Entfernung des peripherischen und centralen Endes nicht gleichgültig seyn, sondern muß neben Andreem auch ein Moment zu Bestimmung des Grades dieser Wechselwirkung abgeben. Was dem Gehirn zu nahe ist, muß dasselbe stärker ergreifen und aufregen, folglich eine mehr subjective Veränderung in ihm hervorbringen. Dies gilt vom Riechnerven: so wie er aus seinem Sinnesorgane getreten ist, taucht er sogleich in seinen Hirnthheil, den Riechkolben und Riechstreifen ein; Centrum und Peripherie fallen hier beynabe zusammen, und das pflanzliche Leben des Gehirns wird hier am mächtigsten bestimmt. Der Hörnerv hat sein peripherisches Ende in einer potenzierten Diploe des Schädels selbst, und daher wirkt seine Erregung vorzüglich auf die Subjectivität, auf die Stimmung des Gemüths; aber er läuft eine längere Strecke vom Felsenbeine aus, ehe er sein Centralende erreicht, und daher bringt er seine Eindrücke mehr zu objectiver Anschauung, als der Riechnerv. Der Sehnerv verläuft, nachdem er aus seinem peripherischen Organe getreten ist, noch eine Strecke ausserhalb der Schädelhöhle, in der Augenhöhle, ehe er dem Gehirn sich naht; daher, möchten wir sagen, bringt er die Eindrücke der Gegenstände für die Seele gerade in die rechte Schwelte, wo sie frey beherrscht werden können, erregt weniger die Subjectivität des Gehirns, sondern macht die klarste Anschauung des Objectes möglich. Mit der größern Länge vermindert sich dann wieder die Stärke des Eindrucks und die Klarheit seiner Anschauung in den Zungennerven, und die Länge des herumschweifenden Nerven mag mit zu den Momenten gehören, welche bewirken, daß seine untersten Zweige bloß ein dunkles Gemeingefühl vermitteln. Bey den Rückenmarksnerven ist es freylich anders; wie im Rückenmarke die Länge vorberrscht, so sind die äußersten Spitzen seiner Nerven an den Fingern und Zähnen, vermöge des polarischen Gegensatzes, gerade die sensibelsten und am freysten bewegenden.

§. 627. Die Dicke eines Nervenstamms bezeichnet die Zahl der Nervenfasern, die von den Organen zum Gehirn gehn, also die Intensität der Einwirkung der Peripherie auf das Centrum. Daß sie von dieser Beziehung, und nicht von der Stärke der centralen Einwirkung auf die Peripherie abhängt, sieht man daraus, daß sie bey den Sinnesnerven am stärksten ist; daß das fünfte Paar seine verhältnismäßige Dicke erst dann gewinnt, wenn das Antlitz und seine Sinnesorgane mit ihren Nebenhöhlen sich mehr ausbilden; und daß die Dicke der Nerven mit der Muskelkraft in keinem Verhältnisse steht, wie denn z. B. bey dem Löwen in Verhältniß zu den Muskeln auffallend dünne Nerven sich finden. Bringen wir den Bereich, den Raum, über welchen das peripherische Ende sich ausbreitet, mit in Anschlag, so sind die besonders Hirnnerven offenbar die dicksten. Dann folgen die allgemeinen Hirnnerven, und zwar so daß unter ihnen das sensible fünfte Paar das dickste, das irritable siebente hingegen das schwächste ist. Unter den Mittelnerven sind die irritablen, das elfte und vierte Paar die dünnsten, das sensible dritte

das dickste. — Je dicker also die Nerven sind im Verhältnisse zum Gehirne, um so mehr muß dieses von aussen bestimmt werden, und je mehr sein Umfang die Dicke der Nerven überwiegt, um so mehr muß es eigenmächtig das Aeusserere beherrschen. Hierin findet denn Sommerings (*de basi p. 14. Hirallehre S. 85. tabula basica p. 3 u. 4*) Satz; daß kein Thier bey einem so großen Gehirne so dünne Nerven hat, als der Mensch, seine Bedeutungslosigkeit.

§. 628. Indem die Nervenfasern von den peripherischen Enden her zusammenstreten, und sich allmählig in Reiser, Zweige, Aeste und Stämme sammeln, bringen sie schon eine gewisse Einheit in die ihnen mitgetheilten Thätigkeiten; je länger dagegen die vereinzelt Reiser und Zweige sind, und je kürzer der Stamm ist, um so weniger wird die Ansehung vorbereitet. Den entschiedensten Gegensatz bildet hier der Sehnerv, welcher gar keine Zweige hat, sondern seine peripherischen Enden sogleich zu einem Stamme vereint, und der Riechnerv, welcher gar keinen Stamm hat, sondern in vereinzelt Zweigen an seinen Hirnthell übergeht. So unterscheidet sich auch der thierische Körper dadurch, daß bey ihm die Nerven länger gespalten und mehr in einzelnen Zweigen dahin laufen, und die Stämme kürzer sind, als bey dem Menschen.

§. 629. Die Anastomosen, welche zu den reinen Sinnesnerven gänzlich fehlen, sind überal in den Rumpfnerven, und zeigen also eine Beziehung zur Plasticität. Demnach kommen sie vorzüglich bey den allgemeinen Hirnnerven vor, und zwar so, daß 1) die verschiedenen Zweige eines Paares unter einander sich verbinden, so die drey Aeste des fünften Paares und die Zweige des siebenten Paares im Antlitz, vor Allen aber die Zweige des zehnten Paares am Speiseröhrenkopfe und Luftröhrenkopfe, an der Speiseröhre und Luftröhre, an dem Magen und den Lungen. 2) Ein Paar anastomosirt mit dem andern, am vielfachsten das fünfte mit dem siebenten im Antlitz; weniger das siebente mit dem zehnten im Halse. 3) Ein allgemeines Paar anastomosirt mit einem Mittelpaare, am vielfachsten das zehnte mit dem neunten, elften und zwölften; dann das fünfte mit dem dritten, vierten, sechsten und zwölften; endlich das siebente mit dem neunten. 4) Die Anastomose mit irritablen Hirnnerven ist bey dem irritablen siebenten Paare am stärksten, schwächer bey dem fünften und zehnten. 5) Mit dem Rumpfnerven anastomosirt das plastische zehnte Paar am vielfachsten und in seinen ganzen Verläufe; nächst dem das fünfte, am wenigsten das siebente Paar. — Was die Mittelnerven der ersten Reihe anlangt, so anastomosirt 1) das erste Paar mit dem neunten und zwölften; 2) das neunte mit dem siebenten und zehnten; das zwölfte mit dem fünften und zehnten, das elfte mit dem zehnten allein; 3) das elfte Paar mit dem zweyten bis fünften Hirnnerven, das zwölfte mit dem ersten und zweyten Hirnnerven; das neunte Paar hingegen nicht; 4) mit dem Rumpfnerven anastomosirt das neunte Paar am vielfachsten; das zwölfte weniger; das elfte gar nicht. Von der zweyten Reihe verbinden sich 1) alle drey Paare mit dem fünften; 2) das sechste vorzüglich, weniger das dritte mit dem Rumpfnerven.

§. 630. Eine Eigentümlichkeit der allgemeinen Hirnnerven sind die rückläufigen Zweige, welche vom peripherischen Ende her anfänglich in einer ihrem Stamme entgegengesetzten Richtung verlaufen, also von ihrem Centralpunkte im Gehirne sich immer mehr entfernen, dann aber umkehren und in der Richtung des Stamms gegen das

Gehien zu sich fortsetzen. Mechanische Erklärungen können nicht genügen; z. B. Gallen's Meynung, daß der *Respirans* zu Verstärkung seines Einflusses auf den Kehlkopf, gleich einem Seile um eine Rolle sich schlinge, widerspricht unserer gegenwärtigen Kenntniß von den Nervenenthätigkeit; auch dürfen wir nicht annehmen, daß diese Zweige durch ein mechanisches Verhältniß gehindert werden, gleich von Anfang an, den geraden Weg gegen das Gehirn zu einschlagen, denn die untern Kehlkopfnerven sind durch nichts Hemmendes von ihrem Stamme geschieden, und dagegen werden die Löcher im Schädel durch den Verlauf der Nerven bestimmt. Es muß vielmehr diese Richtung einen besondern Sinn haben. Vergleichen wir die rücklaufenden Zweige unter einander, so finden wir, daß sie die Eigenschaft mit einander gemein haben, theils verschiedenartige Richtungen der Sensibilität in den verschiedenen Eingeweiden und Sinnesorganen unter einander zu verbinden, theils die Irregularität mit der Sensibilität innig zu verknüpfen. 1) Der rücklaufende Zweig des zehnten Paares spricht die Beziehung des Halses zur Brust aus, und hat seine peripherischen Enden sowohl in Organen unwillkürlicher Bewegung, Luftröhre, Speiseröhre und Arterien, als auch im Luftröhrenkopfe und Speiseröhrenkopfe, mithin in Organen, welche auch andre Nerven haben, die gerade gegen das Gehirn aufsteigen, und welche theils der Willkühr gehorchen, theils gegen äussere Reize sehr empfindlich sind und unwillkürlich sich bewegen. Wird vielleicht die willkürliche Bewegung der Stimmritze und des Speiseröhrenkopfs durch die obern Zweige des neunten und zehnten Paares, und die unwillkürliche durch den in die Brust sich einsenkenden rücklaufenden Nerven bestimmt? 2) Der Riachelnerv verknüpft die Nasenhöhle mit dem Auge, und läuft erst gegen das Gehirn zu, und dann wieder abwärts zu seinem Stamme; auch hat er peripherische Enden in den Muskeln der Nase und Oberlippe, welche noch andre zum fünften und siebenten Paare gehörige Nerven haben, und beym Schnaufen und Weinen unwillkürlich wirken. 3) Der Flügelnerve bringt das Kopfeinde des Rumpfnerven und den Rachen, so wie den Ausgang der Eustachischen Röhre in Beziehung zur Notenhöhle. 4) Die Paukenseite vermittelt die unwillkürliche Bewegung der Gehörknochen und verknüpft das innere Ohr mit der Zunge. — Auf eine ähnliche Weise sehen wir im Arteriensysteme Verknüpfung der mannichfaltigen Aeste durch rücklaufende Zweige überall, wo ein Scheidungspunct der Gliederung, ein Gegensatz an einander gränzender Gebilde sich findet: so an den Gelenken der Gliedmaßen im Gegensatze der obern und untern Knochen; an der vordern Fläche der Rumpfwand im Gegensatze von Brust und Bauch, obern und untern Gliedmaßen; an der Schilddrüse im Gegensatze von Kopf- und Armarterien; am Gehirn im Gegensatze vom großen und kleinen Hirne; am Magen im Gegensatze desselben zur Leber und des obern Magenmundes zum untern.

§. 63. Was den Lauf der Nerven innerhalb der Schädelhöhle betrifft, so erscheinen Gehirn und Rückenmark, als ein Ganzes, welches als Centrum die Nerven von allen Seiten her aufnimmt. Denken wir uns das Gehirn, als den obersten Theil des Rückenmarks fortgehend, also seine Beugung nach vorne obgerechnet, so daß sein vordres Ende das Oberste ist, so sehen wir in den zwöy obersten Halswirbeln einen Indifferenzpunct der Richtung, indem hier die Nerven in wagerechter Richtung vom Wirbel zum Rückenmark gehn, während die darüber gelegenen Nerven mehr abwärts gegen das Gehirn,

die darunter liegenden in fortschreitender Progression mehr aufwärts gegen das Rückenmark laufen. Die Lage dieses Indifferenzpunkts scheint nicht ohne Bedeutung zu seyn. Bey Säugethieren erstreckt er sich durch Hals und Brust und erst die Bauchnerven gehn schräge nach oben oder vorne gegen das Rückenmark. Beym Menschen hingegen wird das Rückenmark verkürzt und den ihm entsprechenden Wirbeln entrückt, indem es vom Gehirne angezogen und beherrscht wird; daher müssen die Rückenmarksnerven, mit Ausnahme der zwey obersten Halsnerven, innerhalb der Wirbelhöhle eine Strecke aufwärts, die Hirnnerven hingegen innerhalb der Schädelhöhle eine Strecke abwärts (rückwärts) laufen, ehe sie zu ihrem Centralpuncte gelangen.

Zweyter Theil

Vom Leben der Hirnthteile insbesondere.

Erste Abtheilung.

P r ä l i m i n a r i e n .

§. 632. Die Bemühung, das Hirnleben auch in seinen einzelnen Richtungen, und in seiner Beziehung zu den einzelnen Hirnthteilen näher kennen zu lernen, ist kein vermessener Vorwitz, sondern ein Werk des Forschungsgeistes, der bis zu den Grenzen der möglichen Erkenntniß vordringen will. Um aber auf solch schließfriger Bahn sicher zu gehn, müssen wir theils zuvor die Hülfsmittel erwägen, welche uns hier zu Gebote stehn (§. 633-643), theils vorläufig die Frage beantworten: was wir hier zu suchen haben (§. 644-651).

A. Hülfsmittel.

§. 633. Das erste Hülfsmittel der speciellen Physiologie des Gehirns ist die Vergleichung der abnormen Veränderungen in den materiellen Verhältnissen seiner einzelnen Theile mit den dabey eintretenden Veränderungen seiner einzelnen Lebensäußerungen. Jene Veränderungen sind aber theils solche, die im Verlaufe einer Krankheit eintreten (§. 634-637); theils solche, die wir absichtlich herbeiführen (§. 638).

§. 634. Es ist kein Zweifel, daß die pathologische Anatomie, welche die bey der Leichenöffnung gefundenen Abnormitäten mit den während des Lebens beobachteten Krankheitserscheinungen vergleicht, eine der wichtigsten Erkenntnißquellen ist, und zu belehrenden Resultaten führen kann. Aber diese bieten sich nicht beym ersten Griffe dar, sondern kommen erst nach mühsamerer Forschung zu Tage, und zwar so, daß sie auch dann noch zweydeutig bleiben, wenn sie nicht anderswo noch eine Stütze finden. Denn: 1) da das Entstehen und Fortschreiten der Krankheit sich nicht beobachten läßt, so können wir keine sichere Vergleichung ihrer Zeitverhältnisse mit denen der Symptome anstellen, welche doch ein Urtheil über die ursachliche Verknüpfung vorzüglich begründen muß. 2) In den meisten Fällen finden sich gleichzeitig mehrere Abnormitäten im Gehirne, und es bleibt ungewiß, ob diese oder jene mit einer bestimmten Krankheits-

scheidung zusammenhäng. 3) Die Symptome überhaupt sind wandelbare Erscheinungen, welche nur zum Theil in der allgemeinen Natur der Krankheit, zum Theil in der Individualität begründet, von der Stimmung und Spannung der Lebensthätigkeiten und Organe abhängig, also durch die Modalität der krank machenden Einwirkung, durch die vorhergegangenen Umstände, durch Gewohnheit u. s. w. bestimmt werden (Vgl. §. 511.). Kein Theil des Gehirns kann krankhaft verändert werden, ohne auf die übrigen störend einzuwirken: die örtliche Abnormität kann vermöge der bestehenden Spannungsverhältnisse bald die Lebensthätigkeit eines andern Theils vorzugsweise stören, und consensuell oder antagonistisch Symptome erregen, welche dem ursprünglich und materiell erkrankten Organe selbst fremd sind, bald ihre Wirkungen gleichförmig über das Ganze ausbreiten. Die Erscheinung, welche wir bey der Abnormität eines Hirnthells beobachten, kann auf der Steigerung seiner Function, vermöge der Statt findenden Reizung und antagonistischer Depression oder consensueller Erregung seines Gegensatzes, oder auch auf Schwächung des kranken Organs und consensueller Depression oder antagonistischer Steigerung in andern Organen, beruhen, u. s. w.

§. 635. Da aus diesen Gründen einzelne Fälle über die Functionen der Hirntheile uns gar nicht belehren können, so muß die Vergleichung einer großen Zahl von Fällen unser Urtheil leiten. Wenn in der Mehrzahl der Fälle die Störung einer Function mit dem Leiden eines Hirnthells zusammen trifft, so nehmen wir eine nähere Beziehung dieses Theils zu jener Function an. Was nämlich die Individualität in den einzelnen Fällen bewirkt, gleicht sich in ganzen Summen von Fällen wieder aus: in den Massen macht sich das Gesetz geltend, welches hier und da durch Zufälligkeiten gekemmt gewesen war. Dasselbe Princip ist es, was wir in der ganzen Naturkunde und Arzneikunde befolgend: die gesammte Empirie ist Nichts, als eine solche Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dabey bleibt nun allerdings der Uebelstand, daß eine Approximation zur Wahrheit nur bey sehr großen Summen zu erwarten steht. Indeß darf man doch deshalb nicht stöhnen, auch aus geringern Summen Resultate zu ziehen, da auch in ihnen das richtige Verhältniß sich offenbaren kann, wenn anders der Zufall günstig ist. Haben wir gegen 4000 Beobachtungen vor uns, so würde allerdings unser Material noch einmal so vollkommen seyn, wenn wir 40000 Beobachtungen hätten: allein wenn uns auch 40,000 zu Gebote stünden, wäre uns immer noch keine Gewißheit zu Theil geworden, da 40,000 neue Fälle ganz andre Resultate geben könnten! Das ist eben das Loos der Empirie, daß sie nie fertig wird: will man erst dann zur Beurtheilung schreiten, wenn man vermöge seiner empirischen Schätze vor allem Irrthume gesichert ist, so kommt man nie zum Urtheile, denn nur in der Unendlichkeit aller Fälle liegt die voll. Wahrheit. — In diesem Sinne habe ich denn am Schlusse dieses Werks eine Sammlung von 117 Beobachtungen aufgestellt, und die wichtigsten Momente der Leidenöffnung angegeben. Ich gebe damit eine Uebersicht dessen, was ich benutzt habe, vermöge deren es meinen Nachfolgern leichter werden wird, meine Arbeit zu vervollständigen und zu berichtigen: Ich habe vorzüglich solche Beobachtungen ausgewählt, welche eine genauere Angabe der kranken Hirntheile und der Krankheitserscheinungen darbieten; von häufiger vorkommenden und in ihren Wirkungen meist übereinstimmenden Krankheiten, z. B. von der acuten Hirnhöhlenwas-

versucht, von Verköcherungen der festen Hirnhaut u. s. w. habe ich bloß beyspielsweise einige Fälle angeführt. Um die Citate abkürzen zu können, habe ich die Beobachtungen numerirt. — Wenn ich gern zugebe, daß die Summe meines Materials zu gering ist, als daß es ganz sichere Schlüsse begründen könnte, so räume ich zugleich noch ein, daß die Beschaffenheit desselben nicht immer die erforderliche ist. Die Aerzte überschien bey der Leichenöffnung öfters eine wesentliche Abnormität, indem eine gleichzeitige, mehr in die Sinne fallende, z. B. Ergießung von Wasser oder Blut, ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht; der Ungeübte sieht bisweilen für eine Abnormität an, was bloß Folge seiner Präparationsweise ist, und behauptet, daß die Zirbel gefehlt habe, die er mit der Sichel, dem Zelte und dem Gefäßgeflechte herausgerissen hat, oder nimmt eine Erweichung im kleinen Hirne oder in den Stammganglien, die erst nach dem Tode bey zu spät angestellter Leichenöffnung durch die beginnende Fäulniß entstanden ist, als Krankheit an. Eine gründliche Kritik der einzelnen Beobachtungen würde oft unmöglich, auf jeden Fall aber unendlich weitläufig seyn. — Ich habe die Abnormitäten nach ihrer Qualität geordnet, und die Unterabtheilungen nach der Localität bestimmt. In beyden Hinsichten finden sich Schwierigkeiten. Wo mehrere Abnormitäten beysammen waren, habe ich diejenige, welche die vornehmste schien, als Ordnungsgrund gewählt, und die übrigen unter ihren Rubriken nach der Nummer des Falls, dem sie angehörten, citirt. Da es nämlich ungewiß ist, ob die beobachteten Krankheitserscheinungen von der Abnormität dieses oder jenes Hirnthells abhängen, so habe ich jeden Fall analysirt und in so viele Fälle zerlegt, als er Abnormitäten verschiedner Hirnthelle in sich faßt. Aber die Qualität der von einem Andern beobachteten Abnormität zu bestimmen, ist oft schwierig: ist der Balg, der beschrieben wird, ein Geschwür, oder ein Aftergebilde? ist die Erweichung wirklich eigenthümlich, oder eine eben beginnende Eiterung? ist die Festigkeit bloß Erhärtung, oder ein eignes Aftergebilde? — Viele Beobachter nehmen zu wenig Rücksicht auf die Localität, und sprechen z. B. von einer Verhärtung in den Hemisphären, ohne zu bestimmen, in welchem Lappen sie ihren Sitz hatte. Man bleibt bey der Leichenöffnung meist auf der alten Heerstraße, und nimmt, als ob man noch zu Mondini's Zeiten lebte, auf die neu entdeckten Gebilde keine Rücksicht: eine Abnormität im Ammonshorn wird äusserst selten, und eine im Linsenganglion gar nicht erwähnt, ungeachtet dies seit 40 Jahren hätte bekannt seyn können; von Abnormitäten in der Schleife, im Stabkranz, in der Zwinke u. s. w. ist noch weniger die Rede. — Das quantitative Verhältniß der Abnormität, z. B. der Grad der Verhärtung oder Erweichung oder der Umfang der Eiterung muß bedeutendem Einfluß auf die Krankheitserscheinungen haben, wird aber zu wenig beachtet. Dazu kommt, daß der Befangene oder Ungeübte über quantitative Verhältnisse, z. B. über die Consistenz und Größe der Theile, oder über die Menge einer Flüssigkeit leicht ein irriges Urtheil fällt, und als Abnormität annimmt, was gar keine ist.

§. 636. Die Krankheitserscheinungen, die in den angeführten Fällen beobachtet wurden, habe ich in den §. §. 652 — 709 zusammengestellt. Auch hier ist viel Unsichres: Zurüberst geben die Beobachter bisweilen manche Symptome, z. B. Kopfschmerz, Unruhe, Betäubung, als zu gewöhnlich, nicht an; gleichwohl müssen wir uns an ihre Aussagen halten, und dürfen jene Symptome nicht voraussetzen; die von der Erschütte-

rung bey Kopfwunden herrührende Betäubung habe ich in jener Zusammenstellung der Symptome unberücksichtigt gelassen. Sodann sind die Ausdrücke oft zweydeutig: z. B. Melancholie bedeutet bald krankhafte Affectio des Gefühls, bald Verrücktheit. Ferner kann hier, wo es auf eine allgemeine Uebersicht ankommt, weder unter den verschiedenen Arten und Abstufungen, noch unter den mancherley Zeitverhältnissen einer Krankheitserscheinung ein bestimmter Unterschied festgesetzt werden: so habe ich Benommenheit, Schlafsucht und Betäubung unter der allgemeinen Kategorie der Verdunkelung des Bewusstseyns zusammengestellt, und vielleicht manche Fälle hier aufgenommen, wo die Betäubung nicht die späte Folge der Gehirnanomalie, sondern das Symptom eines langwierigen Todeskampfes war. Dazu kommt nun noch die Mangelhaftigkeit der meisten Beobachtungen, namentlich in psychischer Hinsicht. Mit dem Mechanismus und dem leiblichen Leben des Kranken zunächst beschäftigt, nehmen Aerzte und Wundärzte seine psychischen Krankheitserscheinungen oft nicht wahr, besonders da sie ihn gewöhnlich nur zu kurze Zeit sehen, als daß sie ein vollständiges Bild von seinem Seelenzustande auffassen könnten. Fallen ihnen auch die größern Züge, die Abnormitäten des gemeinen Bewusstseyns oder des Gedächtnisses auf, so werden gar zu leicht die Veränderungen der Urtheilskraft, der Gefühle und Neigungen übersehen, zumal solche, die im Tumulte der Fieberbewegungen, wo das Leben selbst gefährdet ist, weniger hervortreten, und erst nach der leiblichen Genesung allmählig sich deutlicher zeigen können. Bemerken sie endlich auch auffallende psychische Erscheinungen, so fehlt es ihnen nur zu oft, z. B. in Hospitälern, an Gelegenheit sich zu unterrichten, ob diese Erscheinungen in der Individualität begründet und durch psychische Verhältnisse veranlaßt, oder Wirkungen der Hirnkrankheit sind.

§. 637. In den nach §. 719 eingeschalteten Tabellen habe ich zu Gewinnung von Resultaten die Summe der Fälle, in welchen eine Krankheitserscheinung beobachtet wurde, mit der Summe der Fälle, in welchen eine abnorme Veränderung der Hirntheile zu bemerken war, verglichen. Die Proportionen, welche hier aufgestellt werden, sind nicht allein wegen des schon (634 — 636) Gesagten, sondern auch wegen der getroffenen Auswahl der Beobachtungen unsicher. Denn zuvörderst wählen die Beobachter, besonders diejenigen Fälle zur Bekanntmachung, die durch die Sonderbarkeit und Ungewöhnlichkeit ihrer Zufälle sich auszeichnen; die also, wenn sie in größerer Zahl in Anschlag gebracht werden, eine unrichtige Proportion geben müssen. Sodann gerathen auch treffliche Forscher, indem sie bald nur Eins; bald Alles sehen wollen, auf Abwege; wodurch ihre Beobachtungen unsicher werden: Wenzels echteten bey der Epilepsie auf den Hirnanhang, *la Peyronie* bey Störung des Bewusstseyns auf den Balken, weil sie von einigen Beobachtungen eine unbeschränkte Anwendung machen zu dürfen glaubten; Greding dagegen zersplitterte seine vielseitigen, mühsamen und verdienstlichen Untersuchungen dergestalt, daß ein guter Theil derselben als Spreu erscheint. — Unter allen diesen Umständen läßt sich von der pathologischen Anatomie gegenwärtig noch keine große, aber doch einige Ausbeute erwarten. Wir wollen auf dem bezeichneten Wege, da er der einzig richtige zu seyn scheint, Resultate sammeln, um dann zu sehen, ob sie durch die Benutzung andrer Hülfsmittel bestätigt werden: Was die Pathologie gewähren kann, hat man

ihr meist deshalb noch nicht abgewonnen, weil man zu angeduldig war, und weil die Pathologen, anstatt das physiologische Verhältnisse zum nächsten Augenmerk zu machen; sofort zum Praktischen eilten, die Physiologen aber oft nur das ergriffen, was auf der Oberfläche der Pathologie schwimmt.

§. 638. Die Heilungsversuche, als da ist das an Kranken und Verwundeten angestellte Zusammendrücken, Einspritzen, Unterbinden und Abschneiden, gehen einige Wunde, die aber nicht bedeutend seyn können, da die Beobachtung durch den Hauptzweck der Erhaltung und Heilung des Kranken beschränkt wird. An Thieren angestellte Versuche aber bleiben in Hinsicht ihrer Wirkungen auf das innere Leben für immer zweydeutig. Einzelne stehende Beobachtungen sind auch hier unzuverlässig, und wenn auch eine große Reihe von Versuchen angestellt wird, so gebietet immer große Vorsicht und Unbefangenheit dazu, um die Wirkungen richtig aufzufassen und zu beurtheilen; noch haben wir nur wenig Untersuchungen dieser Art.

§. 639. Die Vergleichung der verschiedenen Bildungsformen, in welchen das Gehirn erscheint, mit den gleichzeitigen Modificationen der Lebensäußerungen begreift die Untersuchungen des Gehirns in der Thierreihe, im Laufe des Lebens (§. 640) und in den Individuen (§. 641.). Was die Zoologie betrifft, so gewährt sie uns zwar über die Bildungsgesetze des Gehirns im Allgemeinen viel Belehrung; aber es würde einseitig seyn, wenn wir ihren Werth zu hoch anschlagen und sie zur Grundlage der gesamten Hirnlehre machen wollten, da sie im Einzelnen so Vieles zu wünschen übrig läßt. Unser Kenntniß von den psychischen Zuständen der Thiere muß für immer sehr unvollkommen bleiben, und ist es besonders noch in unsrer Zeit: es fehlt uns also an hinlänglichem Stoffe zur Beurtheilung in der psychischen Beziehung der Hirnorgane. Sodann finden sich selbst in der Bestimmung der einzelnen Gebilde, d. h. in der Anerkennung der Identität eines Gehirns in den verschiedenen Thierclassen große Schwierigkeiten, und namentlich finden sich jetzt darin noch viele Widersprüche, erstlich, weil man die Gebilde meist nur nach ihrem Aussehen unter einander vergleicht, und dagegen ihre wesentlichen Charaktere, die Verhältnisse ihrer Faserung, zu wenig untersucht, was freylich bey den kleineren Thieren äußerst schwierig ist; zweytens, weil man oft ohne Weiteres annimmt, daß die Gebilde, die in den Säugethieren vorkommen, auch in den übrigen Thierclassen sich wieder finden müssen, und somit jede entfernte Aehnlichkeit für einen Beweis der Identität nimmt. Endlich ist es nicht ganz leicht, über die geringere oder höhere Ausbildung eines Organs ein richtiges Urtheil zu fällen: offenbar einseitig ist es, nur die Massenverhältnisse zum Maasstabe zu nehmen, da es hier gewiß noch mehr auf die innern Bildungsverhältnisse, auf schärfere Begränzung, auf Mannichfaltigkeit der Elementartheile, auf Bestimmtheit und Vielseitigkeit der Faserung ankommt. — Aus der Zootomie beweisen wir die Function eines Organs, indem wir die Uebereinstimmung der Stufe seiner Entwicklung mit dem Grade einer Kraft bemerken. Aber wenn bey einer Thierart ein Organ fehlt, folgt daraus, daß auch jene Kraft ihm fehlen müsse, und daß, wenn sie ihm nicht fehlt, das Organ in keiner Beziehung zu dieser Kraft stehe? Keinesweges: die Zootomie lehrt in Beziehung auf andre Lebensthätigkeiten, daß dieselbe Function theils in ganz verschieden geformten Organen, theils ohne alle besondre Organe vor sich gehen kann.

Vergleichen wir das rege und vielseitige psychische Leben der Insecten mit ihrem einfachen Ganglionenge, so erkennen wir, daß auch von einer gleichartigen sensibeln Centralmasse die Hirnfunktionen vollzogen werden können. Wenn bey ihnen Speichel, Harn oder Galle in einfachen Bländröhrchen gebildet, und bey noch niedern Thieren die Bewegung durch eine einfache irritable Masse vermittelt wird, so können wir deshalb nicht läugnen, daß die Organe, durch welche bey den höhern Thieren dieselben Functionen vollzogen werden, aus Gebilden zusammengesetzt sind, deren jedes seine eigne Bedeutung und seinen bestimmten Antheil an der Gesamtfunktion hat. — Umgekehrt können wir auch daraus noch nicht behaupten, daß eine Kraft in keinem Zusammenhange mit einem Hirntheile steht, weil bey Thieren, wo dieser einen ziemlichen Umfang hat, jene gering ist; denn im organischen Reiche treten an manchen Stellen Organe auf, ehe die ihnen zukommende Kraft sich entwickelt hat (§. 650). *der Mensch unterscheidet sich bloß durch die Größe des Gehirns von den niedern Thieren.*

Die Verfolgung der verschiedenen Entwicklungsstufen des Gehirns im Laufe des Lebens giebt uns in psychischer Beziehung auch nicht mehr, als einzelne Fingerzeige, da die wichtigsten Schritte der Entwicklung in die frühesten Zeiträume des Embryonenzustandes fallen, wo ein Theil der Gebilde seine eigentliche Function noch gar nicht vollsteht, und wo übrigens alle Verhältnisse des innern Lebens noch ganz dunkel sind. Aus dem frühern oder spätern Erscheinen eines Organs läßt sich an und für sich seine Bedeutung noch nicht bestimmen, denn das Höhere kann als die wesentliche Grundlage zuerst aufstehen, oder auch als das Vervollkommnende und Vervollendende erst später hinzukommen.

§. 641. Mehr verspricht die Zusammenstellung besonderer Eigentümlichkeiten des Hirnbaues einzelner Individuen mit den an ihnen zu beobachtenden eigenthümlichen Richtungen und Artungen des Lebens, wenn wir dabey durch zahlreiche Beobachtungen entgegen dem Irrthum zu sichern suchen, ein zufälliges Beysammenseyn für eine wesentliche Verknüpfung zu halten. Ueber die Verhältnisse der einzelnen Hirnorgane haben wir zur Zeit noch keine Beobachtungen in dieser Hinsicht, wohl aber über die Gesamtgestalt des Gehirns und des Schädels und über die Verhältnisse einzelner Gegenden desselben. Schon längst betrachtete die Physiognomik die Stirne als psychisches Zeichen, aber sie wurde ganz in der geistlosen Manier unsrer gewöhnlichen Semiotik bearbeitet, welche darauf sich beschränkt, Beobachtungen, die unsicher und zweydeutig genug sind, auf gut Glück an einander zu reihen, ohne einen Versuch, in das Wesen der Erscheinungen einzudringen und der ursächlichen Verbindung nachzuspüren, und so hatte denn auch die Wissenschaft keinen Gewinn davon. Erst Gall stellte vielseitigere Beobachtungen über die Gestalt des Schädels, als den Ausdruck der Gestalt des Gehirns in Vergleich mit der psychischen Eigentümlichkeit, an. Das Gehirn ist das Organ der Seele und die Beschaffenheit der Function muß der Gestalt des Organs entsprechen, nun hängt die Gestalt des Schädels im Ganzen von der Gestalt des Gehirns ab, folglich müssen bey den einzelnen Individuen eigenthümliche Artungen der Seele den eigenthümlichen Formen des Kopfs entsprechen. Dies war Gall's Princip, gegen welches sich nichts Einholdenes einwenden läßt. Ausgerüstet mit scharfem Beobachtungsgeiste, begünstigt durch die Verhältnisse, unbehungen und frey von irgend einer vorgefaßten Meynung, widmete er einen

großen Theil seines Lebens der Beobachtung in dieser Hinsicht, und wir müssen die Resultate derselben als Aussprüche der Empirie achten, und sie als eins der Mittel benutzen, durch welche wir zu Erkenntniß der Functionen der einzelnen Hirngebilde gelangen können, nicht als die Basis, noch weniger als die Erkenntniß selbst, aber auch nicht als eine Chimäre, wie die von den Philosophen seit dem 17ten Jahrhunderte aufgeworfene war.

§. 642. Ein andres Hülfsmittel wären die Aussprüche des Gemeingefühls. Man hat bisher zu wenig darauf geachtet, daß bey verschiedenen psychischen Thätigkeiten und Zuständen auch verschiedene örtliche Empfindungen im Gehirne entstehen, deren richtiger Auffassung und Deutung freylich große Hindernisse entgegen stehen. Im gesunden Zustande können nur schwache Affectionen des Gemeingefühls bey dem Denken und Fühlen hervortreten (§. 373); ohne Kenntniß des Hirnbau's kann man die Oertlichkeit der Empfindung nicht so bestimmt bezeichnen, und bey solcher Kenntniß ist es wieder leicht möglich, daß die Phantasie uns täuscht. Wo aber die Seele gestört ist, fehlt noch das Bewußtseyn, welches diese Affectionen aufnehmen könnte. Ein Mittel wäre noch übrig, nämlich die Aussage von Somnambulen über ihre Empfindung im Gehirne, da in diesem Zustande bey übriger Normalität das Gemeingefühl gesteigert ist. Nur müßte es 1) angesetzt seyn, daß kein Betrug im Spiele ist; ohne Kritik, ohne die strengste und vollständigste Beglaubigung sind natürlich dergleichen Erzählungen nur lächerlich; 2) es müßten geistig regsame und gebildete Menschen zum Gegenstande dieser Untersuchungen gewählt werden; 3) wo möglich solche, die den Hirnbau kennen, und deren somnambule Aussagen man mit den theoretischen Ansichten, die sie im wachen Zustande behaupten, vergleichen könnte; 4) man müßte den Einfluß der Vorstellungen und Meynungen des Magnetiseurs beachten; 5) vor Allem endlich müßte eine größere Zahl von Beobachtungen dieser Art gesammelt werden, aus welchen man ein Gesamteresultat ziehen könnte. Wir würden diese Aussagen nicht als Offenbarungen, nicht als untrügliche höhere Eingebungen betrachten, aber als interessante Thatfachen neben andern benutzen.

§. 643. Wenn die bisher aufgezählten Hülfsmittel sämmtlich bloß einen relativen Werth haben, und nur in ihrer Gesamtheit ein sicheres Resultat geben können, so sehen wir uns noch nach einem Principe um, welches die Grundlage der Forschungen ausmacht, und als Leitfadon auf der verschlungenen Bahn dient. Ich finde es in der Morphologie. Diese geht von der Anschauung der Wesenheit der Erscheinungen aus, und sieht in der Gestalt den Ausdruck des Ideellen, Dynamischen; sie erkennt in den Formen den ihnen zum Grunde liegenden Gedanken, das Verhältniß der Kräfte, aus welchem sie hervorgegangen sind, und welches hinwiederum durch sie als ein Bleibendes sich verwirklichen will. So nimmt sie denn das Gehirn als den räumlichen Ausdruck seiner Functionen; sie übersetzt gleichsam aus dem Raume in die Zeit, indem sie in den Verhältnissen des Hirnbau's die entsprechenden Verhältnisse der Seelenthätigkeit erkennt. Die Idee der Morphologie, beruhend auf Anerkennung der Uebereinstimmung des Aeusserlichen mit dem Innerlichen, der Erscheinung mit ihrem Grunde, stimmt mit den Vernunftgesetzen überein, und ist dem Zweifel entrückt. Aber die Art, wie sich diese Idee in unsrer Individualität und in Beziehung auf bestimmte Objecte gestaltet, kann irrig seyn. Um uns gegen den Irrthum zu sichern, müssen wir der morphologischen Betrachtung

Thatsachen, welche sich als solche unmittelbar ankündigen, gleichsam als Rechnungsprobe anknüpfen, und mit unbehungenem Sinne bey der Erfahrung nachfragen, ob sie unsere Ansichten bestätigt. Unsere ganze specielle Hirnlehre wird sich nicht wie ein dogmatisches System, sondern wie ein auf Principien ruhendes und folgerecht zusammenhängendes Gebäude von — Wahrachsalichkeiten gestalten. Mag eine reichere Erfahrung künftig Gedicneres gewähren!

B. Aufgaben.

§. 64. Vorläufig haben wir nun noch einige Fragen über das, was wir eigentlich im Gehirne suchen dürfen, zu beantworten, um dadurch Richtungspunkte für die specielle Physiologie des Gehirns zu gewinnen. Vorläufig und *a priori* beantworten wir diese Fragen. Wir haben aber in der specielle Naturforschung kein andres *a priori*, als das, welches auf Analogie nicht gründet. Die Seele als Lebenserscheinung und das Gehirn als organisches Gebilde verhalten sich zu einander wie Function und Organ: sie werden also auch in ihren Momenten mit andern analogen Lebenserscheinungen übereinstimmen. In diesem Sinne werden wir die vorläufigen Fragen zu beantworten haben. Zuerst also: giebt es ein besonderes Seelenorgan im Gehirne? Die Dualisten, oder diejenigen, welche für den einen Gegenstand materialistische, für den andern spiritualistische Ansichten haben, waren zum Theil zu einer solchen Annahme geneigt, erstlich weil sie meynen, die Seele als ein einfaches Wesen könne nur in einem einigermassen theilbaren Punkte ihren Sitz haben, sodann weil man beobachtete, daß einzelne Theile des Gehirns verletzt, oder zerstört werden können, ohne daß die Seelenthätigkeit dabey leidet. Allein, was Erstes anlangt, so ist das Wesen der Materie Erfüllung des Raums nach den drey Dimensionen, folglich Ausdehnung, mithin Theilbarkeit; eine untheilbare Materie ist nicht denkbar, und für die Einheit der Seele ist es durchaus gleichgültig, ob ihr Organ über das ganze Gehirn sich ausbreitet, oder in ein vom kleinsten Sandkörnchen zu bedeckendes Pünktchen gedrängt ist, indem Letztes seiner Kleinheit wegen nicht aufhört, ausgedehnt zu seyn. Was aber den zweyten Grund anlangt, so hat gerade die Erfahrung gelehrt, daß es keinen Theil im Gehirne giebt, dessen Abnormität nicht zuweilen eine Störung der Seelenthätigkeit zur Folge gehabt hätte, und eben so keinen, bey dessen Abnormität die Seelenthätigkeit nicht ungestört geblieben wäre, und daraus beweis, denn auch schon Ziem (Haller Diss. III. p. 430 egg), daß der Sitz der Seele im ganzen Gehirne seyn müsse. Jedes Organ vollzieht in seiner ganzen Ausdehnung die Function, deren räumlicher Ausdruck es ist, und so wenig wir in den Lungen noch ein besonderes Athmungsorgan, und in der Leber noch ein besonderes Gallenbildungsorgan entdecken, eben so wenig dürfen wir in einem einzelnen Theile des Gehirns das eigentliche Seelenorgan suchen. Allerdings begriff jede Function wieder mehrere Momente in sich: die Verdauung umfaßt Zuführung, Fortleitung, Zurückhaltung, Ansammlung der empfangenen Stoffe, Beymischung organischer Säfte und neue Bildung, Einsaugung des Gebildeten u. s. w. und dem gemäß giebt es denn auch einzelne Elemente und besondere Abtheilungen der Verdauungsorgane. Aber die Verdauung als wirkliche Function, als eigner Zweig der Lebensthätigkeit, ist doch nur der lebendige Verein aller jener Momente, und wird nur durch die Gesamtheit aller jener Theile des Verdauungssystems zu Stande gebracht; jeder Laut, den wir von uns

geben, ist das Resultat der Thätigkeit verschiedener Gebilde: kurz, jede organische Handlung beruht auf dem Zusammenwirken und ineinandergreifen mehrerer Lebensthätigkeiten. So ist denn auch die Seelenthätigkeit überhaupt, als Hirnfunction betrachtet, der Totaleffect der Hirnthätigkeiten; der Einklang der Wirksamkeit der verschiedenen Hirnthelle.

§. 645. Nun entsteht aber die Frage: trägt zu diesem Totaleffecte jeder Punct des Gehirns dasselbe bey? Sind die verschiedenen Hirnthelle in ihren Functionen einander völlig gleich? Hat also die Hirnmasse bloß die allgemeine psychische Bedeutung, und ist folglich die Untersuchung damit abgeschlossen, daß wir das Gehirn überhaupt als Seelenorgan anerkennen? Dem widerspricht: 1) alle Analogie. Es ist gewiß die niedrigste Ansicht, die wir vom Organismus haben können, wenn wir ihn mit einer Maschine, namentlich verglichen; aber schon in einer Maschine trägt jedes Rad, jede Spindel auf besondere Weise zur Gesamtwirkung bey. Zu jeder Function vereinigen sich verschiedene Glieder. Die Leber hat zwar in allen Puncten ein gleichartiges Gewebe und bloß Verschiedenheiten der äussern Gestaltung; aber Pfortader und Leberarterie, Lebervenen; Gallengänge und Sangadern; sympathischer und herumschweifender Nerve sind Glieder ihrer Lebendigkeit, deren Jedes seine eigne Bedeutung und seinen besondern Antheil an der Gesamtfunktion hat. Nur auf der niedrigsten Stufe und im ersten Beginnen des Lebens ist eine gleich bedeutende Masse vorhanden. Die Function offenbart sich in verschiedenen Momenten, und das Organ zerfällt in verschiedene Gebilde, theils wo eine Function vorherrschend wird, z. B. die Luftathmung bey den Vögeln, wo ein unterer Kehlkopf, Luftsäcke im Rumpfe und Lufthebälter in den Knochen auftreten, theils wo eine Function an und für sich auf einer höhern Stufe steht, z. B. bey'm Sehen; welches durch den Verein so zahlreicher Gebilde verwirklicht wird. Und das Gehirn, namentlich das menschliche Gehirn, sollte niedriger stehn, als diese Organe; und bloß eine gleichförmige, indifferente Masse darstellen? 2) Kein Organ ist so individualisirt, und schließt so vielfältige und bestimmte Formen in sich, als das Gehirn. In jeder Gegend zeigt es eigenthümliche Artung der Substanz, der Faserung und der Gestaltung, und eigenthümliche Verknüpfung seiner Elemente. Wir stehen nicht an, das entwickelte Gehirn für eine der schönsten Erscheinungen im Gebiete der reinen Form, für ein Meisterstück der Plastik zu erklären. Nur die Blüte und das Ange lassen sich unter den organischen Theilen damit vergleichen, inwiewohl die Schönheit dieser Gebilde nicht ganz den reinen Formenverhältnissen, sondern zum Theil auch dem Farbenglänze anheim fällt. Der unbefangene Kunstsinne unterscheidet alsbald das menschliche Gehirn von dem thierischen, da Jenes überall Ebenmaaß und Freyheit ankündigt, und in seinen Formen so reich und so harmonisch, so bestimmt und doch so frey, so kräftig und doch so zart ist. Schon dieser Umstand könnte uns bestimmen, die Bedeutung der Hirnformen anzuerkennen. Ihnen einen Sinn abzusprechen, würde selbst widersinnig; würde ein Frevel an der Natur seyn. In den Naturerscheinungen liegt überall ein tiefer Sinn; weil ein Ideelles ihren Grund enthält. Wo daher in der Organisation das Formenverhältniß besonders sich artet, treten auch entsprechende Modificationen der Lebensthätigkeit hervor. Mithin müssen auch die verschiedenen Elemente des Gehirns einen bestimmten Antheil an der psychischen

Gesamtwirkung haben, und den besondern Gestalten inüssen besondre Richtungen der Seelenthätigkeit entsprechen. 3) Am deutlichsten zeigen sich die Verschiedenheiten der Hirnorgane in Hinsicht auf die Verbindung mit den Nerven. Die Stelle, wo der herum-schweifende Nerve als Repräsentant der Verdauungs- und Athmungsorgane in das Gehirn tritt, kann nicht gleiche psychische Bedeutung mit der haben, wo der Schnerve, bloß im Lichtorgane wurzelnd, sich in dasselbe verliert; und der Hirnstamm, welcher durch die Nerven mit dem übrigen Leibe in Verbindung steht, muß einen andern Antheil an der Seelenthätigkeit haben, als das Belegungssystem, welches mit keinem Nerven in unmittelbarer Beziehung steht. 4) Wir erkennen endlich eine solche Mannichfaltigkeit der Seelenthätigkeiten, daß, wenn wir sie einmal in ein Organ gebunden uns denken, der Zusammenhang derselben mit besondern Artungen des Gesamtorgans wahrscheinlich wird. — Herder (Ideen I. S. 115. fgg.) erklärt sich gegen die Annahme besondrer Organe für die einzelnen Seelenthätigkeiten darum, weil das Denken ungetheilt und jede Seelenthätigkeit eine Frucht dieses Denkens ist; und weil es ungereimt seyn würde, abstrahirte Vorstellungen, wie einen Körper zergliedern zu wollen. Wir geben freylich zu, daß es ein großer Fehlgriff seyn würde, sich die verschiedenen Seelenkräfte wie eigne Substanzen; wie eine Gesellschaft zusammengekommener besondrer Wesen zu denken. Sie sind allerdings nur die verschiedenen Beziehungen und Richtungen derselben Kraft, aber diese verschiedenen Beziehungen existiren doch real und können mit einander in Widerstreit treten: der Verstand tritt der Sinnlichkeit entgegen, und wenn Beide sich verbündet haben, werden sie wieder von der Vernunft bekämpft. Ist nun die Seele einmal in ein Räumliches geknüpft, so müssen diese einander widerstrebenden Seiten derselben auch mit besondern Räumen verwandt seyn: die Sinnlichkeit oder die Beziehung der Seele zum kussern Leben und zur Erscheinungswelt wird nicht in demselben Verhältnisse zum Gehirne stehn, wie die Vernunft oder die Beziehung der Seele zu ihrem Grundwesen und ihrem Urquelle. Diese räumliche Verschiedenheit der Seelenkräfte kann unbeschadet der Einheit der Seele bestehen. Auch die Lebenskraft ist ein Elniges, und residirt als Allgemeines nicht in einem einzelnen Gebilde, sondern tritt überall in besondern Formen hervor, welche auf ihre bestimmte Weise zum Gesamtleben beytragen. Und eben so ist es mit den einzelnen, auch den niedrigen Functionen: der Gesamtnagen der Wiederkauer hat die gemeinsame Function der Verdauung, aber jede Abtheilung hat bey ihrer besondern Gestaltung auch eine besondre Art zu verdauen, oder ist ein eigenes Moment für den gemeinschaftlichen Hergang. Wenn nun die Seelenthätigkeit durch das Ganze des Gehirns vermittelt wird, so muß jedes eigenthümliche Gebilde in demselben auch etwas Eigenthümliches dazu beytragen, oder an der Gesamtwirkung einen besondern Antheil haben. — Die Seelenthätigkeiten bestehen in der Natur nicht so, wie wir sie in der Abstraction sondern: jedes einzelne Organ wird alle in sich begreifen, und nur das Uebergewicht einzelner in bestimmten Combinationen darstellen. — Auch Reil (Archiv I. 1. St. S. 170) lagerte die besondern Abtheilungen des Gehirns für besondre Seelenkräfte darum, weil nicht immer bey Verletzung eines bestimmten Hirnthells eine bestimmte Seelenthätigkeit gestört wird. Allein im Gehirne sind ganze Systeme für eine Richtung der Seelenthätigkeit, und die Störung eines einzelnen Punctes trifft nicht

das Ganze (Vgl. §. 492.). Reil erklärt das Vorstättigehen der verschiedenen Seelenthätigkeiten sehr unbefriedigend, nämlich bald (a. a. O.) aus der Verbindung zwischen Hirnthätigkeit und besondern Nerven, bald (Beiträge II. S. 83) aus Intensität der Action und Extensität der Masse; bald (Archiv XI. S. 343) aus den Verschiedenheiten der dynamischen Spannung; allein die Verknüpfung der Nerven, und die dynamische Spannung setzt immer ein real Verschiedenes voraus, wie wir es in den mannichfaltigen Hirngebilden finden, und übrigens sind auch die Seelenthätigkeiten nicht bloß intensiv, sondern auch qualitativ verschieden.

§. 646. Die dritte Frage ist: für welche Kräfte der Seele dürfen wir besondere Organe im Gehirne suchen? Wir glauben antworten zu dürfen, für die Elementarkräfte; die abgeleiteten Seelenthätigkeiten werden mit den verschiedenen Combinationen der Wirkksamkeit der Elementarorgane verbunden seyn. Dies näher zu bestimmen, setzt freylich eine eigne Untersuchung voraus, welche hier nicht Platz finden kann. Nur so viel bemerken wir, daß die Elementarkräfte der Seele durch Potenzirung in verschiedenen Spüren sich äussern; daß die höchste Sphäre den Ideen und der Beziehung zum Ganzen zugewendet ist, und daß sie keine besondern Organe haben kann, weil eben das Ganze in allen Einzelheiten zusammengekommen liegt, aber selbst nichts Einzelnes ist, und die Idee in der Gesamtheit der Erscheinungen, aber nicht selbst als besondere Erscheinung sich kund thut. Hier genüge es, einige Meynungen historisch anzugeben. Gallen hatte drey Grundkräfte der Seele aufgestellt, und seine Nachfolger behaupteten, daß drey verschiedene Abtheilungen oder Höhlen (*cellulae, specus, sinus, cavernae*) für sie bestimmt seyen: die vordre für das Wahrnehmungsvermögen (*γαστήρ, anima imaginativa, sensus communis*), die mittlere für die Denkkraft (*λογος, διανοη, νοε, φρονησις, anima cogitativa*), die hintre für das Gedächtnis (*μνησις, anima memorativa*). (Vgl. I. Bd. S. 199 bis 208.). Nach Willis sollte in den Streifenhöhlen das Wahrnehmungsvermögen, im Balken die Phantasie und der Wille, und in den Randwülsten das Gedächtnis wirken. Spix und Huschke nahmen die Schädelwürbel als Eintheilungsgrund an. Nach Erstrem wirkt im Hinterhauptswirbel die centrale Sinnlichkeit (*animus*), unten der äussere Sinn mit dem Gedächtnisse, oben die Phantasie; im Scheitelwirbel die vorstellende, reflectirende und schließende Kraft (*Soele, anima, logos*), unten Vorstellungsvermögen und Urtheilskraft, oben Verstand; im Vorderhauptswirbel die Intelligenz (*spiritus, vovs*), unten der Glaube, oben das Wissen. Huschke verlegt in den hintersten Wirbel mit dem kleinen Hirne die Begehrung und den Willen; in den mittlern Wirbel mit Vierhöhlen, Sehhöhlen, Hirnanhang u. a. w. das Gemeingefühl und die Sensation; in den vordersten Wirbel mit den Streifenhöhlen die Intelligenz.

§. 647. Gall ist darin durchaus originell, daß er nicht für die Hauptzweige der Seelenkräfte, sondern für die Richtungen derselben auf die verschiedenen Arten von Objecten eigenthümliche Sitze aniebt. Man bewies nur, daß man das Wesentliche seiner Lehre noch gar nicht gefaßt hatte, wenn man die zufällig gefundenen alten Holzschnitte, auf welchen die äussern Gegenden des Kopfs nach den von den Galenikern angenommenen drey Abtheilungen bezeichnet waren, für einen Beweis halten konnte, daß Gall's Lehre nicht neu sey. Es entsteht aber nun die Frage ob wir, von empirischen Gründen

abgesehen, eine solche Annahme als statthaft anerkennen, oder sie als sich widersprechend in voraus verwerfen müssen. Zwar läßt es sich nicht denken, daß es für alle speciellen Richtungen der Seele, namentlich für die, welche bloß Combinationen allgemeiner Richtungen und Bestimmungen sind, eigene Organe geben sollte; auch erkennen wir diese objectiven Richtungen nicht als etwas Selbstständiges, sondern als besondere Beziehungen der Subjectivität, und wir finden uns dadurch bestimmt, sie nur mit den Unterabtheilungen des Gehirns zusammenzustellen; die subjectiven Kräfte dagegen mit den Hauptabtheilungen zu vergleichen. Aber auf der andern Seite scheint es auch eine Uebereilung zu seyn, wenn man die Möglichkeit, daß besondere Richtungen der Seelenkräfte in besondern Richtungen des Gehirns wirken, in voraus läugnet. Man sagt (Carus Nervensystem S. 299. fg.): im räumlichen Organe stellt sich bloß das Vermögen überhaupt, nicht die Modification jeder Vervollkommenung seiner Kraftäußerung dar; in der Bildung der Hand ist nicht jede besondere Kunstfertigkeit derselben zu erkennen. Allein fürs Erste ist dieser Vergleich ganz unpassend, da ja die Hand nicht der ursprüngliche Sitz der Kunstfertigkeit, wie etwa das Gehirn der des Kunstsinnes; sondern bloß das Werkzeug ist, welches seine Richtungen vom Gehirne aus empfängt. Sodann ist nicht davon die Rede, daß die Modification jeder Vervollkommenung der Kraftäußerung in qualitativ verschiednen Bildungen sich darstelle, sondern davon, daß es, wie es verschiedene Sinnesorgane, d. i. verschiedene Organe für Richtungen der allgemeinen Sinnesfähigkeit auf einzelne Classen von Eindrücken giebt, eben so auch verschiedene Stellen des Gehirns den verschiedenen Richtungen der Seele entsprechen: der Analogie nach ist dies sehr wohl denkbar. Wenn Gall dem Witze u. s. w. ein besonderes Organ zuschreibt, so ist im Grunde nur so viel damit gesagt, daß die Kraft der Combination ungleichertiger Momente mit einer gewissen Gegend des Gehirns im Zusammenhange steht, und daß, wenn jene Kraft stärker sich äußert, als Witz, auch diese Gegend stärker entwickelt ist.

§. 648. Gibt es Organe für die Plasticität im Gehirne? — Das Leben ist die Einheit von Seyn und Thätigkeit, oder ein stetiges Werden. So muß denn auch das Gehirn, wie jedes andre Organ, in fortwährender Selbstbildung begriffen seyn, und zwar, da jedes Organ die Verkörperung seiner Function ist, nach dem Schema der Seele sich bilden; und die mannichfaltigen Gegensätze, die im Begriffe derselben enthalten sind, durch entsprechende Gestaltungen ausdrücken. Während es in diesen Besonderheiten der Gestaltung seine eigenthümlichen Bedeutungen ausspricht, muß der allgemeine Hergang seiner Bildung eben so beschaffen seyn, wie in allen übrigen Organen, denn es ist derselbe, allen gemeinschaftliche Proceß. Er besteht aber in einem Kreislaufe der Materie unter der Herrschaft der lebendigen Formenverhältnisse, in einem wechselseitigen Uebergange fester und flüssiger Gestalt, in einer fortgehenden Synthesis und Analysis. Die Materie hat ihren Kreislauf in Kurzem vollbracht: die Bande, welche sie knüpfen, lösen sich; sie fällt ab von dem übrigen, lebendigen Organe, nimmt die indifferente, flüssige Form an, und wird mittelbar oder unmittelbar dem Blute zurückgegeben. Dieser Abstoßung entspricht eine Anziehung: das Organ strebt, sich zu erhalten; die allgemeine organische Materie zu seiner besondern umzuschaffen, sie in seine Form aufzunehmen und sie seinem Wesen einzubilden; es zieht aus dem unmittelbar berührten oder in dünnwandigen Her-

gefaßten enthaltenen Blute die verwandten Stoffe an sich, prägt ihnen seinen Charakter auf, und verschmelzt sie durch lebendige Krystallisation mit seinem Leibe. Zu diesem auf der Macht und der Bedeutung des Lebens beruhenden Hergange bedarf es keines andern Apparats, als das der Gefäße, und diesen finden wir auch im Gehirne. Man nahm ausserdem noch besondere plastische Organe an, welche theils einen feinen Stoff zum Behufe der Seelenthätigkeit absondern, theils einen excrementitiellen Stoff ausführen sollten. Was die Excretion anlangt, so bezog man sich bey deren Annahme besonders auf Krankheitserscheinungen, namentlich auf diejenigen, welche man Katarrh, Rheuma, Fluß nannte, und die man theils als etwas Herumziehendes, theils als einen Abfluß sich dachte. Nach den Hippokratischen Schriften (*de glandulis sect. 8. p. 418*) soll ein Abfluß aus dem Gehirne durch Augen, Nase, Ohren, Gaumen, Kehle, Rückenmark und Blot erfolgen, dessen Unterbrechung Krankheiten, namentlich (*de morbo sacro. sect. 7. p. 331*) Epilepsie erzeugt; dagegen (*de carnibus sect. 17. p. 122*) sollen beym Katarrh die Feuchtigkeiten aus dem Gehirne zu dem Rachen und den Lungen kommen. Auch nach Aristoteles (*de part. animal. lib. II. c. 7. p. 604*) entstehen Flüsse aus dem Haupte, wenn das aufsteigende *νεκρωμα* durch zu große Kälte des Gehirns abgekühlt und gleich dem Regen niedergeschlagen wird. Galen (*de usa part. lib. IX. c. 1. p. 171. de odoratus instrumento c. 2. p. 110*) führte dies weiter aus, und meynte, das Gehirn müsse so gut, wie andre Organe einen Auswurfstoff, d. h. den zu seiner Ernährung untauglichen Theil der ihm zugeführten Säfte, ausführen, und zwar entweiche der dunstartige Theil durch die Nüße und die lockre Substanz des Schädels, während der wässerige und schleimige Theil aus den vordern Hirnhöhlen durch weisere Oeffnungen des Schädels in den Mund und die Nase sich herabsenke. Diese Lehre wurde nun mannichfaltig gedeutet und ausgeschmückt. Avicenna verglich das Gehirn mit einem Helme, der die aufsteigenden Dünste aufnimmt und verdichtet. Berengar (Fol. 439) leitete alle Nasenfeuchtigkeit aus dem Gehirne ab, aber nicht durch das Riechbein, da dies bloß der Luft und dem Riechstoffe zum Durchgange diene, sondern durch den Hirnanhang und das Keilbein. Dagegen soll nach Varoli (p. 136) die überflüssige Feuchtigkeit der Hirnhöhlen nicht in die Nase kommen, sondern durch den Trichter zum Gaumen fließen. Nach Deleboe (S. 33. p. 21) scheidet sich das Blut im Gehirne in thierischen Geist und in eine wässrige, mit einigen übrigen geistigen Theilen vermischte Flüssigkeit, welche theils unter der Gefäßhaut zusammenfließt, auch aus den Hirnhöhlen, in den Hirnanhang kommt und von da als Speichel in den Rachen und Kehlkopf, so wie zu Schleim verdichtet in die Nase gelangt, theils von der Zirbel und den Drüsen des Gefäßgeflechts eingesogen wird. Wharton (p. 151) fügte den Ableitungen durch den Riechstreifen und das Riechbein zur Nase, und durch den Hirnanhang zu den Augen, oder Mandeln, oder Kiemen drüsen eine dritte durch die Ohren bey. Helmont bestritt zuerst die Meynung, daß der Katarrh ein Ausfluß aus dem Gehirne sey, und Schneider (*de catarrib. lib. II. sect. 1. c. 5-10. p. 70-101. sect. 2. c. 6. p. 391*) bewies mit völliger Evidenz, daß weder ein Abfluß aus den Hirnhöhlen möglich ist, noch Dünste durch die Suturen entweichen. Doch suchte man immer noch, Galen's Autorität einigermaßen zu retten. So gab Vieussens (c. 16. p. 104) zwar zu, daß eine Feuchtigkeit weder durch die Löcher des

Schädels abgeführt werde, noch in die Nase gelange, behauptete aber, daß der Dunst durch die Suturen entweiche, die schleimige Feuchtigkeit durch den Hirnanhang in die Zellenblutleiter, und die wässerige Feuchtigkeit in der Zirbel und den Drüsen des Gefäßgeflechts theils in den Hirnanhang, theils in Saugadern und Venen geführt werde. So hat man denn auch späterhin die Zirbel und den Hirnanhang als absondernde und aussondernde Drüsen betrachtet. Allein wir finden es überhaupt ganz unstatthaft, besondere Bildungsorgane und drüsige Gebilde im Gehirne anzunehmen. Denn 1) die Theile, welche man dafür ansieht, haben gar nicht den Bau der Drüsen, zeigen sich gar nicht als solche Verzweigungen und Knäuel überwiegender Haargefäße, sondern bestehen aus Hirsustanz, mit Gefäßen durchzogen, wie das ganze übrige Gehirn. Wollte man Hirndrüsen, einzig in ihrer Art, annehmen, so wäre mit dieser Verschmähung der Analogie der Einbildungskraft Alles eingeräumt, und man könnte eben so gut Hirnmuskeln und irgend was annehmen. 2) Drüsen sind bloß Brennpuncte des plastischen Lebens, höhere Entwicklungen der Gefäßenden zu Erzeugung einer besondern Flüssigkeit. Das Gehirn aber greift nicht materiell in den Bildungsproceß ein; es producirt nichts Andres, als sich selbst, und den dasselbe umgebenden Dunst zur Ernährung aber und zur wässerigen Absonderung bedarf es keiner Drüsen, so wie die Muskeln und die Sinnesorgane dieselben entbehren.

§. 649. Ist es wahrscheinlich, daß es Hirnorgane für die verschiedenen körperlichen Functionen, Repräsentanten der verschiedenen Theile des Leibes im Gehirn giebt? — Wir erkennen eine Verknüpfung zwischen bestimmten Vorstellungen und bestimmten Organen des Leibes, so daß jene auf diese wirken, und diese jene hervorgerufen: z. B. die durch rein organische Ursachen entstandene Congestion in den Zeugungstheilen weckt Vorstellungen von Geschlechtsverhältnissen, und umgekehrt wenn die Phantasie mit diesen sich beschäftigt, so entsteht dadurch jene Congestion. Wenn wir hier eine Verbindung zwischen den Leibesorganen und einer besondern Gegend des Gehirns vermuthen, so dürfen wir dieselbe nicht zu materiell uns denken, als ob es z. B. ein besonderes Hirnorgan für die Zeugung, für die Verdauung u. s. w. gäbe. Denn erstlich müßten wir, um eine solch materielle Verbindung annehmen zu können, einen dergleichen Contrapunct im Gehirn da finden, wo die Nerven jener Leibesorgane ihr centrales Ende haben: dieses findet sich aber theils gar nicht im Gehirn, z. B. von den Zeugungstheilen, theils verläuft es in einem engen Raume und ohne Besonderheit der Gestaltungsverhältnisse Nerven von sehr verschiedenen Organen, wie dies z. B. vom zehnten Paare gilt. Sodann zeigt uns die Beobachtung auch manche Erscheinungen, welche jener Annahme widersprechen. Nämlich bloße Stimmungen der Seele, für welche doch kein besonderes Hirnorgan vorhanden seyn kann, stehen auch in Beziehung zu gewissen Leibesorganen: der Zorn wirkt auf die Leber, und bey Leberkrankheiten entsteht Aergerlichkeit, aber es würde abgeschmackt seyn, ein Organ des Zorns und der Aergerlichkeit im Gehirn zu suchen. Ein andermal wirkt eine bestimmte Vorstellung auf einen bestimmten, unbedeutenden Punct des Leibes, z. B. im Hautgewebe, wo wir durchaus keine besondere materielle Verknüpfung mittels eines Hirnorgans uns denken können. Wenn wir von einer Gemüthsbewegung ergriffen sind, so bewegen sich nicht eigene Muskeln, sondern die Muskeln über-

haupt gerathen unwillkürlich in eine besondre Art von Bewegung und gegenseitiger Stellung; und wenn wir willkürlich diese Gebärden mit einer gewissen Lebhafteit hervorbringen, entsteht in uns endlich dieselbe Stimmung, deren Ausdruck sie sind. Hieraus erkennen wir denn, daß mehr eine dynamische, consensuelle Verbindung Statt findet. Eine Art von Seelenthätigkeit erregt eine besondre Stimmung des Leibes, aber nicht des Leibes überhaupt, sondern eines bestimmten Organs in demselben; dies Organ ist nicht lediglich für solche Einwirkung bestimmt, nicht ein eignes Werkzeug der Seele, sondern hat eine eigenthümliche leibliche Function; aber es zeigt dahey eine Verwandtschaft mit jener Seelenthätigkeit, welche, wie aller Consensus, nur auf der Uhereinstimmung des allgemeinen Begriffs beyder beruhen kann. Da uns nun die Erfahrung lehrt, daß auf eine gleiche Weise der Leib auf die Seele wirkt, wie diese auf jenen, so dürfen wir auch vermuthen, daß jede leibliche Function vermöge ihres Begriffs in einer specifischen Beziehung zu einem besondern Theile des Seelenorgans steht. — Man hat in unsern Tagen viel von der Wiederholung bestimmter Organe in fremden Sphären gesprochen; man hat in den Nieren die Lungen, in den Kiefern die obern und untern Gliedmaßen sammt Fingern, Zähnen und Nägeln wiedergefunden, und dies eine Philosophie der Anatomie oder eine Anschauung der Bedeutung der Organe genannt. Soll diese Vergleichung einen verständigen Sinn haben, so kann sie nichts Andres seyn, als die Anerkennung, daß zwey Functionen bey aller speciellen Verschiedenheit in ihrem allgemeinen Begriffe mit einander übereinstimmen, und daß dem gemäß auch die Gestaltungsverhältnisse ihrer Organe im Allgemeinen einander analog sind. Diesen Gedanken wird die Morphologie ausführen: sie wird nicht das eine Glied als den Prototyp ansehen, noch dasselbe mit Haut und Haaren in dem andern Gliede wieder finden wollen, sondern sie wird aus der Vergleichung beyder Glieder den allgemeinen Begriff abstrahiren, das Gemeinsame und Wesentliche derselben erfassen, und dann erforschen, wie der allgemeine Begriff in den einzelnen Gebilden zur eigenthümlichen Bedeutung wird, und wie Dem entsprechend der allgemeine Typus der Bildung zu eigenthümlichen Formen sich gestaltet. In diesem Sinne werden wir dann auch Leibesorgane mit Hirnorganen zusammenstellen können, indem wir versuchen, die Wesenheit beyder zu erfassen, und für die daraus abgeleiteten Sätze die Bestätigung suchen, in den Erfahrungen über *Consensus* und *Antagonismus* derselben.

§. 650. Gibt es im Gehirne Repräsentanten thierischer Formen? — Wir werden jetzt von manchen Seiten her ermahnt, nicht nach dem Nutzen der Organe, sondern nach ihrer Bedeutung in der Thierreihe zu fragen, so daß wir es wohl ernstlich überlegen müssen, was diese Ermahnung denn eigentlich selbst für eine Bedeutung hat. — Allerdings haben wir eine aherwitzige Teleologie verbannt, und fragen in der Physiologie nicht mehr nach der Nützlichkeit, d. h. nach den Vortheilen und Bequemlichkeiten, welche in vorkommenden Fällen und bey mancherley eintretenden Bedürfnissen aus einer gewissen organischen Einrichtung erwachsen. Aber nach dem Nutzen, d. h. nach der organischen Wirksamkeit der Organe, nach dem, was sie ihrerseits zum Gesamtleben beytragen, forschen wir allerdings. Die Natur ruht auf einem geistigen Grunde, und wirkt darum überall auf Zwecke hin: was da ist, muß thätig seyn, und die Thätigkeit muß in das Leben eingreifen, also ihren Nutzen haben. Daher heißt es denn das Kind

mit dem Bade ausschütten, wenn man nicht blofs die aberwitzige Teleologie, sondern die Teleologie überhaupt verbannen will. Aber das Einzelne ist nicht selbstständig, sondern ist das Glied eines Ganzen, und wird durch dasselbe bestimmt. Eine jede Abtheilung des Thierreichs bildet ein solches Ganzes, indem es Familien in sich begreift, welche einander näher stehn und im Allgemeinen in Formen- und Lebensverhältnissen unter einander übereinstimmen, und hier wird bisweilen ein einzelnes Gebilde blofs durch die Verwandtschaft bestimmt, so dafs eine Thiergattung ein Organ hat, nicht weil es für ihre Organisation nöthig ist, sondern weil es zur Organisation andrer, ihnen verwandter Gattungen gehört. Ein solches Organ erscheint dann in unvollkommner, verkrüppelter, zu seiner Function untauglicher Form, nur als Ausdruck der Uebereinstimmung mit derjenigen Sphäre des Thierreichs, zu welcher das Einzelne zunächst gehört. Z. B. die Eckzähne fehlen bey der Stute, und kommen bey dem Hengste vor, aber kurz und zum Kaen untauglich; eben so untauglich sind sie bey dem Wallrosse, wo sie blofs im Oberkiefer sich finden; bey'm Eber sind welche in beyden Kiefern, aber so grofs, dafs sie nicht zum Kaen, sondern blofs als spitze Waffen dienen; bey'm Hirscheber sind sie endlich in Form von Hörnern zusammengerollt, so dafs sie weder zu dem einen, noch zu dem andern Zwecke gebräucht werden können. Die Schneidezähne des Oberkiefers, die bey den Wiederkäuern fehlen und bey den Einhufern vollständig vorhanden sind, kommen bey den zwischen jenen beyden Classen mitten inne stehenden Dickhäutern auch vor, aber so, dafs die äussern derselben die des Unterkiefers nicht berühren und zum Kaen unnütz sind. Die Giraffe, welche den Uebergang von den Wiederkäuern zu den Einhufern bildet, hat nur einen Ueberrest von Hörnern oder Geweih in weichen, mit Haut überzogenen Fortsätzen, welche als Waffen untauglich sind. — Nach dergleichen Wahrnehmungen können wir nun wohl die Frage aufwerfen: ob nicht im menschlichen Gehirne ähnliche verschrumpte und verkrüppelte Organe vorkommen, welche nur bey Thieren eine wirkliche Function haben, hier aber unnütz, gleichsam blofs Reminiscenzen der Thierheit sind? 1) Man hat dies von dem Hirnanhange und der Zirbel behauptet, da sie bey Menschen verhältnismäfsig kleiner sind, und weil an Letzterer sich Sand bildet. Allein dieser Grund ist durchaus nicht entscheidend: vergleichen wir die Textur dieser Gebilde unbefangen, so finden wir, dafs sie bey dem Menschen zarter, aber keinesweges so schlös und ausgeartet sind. 2) Läßt es sich wohl denken, dafs die psychische Function dieser Gebilde, welche allen Wirbelthieren mit wenigen Ausnahmen gemein sind, im Menschen ganz erloschen wäre? Deutet nicht vielmehr Alles darauf hin, dafs der Mensch die gesammten thierischen Kräfte in sich vereint und noch neue dazu gewinnt? 3) Wir sehen übrigens bey dem Menschen keine Theile, welche einzig Reste thierischer Bildung wären. Ackermann (*de nerv. syst. p. 52*) giebt zwar den Plantarmuskel, den *risorius Santorini*, die Ohrenmuskeln und die halbmondförmige Falte der Bindehaut als solche an; aber diesen Gebilden können wir doch eine organische Beziehung zum menschlichen Organismus nicht absprechen, wenn sie auch theils ihrem Baue, theils ihrer Function nach bey Thieren stärker entwickelt sind. Somit ist es denn höchst unwahrscheinlich, dafs im edelsten Organe, im Gehirne allein eine solche missige Reminiscenz vorkomme. 4) Unnütze Ueberbleibsel einer unvollkommenen Bildung scheinen

vorzüglich nur auf den Uebergangsstufen zu erscheinen, wo die Organisation, als ein Fortschreitendes gedacht, sich der Unvollkommenheit noch nicht mit einem male gänzlich entledigen kann. Z. B. bey den Gliederthieren der untersten Stufe zerfällt der Körper in zahlreiche, einander ganz gleiche Ringe, die auf gleiche Weise zur Ortsbewegung geschickt sind; bey fortschreitender Entwicklung wird diese Gleichförmigkeit durch das Erwachen von Gegensätzen verdrängt: einzelne Ringe bekommen das Uebergewicht, so daß die Gliederbewegung sich an ihnen concentrirt, aber an den übrigen Ringen bleiben zunächst noch Ueberbleibsel von Bewegungsorganen, welche verkrüppelt und unnütz sind. Während der Tausendfüßer an jedem Körperringe gleiche Füße hat, sind bey *Lepisma* wahre Füße nur an den drey vordern, und an jedem der hintern sitzen bloß Stumpfe, die für die Ortsbewegung nicht mehr dienen können. Beym *Oniscus* besteht der Körper aus fast gleichen Ringen, aber die hintern haben nur Stumpfe von Füßen; bey *Krebse* ist mehr Ungleichheit, und die wahren Füße haben sich am Vordertheile des Körpers gesammelt, aber hinten bleiben noch Füßchen als Ueberreste der niedern Form, die zur Ortsbewegung nicht tauglich, und bey *Brachirus* selbst so verkrüppelt sind, daß sie nach oben ragen und an der Rückenseite getragen werden. Bey den Insecten endlich verschwinden diese Reste, indem die eigenthümliche, concentrirte Gliederbildung hier zu ihrer Vollkommenheit gelangt. — Somit ist es denn nicht wahrscheinlich, daß das menschliche Gehirn, welches nicht Durchgangspunct, sondern Gipfel der organischen Gestaltung ist, dergleichen Ueberreste enthalte. 5) Man ist zu jener Ansicht dadurch gekommen, daß man auf eine allerdings zweckmäßige Weise das Leben von seinen ersten Anfängen durch die verschiedenen Entwicklungsstufen hindurch verfolgt, und so das Niedere in dem Höhern wieder zu finden geneigt wird. Indem wir aber bey dieser Methode die Einheit in der Natur erkennen, dürfen wir nicht vergessen, daß wir auch das Höhere im Niedern anzuerkennen haben. Wir dürfen das Frühere, Unvollkommnere nicht als Maasstab und Norm annehmen. Der wahre Prototyp liegt im Höchsten, wo sich die eigentliche Bedeutung der Gebilde ausspricht, wenn auch sein Umriss vermöge seiner Einfachheit als erster Entwurf klärer im Unvollkommnern sich darstellt. In der That wirkt die ewige Jugendkraft der Natur immer mehr auf ein Künftiges hin, als daß sie eine erstorbene Vergangenheit fest hält, und es treten unentwickelte, ja fruchtlose Keime mehr hervor, als erloschene Stätten des Lebens und Schlacken. Solche functionlose Anfänge kommen vorzüglich theils im sensibeln Systeme selbst und in den Ausseuwerken der Seele vor, theils im Zeugungssysteme, also in den Organen derjenigen plastischen Function, welche mit der Seelenthätigkeit die meiste Verwandtschaft hat. Die Zeugungsorgane sind bey dem Kinde bloß materiell vorhanden, ohne Secretion, ohne besondere Function überhaupt. Eben so erscheinen bey manchen kryptogamischen Gewächsen Theile, welche die Form, aber nicht die Function männlicher Geschlechtsorgane haben. Dasselbe gilt von denjenigen niedern Thieren, welche beyderley Geschlechtsorgane haben, ohne sich mit andern Individuen gegenseitig zu begatten; die weiblichen Organe bewirken hier die Zeugung durch eigne Kraft, und die männlichen sind bloß Scheinorgane, denn eine Selbstbefruchtung ist nicht zu erweisen, aber auch gar nicht denkbar, wenn wir durch Vereinigung aller sichern Erfahrungen das Wesen der Befruchtung er-

kannt haben. Was aber die Sinnesorgane betrifft, so fehlen die Augen noch bey den Strahlthieren, erscheinen bey einigen Würmern und bey den Accephalen als Hautwärtchen oder schwarze Punkte, die zum Sehen ganz untauglich sind; bilden sich weiter aus bey den Gastropoden, wo sie Linse, Glaskörper, Ciliargefäße, Choroiden, schwarzes Pigment und einen Nerven erlangen, bleiben aber auch hier, wenn nicht ganz blind, doch so schwach, daß das Thier nicht durch das Sichtbare bestimmt wird, sondern bloß dem Getaste traut. Beym Proteus sind die Augen bloß geeignet, geblendet zu werden, nicht zu sehen; seine Glieder sind ferner zu klein und zart, als daß sie der Ortsbewegung dienen sollten, und die Bewegung erfolgt vielmehr wie bey den Fischen; während er endlich Rudimente von Lungen hat, zeigt er doch keine Athmungsbewegungen am Thorax, sondern athmet durch Kiemen. Sollte nun nicht das Thiergehirn auch ein solcher Proteus seyn? Sollte es nicht Gebilde ohne Function enthalten, gleichsam unbefruchtete Keime, leere Hüllen, Uebergangspunkte und Versuche zu einem Höhern anzustreben, welches erst in dem Menschen sich verwirklicht? Wie sich bey dem Embryo Organe bilden, die für die Gegenwart noch unbrauchbar, erst in der Zukunft, zum Theil spät, zu zweckmäßiger Thätigkeit gelangen, so kann dasselbe Verhältniß in der Entwicklung der Thierreihe Statt finden, denn die Analogie beyder Entwicklungsarten, welche auf der Einheit der Gesetze des Zeitlichen und des Räumlichen beruht, ist offenbar. Die Seele des Menschen ist von der des Thiers doch so himmelweit verschieden, und gleichwohl kommt im Gehirne des Erstern keine neue eigenthümliche Gestaltung vor: das Gehirn der Thiere muß also den materiellen Keim zur höhern Seelenkraft enthalten, der aber noch nicht seine volle Bedeutung erlangt hat, sondern nur ein Proteusauge, ein leibliches Vorbild dessen ist, was es werden kann. Bey dem Menschen kommt bloß durch weitere Ausbildung, der schon vorhandenen Formen, durch neue Verhältnisse des schon Bestehenden der wahre Sinn in das Ganze, und dies gewinnt damit seine volle, höhere Bedeutung.

§. 651. Endlich hat man auch Organe im menschlichen Gehirne angenommen, welche bloß bey dem Embryo ihre Function haben, und während des übrigen Lebens nur als Ruinen sich erhalten sollen. Allein in der Annahme eigenthümlicher thätiger Gebilde liegt auch die Annahme eines eigenen qualitativ verschiedenen Lebens: ein solches aber im Gehirne des Embryo zu vermuthen, haben wir durchaus keinen Grund. Nur in der plastischen Sphäre finden wir eigenthümliche Embryonenorgane, und die Ueberreste derselben verschwinden entweder ganz, oder deuten durch ihre narbige, fleckige Natur darauf hin, daß sie abgestorben sind: etwas Aehnliches kommt aber im Gehirne nicht vor. Man hat keinen andern Grund, die Zirbel und den Hirnanhang für Embryonenorgane zu halten, als den, daß sie bey dem Embryo verhältnißmäßig größer sind, als bey Erwachsenen: könnte aber dies als vollgültiger Maasstab dienen, so müßte auch das ganze Gehirn nichts weiter, als ein bloßes Embryonenorgan seyn.

C. Materialien.

§. 652. Wir suchen endlich empirische Materialien für die Erkenntniß der Bedeutung der einzelnen Hirntheile in der pathologischen Anatomie nach den (§. 635 — 637)

aufgestellten Grundsätzen. Zu diesem Zwecke stellen wir die in einer Reihe von Fällen; welche im Anhange verzeichnet sind, beobachteten Krankheitserscheinungen in Vergleichung mit der Oestlichkeit der Hirnabnormitäten zusammen. Der Kürze wegen sind die Arten der Abnormität mit lateinischen Ziffern bezeichnet: I. bedeutet Blutergießung; II. seröse Ergießung; III. Eiterung; IV. Atrophie; V. Höhlungen; VI. Hypertrophie; VII. Erweichung; VIII. Verhärtung; IX. Verwachsung; X. Aßergelbte; XI. Hydatiden; XII. erdige und knöcherne Concremente; XIII. Erschütterung; XIV. penetrierende Wunden; XV. eingebrangene fremde Körper; XVI. Depression des Schädels; XVII. Blutunterlaufung; XVIII. Brand; XIX. Beinfaß. Die §§. 653 — 709 geben die Fälle, in welchen eine Krankheitserscheinung beobachtet wurde, nach den Nummern an, unter welchen sie im Anhange aufgeführt sind. Die Tabellen geben eine Uebersicht von der Zahl der Fälle, in welchen eine Krankheitserscheinung beobachtet worden ist. Die letzte Columnne jeder Tafel giebt die Proportion der Zahl der Fälle an, in welchen eine Abnormität beobachtet wurde, zur Zahl derjenigen Fälle unter ihnen, in welchen eine bestimmte Krankheitserscheinung Statt fand, und zwar, die letztere Zahl als Einheit gesetzt. Die Rubrik unter der Angabe der Hirnthelle giebt die Summe der Fälle an, in welchen bey einer und derselben Abnormität in den verschiedenen Hirnthellen eine Krankheitserscheinung eintrat, und die letzte Zeile giebt die Proportion dieser Zahl zur Gesamtzahl der Fälle, in welchen jene Abnormität beobachtet wurde, Erstre wieder als Einheit angenommen. Um die Vergleichung zu erleichtern, und dabey doch Wiederholungen zu vermeiden, geben die 3 ersten Tabellen die Zahl der Fälle an, in welchen eine Abnormität in der im Anhange aufgestellten Reihe von Beobachtungen vorkam.

§. 653. Kopfschmerz bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Verlängertes Mark 133. 1059; Oberfläche des kleinen Hirns 133. 134; Seitenhöhle 152. 156. 162. 163. 165. 176. 185. 213. 411; Sehhügel 197. 198. 490; Streifenhügel 206. 207. 214; Mantel, Oberfläche 217. 218. 226. 243. 325; Substanz 214. 226. 227; Oberlappen, Substanz 243. 247. 248. 249; Hinterlappen, Oberfläche 274; Vorderlappen, Oberfläche 274. 2035, Substanz 282. 284. — II. Verlängertes Mark 307; kleines Hirn 780; Seitenhöhlen, ischiopathisch acut 325 bis 329, chronisch 380. 397. 398, symptomatisch 227. 302. 306. 333. 399. 402. 403. 407. 426. 428. 468. 513. 544. 558 bis 558. 580. 706. 734. 778. 781. 783. 810. 817. 881. 884. 916. 922. 923. 938. 940. 944. 947. 953. 954. 974. 980. 981. 996. 998. 1004. 1006. 1022. 1026. 1036. 1039. 1059. 1060. 1064. 1080. 1091. 1092. 1102. 1107; Zirkel 399. 402. 403; Mantel, Oberfläche 197. 217. 304. 306. 307. 310. 311. 332. 333. 399. 328. 706. 734. 780. 795. 891. 923. 924. 928. 933. 1026. 1061. 1063. 1074. 1102. 1105. 1107. — III. Verlängertes Mark 406. 407; kleines Hirn, Oberfläche 406. 407. 409. 411; Substanz 417. 423 fg. 426 bis 428. 430. 943. 951. 953; Großhirnstamm 434; Seitenhöhlen 440. 441. 454. 542. 586, a. 897. 926; Sehhügel 434; Streifenhügel 454. 459. 974; Zirkel 940; Trichter und Hirnanhang 466 bis 467; Mantel, Oberfläche 475. 954; Substanz 483 bis 485, 487 bis 490; Oberlappen, Substanz 513. 515 bis 521. 523 fg. 527 fg. 792; Unterlappen 426. 434. 541 bis 545; Hinterlappen, Oberfläche 550, Substanz 542. 554 bis 558. 583. 782. 1030; Vorderlappen, Substanz 579 fg. 582 bis 584. 586. 596, a. — IV. Kleines Hirn 654. 886. 929; Brücke 886; Bindearme 940; Vierhügel 940. 980; Sehhügel 218. 707. 1059; Streifenhügel 218. 662; Ballen 1066;

Mantel 313; Hinterlappen 886. — V. Sehhügel 682; Oberlappen 818. — VI. Höhlenhaut 928, 1006; Zirbel 694 fg.; Hirnanhang 940; Häute des Mantels 706 fg. 818, 828, 974. — VII. Verlängertes Mark 586, a; Brücke 729, 731, 754; Höhlenhaut 706, 780; Großhirnstamm 198, 757; Vierhügel 756; Sehhügel 745, 753, 756; Streifenhügel 459, 743, 747, 754, 756, 974; Zirbel 450, 756, 993, 1016; Hirnanhang 764; Scheidewand 434, 779, 980; Gewölbe 434, 743, 753, 756, 778 bis 784; Balken 261, 785, 784, 792, 796, 809; Mantel 214, 694, 729, 755, 799, 944, 975, 998, 1012; Oberlappen 245, 247, 742, 745, 753, 808, 809, 900 bis 902, 1003, 1009, 1012; Unterlappen 261, 544, 810; Hinterlappen 714, 815, 817, 888, 1028; Vorderlappen 249, 284, 900, 1040, 1041. — VIII. Sehhügel 857; Mantel 818, 1042, 1091; Oberlappen 515, 958; Vorderlappen 888. — IX. Häute des kleinen Hirns 433; Seitenhöhlen 440, 448; Mantel 477, 694, 818, 856, 1066; Oberlappen 974; Unterlappen 545, 547; Hinterlappen 831, 1024; Vorderlappen 524, 463, 1035, 1038. — X. An der festen Hirnhaut des kleinen Hirns 881, 885 fg.; des Großhirnstamms 890 fg.; des Mantels 888; des Oberlappens 892, 894 bis 897, 900, 904; des Hinterlappens 894, 909 bis 911; des Vorderlappens 894, 914, 916, 918 bis 920. Granulationen der plastischen Häute 217, 707, 818, 928, 966, 1002, 1039, 1102; der Gefäßgeflechte 327, 332, 690. Aftergebilde des kleinen Hirns, an der Oberfläche 597, 778, 926 bis 929, in der Substanz 398, 888, 923, 935 fg., 938 fg., 943 fg., 946 fg., 951 bis 953, 993, 998, 1001, 1099, 1026; der Brücke 924, 956 bis 958, 963; der Seitenhöhlen 964 bis 966, 968, 1012; des Großhirnstamms 956, 987; der Sehhügel 969, 971, 1006; der Streifenhügel 974 fg.; der Zirbel 977 fg., 980 bis 982; des Hirnanhangs 987 fg.; des Ammonshorns 1029; des Balkens 990 fg.; des Mantels, an der Oberfläche 993 fg., 996, in der Substanz 411, 782, 975, 994, 997 bis 999, 1001 fg.; des Oberlappens, an der Oberfläche 943, 1003, 1006, in der Substanz 1002, 1009, 1014, 1016; des Unterlappens 1019; des Hinterlappens 1020, 1025 fg., 1024, 1026, 1028 bis 1030, 1032; des Vorderlappens, in der Substanz 1035 fg., 1038 fg., 1041 fg. — XI. Verlängertes Mark 1060; Seitenhöhlen 1063 fg.; Gefäßgeflechte 411, 558, 682, 1039, 1061, 1080; Sehhügel und Streifenhügel 1066; Zirbel 982; Mantel, Oberfläche 1068 fg.; Oberlappen 1074 fg.; Vorderlappen 1077, 1080. — XII. Kleines Hirn, Haut 1091, 1101; Vierhügel 438; Mantel, Haut 165, 217, 399, 1092, 1116; Oberlappen, Haut 1094 bis 1096, Substanz 517, 969, 1097 fg.; Hinterlappen, Substanz 1115; Vorderlappen, Haut 1095, 1101 bis 1104, Substanz 1106.

§. 654. Kopfschmerz bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 185, 190; Mantel, Oberfläche 185; Oberlappen, Oberfläche 250, Substanz 32, 256; Hinterlappen, Substanz 435; Vorderlappen, Oberfläche 95, 279. — II. Seitenhöhlen 988, 1016, 1025, 1040, 1115; Mantel, Oberfläche 513 fg., 824; Vorderlappen 525. — III. Verlängertes Mark 415; kleines Hirn, Oberfläche 415, Substanz 435; Großhirnstamm 435; Seitenhöhlen 415, 448, 450; Vierhügel 437 fg.; Streifenhügel 464; Mantel, Oberfläche 448, 477 bis 481, Substanz 438, 464; Oberlappen, Oberfläche 32, 697, 500 bis 502, 540, 511 fg., Substanz 66, 532, 536, 539; Unterlappen 531, 547 fg.; Hinterlappen, Substanz 450, 559 fg., 563, 565; Vorderlappen, Oberfläche 437, 568 fg., 569, 572, 574, 577 fg., Substanz 98, 100, 587, 589 fg., 592, 596 fg. — VII. Mantel 589, 802; Hinterlappen 818; Vorderlappen 27, 321, 597, 820, 822. — XIV. Oberlappen 77; Vorderlappen 587. — XV. Seitenhöhlen 60; Oberlappen, Oberfläche 536, Substanz 66, 77, 511; Vorderlappen 94 fg., 97 fg., 100, 105. — XVI. Ober-

lappen 115. 118. 122. 479. 504; Hinterlappen 125; Vorderlappen 129. 590. 708; — XVII. Großhirnstamm 435; Balken 60. — XVIII. Oberlappen 67. 504. 827 fg. 828. 830. 835; Unterlappen 547; Hinterlappen 83; fg. Vorderlappen 824. — XIX. Oberlappen 479. 518. 528. 834 fg.; Unterlappen 541; Hinterlappen 836. 1024; Vorderlappen 524. 577. — §. 655. Schwindel bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Kleines Hirn, Substanz 138. 148; Seitenhöhlen 138. 174. 177. 185; Sehhügel 490; Mantel, Oberfläche 325; Oberlappen, Substanz 267; Vorderlappen, Substanz 284. — II. Seitenhöhlen, idiopathisch, acut 325, chronisch 397, symptomatisch 333. 881. 922. 1060; Mantel, Oberfläche 138. 305. 333. 906. 953. 1061. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 409, Substanz 423. 951; Seitenhöhlen 926; Mantel, Substanz 490; Hinterlappen, Substanz 1030. — IV. Mantel 313. — VII. Streifenhügel 797; Zirbel 993; Gewölbe 743. 753. — IX. Oberlappen 317; Vorderlappen 322. — X. Seitenhöhlen 1012.

§. 656. Schwindel bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 184 fg.; Mantel, Oberfläche 184 fg. — II. Oberlappen 317 fg.; Vorderlappen 322. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 412; Vierhügel 412; Oberlappen, Oberfläche 119. 502. — XIV. Vorderlappen 25. — XV. Oberlappen 43. 75. — XVI. Oberlappen 114. 119. 121. — XIX. Hinterlappen 1024.

§. 657. Delirium von dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 270; Sehhügel 460; Streifenhügel 213 fg.; Mantel, Oberfläche 216 fg.; Substanz 214; 227; Oberlappen, Substanz 248. 251 fg.; Hinterlappen, Oberfläche 974; Substanz 270. — II. Verlängertes Mark 307; kleines Hirn 780; Seitenhöhlen, idiopathisch acut 327. 329; symptomatisch 223. 227. 306. 335. 403. 407. 513. 556. 558. 580. 730. 778. 781. 790. 806. 881. 922. 925. 931. 974. 980. 995. 998. 1036. 1080; Zirbel 403; Mantel 217. 223. 304 bis 307. 689. 780. 795. 879. 928. 1063; Vorderlappen 320. — III. Verlängertes Mark 407; kleines Hirn, Oberfläche 467; Substanz 417. 963; Großhirnstamm 434; Seitenhöhlen 440. 462. fg. 454. 542. 586. a; Sehhügel 434; Streifenhügel 454. 974; Mantel, Oberfläche 475, Substanz 485. 488. 490; Oberlappen, Substanz 513. 520. 522. 792; Unterlappen 434. 542 fg. 545; Hinterlappen, Substanz 542. 555 fg. 558. 782; Vorderlappen, Substanz 580. 582. 586. 586. a. — IV. Vierhügel 980; Sehhügel 707; Mantel 313. — V. Unterlappen 786. — VI. Höhlenhaut 928; Zirbel 327. 694. 697; Scheidewand 765; Mantel, Haut 214. 707. 974. — VII. Verlängertes Mark 586. a; kleines Hirn 710. 928. 980; Brücke 730. 956; Höhlenhaut 780; Großhirnstamm 737; Streifenhügel 436. 755. 931; Scheidewand 434. 980; Gewölbe 434. 778. 780 bis 782. 784. 931; Balken 261. 784. 790 bis 792. 931; Mantel 214. 694. 790. 795 fg. 837. 1002; Oberlappen 213. 248. 252. 806; Unterlappen 261; Hinterlappen 270. 815; Vorderlappen 386. 730. — VIII. Kleines Hirn 846; Sehhügel 857; Mantel 214. 327. 925. 931. 1074; Oberlappen 806. — IX. Seitenhöhlen 440; Mantel, Haut 214. 694. 879; Oberlappen 974; Unterlappen 545; Hinterlappen 831; Vorderlappen 1038. — X. Kleines Hirn, Hüfte 881, Oberfläche 778. 928, Substanz 931. 939. 943. 945. 998; Brücke 956. 958; Seitenhöhlen 965 fg.; Gefäßgeflechte 327. 690; Streifenhügel 974; Zirbel 880; Ammonshorn 1029; Balken 991 fg.; Mantel, Hüfte 928. 966, Oberfläche 995; Substanz 782. 998; Hinterlappen 1028 fg.; Vorderlappen 1036. 1038. — XI. Seitenhöhlen 1063; Gefäßgeflecht

17. 277. 1060; Vorderlappen 1980. — XII. Kleines Hirn; Hünte 945. 1101; Vierhügel 438; Oberlappen 1097.

§. 659. Delirium bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Verlängertes Mark 135; kleines Hirn 135. 137; Balken 259. 261; Mantel, Oberfläche 223; Oberlappen, Oberfläche 240; Substanz 32; Vorderlappen, Oberfläche 276 fg. 279. — II. Mantel 314. 821. 831; Oberlappen 315; Vorderlappen 321. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 413; Großhirnstamm 436; Seitenhöhlen 59. 97. 447; Vierhügel 437 fg.; Balken 576; Mantel, Oberfläche 480; Substanz 438; Oberlappen, Oberfläche 32. 499. 501. 505. 509; Substanz 17. 69. 76. 530. 534; Unterlappen 83; Hinterlappen, Oberfläche 551. 553, Substanz 560 fg.; Vorderlappen, Oberfläche 437. 566 bis 569. 572 fg. 576, Substanz 54. 107. 594. — VII. Kleines Hirn 727 fg.; Mantel 59. 223. 802; Oberlappen 17; Vorderlappen 321. 820. 822. — XIII. Hinterlappen 4. — XIV. Kleines Hirn 87; Oberlappen 45. 77; Vorderlappen 25. — XV. Seitenhöhlen 59; Oberlappen 17. 61. 64. 69. 71. 77; Unterlappen 83 fg.; Hinterlappen, Oberfläche 89, Substanz 87; Vorderlappen 97. — XVI. Oberlappen 116. 120. 122. — XVII. Oberlappen 276. 568. — XVIII. Kleines Hirn 802; Oberlappen 67. 828.

§. 659. Verrücktheit und Manie. I. Seitenhöhlen 164; Mantel, Oberfläche 164; Hinterlappen, Oberfläche 166. — II. Seitenhöhlen 698. 718 fg. 739. 759 fg. 839. 922. 940. 1070; Mantel 655. 798. 859; 843. 1063. 1070. — IV. Vierhügel 655; Sehhügel 707. — V. Sehhügel 682; Oberlappen 683 fg.; Hinterlappen 683. — VI. Höhlenhaut 739. 1070; Mantel, Haut 682. 707. 739. 1070. — VII. Kleines Hirn 716 bis 719. 1070; Brücke 730; Bündelke, Vierhügel und Sehhügel 739; Zirkel 758 bis 760. 763; Hirnanhang 655. 759. 766; Gewölbe 775; Balken 788. 793; Mantel 798; Hinterlappen 739; Vorderlappen 730. 1054. 1056. — VIII. Verlängertes Mark 839. 843; kleines Hirn 843; Großhirnstamm 1116; Sehhügel 922; Streifenhügel 859. 922; Zirkel 869. 871; Hirnanhang 863 fg.; Scheidewand 932; Mantel 759. 775. 853. 932. — IX. Höhlenhaut 683; Mantel 698; Oberlappen 1070; Unterlappen 1070. — X. Verlängertes Mark 922; kleines Hirn, Substanz 932. 936; Gefäßgeflechte 1070; Mantel, Hünte 707. 739; Oberlappen, Substanz 1010; Hinterlappen 1025. 1031; Vorderlappen, Oberfläche 1033; Substanz 1034. 1045. — XI. Mantel, Oberfläche 1070; Hinterlappen 1076; Gefäßgeflechte 682. 843. 1036. 1061. — XII. Seitenhöhlen 1111; Schistreifen 1110; Mantel, Hünte 164. 309. 682. 1116.

§. 660. Betäubung bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Verlängertes Mark 1059; kleines Hirn, Oberfläche 134; Substanz 1037; Seitenhöhlen 153. 160 bis 163. 168. 174. 179. 196. 243. 284. 445; Sehhügel 196. 199; Streifenhügel 207. 209. 213 fg.; Mantel, Oberfläche 217. 219. 226. 243. 658; Substanz 214. 226 bis 228; Oberlappen, Substanz 243. 249. 272; Hinterlappen, Substanz 269. 271 fg.; Vorderlappen, Oberfläche 274; Substanz 283 fg. — II. Verlängertes Mark 446; kleines Hirn 446. 780; Seitenhöhlen idiopathisch, acut 326. 328 fg., chronisch 371. 375 fg. 397, symptomatisch 271. 335. 403. 427 fg. 466. 473. 514. 544. 556. 558. 580. 696. 698. 734. 781. 783. 790. 810. 881. 884. 923. 925. 948. 959. 980 fg. 995. 998. 1022. 1026. 1059. 1075; Mantel, idiopathisch 340. 344, symptomatisch 217. 271. 310 fg. 335. 446. 528. 734. 780. 923. 928. 948. 993. 1015. 1026. 1074. — III. Verlängertes Mark 406. 422; kleines Hirn, Oberfläche 406, Substanz 418 fg. 422. 427. 431. 943; Großhirnstamm 434; Seitenhöhlen 159. 419. 440. 442. 444 bis 446. 542; Seh-

hügel 434. 970; Trichter und Hirnanhang 466; Mantel, Oberfläche 473. 475; Substanz 487. 489 fg.; Oberlappen, Substanz 514 fg. 517. 521 bis 523. 526. 528. 793; Unterlappen 434. 542 bis 545; Hinterlappen, Substanz 542. 555 fg. 558. 583; Vorderlappen, Substanz 580 fg. 583 fg. 586. — IV. Vierhügel 980; Sehhügel 658. 800; Hirnanhang 665. 850; Mantel 216. 375. 375. 444. — V. Brücke 199; Schhügel 199. 682; Mantel 434; Oberlappen 686 bis 688; Unterlappen 199. 687. 689. — VI. Haut des kleinen Hirns 725; der Seitenhöhlen 371. 928; des Mantels 214. 503. 1051; des Hinterlappens 708; Zirbel 696. 698 fg. — VII. Kleines Hirn 130. 272. 326. 431. 725. 756. 928. 930. 934. 943. 980; Brücke 729. 732 bis 734. 751. 956; Höhlenhaut 174. 183. 780; Vierhügel 738; Schhügel 201. 209. 732. 743. 751. 753; Streifenhügel 188. 201. 209. 732. 743. 745. 747 fg. 750 fg. 753 bis 756. 800. 805; Zirbel 450. 736. 756. 993. 1016; Scheidewand 434. 779. 800. 980; Gewölbe 434. 743. 753. 756. 779 bis 781. 783. 800; Balken 783. 790 bis 792. 794. 809; Mantel 214. 658. 725. 729. 790. 796 fg. 799 fg. 975. 998. 1002. 1042; Oberlappen 213. 243. 252. 272. 686 fg. 743. 748. 750. 753. 805. 808 fg.; Unterlappen 544. 805. 810; Hinterlappen 269. 272. 326. 812. 815. 817. 1022; Vorderlappen 249. 284. 586. 1040. — VIII. Mantel 214. 925. 1042; Oberlappen 516. 968. 1071. — IX. Kleines Hirn 446; Brücke 1016; Seitenhöhlen 440; Mantel 214. 446. 477. 548; Oberlappen 1016; Unterlappen 545; Hinterlappen 831; Vorderlappen 324. 1037 fg. — X. Verlängertes Mark 923. 948; kleines Hirn, Häute 881. 683 fg.; Oberfläche 397. 928. 930. 959; Substanz 923. 934. 943. 945. 948. 993. 1026; Brücke 956. 958 fg.; Großhirnstamm, Haut 889; Substanz 934. 987; Seitenhöhlen 968. 1012; Gefäßgeflechte 690; Sehhügel 970. 1006; Streifenhügel 973. 975; Zirbel 978. 980 fg.; Hirnanhang 987; Ammonshorn 1029; Balken 989. 991 fg.; Mantel, Häute 887. 1002. Oberfläche 993 fg. 996. Substanz 975. 994. 999. 1002; Oberlappen, Häute 903. 904. Oberfläche 1007. Substanz 1002. 1009. 1011. 1014 bis 1017; Unterlappen 1019; Hinterlappen, Häute 910. 912. Substanz 1002. 1026. 1028 fg. 1031; Vorderlappen, Oberfläche 1033. Substanz 959. 1002. 1034. 1036. 1038. 1040. 1042. — XI. Verlängertes Mark 1059; Seitenhöhlen 850. 1062. 1065; Gefäßgeflechte 17. 176. 277. 285. 319. 558. 993; Mantel 1068 fg.; Oberlappen 1071. 1074 fg. — XII. Kleines Hirn, Häute 945. 1091; Mantel, Häute 217. 1011; Oberlappen 517. 1097; Vorderlappen 1106.

§. 661. Betäubung bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 22. 181 bis 183. 188 bis 192; Balken 260; Mantel, Oberfläche 19. 33 bis 35. 190. 192. 222. 478. 492. 826; Oberlappen, Oberfläche 38. 229 bis 234. 236. 238. 240. 509; Substanz 32. 255 fg. 258; Unterlappen 262 bis 264; Hinterlappen, Oberfläche 267. 478. Substanz 435; Vorderlappen, Oberfläche 136. 267. 278 bis 281. Substanz 285 fg. — II. Seitenhöhlen 930. 1016. 1040; Mantel, Oberfläche 313 fg. 831; Oberlappen 316; Hinterlappen 319; Vorderlappen 323 fg. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 414; Seitenhöhlen 59. 97. 189. 449 fg. 462; Streifenhügel 462; Balken 469 bis 472. 576; Mantel, Oberfläche 477 fg. 481; Substanz 67. 492; Oberlappen, Oberfläche 32. 114. 493 fg. 498. 503 fg. 509. 512. 829; Substanz 17. 66. 69. 88. 469 fg. 472. 533 fg. 536 bis 539; Unterlappen 83. 546. 548; Hinterlappen, Oberfläche 1051. Substanz 450. 559. 562 bis 565; Vorderlappen, Oberfläche 568. 573. 576 bis 578. Substanz 55. 98. 100 fg. 589. 591 bis 593. 598 fg. 823. — VII. Mantel 34. 59. 93. 589. 802; Oberlappen 17. 66. 537. 539; Hinterlappen 319. 1051; Vorder-

Iappen 286. 597. 819 fg. 823. 825. — XIII. Hinterlappen 5; Vorderlappen 11. — XIV. Oberlappen 33; Vorderlappen 22. 25. 94. 181. 593. — XV. Kleines Hirn 156; Oberlappen, Oberfläche 79. 82. 114. 119. 469. 478. 536. Substanz 17. 36. 38. 61. 63 bis 66. 73 bis 75. 77; Unterlappen 83; Vorderlappen 48. 50. 94. 93. 96 fg. 100. — XVI. Oberlappen 114. 116. 119 fg. 123. 511; Hinterlappen 1051; Vorderlappen 34. 129. 599. — XVII. Mantel, Oberfläche 93; Oberlappen 35. 493; Vorderlappen 568. — XVIII. Kleines Hirn 802. 826; Oberlappen 67. 504. 830; Vorderlappen 191. 833. — XIX. Oberlappen 528. 834; Vorderlappen 324.

§. 662. Apoplexie bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Verlängertes Mark 143. 146. 150. 215. 1059; kleines Hirn, Oberfläche 130 bis 132. 134. 144. Substanz 138 fg. 141. bis 150. 875; Brücke 215; Seitenhöhlen 138. 150 bis 152. 154 bis 159. 166 fg. 169 bis 171. 176 fg. 180. 197 fg. 200. 241 bis 243. 246. 253. 270. 284. 456. 485. 968; Biendeirne 142; Vierhügel 388; Sehhügel 193 fg. 197 bis 201. 204. 245. 490. 740; Streifenhügel 145. 201 bis 206. 208 bis 212. 215. 241. 246; Mantel, Oberfläche 150 fg. 166. 177. 216. 220. 243. 254. 800. Substanz 224 fg. 228. 664; Oberlappen, Substanz 241 bis 247. 250 bis 254. 272; Unterlappen 265; Hinterlappen, Oberfläche 266. Substanz 211. 269 bis 273; Vorderlappen, Oberfläche 155. 800. Substanz 282 bis 284. 813. — II. Kleines Hirn 330 fg; Seitenhöhlen, chronisch 388, symptomatisch 132. 201. 265. 271. 330. 333 bis 337. 458. 653. 686. 718 bis 721. 806. 841. 995. 1021. 1026. 1066; Zirkel 686; Mantel 138. 149 fg. 197. 201. 215. 271. 282. 332 bis 337. 653. 661. 686 bis 688. 795. 827. 841. 1015. 1026. 1058. 1061. 1063. 1066. 1072. 1108. 1117. — III. Verlängertes Mark 422; kleines Hirn, Oberfläche 201. 409. Substanz 422; Sehhügel 451 fg. 456; Streifenhügel 452. 455 fg. 458; Mantel, Substanz 485; Oberlappen, Substanz 458. 518. 522. 525. 527; Hinterlappen, Substanz 265; Vorderlappen, Substanz 579. 586. — IV. Sehhügel 661. 800; Hirnanhang 664. 666; Balken 1066; Mantel 193. 216. — V. Brücke 199; Großhirnstamm 193; Sehhügel 199; Mantel 134. 145. 273. 875; Oberlappen 150. 203. 242. 684 bis 686. 688; Unterlappen 199; Hinterlappen 193. — VI. Höhlenhaut 201. 458; Scheidewand 705; Mantel, Häute 150. 200 fg. 234. — VII. Kleines Hirn 201. 272. 710 fg. 720. 722. 724. 726; Brücke 731 fg. 735 fg. 742. 751; Höhlenhaut 193; Gefäßgeflechte 170. 180; Großhirnstamm 198; Biendeirne 143; Sehhügel 154. 157. 201. 209. 732. 740. 742. 751. 753. 803; Streifenhügel 145. 154. 157. 188. 201. 203 fg. 209. 215. 732. 742. 747. 749 bis 751. 753. 800. 976; Hirnanhang 272; Scheidewand 800; Gewölbe 157. 753. 776. 800; Balken 261. 749; Mantel 224. 671. 797. 800; Oberlappen 212. 215. 243. 247. 252 bis 254. 272. 458. 686. 750. 753. 806 fg; Unterlappen 261. 265. 800; Hinterlappen 201. 269. 270. 272. 811 bis 814; Vorderlappen 282. 284. 579. 586. 749. 1041. — VIII. Verlängertes Mark 842; Sehhügel 857; Hirnanhang 866; Scheidewand 280; Mantel 150. 200. 253. 776. 866; Oberlappen 806. 875. 1071; Unterlappen 875. — IX. Häute des Mantels 1066; Oberlappen 807; Vorderlappen 282. 1038. — X. Kleines Hirn, Substanz 998. 1026; Großhirnstamm, Haut 890; Seitenhöhlen 967 fg; Höhlenhaut 282; Gefäßgeflechte 332; Streifenhügel 976; Balken 990; Mantel, Häute 150, Oberfläche 995, Substanz 866. 998; Oberlappen, Substanz 1014; Hinterlappen 1026; Vorderlappen, Haut 920, Oberfläche . Substanz 1038. 1041. — XI. Verlängertes Mark 1039; Sehhügel und Streifenhügel 1066; Balken 1067; Oberlappen 1071; Ge-

Stützgeflechte 176. 254. 330. 334. 841. 1061. 1117. — XII. Kleines Hirn, Haut 1101; Gefäßgeflechte 224; Mantel, Haut 705; Oberlappen, Haut 1096; Vorderlappen, Haut 1101.

§. 663. Apoplexie bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 23. 186 fg. 435. 584. 803; Balken 259; Mantel, Oberfläche 186 fg. 564; Hinterlappen, Substanz 435. — III. Großhirnstamm 435; Streifenhügel 464; Vorderlappen, Substanz 597. — VII. Mantel 803. — XVII. Großhirnstamm 435; Sehhügel 220; Streifenhügel 805; Mantel 215. 224.

§. 664. Geistesschwäche und Blödsinn bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Verlängertes Mark 150; Seitenhöhlen 270; Sehhügel und Streifenhügel 201; Mantel, Oberfläche 150. 663; Hinterlappen, Substanz 270. 273. — II. Seitenhöhlen, idiopathisch 374. 376. 378 fg. 384 fg. 385. 388. 392 fg. 393, symptomatisch 201. 223. 653. 707. 790. 841. 1021 fg. 1058; Trichter 388; Mantel, idiopathisch 341. 346, symptomatisch 150. 201. 795. 841. 867. 1015. 1058. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 201, Substanz 431; Seitenhöhlen und Streifenhügel 457. — IV. Kleines Hirn 739; Großhirnstamm und seine Ganglien 379. 388. 392. 395; Streifenhügel 663; Zirbel 656 fg.; Balken 388. 677 fg.; Mantel 376. 379. 395; Oberlappen 679; Hinterlappen 680. — V. Mantel 273. 875; Oberlappen 150. 685. — VI. Höhlenhaut 201. 707. 739; Zirbel 388. 700 fg.; Mantel, Haut 150. 201. 653. 707. 739. — VII. Kleines Hirn 431. 712 fg. 715. 851. 855. 946; Brücke 971; Bindearme, Vierhügel und Sehhügel 739; Hirnanhang 764 fg. 771; Balken 713. 787. 790. 793; Mantel 790. 796. 831; Oberlappen 712; Hinterlappen 201. 270. 739. 1021 fg. 1028. 1100; Vorderlappen 1040. — VIII. Verlängertes Mark 841. 852; kleines Hirn 431. 844 fg. 847. 849. 875; Brücke 841. 851 fg.; Großhirnstamm 841. 855 fg.; Sehhügel 858; Zirbel 841. 867. 870; Hirnanhang 861 fg.; Balken 872. 874; Mantel 150. 393. 656. 707. 789. 841. 854. 1017. 1112 fg.; Oberlappen 875; Unterlappen 875; Vorderlappen 877; Gefäßgeflecht 771. — IX. Hante des Mantels 653. 841; des Hinterlappens 877. — X. Verlängertes Mark 935; kleines Hirn, Haut 883, Substanz 935. 946; Sehhügel 970; Balken 989; Mantel, Hante 653. 739. 1058. 1105, Substanz 997; Oberlappen, Haut 905. 1073, Oberfläche 1006, Substanz 1015. 1017; Hinterlappen, Haut 911, Substanz 1021 fg. 1028; Vorderlappen, Haut 920, Substanz 1040. — XI. Mantel 1158; Oberlappen 1073; Gefäßgeflecht 841. — XII. Kleines Hirn, Haut 1090, Substanz 851; Seitenhöhlen 680. 1112 fg.; Hirnanhang 771; Mantel, Haut 656; Hinterlappen, Haut 1100; Vorderlappen, 1105.

§. 665. Geistesschwäche und Blödsinn bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Balken 261; Mantel, Oberfläche 223. — II. Seitenhöhlen 1040. — III. Großhirnstamm 435; Seitenhöhlen 596; Streifenhügel 464; Mantel, Substanz 464; Hinterlappen, Substanz 561. 563; Vorderlappen, Substanz 596. — VII. Mantel 223. — XIII. Hinterlappen 4; Vorderlappen 12. — XIV. Oberlappen 44; Vorderlappen 47 fg. — XV. Vorderlappen 48. 99. — XVI. Oberlappen 117; Hinterlappen 124. — XVII. Großhirnstamm 435. — XIX. Vorderlappen 596.

§. 666. Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten. I. Seitenhöhlen 154; Sehhügel 197. 201; Streifenhügel 201; Mantel, Substanz 687; Oberlappen, Substanz 247. — II. Seitenhöhlen, idiopathisch, acut 329, chronisch 388. 397, symptomatisch 201. 881. 925. 947. 1058; Mantel, Oberfläche 197. 201. 687. 689. 795.

1015. 1058. — III. Kleines Hirn, Oberfläche 201; Oberlappen, Substanz 792; Vorderlappen, Substanz 579. — IV. Sehhügel 800; Balken 388; Oberlappen 679. — V. Oberlappen 687. — VI. Mantel, Haut 1073. — VII. Kleines Hirn 201, 928, 947; Brücke 971; Sehhügel 154; Streifenhügel 201; Gewölbe 800. — VIII. Mantel 818, 1065. — IX. Mantel 818. — X. Kleines Hirn, Haut 882, Substanz 933, 947, 954. — XI. Seitenhöhlen 1066. — XII. Vierhügel 438.

§. 667. Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten. I. Balken 261. — III. Vierhügel 438; Mantel, Oberfläche 480; Substanz 438, 492; Oberlappen, Oberfläche 510. — VI. Hinterlappen 818. — XIII. Vorderlappen 9, 10, 12. — XIV. Vorderlappen 31, 47, 53. — XVI. Hinterlappen 124.

§. 668. Unruhe. I. Streifenhügel 212; Mantel 222; Vorderlappen 93. — II. Kleines Hirn 780; Seitenhöhlen 580; Mantel 312, 780, 1072; Vorderlappen 323. — III. Vierhügel 635, 980; Oberlappen 497, 501, 504, 829; Vorderlappen 571, 580. — V. Unterlappen 689. — VI. Haut des Mantels 150; des Vorderlappens 709. — VII. Vierhügel, Zirbel und Sehhügel 756; Streifenhügel 755 fg.; Gewölbe 756, 779 fg.; Scheidewand 779; Mantel 93; Oberlappen 212. — X. Zirbel 980; Gewölbe und Hinterlappen 1029. — XV. Vorderlappen 93. — XVI. Oberlappen 829; Vorderlappen 1057. — XVII. Mantel 93. — XVIII. Vorderlappen 1056.

§. 669. Empfindlichkeit, Verdrüßlichkeit, Aergerlichkeit, Ungeduld, Jähzorn, Trotz, Starrsinn, Widerspenstigkeit. I. Streifenhügel 213 fg.; Mantel 214, 217; Oberlappen 249. — II. Seitenhöhlen 329, 365; Mantel 310, 880, 993, 1074, 1105. — III. Kleines Hirn 433; Hinterlappen 557, 561. — IV. Hirnanhang 663. — VI. Mantel, Häute 707. — VII. Zirbel 993; Oberlappen 213; Vorderlappen 249. — VIII. Großhirnstamm 856. — X. Verlängertes Mark und Brücke 924; Großhirnstamm, Haut 890; Zirbel 981; Mantel 993; Hinterlappen 1024. — XII. Seitenhöhlen 1113. — XIII. Hinterlappen 4. — XIX. Hinterlappen 1024.

§. 670. Dürsterheit, Traurigkeit, Verslossenheit, Furchtsamkeit, Aengstlichkeit, Misträuen, Melancholie, Lebensüberdruß. I. Verlängertes Mark 150; kleines Hirn 148, 150; Mantel 216, 259, 325. — II. Seitenhöhlen 325, 327, 698, 702, 867, 884, 940, 1091; Zirbel 404; Mantel 689, 867, 1061. — III. Vierhügel und Zirbel 940; Vorderlappen 579, 584. — V. Oberlappen 683; Unterlappen 689; Hinterlappen 683. — VI. Zirbel 697 bis 699; Hirnanhang 940. — VII. Streifenhügel 747; Zirbel und Hirnanhang 768; Scheidewand 785; Balken 789; Oberlappen 808; Vorderlappen 579. — VIII. Zirbel 867, 869; Hirnanhang 864; Mantel 697, 1091; Oberlappen 515; Hinterlappen 877, 1076. — IX. Kleines Hirn, Haut 1091. — X. Kleines Hirn, Haut 884, Substanz 940, 945; Seitenhöhlen 967; Gefäßgeflechte 940; Balken 992; Unterlappen, Haut 908; Hinterlappen, Haut 912. — XI. Seitenhöhlen 1064; Hirnanhang 864; Hinterlappen 1076. — XII. Kleines Hirn, Haut 1091; Mantel, Haut 1093, 1109; Oberlappen, Haut 1094, Substanz 1098; Vorderlappen 1105.

§. 671. Aufregung, große Lebhaftigkeit, Fröhlichkeit, Geschwätzigkeit. I. Mantel 227; Hinterlappen 974; Vorderlappen 282. — II. Seitenhöhlen 227, 309, 373, 380, 393, 398; Mantel 282. — III. Streifenhügel 459, 974. — V. Sehhügel 682; Oberlappen 683 fg. Hinterlappen 683. — VII. Vorderlappen 282.

§. 672. Schwäche des Gesichts und Blindheit. I. am kleinen Hirne 137; Sehhügel

196; Streifenhügel 212; Mantel des großen Hirns 223, 224, 273, 658; Oberlappen 235, 240, 255; Vorderlappen 35, 282, 813, II.) Seitenhöhlen 23 (Nr. 223, 255, 329, 372 a), 373, 377, 378, 379, 388, 398, 429, 557, 696, 706, 707, 818, 848, 881, 922, 927, 934, 963, 1066), Mantel 5 (Nr. 223, 282, 332, 706, 993). III.) Kleines Hirn 2 (Nr. 429, 952), Vierhügel 1 (Nr. 437), Hirnanhang 1 (Nr. 467), Sehhügel 1 (Nr. 451), Oberlappen 3 (Nr. 469, 527, 539), Hinterlappen 4 (Nr. 553, 557, 561, 563), Vorderlappen 1 (Nr. 568), IV.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 554), kleines Hirn 1 (Nr. 654), Brücke 1 (Nr. 429), Vierhügel 1 (Nr. 707), Sehhügel 8 (Nr. 372 a), 379, 539, 658, 659, 660, 707, 922), Streifenhügel 4 (Nr. 372 a), 379, 539, 922), Hirnanhang 1 (Nr. 667), Hinterlappen 1 (Nr. 886), V.) Mantel 2 (Nr. 273, 667), Oberlappen 1 (Nr. 818), VI.) Zärbel 2 (Nr. 696, 697), VII.) Kleines Hirn 2 (Nr. 724, 756), Brücke 2 (Nr. 732, 971), Vierhügel 1 (Nr. 756), Sehhügel 2 (Nr. 732, 756), Streifenhügel 7 (Nr. 203, 213, 732, 743, 746, 748, 756), Mantel 2 (Nr. 1041, 1042), Oberlappen 5 (Nr. 212, 213, 804, 809, 969), Hinterlappen 2 (Nr. 813, 818), VIII.) Verlängertes Mark 2 (Nr. 842, 857), kleines Hirn 1 (Nr. 848), Brücke 1 (Nr. 857), Sehhügel 1 (Nr. 857), Streifenhügel 1 (Nr. 857), Mantel 1 (Nr. 697), Hinterlappen 1 (Nr. 857), X) Verlängertes Mark 2 (Nr. 922, 924), Haut des kleinen Hirns 3 (Nr. 881, 882, 886), kleines Hirn 5 (Nr. 398, 927, 929, 934, 993), Brücke 2 (Nr. 962, 963), Seitenhöhlen 1 (Nr. 964), Sehhügel 3 (Nr. 969, 970, 971), Streifenhügel 1 (Nr. 975), Haut des Mantels 1 (Nr. 888), Mantel 4 (Nr. 975, 993, 994, 997), Haut des Oberlappens 2 (Nr. 894, 901), Oberlappen 2 (Nr. 1005, 1007), Haut des Hinterlappens 2 (Nr. 888, 910), Hinterlappen 4 (Nr. 1027, 1028, 1030, 1031), Unterlappen 1 (Nr. 1019), Haut des Vorderlappens 1 (Nr. 920), Vorderlappen 5 (Nr. 888, 1033, 1039, 1041, 1042), XI.) Höhlen 2 (1065, 1075), Sehhügel 1 (Nr. 1066), Mantel 1 (Nr. 1069), Oberlappen 1 (Nr. 1075), Vorderlappen 1 (Nr. 1079), XIII) Vorderlappen 1 (Nr. 10), XIV.) Vorderlappen 1 (Nr. 31), XV.) Oberlappen 1 (Nr. 78), Vorderlappen 3 (Nr. 94, 105, 109), XVI.) Oberlappen 3 (Nr. 113, 115, 121), Vorderlappen 1 (Nr. 129), kleines Hirn 1 (Nr. 111).

§. 673. Taubheit I.) Streifenhügel 1 (Nr. 213), Hinterlappen 1 (Nr. 269), II.) Kleines Hirn 1 (Nr. 370), Seitenhöhlen 4 (Nr. 346, 370, 956, 963), Mantel 2 (Nr. 346, 928), III.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 415), kleines Hirn 3 (Nr. 412, 415, 419), Seitenhöhlen 2 (Nr. 415, 419), Vierhügel 2 (Nr. 412, 437), Hirnanhang 1 (Nr. 467), Mantel 1 (Nr. 487), Oberlappen 1 (Nr. 527), Unterlappen 1 (Nr. 541), IV.) Kleines Hirn 1 (Nr. 654), Hinterlappen 1 (Nr. 886), VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 851), Streifenhügel 2 (Nr. 213, 747), Zärbel 1 (Nr. 757), Mantel 1 (Nr. 851), Oberlappen 2 (Nr. 213, 808), Hinterlappen 2 (Nr. 817, 818), VIII.) Verlängertes Mark 2 (Nr. 654, 842), Brücke 1 (Nr. 851), X.) Haut des kleinen Hirns 2 (Nr. 882, 886), kleines Hirn 1 (Nr. 928), Brücke 2 (Nr. 956, 963), Zärbel 1 (Nr. 982), Haut des Mantels 1 (Nr. 888), Mantel 2 (Nr. 993, 1002), Haut des Oberlappens 2 (Nr. 894, 898), Haut des Unterlappens 3 (Nr. 907, 910, 1019), Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 888), Haut des Vorderlappens 1 (Nr. 910), XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 1065), XII.) Oberlappen 1 (Nr. 1097), XIII) Vorderlappen 2 (Nr. 9, 12), XVI) Kleines Hirn 1 (Nr. 111), Oberlappen 1 (Nr. 113), Vorderlappen 1 (Nr. 129).

§. 674. Allgemeine Lähmung der Gliedmaßen. I.) Kleines Hirn 1 (Nr. 134), II.) Seitenhöhlen 7 (Nr. 374, 377, 393, 395, 397, 398, 744), Mantel 2 (Nr. 393, 744), III.) Strei-

fenhügel 1. (Nr. 459). IV) Kleines Hirn 1. (Nr. 886); Brücke 1. (Nr. 886), Großhirnstamm 1. (Nr. 395), Balken 1. (Nr. 393), Hinterlappen 1. (Nr. 886). VI) Großes Hirn 1. (Nr. 690). VII) Kleines Hirn 1. (Nr. 725), Brücke 3. (Nr. 731, 733, 736), Schhügel 1. (Nr. 743), Streifenhügel 3. (Nr. 743, 744, 745), Gewölbe 1. (Nr. 743), Mantel 3. (Nr. 398, 725, 858), Oberlappen 2. (Nr. 743, 804). VIII) Schhügel 1. (Nr. 858). X) Haut des kleinen Hirns 1. (Nr. 886), kleines Hirn 1. (Nr. 397), Brücke 1. (Nr. 958), Mantel 1. (Nr. 398), Haut des Unterlappens 1. (Nr. 1018). Hirnbruch, Oberlappen 1. (Nr. 290).

§. 675. Allgemeine Krämpfe und Epilepsie. I) Verlängertes Mark 1. (Nr. 143), kleines Hirn 7. (Nr. 133, 140, 142, 143, 303, 826, 1037), Seitenhöhlen 9. (Nr. 33, 162, 163, 165, 177, 220, 485, 968, 1096), Vierhügel 1. (Nr. 388), Schhügel 1. (Nr. 194, 490), Streifenhügel 1. (Nr. 194), Balken 2. (Nr. 259, 260), Mantel 8. (Nr. 33, 177, 220, 221, 259, 260, 478, 658), Oberlappen 7. (Nr. 33, 74, 114, 229, 233, 249, 256), Hinterlappen 1. (Nr. 1021), Vorderlappen 4. (Nr. 127, 275, 283, 1035). II) Kleines Hirn 4. (Nr. 331, 370, 372, a. 10007), Seitenhöhlen 63. (Nr. 302, 306, 326, 327, 328, 366, 367, 369, 370, 371, 372, a. 274, 375, 381, 385, 388, 393, 397, 399, 406, 408, 425, 429, 468, 473, 477, 478, 513, 514, 538, 557, 676, 744, 759, 810, 831, 840, 867, 884, 916, 923, 930, 934, 940, 942, 947, 948, 953, 956, 964, 981, 995, 1006, 1007, 1021, 1022, 1023, 1036, 1058, 1075, 1080, 1091, 1115), Zirbel 1. (Nr. 399), Hirnanhang 4. (Nr. 370, 372, a. 388, 405), Mantel 22. (Nr. 306, 308, 310, 311, 312, 340, 343, 344, 346, 356, 361, 399, 405, 446, 687, 744, 831, 867, 923, 948, 1026, 1058), Hinterlappen 1. (Nr. 708), Vorderlappen 1. (Nr. 820). III) Verlängertes Mark 2. (Nr. 408, 654), kleines Hirn 6. (Nr. 440, 447, 418, 425, 429, 433), Großhirnstamm 1. (Nr. 436), Seitenhöhlen 8. (Nr. 59, 97, 442, 443, 445, 446, 696, 897), Vierhügel 1. (Nr. 438), Streifenhügel 2. (Nr. 436, 458), Zirbel 1. (Nr. 940), Mantel 15. (Nr. 46, 59, 425, 438, 442, 458, 473, 475, 477, 478, 483, 485, 486, 490, 492), Oberlappen 18. (Nr. 62, 606, 613, 614, 615, 617, 620, 623, 629, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 792), Unterlappen 4. (Nr. 83, 85, 543, 548), Hinterlappen 7. (Nr. 550, 552, 555, 557, 561, 562, 562, 583), Vorderlappen 14. (Nr. 567, 568, 569, 573, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 593, 595, 596). IV) Kleines Hirn 3. (Nr. 367, 654, 940), Brücke 1. (Nr. 429), Großhirnstamm 7. (Nr. 369, 370, 371, 372, a. 381, 388, 392), Vierhügel 2. (Nr. 381, 940), Schhügel 1. (Nr. 658), Zirbel 8. (Nr. 372, a. 381, 673, 674, 704, 865, 984, 985), Hirnanhang 5. (Nr. 667, 673, 674, 675, 676), Gewölbe 1. (Nr. 370), Balken 3. (Nr. 370, 381, 888), Mantel 1. (Nr. 744), Oberlappen 1. (Nr. 1065). V.) Oberlappen 1. (Nr. 687). VI.) Höhlenhaut 3. (Nr. 371, 458, 1006), Zirbel 3. (Nr. 327, 388, 405), Hirnanhang 2. (Nr. 704, 940), Mantelhaut 1. (Nr. 708). VII.) Kleines Hirn 6. (Nr. 326, 712, 714, 721, 930, 1090), Brücke 3. (Nr. 732, 751, 956), Schhügel 4. (Nr. 732, 741, 751, 763), Streifenhügel 7. (Nr. 732, 744, 745, 747, 751, 752, 753), Zirbel 7. (Nr. 676, 704, 759, 769, 770, 783), Hirnanhang 8. (Nr. 759, 768, 766, 769, 770, 771, 773, 903), Gewölbe 2. (Nr. 777, 784), Scheidewand 1. (Nr. 785), Balken 5. (Nr. 784, 785, 792, 793, 794), Mantel 6. (Nr. 367, 458, 658, 799, 801, 1042), Oberlappen 3. (Nr. 712, 753, 900), Unterlappen 1. (Nr. 810), Hinterlappen 3. (Nr. 326, 714, 816), Vorderlappen 6. (Nr. 249, 308, 819, 820, 822, 900). VIII) Verlängertes Mark 2. (Nr. 840, 857), Brücke 1. (Nr. 857), Gefäßflechte 1. (Nr. 771), Schhügel 1. (Nr. 857), Streifenhügel 1. (Nr. 857), Zirbel 2. (Nr. 857, 868), Hirnanhang 4. (Nr. 861, 863, 866, 866), Balken 1. (Nr. 873), Mantel 6. (Nr. 327,

297, 854, 866, 1042, 1091), Oberlappen 1 (Nr. 983), Hinterlappen 2 (Nr. 857, 876), IX.) Haut des kleinen Hirns 1 (Nr. 433), des Mantels 1 (Nr. 446) des Hinterlappens 2 (Nr. 876, 1024), X.) Verlängertes Mark 3 (Nr. 921, 925, 948), Haut des kleinen Hirns 2 (Nr. 882, 884), kleines Hirn 15 (Nr. 397, 888, 923, 927, 930, 934, 937, 939, 940, 942, 947, 958, 952, 953, 1026), Brücke 3 (Nr. 956, 957, 958), Haut des Großhirnstammes 1 (Nr. 889), Großhirnstamm (Nr. 934), Seitenhöhlen 4 (Nr. 964, 966, 967, 968), Gefäßgeflechte 2 (Nr. 327, 940), Streifenhügel 2 (Nr. 972, 975), Zärbel 2 (Nr. 979, 981), Hirnanhang 3 (Nr. 984, 985, 886), Balken 1 (Nr. 990), Haut des Mantels 3 (Nr. 887, 888, 1002), Mantel 6 (Nr. 866, 975, 994, 995, 997, 1002), Haut des Oberlappens 7 (Nr. 896, 897, 898, 900, 902, 903, 914), Oberlappen 6 (Nr. 140, 1003, 1005, 1006, 1007, 1013), Hinterlappen 5 (Nr. 1021, 1022, 1024, 1026, 1031), Haut des Vorderlappens 3 (Nr. 914, 915, 916), Vorderlappen 9 (Nr. 888, 1035, 1086, 1037, 1042, 1044), XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 1065), Gefäßgeflechte 3 (Nr. 369, 1036, 1080), Zärbel 1 (Nr. 675), Mantel 2 (Nr. 840, 1058), Oberlappen 2 (Nr. 1073, 1075), Hinterlappen 1 (Nr. 1076), Vorderlappen 2 (Nr. 1079, 1080), XII.) Haut des kleinen Hirns 3 (Nr. 1089, 1090, 1091), Vierhügel 1 (Nr. 438), Haut des Mantels 2 (Nr. 165, 599), Haut des Oberlappens 1 (Nr. 1096), Oberlappen 1 (Nr. 517), Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 1099), Hinterlappen 1 (Nr. 1113), Vorderlappen 1 (Nr. 1106), XIII.) Vorderlappen 1 (Nr. 8), XIV.) Oberlappen 1 (Nr. 44), Vorderlappen 4 (Nr. 25, 26, 46, 53), XV.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 59), Oberlappen 4 (Nr. 62, 63, 74, 77), Unterlappen 2 (Nr. 83, 85), Vorderlappen 4 (Nr. 92, 94, 97, 98), XVI.) Oberlappen 3 (Nr. 114, 115, 121), Hinterlappen 1 (Nr. 125), Vorderlappen 2 (Nr. 127, 129), XVII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 826), Oberlappen 1 (Nr. 828), Hinterlappen 1 (Nr. 831), Vorderlappen 1 (Nr. 833), XIX.) Oberlappen 1 (Nr. 835), Hinterlappen 2 (Nr. 550, 836), Hirnbruch Oberlappen 2 (Nr. 287, 288), Hirnswamm Oberlappen 1 (Nr. 1048), Exostosen Oberlappen 3 (Nr. 1081, 1083, 1084).

§. 676. Allgemeine Starrheit und Tetanus. I.) Kleines Hirn 3 (Nr. 131, 142, 143), verlängertes Mark 1 (Nr. 143), Hinterlappen 2 (Nr. 267, 268), Vorderlappen 2 (Nr. 95, 267), II.) Seitenhöhlen 5 (Nr. 380, 839, 913, 944, 1006), III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 448), Mantel 2 (Nr. 448, 474), IV.) Kleines Hirn 1 (Nr. 654), VI.) Höhlenhaut 1 (Nr. 1006), VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 721), VIII.) Verlängertes Mark 2 (Nr. 654, 839), IX.) Höhlenhaut 1 (Nr. 448), X.) Kleines Hirn 4 (Nr. 888, 953, 943, 944), Haut des großen Hirns 1 (Nr. 888), Oberlappen 1 (Nr. 1006), XY.) Vorderlappen 1 (Nr. 95).

§. 677. Lähmung beyder Gliedmaßen einer Seite. I.) Verlängertes Mark 2 (Nr. 143, 150), kleines Hirn 5 (Nr. 137, 143, 147, 150, 875), Seitenhöhlen 25 (Nr. 150, 154, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 193, 196, 198, 200, 253, 270, 435, 456, 968), Sehhügel 9 (Nr. 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 490), Streifenhügel 10 (Nr. 194, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213), Balken 3 (Nr. 259, 261, 485), Mantel 13 (Nr. 19, 150, 186, 187, 218, 219, 224, 225, 223, 254, 261, 435, 710), Oberlappen 11 (Nr. 238, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 272), Unterlappen 2 (Nr. 263, 265), Hinterlappen 5 (Nr. 266, 269, 270, 272, 273), Vorderlappen 4 (Nr. 274, 277, 280, 282), II.) Kleines Hirn 1 (Nr. 1007), Seitenhöhlen 20 (Nr. 277, 408, 458, 507, 538, 556, 557, 806, 807, 810, 817, 901, 922, 956, 1007, 1023, 1029, 1040, 1075, 1115), Mantel 11

(Nr. 150, 207, 248, 280, 361, 387, 688, 894, 924, 961, 1063), Oberlappen 1 (Nr. 317), Hinterlappen 1 (Nr. 708), Vorderlappen 2 (Nr. 221, 322), III.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 408), kleines Hirn 2 (Nr. 416), Großhirnstamm 1 (Nr. 435), Seitenhöhlen 6 (Nr. 59, 447, 443, 454, 460, 463), Sehhügel 3 (Nr. 452, 453, 455), Streifenhügel 9 (Nr. 450, 453, 454, 455, 456, 458, 460, 462, 463), Balken 1 (Nr. 372), Mantel 9 (Nr. 59, 67, 416, 458, 462, 475, 485, 490, 492), Oberlappen 20 (Nr. 247, 493, 507, 508, 510, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 586), Unterlappen 2 (Nr. 507, 548), Hinterlappen 8 (Nr. 88, 255, 552, 556, 557, 562, 565, 583), Vorderlappen 10 (Nr. 46, 507, 569, 583, 584, 585, 586, 592, 593, 594), IV.) Sehhügel 1 (Nr. 661), Streifenhügel 1 (Nr. 682), Großhirnstamm 1 (Nr. 228, 922), IV.) Brücke 1 (Nr. 199), Oberlappen 6 (Nr. 150, 684, 685, 687, 688, 875), Unterlappen 3 (Nr. 199, 687, 875), Hinterlappen 1 (Nr. 193), VI.) Höhlenhaut 2 (Nr. 201, 438), Haut des Mantels 2 (Nr. 250, 254), VII.) Kleines Hirn 7 (Nr. 201, 272, 710, 711, 724, 728, 855), Brücke 5 (Nr. 729, 733, 735, 751, 971), Sehhügel 6 (Nr. 154, 209, 740, 743, 751, 753), Streifenhügel 16 (Nr. 154, 172, 173, 186, 188, 209, 743, 746, 747, 748, 749, 750, 754, 752, 753, 805), Gewölbe 2 (Nr. 743, 753), Balken 2 (Nr. 261, 749), Hirnanhang 2 (Nr. 892, 903), Zirkel 1 (Nr. 66), Mantel 1 (Nr. 212, 224, 261, 729, 800, 924, 1046), Oberlappen 20 (Nr. 213, 248, 249, 252, 254, 272, 539, 586, 687, 743, 750, 753, 805, 806, 807, 808, 809, 898, 901, 1003), Unterlappen 3 (Nr. 265, 805, 810), Hinterlappen 7 (Nr. 221, 269, 270, 811, 814, 817, 1110), Vorderlappen 7 (Nr. 249, 277, 282, 521, 586, 746, 749), VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 857), kleines Hirn 1 (Nr. 875), Brücke 1 (Nr. 857), Großhirnstamm 1 (Nr. 855), Sehhügel 1 (Nr. 857), Streifenhügel 1 (Nr. 857), Scheidewand 1 (Nr. 200), Mantel 1 (Nr. 854), Oberlappen 2 (Nr. 875, 968), Unterlappen 1 (Nr. 875), Hinterlappen 1 (Nr. 857), IX.) Haut des Mantels 1 (Nr. 548), X.) Verlängertes Mark 2 (Nr. 922, 924), Brücke 3 (Nr. 924, 956, 957), Haut des Hirnstamms 1 (Nr. 891), Seitenhöhlen 2 (Nr. 968), Sehhügel 2 (Nr. 970, 971), Streifenhügel 2 (Nr. 972, 973), Mantel 1 (Nr. 999), Haut des Oberlappens 5 (Nr. 898, 901, 903, 904, 906), Oberlappen 6 (Nr. 1003, 1005, 1007, 1013, 1014, 1015), Haut des Unterlappens 1 (Nr. 908), Haut des Hinterlappens 3 (Nr. 909, 1023, 1029), Hinterlappen 1 (Nr. 1031), Haut des Vorderlappens 1 (Nr. 919), Vorderlappen 1 (Nr. 1040), XI.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 1063, 1065), Gefäßgeflecht 2 (Nr. 126, 254), Mantel 1 (Nr. 1069), Oberlappen 1 (Nr. 1075), XII.) Gefäßgeflecht 1 (Nr. 224), Hinterlappen 1 (Nr. 1115), Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 1100), XIV.) Oberlappen 2 (Nr. 36, 144), Unterlappen 1 (Nr. 19), Vorderlappen 3 (Nr. 31, 46, 53), XV.) Oberlappen 9 (Nr. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 78, 79), Unterlappen 1 (Nr. 83), Hinterlappen 1 (Nr. 88), Vorderlappen 1 (Nr. 94), XVI.) Oberlappen 1 (Nr. 113), Vorderlappen 2 (Nr. 128, 129), XVII.) Lähmung der oberen Gliedmaßen. I.) Seitenhöhlen 4 (Nr. 154, 188, 197, 228), Sehhügel 1 (Nr. 197), Streifenhügel 2 (Nr. 221, 215), Mantel 1 (Nr. 228), Hinterlappen 1 (Nr. 267), Vorderlappen 2 (Nr. 267, 815), II.) Seitenhöhlen 5 (Nr. 17, 335, 840, 850, 1056), Mantel 4 (Nr. 215, 335, 346, 1056), III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 926), Mantel 3 (Nr. 481, 484, 486), Oberlappen 5 (Nr. 17, 503, 515), Hinterlappen 2 (Nr. 555, 559), Vorderlappen 1 (Nr. 598), IV.) Sehhügel 1 (Nr. 980), VII.) Brücke 1 (Nr. 732), kleines Hirn 2 (Nr. 756, 980), Vierhügel 1 (Nr. 756), Sehhügel 3 (Nr. 454, 732, 746), Streifenhügel 1 (Nr. 732).

gel 6 (Nr. 154, 183, 215, 732, 754, 756); Zirkel 1 (Nr. 756); Gewölbe 2 (Nr. 756, 980); Oberlappen 2 (Nr. 213, 215); Hinterlappen 2 (Nr. 812, 813); VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 840); Brücke 1 (Nr. 850); X.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 920a); kleines Hirn 5 (Nr. 926, 927, 928, 929, 951); Streifenhügel 1 (Nr. 976); Zirkel 1 (Nr. 980); XI.) Gefäßgeflecht 1 (Nr. 17); Oberlappen 1 (Nr. 1073); XIV.) Oberlappen 1 (Nr. 117); Vorderlappen 1 (Nr. 48); XV.) Oberlappen 1 (Nr. 77); XVI.) Oberlappen 1 (Nr. 120); Hirnbruch, Vorderlappen 1 (Nr. 296); — Hirnschwanz, Vorderlappen 1 (Nr. 1056);

§. 679. Frühere oder stärkere Lähmung in den oberen, als in den unteren Gliedmaßen. I.) Mantel 1 (Nr. 228); Oberlappen 1 (Nr. 247); Vorderlappen 1 (Nr. 277); II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 277, 1007); kleines Hirn 1 (Nr. 1007); VIII.) Streifenhügel 1 (Nr. 463); Oberlappen 3 (Nr. 507, 523, 534); Unterlappen 1 (Nr. 807); Hinterlappen 1 (Nr. 808, 883); Vorderlappen 2 (Nr. 507, 583); X.) Haut des Oberlappens 1 (Nr. 901); Oberlappen 1 (Nr. 1007); Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 909); des Vorderlappens 1 (Nr. 919); XV.) Hinterlappen 1 (Nr. 88);

§. 680. Krämpfe in den oberen Gliedmaßen. I.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 279); Oberlappen 2 (Nr. 229, 248); Hinterlappen 1 (Nr. 270); II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 906, 1036); Mantel 3 (Nr. 248, 293, 306); III.) Oberlappen 2 (Nr. 520, 529); Unterlappen 1 (Nr. 548); Hinterlappen 1 (Nr. 561); VII.) Oberlappen 1 (Nr. 248); Hinterlappen 1 (Nr. 270); Vorderlappen 1 (Nr. 819); IX.) Mantel 1 (Nr. 548); X.) Haut des Oberlappens 1 (Nr. 902); des Hinterlappens 1 (Nr. 1009); — Hirnbruch, Hinterlappen 1 (Nr. 1293);

§. 681. Lähmungsartige Schwäche und Lähmung in den unteren Gliedmaßen. I.) Kleines Hirn 2 (Nr. 134, 148); Seitenhöhlen 2 (Nr. 154, 192); Mantel 1 (Nr. 192); II.) Seitenhöhlen 11 (Nr. 367, 373, 376, 380, 383, 388, 393, 1429, 655, 934, 963); Mantel 3 (Nr. 302, 393, 655); III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 429); Seitenhöhlen 1 (Nr. 456); Oberlappen 1 (Nr. 518); IV.) Brücke 1 (Nr. 429); Vierhügel 1 (Nr. 655); Großhirnstamm 2 (Nr. 376, 388); VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 961); Sehhügel 1 (Nr. 154); Streifenhügel 2 (Nr. 134, 934); Hirnanhang 1 (Nr. 655); Gewölbe 1 (Nr. 931); Balken 1 (Nr. 931); Mantel 1 (Nr. 1042); Oberlappen 1 (Nr. 66); VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 857); Brücke 2 (Nr. 831, 857); Großhirnstamm 1 (Nr. 856); Sehhügel 1 (Nr. 857); Streifenhügel 1 (Nr. 857); Hinterlappen 1 (Nr. 857); X.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 924); Haut des kleinen Hirns 1 (Nr. 883); kleines Hirn 2 (Nr. 931, 934); Brücke 2 (Nr. 961, 963); Haut des Mantels 1 (Nr. 888); Haut des Vorderlappens 2 (Nr. 915, 920); Vorderlappen 1 (Nr. 1042); XII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 831); XV.) Hinterlappen 1 (Nr. 88); Oberlappen 1 (Nr. 66); Hirnbruch 1 (Nr. 356);

§. 682. Lähmung in den unteren Gliedmaßen früher oder stärker, als in den oberen. I.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 143); kleines Hirn 2 (Nr. 134, 143); Streifenhügel 1 (Nr. 207); II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 393, 398); III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 432); VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 725); Mantel des großen Hirns 1 (Nr. 725); X.) Kleines Hirn 1 (Nr. 398); XII.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 1065);

§. 683. Krämpfe in den unteren Gliedmaßen. I.) Unterlappen 1 (Nr. 262); III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 897); Vorderlappen 1 (Nr. 597); IX.) Haut des Oberlappens 1 (Nr. 897); XIV.) Vorderlappen 1 (Nr. 54);

§. 684. Lähmung des Kieifers. II.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 397). III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 586, a). Vorderlappen 1 (Nr. 589, a). IV.) Kleines Hirn 1 (Nr. 886). Brücke 1 (Nr. 886). Hinterlappen 1 (Nr. 886). VII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 586, a). kleines Hirn, Vierhügel, Streifenhügel, Zierbel, Gewölbe (sämtlich Nr. 756). Vorderlappen 1 (Nr. 823). X.) Haut des kleinen Hirns 1 (Nr. 886). kleines Hirn 2 (Nr. 397, 888). Haut des großen Hirns 1 (Nr. 888). §. 685. Krampf des Kiefers; Zahnkirschen, Trismus. I.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 197, 485). Schhügel 1 (Nr. 197). Balken 1 (Nr. 260). Mantel 1 (Nr. 285). Oberlappen, 3 (Nr. 32, 249, 252). Vorderlappen 1 (Nr. 285). II.) Seitenhöhlen 6 (Nr. 474, 557, 734, 817, 959, 1006). Mantel 1 (Nr. 734). III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 448). Streifenhügel 1 (Nr. 459). Mantel 4 (Nr. 448, 474, 475, 485). Oberlappen 1 (Nr. 536). Unterlappen 1 (Nr. 548). Hinterlappen 2 (Nr. 543, 557). Vorderlappen 3 (Nr. 569, 575, 584). VII.) Brücke 2 (Nr. 732, 734). Schhügel 1 (Nr. 732). Streifenhügel 3 (Nr. 732, 754, 755). Hirnanhang 1 (Nr. 903). Oberlappen 2 (Nr. 249, 252). Hinterlappen 1 (Nr. 817). Vorderlappen 2 (Nr. 249, 819). X.) Kleines Hirn 1 (Nr. 959). Brücke 1 (Nr. 959). Haut des Oberlappens 1 (Nr. 903). Oberlappen 1 (Nr. 1006). Vorderlappen 1 (Nr. 959). XIV.) Vorderlappen 1 (Nr. 48). XV.) Oberlappen 1 (Nr. 69). §. 686. Lähmung der Zunge; schwere, stammelnnde, unarticulierte Sprache, Aphonie. I.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 156). kleines Hirn 2 (Nr. 137, 150). Seitenhöhlen 8 (Nr. 150, 176, 188, 190, 197, 223, 435, 485). Schhügel 3 (Nr. 197, 199, 490). Streifenhügel 3 (Nr. 208, 209, 212). Mantel 5 (Nr. 190, 219, 223, 224, 228). Oberlappen 5 (Nr. 233, 245, 247, 248, 250). Hinterlappen 1 (Nr. 266). Vorderlappen 4 (Nr. 280, 282, 586, 813). II.) Seitenhöhlen 21 (Nr. 150, 223, 336, 371, 376, 377, 378, 395, 397, 398, 458, 538, 556, 696, 744, 840, 930, 954, 956, 995, 1075). Mantel 9 (Nr. 150, 197, 223, 236, 248, 282, 336, 356, 744). III.) Großhirnstamm 4 (Nr. 435). Seitenhöhlen 1 (Nr. 454). Streifenhügel 2 (Nr. 454, 458). Mantel 5 (Nr. 67, 458, 485, 487, 490). Oberlappen 10 (Nr. 247, 508, 510, 522, 525, 527, 536, 538, 539, 586). Hinterlappen 3 (Nr. 556, 562, 565). Vorderlappen 1 (Nr. 586). IV.) Großhirnstamm 3 (Nr. 371, 376, 395). V.) Brücke 1 (Nr. 199). Oberlappen 2 (Nr. 150, 688). Unterlappen 1 (Nr. 199). VI.) Zierbel 1 (Nr. 696). Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 708). VII.) Kleines Hirn 3 (Nr. 756, 855, 930). Brücke 5 (Nr. 729, 732, 733, 966, 971). Vierhügel 1 (Nr. 756). Schhügel 3 (Nr. 209, 732, 756). Streifenhügel 9 (Nr. 188, 209, 732, 744, 746, 748, 752, 754, 756). Zierbel 1 (Nr. 756). Gewölbe 2 (Nr. 756, 770). Mantel 7 (Nr. 212, 219, 223, 224, 458, 729, 858). Oberlappen 4 (Nr. 248, 586, 748, 808). Hinterlappen 4 (Nr. 556, 813, 1024, 1028). Vorderlappen 4 (Nr. 282, 586, 746, 823). VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 840). Großhirnstamm 1 (Nr. 855). Schhügel 1 (Nr. 858). Hinterlappen 1 (Nr. 877). X.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 920a). Haut des kleinen Hirns 1 (Nr. 882). kleines Hirn 4 (Nr. 397, 398, 930, 964). Brücke 4 (Nr. 956, 957, 968, 964). Seitenhöhlen 1 (Nr. 965). Schhügel 1 (Nr. 971). Streifenhügel 1 (Nr. 973). Mantel 2 (Nr. 995, 1002). Haut des Hinterlappens 2 (Nr. 1024, 1028). XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 1065). Oberlappen 1 (Nr. 1075). XIII.) Hinterlappen 1 (Nr. 6). XIV.) Unterlappen 1 (Nr. 19). Hinterlappen 1 (Nr. 21). Vorderlappen 1 (Nr. 31). XV.) Oberlappen 1 (Nr. 67). XVI.) Oberlappen 3 (Nr. 113, 118, 120). Hirnschwamm Oberlappen 1 (Nr. 1050).

§. 687. Epischwertes. Schlingen. I.) Kleines Hirn 1 (Nr. 145), Streifenhügel 1 (Nr. 145), Oberlappen 3 (Nr. 232, 252, 272), Hinterlappen 1 (Nr. 272). II.) Seitenhöhlen 3 (Nr. 427, 734, 840, 959, 963), Mantel 3 (Nr. 252, 356, 734). III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 427), Vierhügel 1 (Nr. 439), Mantel 2 (Nr. 438, 475), Oberlappen 1 (Nr. 525). IV.) Kleines Hirn 1, Brücke 1, Hinterlappen 1 (sämmliche Nr. 896). V.) Haut des Hinterlappens 1 (Nr. 708), des Vorderlappens 1 (Nr. 709). VI.) Kleines Hirn 1 (Nr. 756), Brücke 1 (Nr. 734), Vierhügel 1, Sehhügel 1, Streifenhügel 1, Zärbel 1, Gewölbe 1 (sämmliche Nr. 756), Oberlappen 2 (Nr. 252, 272), Hinterlappen 1 (Nr. 272), Vorderlappen 1 (Nr. 820). VII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 840), Sehhügel 1 (Nr. 858). VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 921), Haut des kleinen Hirns 1 (Nr. 889), kleines Hirn 1 (Nr. 959), Brücke 2 (Nr. 959, 963), Seitenhöhlen 1 (Nr. 965), Haut des Unterlappens 1 (Nr. 908), Vorderlappen 1 (Nr. 959). IX.) Oberlappen 1 (Nr. 45), Hinterlappen 1 (Nr. 21), Epistose Vorderlappen 1 (Nr. 1085).

§. 688. Krampf der Nackenmuskeln, Steifheit des Nackens, Beugung des Halses nach hinten. I.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 163), Mantel 1 (Nr. 222), Vorderlappen 1 (Nr. 813). II.) Kleines Hirn 1 (Nr. 433), Seitenhöhlen 1 (Nr. 586 a), Vorderlappen 2 (Nr. 571, 586 a). III.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 586 a), Brücke 1 (Nr. 734), Hinterlappen 1 (Nr. 813). IV.) Kleines Hirn 2 (Nr. 933, 959), Brücke 1 (Nr. 959), Vorderlappen 1 (Nr. 959).

§. 689. Lähmung der Halsmuskeln, Beugung des Kopfs auf eine Seite. I.) Sehhügel 1 (Nr. 199), Streifenhügel 1 (Nr. 212), Oberlappen 1 (Nr. 252), Vorderlappen 1 (Nr. 813). II.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 1115). III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 454), Streifenhügel 2 (Nr. 454, 458), Mantel 1 (Nr. 458). IV.) Brücke 1 (Nr. 199), Unterlappen 1 (Nr. 199). V.) Brücke 1 (Nr. 736), Streifenhügel 1 (Nr. 734), Mantel 2 (Nr. 212, 458), Oberlappen 1 (Nr. 252), Hinterlappen 1 (Nr. 813). VI.) Hinterlappen 1 (Nr. 1115).

§. 690. Lähmung der Gesichtsmuskeln. I.) Kleines Hirn 3 (Nr. 134, 140, 149), Seitenhöhlen 2 (Nr. 200, 228), Sehhügel 2 (Nr. 199, 209), Streifenhügel 1 (Nr. 212), Mantel 1 (Nr. 218), Oberlappen 2 (Nr. 228, 248), Vorderlappen 2 (Nr. 282, 813). II.) Seitenhöhlen 5 (Nr. 140, 149, 557, 807, 1040), Mantel 4 (Nr. 140, 149, 248, 282). III.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 441), Streifenhügel 1 (Nr. 459), Oberlappen 5 (Nr. 520, 521, 522, 539, 586), Hinterlappen 1 (Nr. 557), Vorderlappen 1 (Nr. 586). IV.) Sehhügel 2 (Nr. 218, 539), Streifenhügel 2 (Nr. 218, 539). V.) Brücke 1 (Nr. 199), Oberlappen 2 (Nr. 134, 140), Unterlappen 1 (Nr. 199). VI.) Kleines Hirn 1 (Nr. 724), Brücke 2 (Nr. 732, 736), Sehhügel 4 (Nr. 732, 743, 756, 805), Streifenhügel 5 (Nr. 732, 743, 750, 752, 805), Mantel 2 (Nr. 1040, 1041), Oberlappen 7 (Nr. 743, 750, 752, 756, 805, 807, 808), Unterlappen 1 (Nr. 805), Hinterlappen 3 (Nr. 813, 814, 1110). VII.) Mantel 1 (Nr. 1002), Haut des Oberlappens 1 (Nr. 902), Oberlappen 1 (Nr. 999), Vorderlappen 2 (Nr. 1040, 1041). VIII.) Oberlappen 2 (Nr. 1001, 1071). IX.) Vorderlappen 1 (Nr. 95). X.) Oberlappen 1 (Nr. 118) — Hirschwamm 1 (Nr. 1050).

§. 691. Krämpfe der Gesichtsmuskeln. I.) Kleines Hirn 1 (Nr. 145), Streifenhügel 1 (145), Balken 1 (Nr. 260), Vorderlappen 1 (Nr. 813). II.) Seitenhöhlen 6 (Nr. 326, 730, 807, 839, 850, 930), Mantel 3 (Nr. 340, 359, 839). III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 419), Oberlappen 1 (Nr. 515), Unterlappen 2 (Nr. 545, 546), Hinterlappen 1 (Nr. 552), Vorderlappen 2 (Nr. 573, 584). VI.)

Mantel 1 (Nr. 690). VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 326). Brücke 2 (Nr. 730. 732). Sehhügel 1 (732). Streifenhügel 2 (Nr. 732. 747). Oberlappen 1 (Nr. 807). Hinterlappen 2 (Nr. 326. 813). Vorderlappen 2 (Nr. 730. 819). VIII.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 839). Brücke 1 (Nr. 850). X.) Kleines Hirn 1 (Nr. 930). Balken 1 (Nr. 992). Mantel 1 (Nr. 1002). Haut des Oberlappens 1 (Nr. 902). XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 850). XV.) Vorderlappen 1 (Nr. 95). XVI.) Oberlappen 1 (Nr. 120).

§. 692. Lähmung des obren Augenlides. I.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 196). Sehhügel 3 (Nr. 196. 199. 740). Streifenhügel 1 (Nr. 212). Vorderlappen 1 (Nr. 35). II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 850. 956). Mantel 2 (Nr. 347. 1074). III.) Mantel 2 (Nr. 475. 486). V.) Unterlappen 1 (Nr. 199). Brücke 1 (Nr. 199). VII.) Sehhügel 1 (Nr. 805). Streifenhügel 1 (Nr. 805). Oberlappen 3 (Nr. 212. 805. 808). Unterlappen 1 (Nr. 805). VIII.) Brücke 2 (Nr. 850. 956). X.) Mantel 1 (Nr. 999). XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 850). Oberlappen 2 (Nr. 1071. 1074). XV.) Oberlappen 2 (Nr. 61. 99). XVII.) Oberlappen 1 (Nr. 35).

§. 693. Lähmung der äussern geraden Augenmuskeln. II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 557. 739). III.) Hinterlappen 1 (Nr. 557). VII.) Vierhügel 1 (Nr. 739). Sehhügel 1 (Nr. 739).

§. 694. Lähmung der innern geraden Augenmuskeln. II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 336. 1039). Mantel 1 (Nr. 336). IV.) Sehhügel 1 (Nr. 1039). X.) Vorderlappen 1 (Nr. 1039).

§. 695. Schielen überhaupt. I.) Vorderlappen 1 (Nr. 282). II.) Kleines Hirn 1 (Nr. 303). Seitenhöhlen 7 (Nr. 328. 364. 380. 427. 557. 848. 930). Mantel 1 (Nr. 340). III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 427). Seitenhöhlen 1 (Nr. 445). Mantel 1 (Nr. 475). Unterlappen 1 (Nr. 543). Hinterlappen 1 (Nr. 557). VII.) Brücke 2 (Nr. 734. 736). Streifenhügel 1 (Nr. 752). Mantel 1 (Nr. 858). Hinterlappen 1 (Nr. 814). VIII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 848). Sehhügel 1 (Nr. 858). X.) Kleines Hirn 2 (Nr. 929. 930). Streifenhügel 1 (Nr. 975). Mantel 1 (Nr. 975). XV.) Vorderlappen 1 (Nr. 95).

§. 696. Lähmung der untern geraden und schiefen Augenmuskeln. I.) Kleines Hirn 1 (Nr. 875). II.) Seitenhöhlen 3 (Nr. 807. 970. 1006). Mantel 1 (Nr. 356). V.) Mantel 1 (Nr. 875). VII.) Oberlappen 1 (Nr. 807). VIII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 875). Oberlappen 1 (Nr. 875). X.) Brücke 1 (Nr. 958). Sehhügel 2 (Nr. 970. 1006). Oberlappen 1 (Nr. 1006).

§. 697. Lähmung der obern geraden und schiefen Augenmuskeln. II.) Seitenhöhlen 3 (Nr. 369. 376. 372).

§. 698. Starrheit der Augenmuskeln. II.) Seitenhöhlen 3 (Nr. 739. 953. 959). Vorderlappen 1 (Nr. 320). III.) Verlängertes Mark 1 (Nr. 406). Kleines Hirn 1 (Nr. 406). Oberlappen 1 (Nr. 531). IV.) Sehhügel 1 (Nr. 1014). VII.) Brücke 1 (Nr. 731). Vierhügel 1 (Nr. 739). Streifenhügel 1 (Nr. 752). X.) Kleines Hirn 2 (Nr. 953. 959). Brücke 1 (Nr. 959). Balken 1 (Nr. 992). Oberlappen 1 (Nr. 1014). Vorderlappen 1 (Nr. 959). XVI.) Oberlappen 1 (Nr. 121).

§. 699. Zuckungen der Augenmuskeln. I.) Balken 1 (Nr. 260). II.) Seitenhöhlen 2 (Nr. 367. 580). Mantel 1 (Nr. 340). III.) Vorderlappen 1 (Nr. 580). X.) Haut des Oberlappens 1 (Nr. 902).

§. 700. Zusammenschiebung oder Erweiterung der Pupille ohne Blindheit. I.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 486). Sehhügel 1 (Nr. 198). Oberlappen 1 (Nr. 33). Hinterlappen 1 (Nr. 271). II.) Seitenhöhlen 6 (Nr. 326. 380. 427. 734. 850. 959). Mantel 3 (Nr. 304. 308. 734).

III.) Kleines Hirn 1 (Nr. 427), Seitenhöhlen 2 (Nr. 445, 958), Schbügel 1 (Nr. 434), Mantel 4 (Nr. 475, 476, 485, 486); Oberlappen 3 (Nr. 522, 525, 527), Unterlappen 3 (Nr. 434, 543, 544). VII.) Kleines Hirn 1 (Nr. 326); Brücke 3 (Nr. 729, 731, 734), Schbügel 1 (Nr. 743), Mantel 3 (Nr. 729, 797, 958), Unterlappen 1 (Nr. 810), Hinterlappen 2 (Nr. 326, 817), Vorderlappen 1 (Nr. 730). VIII.) Brücke 1 (Nr. 850), N.) Kleines Hirn 2 (Nr. 945, 959), Brücke 3 (Nr. 956, 958, 959), Haut des Oberlappens 1 (Nr. 903), Vorderlappen 1 (Nr. 950). XI.) Seitenhöhlen 1 (Nr. 850), XIV.) Unterlappen 1 (Nr. 19), Vorderlappen 1 (Nr. 29).

§ 701. Mühsames, keifobendes, schluchzendes, schnarchendes, röchelndes Athmen und Stiekluf. I. Verlängertes Mark und Brücke 215; kleines Hirn 149; Seitenhöhlen 160 fg. 179, 183, 186 bis 188, 216, 485, 1055; Streifenbügel 215; Mantel 34, 216, 222; Oberlappen 248, 272, 1050; Unterlappen 263; Hinterlappen 267, 272; Vorderlappen 215, 267, 813. — II. Hirnanhang 1117; Seitenhöhlen 149, 324, 326, 346, 367, 372, 429, 538, 840, 899, 1006, 1070, 1115; Mantel 215, 248, 346, 1070; Vorderlappen 324. — III. Kleines Hirn 429; Seitenhöhlen 450; Mantel 476, 485 fg.; Oberlappen 538; Hinterlappen 88, 555; Vorderlappen 584, 591. — IV. Kleines Hirn 367; Brücke 429. — VI. Haut des Vorderlappens 709. — VII. Kleines Hirn 272, 725, 1070; Brücke 736; Oberlappen 215, 809; Hinterlappen 813, 816; Vorderlappen 825. — VIII. Verlängertes Mark 838, 840. — X. Kleines Hirn und großes Hirn 1001; Oberlappen, Haut 895, 899; Substanz 1006; Vorderlappen 1043. — XI. Gefäßgeflechte 838, 1070, 1117; Mantel 840, 1070; Oberlappen 1073. — XII. Oberlappen und Vorderlappen, Haut 1095; Hinterlappen 1135. — XIV. Hinterlappen 21; Vorderlappen 34, 54, 1055.

§ 702. Erbrechen. I. Verlängertes Mark 133; kleines Hirn 130, 133; Seitenhöhlen 160 bis 162, 179, 183, 185, 190, 227 fg. 284, 803; Mantel 185, 190, 219, 222, 226 bis 228; Oberlappen 229, 233, 237 fg. 240, 249 fg. 252; Unterlappen 262; Hinterlappen 268; Vorderlappen 277 fg. 283 fg. — II. Kleines Hirn 1007; Brücke 1016; Zübel 403; Seitenhöhlen 277, 324 fg. 367, 403, 428 fg. 477 fg. 538, 706, 783, 817, 831, 848, 901, 922, 927, 946, 933, 981, 988, 998, 1006 fg. 1016, 1023, 1039, 1064, 1115; Mantel 110, 232, 310, 325, 346, 706, 924, 928, 993, 1016; Oberlappen 316; Vorderlappen 320, 323 fg. — III. Kleines Hirn 409, 412, 423, 428 fg. 433; Großhirnstamm 436; Vierbügel 412, 439; Seitenhöhlen 440, 445, 450, 542, 958; Mantel 438, 477 fg. 480 fg. 486 bis 489; Oberlappen 511, 515, 538; Unterlappen 542, 545; Hinterlappen 542, 550, 560, 565, 583; Vorderlappen 568, 570, 575, 578, 582 bis 584, 587, 590, 593, 600. — IV. Kleines Hirn 367; Brücke 429; Schbügel 922, 1039; Streifenbügel 922. — VI. Zübel 320; Mantel 690. — VII. Brücke 736; Schbügel 803; Streifenbügel 749; Zübel 66, 450; Hirnanhang 771; Gewölbe 783; Mantel 802 fg.; Hinterlappen 817; Vorderlappen 249, 749, 820. — VIII. Verlängertes Mark 838; Kleines Hirn 848, 903. — X. Verlängertes Mark 922, 924; kleines Hirn, Haut 885; Substanz 927 bis 929, 933, 945 fg. 951, 953, 1001; Brücke 958; Großhirnstamm, Haut 891; Hirnanhang 988; Zübel 981; Mantel, Haut 888, Substanz 993, 998, 1001; Oberlappen, Haut 895, 901 fg., Substanz 1006 fg. 1014, 1016; Unterlappen 1019; Hinterlappen 1023, 1032; Vorderlappen 1036, 1039. — XI. Seitenhöhlen 838, 1064 fg.; Gefäßgeflechte 993, 1039; Oberlappen 1074. — XII. Hinterlappen 1115. —

XIII. Vorderlappen 11; 13 fg. — XIV. Oberlappen 37, 43; Unterlappen 18; Hinterlappen 20; Vorderlappen 29, 47, 54. — XV. Oberlappen 64, 66, 76; Hinterlappen 88, 90; Vorderlappen 94 fg. — XVI. Oberlappen 112–116, 133; Vorderlappen 129. — XVIII. Oberlappen 830.

§ 703. Verstopfung. I. Sehhügel 201; Streifenhügel 214; Seitenhöhlen 216; Mantel 214, 216. — II. Seitenhöhlen 369, 377, 384, 390, 398, 544, 557, 706, 744, 848, 927, 930, 1006, 1036; Mantel 201, 310, 706, 744, 924, 1074. — III. Mantel 487; Oberlappen 515; Unterlappen 544; Hinterlappen 557. — VII. Kleines Hirn 201; Brücke 971; Vierhügel und Sehhügel 756; Streifenhügel 744, 756; Mantel 809. — VIII. Kleines Hirn 848; Hirnanhang 384. — X. Verlängertes Mark 924; kleines Hirn 398, 927, 929 fg. 951; Seitenhöhlen 966; Sehhügel 971; Oberlappen 1006; Vorderlappen 1036. — XI. Seitenhöhlen 1065; Oberlappen 1074.

§ 704. Diarrhoe. I. Seitenhöhlen und Mantel 192; Oberlappen 249. — II. Seitenhöhlen 998. — III. Mantel 476; Vorderlappen 568. — VII. Vorderlappen 249. — X. Kleines Hirn 1001; Mantel 998, 1001; Vorderlappen 1036. — XI. Oberlappen 1074.

§ 705. Unwillkürliche Darmausleerung. I. Kleines Hirn 875; Sehhügel 490; Mantel 223; Oberlappen 232; Vorderlappen 277, 285. — II. Seitenhöhlen 223, 277, 285, 367, 384, 388, 392, 538; Mantel 655, 993. — III. Kleines Hirn 67; Oberlappen 538. — IV. Vierhügel 655. — VII. Kleines Hirn 725; Zirbel 993; Hirnanhang 655. — VIII. Kleines Hirn 993; Mantel 875. — X. Mantel 993; Oberlappen 1014; Hinterlappen, Haut 910; Vorderlappen, Haut 920. — XI. Gefäßgeflechte 277, 285, 993. — XIII. Hinterlappen 5, 7. — XV. Oberlappen 67; Vorderlappen 106.

§ 706. Gastrische Zufälle. I. Hinterlappen 974. — II. Seitenhöhlen 343, 974, 1016; Oberlappen 974. — III. Kleines Hirn 413; Seitenhöhlen 448. — VII. Streifenhügel 747; Hirnanhang 771. — X. Streifenhügel 974; Oberlappen 1016; Hinterlappen 1027. — XIV. Hinterlappen 20, 21. — XVIII. Hinterlappen 851.

§ 707. Abmagerung. II. Seitenhöhlen 363, 365, 367, 370 fg. 374, 377, 380 fg. 392, 395 fg. 427, 514, 668, 696, 817, 927, 938, 942, 946, 949, 980; Mantel 339 bis 341, 345, 347, 358, 361, 824, 993. — III. Verlängertes Mark 408, 962; kleines Hirn 427, 962; Streifenhügel und Sehhügel 453; Oberlappen 474, 512, 514, 517. — IV. Hirnanhang 668. — VI. Zirbel 696 fg.; Mantel 693. — VII. Verlängertes Mark 853; Zirbel 767, 993; Hirnanhang 767, 771; Hinterlappen 817; Vorderlappen 824. — VIII. Verlängertes Mark 852; Brücke 851 fg.; Mantel 854. — X. Kleines Hirn 927, 938, 941 fg. 946, 949 bis 951, 993; Brücke 962; Zirbel 980; Mantel 993, 997; Oberlappen, Haut 893, Substanz 949, 1008. — XII. Kleines Hirn 851; Vorderlappen 1106. — XIV. Hinterlappen 21; Oberlappen 68. — XIX. Oberlappen 835.

§ 708. Abnorme Erscheinungen im Harnsysteme. I. Kleines Hirn 149; Sehhügel 490; Oberlappen 233; Hinterlappen 273; Vorderlappen 285. — II. Seitenhöhlen 285, 363, 380, 390, 429, 1016, 1039; Mantel 149, 924, 1063. — III. Verlängertes Mark 406; kleines Hirn 406, 429; Großhirnstamm 436; Mantel 490. — IV. Brücke 429; Sehhügel 1039. — VII. Kleines Hirn 725, 756; Brücke 971; Streifenhügel und Sehhügel 756;

Zirbel 1016; Oberlappen 809. — X. Verlängertes Mark 924; kleines Hirn 929; Schlä-
gel 971; Balken 993; Oberlappen 1016; Vorderlappen, Haut 915. — XI. Seitenhö-
len 1063. 1065; Gefäßgeflechte 1039. — XII. Seitenhöhlen 1113. — XIII. Vorderlap-
pen 14. — XIV. Vorderlappen 49. 51. — XV. Vorderlappen 95.

§. 709. Abnormitäten in den Geschlechtsfunctionen. I. Kleines Hirn 142 bis 147;
Streifenhügel 145. — II. Kleines Hirn 303; Seitenhöhlen 346. 388 fg. 394 fg. 398. 429.
759; Mantel 342. 346. — III. Kleines Hirn 429. — IV. Verlängertes Mark und kleines
Hirn 654; Brücke 429; Hinterlappen 886. — VII. Zichel und Hirnanhang 759. — X.
Kleines Hirn, Haut 886.

I. Tabelle.
Gesamtzahl der Abnormitäten.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XIX.	Summe
Verlängertes Mark	7	2	5				1	7		8	2									32
Kleines Hirn a) Hant						1			3	6		5								15
b) Oberfläche	9		10							8										27
c) Substanz	15		23							33										71
d) überhaupt		7		4	1		38	8				2		1	1	1		2		65
Brücke	2			1	1		12	5		9										30
Großhirnstamm.																				
a) Hant										3										3
b) Substanz			3	10	1		2	5		2							1			24
Selbenthäuten a) selbst	65	163	27							3		5	4		4					275
b) Hant						9	5			1										18
c) Gefäßgeflecht						2	1			5	20	1								29
Bindehime	1			1			2													4
Vierhügel	1		3	3			3					1								11
Schühügel	12		7	8	2		15	3		4	1	1								53
Streifenhügel	18		13	3			36	2		5	1									77
Zirbel	1	7	1	8		12	16	6		6	3				1					60
Hirnanhang		4	3	14		3	13	7		6	4	1								55
Scheidewand						1	6	2												9
Gewölbe							18													19
Balken	3		5	6			15	3		4	1						1			38
Mantel a) Hant						17			16	15		14								62
b) Oberfläche	34		14							4										52
c) Substanz	8		16							11										35
d) überhaupt		86		17	6		30	28		5	5	3		1	1		1			175
Oberlappen. a) Hant									5	16										24
b) Oberfläche	15		19							5					10					49
c) Substanz	22		40							10					24					96
d) überhaupt		4		1	10		37	6		5	4			16		22	3	6	6	120
Unterlappen. a) Hant									3	2										5
b) Oberfläche	4		14		3		6	1		2				3	4			1	1	39
Hinterlappen. a) Hant						1			4	5		2								12
b) Oberfläche	5		5																	10
c) Substanz	7		18																	25
d) überhaupt		1		2	2		22	4		14	1	1	4	2	5	3		2	3	66
Vorderlappen. a) Hant						1			8	10		6								25
b) Oberfläche	17		15							1										33
c) Substanz	6		25							13										44
d) überhaupt		4	9				24	1		4	1	7	30	23	11		2	4	4	124
Summe	252	278	275	78	26	45	303	89	42	216	51	46	11	53	73	37	8	15	14	1911

II. T a b e l l e.

	Dynamisch veranlasste Abnormitäten. (Von innern Ursachen.)						Mechanisch veranlasste Abnormitäten. (Von Kopfverletzungen.)						Gesamt- zahl.
	I.	II.	III.	VII.	IV-VI. VIII-XII.	Summe	I.	II.	III.	VII.	XIII-XIX.	Summe	
Verlängertes Mark	6	2	3	1	17	29	1		2			3	32
Kleines Hirn a) Oberfläche	6		6		8	20	3		4			7	27
b) Substanz	15		22		33	70			1			1	71
c) insgesamt	21	7	28	36	71	163	3		5	2	5	15	178
Brücke	2			12	16	30							30
Großhirnstamm			1	2	24	24			2		1	3	27
Seitenhöhlen	48	155	16	5	29	253	17	8	11		4	40	293
Gefäßgeflechte				2	27	29							29
Bindehäute	1			2	1	4							4
Vierhügel	1			3	4	8			3			3	11
Schlügel	12		6	15	19	52			1			1	53
Streifenhügel	18		8	36	10	72			5			5	77
Zirbel	1	7	1	16	35	60					1		60
Hirnanhang		4	3	13	35	55							55
Scheidewand				6	3	9							9
Gewölbe				18	1	19							19
Balken				15	14	29	3		5		1	9	38
Mantel a) Oberfläche	17		6		4	27	17		8			25	52
b) Substanz	8		10		11	29			6			6	35
c) insgesamt	25	77	16	22	133	273	17	9	14	8	3	51	324
Oberlappen a) Oberfläche					5	5	15		19		10	44	49
b) Substanz	15		18		10	43	7		22		24	53	96
c) insgesamt	15		18	31	65	129	22	4	41	6	87	160	289
Unterlappen	1		8	6	11	26	3		6		9	18	44
Hinterlappen a) Oberfläche	2		1			3	3		4			7	10
b) Substanz	6		10			16	1		8			9	25
c) insgesamt	8		11	19	36	74	4	1	12	3	19	39	113
Vorderlappen a) Oberfläche	6				1	7	11		15			26	33
b) Substanz	4				13	17	2		25			27	44
c) insgesamt	10		9	13	45	77	13	4	40	11	81	149	226
Summe	169	232	128	273	593	1415	83	26	147	30	211	497	1912

III. Tabelle.

Schmerz bey mechanisch und dynamisch veranlasseten Abnormitäten.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XIX.	Summe	= 1
Verlängertes Mark	2	1	3				1			4	1									12	2,66
Kleines Hirn a) Haut									f	3		2								6	2,50
b) Oberfläche	2		5							6										13	2,07
c) Substanz			11							19										30	2,36
d) überhaupt		1		3																4	16,25
Brücke				1			3			5										9	3,33
Großhirnstamm.																					
a) Haut										2										2	1,50
b) Substanz				2			2			2							1			7	3,42
Seitenhöhlen a) selbst	11	67	17							5	2				1					96	2,86
b) Höhlenhaut						2	2		2	3	6									9	3,22
c) Gefäßgeflecht																				1	4.
Eindelfurche				1																6	1,83
Vierhügel				2	2		1					1								16	3,31
Schühügel	3			1	3	1		3	1		3	1								18	4,27
Seitenhügel	3			4	2			6			2	1								16	3,75
Zirbel		3		1			2	4			5	1								7	7,85
Hirnanhang				3			1	1			2									3	3.
Scheidewand								3												12	1,58
Gewölbe								11			1									10	3,80
Balken					1			6			2						1			24	2,58
Mantel a) Haut							5			5	9		5							17	3,03
b) Oberfläche	6			8						3										21	1,66
c) Substanz	3			9						9										47	3,72
d) überhaupt		30			1		11	3			2		3							41	2,18
Oberlappen. a) Haut										1	7									13	3,76
b) Oberfläche	1			8						3					1					17	5,65
c) Substanz	6			4						4					3					52	2,30
d) überhaupt				13		1		13	2		2	4	1		5			6	5	2	2,50
Unterlappen. a) Haut										2										16	2,43
b) Oberfläche				10				3			1							1	1	7	1,71
Hinterlappen. a) Haut							1			2	4									2	5.
b) Oberfläche	1			1																15	1,66
c) Substanz	1			14							8									21	3,14
d) überhaupt					1			6			6		1		1			2	2	15	1,66
Vorderlappen. a) Haut										4	6		5							12	2,75
b) Oberfläche	4			8																17	2,58
c) Substanz	2			15																34	3,64
d) überhaupt		1						10	1		6	2	1	1	6	3			1	2	3,05
Summe	45	103	132	15	2	11	86	7	17	124	18	22	2	11	9	2	10	10	626		
= 1:	5,68	2,92	2,08	3,20	18	3,09	5,32	12,71	2,75	1,77	2,82	2,09	2,60	3,63	6,11	4	1,30	1,10			

IV. T a b e l l e.

S c h m e r z

	bey dynamisch veranlasseten Abnormitäten.							bey mechanisch veranlasseten Abnormitäten.							Insgesamt	
	I.	II.	III.	IV.	V.	Summe	pro 100	I.	II.	III.	IV.	V.	Summe	pro 100	Summe	pro 100
Verlängertes Mark	2	1	2	1	5	11	2,63			1				13	12	2,66
Kleines Hirn																
a) Oberfläche	2		4		6	12	1,66			1				17	13	2,07
b) Substanz			10		19	29	2,41			1				11	30	2,36
c) insgesamt	2	1	14		34	51	3,19			2				27,50	53	3,35
Brücke				3	6	9	3,33								9	3,33
Großhirnstamm			1	2	4	7	3,42			1				27,50	9	3
Seitenhöhlen	9	62	7	2	11	91	2,78	2	5	3		1	11	3,63	102	2,87
Gefäßgeflechte					9	9	3,22								9	3,22
Bindearme					1	1	1,4								1	1,4
Vierhügel				1	3	4	2			2				21,50	6	1,83
Schühügel	3		1	3	9	16	3,25								16	3,31
Streifenhügel	3		3	6	5	17	4,23			1				15	18	4,27
Zirbel		3	1	4	8	16	3,75								16	3,75
Hirnanhang			3	1	3	7	7,85								7	7,85
Scheidewand				3	1	3	3								3	3
Gewölbe				11	1	12	1,58								12	1,58
Balken				6	3	9	3,22					1		19	10	3,80
Mantel					3	10	2,70	1		6				73,57	17	3,05
a) Oberfläche	5		2		3	10	2,70							23	21	1,66
b) Substanz	3		7		9	19	1,52			2						
c) insgesamt	8	27	9	9	42	95	2,87	1	3	8	2			143,64	109	2,97
Oberlappen																
a) Oberfläche					3	3	1,66	1		8		1	10	4,40	13	3,76
b) Substanz	4				4	8	5,37	2		4		3	9	5,88	17	5,65
c) insgesamt	4		13	13	27	57	2,26	3		12		21	36	4,44	93	3,10
Unterlappen										3		2		53,60	18	2,44
Hinterlappen																
a) Oberfläche	1		1			2	1,50								2	5
b) Substanz			9			9	1,77	1		5				61,50	15	1,66
c) insgesamt	1		10	5	17	33	2,24	1		5	1	5	12	3,25	45	2,51
Vorderlappen																
a) Oberfläche	2					2	3,50	2		8			10	2,60	12	2,75
b) Substanz	2		7			9	1,88			8			8	3,37	17	2,58
c) insgesamt	4		7	5	25	41	1,08	2	1	16	5	13	37	4,02	78	2,87
Summe	36	94	78	78	261	502	2,81	16	9	97	8	48	178	4,00	626	3,05
= 1:	4,69	2,67	4,64	8,50	2,74			9,22	2,88	3,72	5,75	4,79				

V. T a b e l l e.

Schwindel bey dynamisch und mechanisch veranlasseten Abnormitäten.

	L	IL	HL	IV.	VII.	IX.	X.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	Summe	= 1.
Kleines Hirn a) Oberfläche			1										1	27
b) Substanz	2		3										5	14,20
Seitenhöhlen	6	6	1				1						14	19,64
Vierhögel			1										1	11
Schhögel	1												1	53
Streifenhögel					1								1	77
Zirbel					1								1	60
Gewölbe					2								2	9,50
Mantel a) Oberfläche	3												3	17,33
b) Substanz			1										1	35
c) überhaupt		8		1									9	19,44
Oberlappen a) Haut						1							1	24
b) Oberfläche			2										2	24,50
c) Substanz	1								2				3	32
d) überhaupt										3			3	40
Hinterlappen b) Substanz			1									1	1	25
c) überhaupt													1	66
Vorderlappen a) Haut						1							1	25
b) Substanz	1								1				1	44
c) überhaupt		1											2	62
Summe	14	15	10	1	4	2	1	1	2	3	1	54	35,38	
= 1:	18	18,53	27,50	78	75,75	21	21,6	53	36,50	12,33	14			

VI. T a b e l l e. Schwindel

bey dynamisch veranlasseten Abnormitäten. bey mechanisch veranlasseten Abnormitäten.

	L	IL	HL	IV	VII	IX	X	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Summe	Pro- portion	Insgesamt Summe	Pro- portion
Kleines Hirn a) Oberfläche			1										1	20	1	27
b) Substanz	2		2										4	17,50	5	14,20
c) insgesamt	2		3										5	32,60	6	29,66
Seitenhöhlen	4	6	1		1								12	21,08	2	19,64
Vierhögel													1	52		11
Schhögel	1												1	72		53
Streifenhögel			1										1	9,50		77
Gewölbe			2										2	60		9,50
Zirbel			1										1	60		60
Mantel a) Oberfläche	1												1	27	2	17,33
b) Substanz			1										1	29		35
c) insgesamt	1	6	1		1								9	30	2	24,92
Oberlappen a) Oberfläche															4	12,75
b) Substanz	1								2				2	22	2	24,50
c) insgesamt	1									2			2	26,50	3	32
Hinterlappen b) Substanz			1										1	5	7	32,11
c) insgesamt													1	39	1	25
Vorderlappen b) Substanz	1												1	17	2	56,50
c) insgesamt	1				1								2	38,50	1	44
Summe	15	12	10	4	4	35	40,42	6	3	7	8	25	26,10	54	35,38	
= 1:	18,77	21	21,53	68,25	148			15,83	15,66	36,75	55,16					

VII. Tabelle.

Delirium bey dynamisch und mechanisch veranlassten Abnormitäten.

	L	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Summe	= 1
Verlängertes Mark	1	1	1				1												4	8
Kleines Hirn. a) Hirnte									1			2							3	5
b) Oberfläche			2							2									4	6,75
c) Substanz			2							5									7	10,14
d) überhaupt	2	1					5	1						1			1		11	5,90
Brücke							2			2									4	7,50
Großhirnstamm			2				1												3	9
Seitenhöhlen	1	27	9				1			2	1				1				42	6,54
Höhlenhaut						1			1										2	9
Gefäßgeflecht										2	3								5	5,80
Vierhügel				2	1								1						4	2,75
Schühügel	1		1	1				1											4	13,25
Streifenhügel	2		2				3			1									8	9,62
Zarbel		1				3				1									5	12
Scheidewand						1	2												3	3
Gewölbe						7				1									8	2,37
Balken						6				2									11	3,45
Mantel, a) Haut	2		1						3	2									8	7,75
b) Oberfläche	3		2			3				1									6	8,66
c) Substanz	2		4							2									8	4,37
d) überhaupt	13		1				10	5											31	5,64
Oberlappen, Haut									1										1	24
Oberfläche	1		5																6	8,16
Substanz	4		9												6				19	15,05
überhaupt		1					5	1				1		2		3		2	15	8
Unterlappen, Haut									1										1	5
überhaupt			5		1		1								2				9	4,33
Hinterlappen, Haut									1										1	12
Oberfläche	1		2												1				4	2,60
Substanz	1		7												1				9	2,77
überhaupt							2			2			1						5	13,20
Vorderlappen, Haut									1										1	25
Oberfläche	3		8																11	3
Substanz			7																7	6,28
überhaupt		2					5			2	1			1	1		2		14	8,85
Summe	24	48	71	3	1	8	51	8	8	28	5	4	1	4	12	3	2	3	284	6,73

= 1:

25,50 5,75 5,87 20 20 5,62 5,94 11,12 5,25 7,71 10,20 11,50 11 13,25 5,00 12,30 4 5

VIII. T a b e l l e.

D e l i r i u m

	bey dynamisch veranlaßten Abnormitäten.						bey mechanisch veranlaßten Abnormitäten.						Insgesamt.	
	I.	II.	III.	VI.	IV-VI. VIII-XII.	Sum- me	I.	II.	III.	VI.	XIII- XIX.	Sum- me	Sum- me	= 1:
Verlängertes Mark		1	1	1		3 9,66	1					1 3	4	
Kleines Hirn. Ober- fläche				1	2	3 6,66			1			1 7	4	
Substanz			2		5	7 10							7	
insgesammt	1	3	3	11	18 9,61		2	1	2	2	7 2,14	25	7,12	
Brücke				2	2	4 7,50							4	
Großhirnstamm			1	1	2	2 12			1			1 3	3	9
Seitenhöhlen	1 27	6	1		5	40 6,32			3		1	4 10	44	6,65
Gefäßgeflecht					5	5 5,80							5	
Vierhügel					2	2 4			2			2 1,50	4	
Sehhügel	1		1		2	4 13							4	
Streifenhügel	2		2	3	1	8 9							8	
Zirbel		1			4	5 12							5	
Scheidewand				2	1	3 3							3	
Gewölbe				7	1	8 2,37							8	
Balken				6	2	8 3,62	2		1			3		
Mantel, Oberfläche	2		1		1	4 6,75	1		1			2 12,50	6	
Substanz	2		3		2	7 4,14						1 6	8	6,11
insgesammt	4 12	4	7	17	44 5,20		1 3	2	3			9 5,66	53	
Oberlappen, Ober- fläche							1		5			6 7,33	6	
Substanz	3		4			7 6,14	1		5		6	12 4,41	19	
insgesammt	3		4 4	3	14 9,21		2 1 10	1	13		27 5,92	41	7,04	
Unterlappen			4 1	2	7 3,71				1		2 3	6 10	4,40	
Hinterlappen, Ober- fläche	1					1 3			2		1 3	2,33	4	
Substanz	1		5			6 2,66			2		1 3	3 9		
insgesammt	2		5 2	3	12 6,16				4		3 7	5,57	19	5,94
Vorderlappen, Ober- fläche							3		8			11 2,36	11	
Substanz			4 2			4 4,25			3			3 9	7	
insgesammt		1 4				11 7	3 1 11	3 4			22 6,77	33	6,84	
Summe	13 43	35	42	65	198 7,14		11 5	35 9	25	86	5,77	284		
	13 4,40	3,65	6,56	9,12			7,54	5,26	6,68	5,53	8,44			

IX. Tabelle.

Verrücktheit und Manie.

	L	II.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Summe- 100	aus 1:
Verlängertes Mark							2		1			3	10,66
Kleines Hirn, Substanz									2			2	35,50
insgesamt.						4	1		2			7	25,42
Brücke						1						1	30
Großhirnstamm							1					1	27
Seitenhöhlen	1	10									1	12	22,91
Höhlenhaut					2			1				3	6
Gefäßgeflecht									1	4		5	5,80
Bindearme						1						1	4
Vierhögel			1			1						2	5,50
Schühgel			1	1		1	1				1	5	10,60
Streifenhögel							2					2	38,50
Zirbel						4	2					6	10
Hirnanhang						3	2					5	11
Scheidewand							1					1	9
Gehirnlbe						1						1	19
Balken						2						2	19
Mäntel, Haut					4			1	2		4	11	5,63
Oberfläche	1											1	52
insgesamt	1	6			4	1	4	1	2	1	4	24	13,50
Oberlappen, Haut								1				1	24
Substanz									1			1	96
insgesamt				2				1	1			4	72,25
Unterlappen, Haut								1				1	44
Hinterlappen, Oberfläche	1											1	10
insgesamt	1			1		1			2	1		6	18,83
Vorderlappen, Oberfläche									1			1	33
Substanz									2			2	22
insgesamt						3			3			6	37,66
Summe	5	16	2	4	10	23	16	6	20	6	10	118	19,50
= 1:	84	17,37	39	6,50	7,50	13,17	5,56	10,50	18	8,50	7,66		

X. Tabelle.

Betäubung bey dynamisch und mechanisch veranlasseten Abnormitäten.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XIX.	Summe	= 1:
Verlängertes Mark	1	1	2							2	1									7	4,57
Kleines Hirn. Hinte						1			3	3		2								9	1,66
Oberfläche	1		2							4										7	3,83
Substanz	1		6							7										14	5,07
überhaupt		2					11								1		2			16	4,06
Brücke					1		6		1	3										11	2,72
Großhirnstamm.																					
Haut										1										1	3
Substanz			1							2										3	8
Seitenhöhlen	21	44	14				3			2	3									87	3,16
Höhlenhaut						2			1											3	6
Gefäßgeflecht										1	7									8	3,62
Vierhügel				4			1													2	5,60
Schhügel	2		2	2	2		6			2										16	3,31
Streifenhügel	4		1				16			2										23	3,34
Zürbel						3	6			3										11	5,46
Hirnanhang				1	2					1										4	13,76
Scheidewand							4													4	2,25
Gewölbe							9			1										10	1,90
Balken	1		5				6			3										15	2,53
Mantel, Haut						3			4	2		2								11	5,63
Oberfläche	15		5							3										23	2,26
Substanz	4		11							4										19	1,84
überhaupt		21		4	1		18	3		2							1			50	3,50
Oberlappen. Haut									1	2										3	8
Oberfläche	11		11							1					7					30	1,63
Substanz	7		22							7				1	12					48	2
überhaupt		1			3		17	3		3	2		1		6	2	3	2		43	2,79
Unterlappen. Haut									1											1	5
überhaupt	3		8		3		3			1					1					19	2,05
Hinterlappen. Haut						1			1	2										4	3
Oberfläche	2		1																	3	3,33
Substanz	4		11																	15	1,66
überhaupt		1					9			5		1				1				17	3,88
Vorderlappen. Haut									3											3	8,33
Oberfläche	7		5							1										13	2,53
Substanz	4		16							7										27	1,62
überhaupt		2					10					1	1	5	7	3	1	2	3	35	3,54
Summe	88	72	124	9	10	10	124	6	15	72	16	7	2	6	28	10	4	7	5	615	3,10
= 1:	2,82	3,88	2,21	5,66	1,60	1,50	1,44	1,83	1,80	5	8,12	6,57	5,50	8,83	2,60	3,70	2	2,14	2,80		

Tabelle XL.

B e z e u g

	bey dynamisch veranlasseten Abnormitäten.							bey mechanisch veranlasseten Abnormitäten.							Insgesamt	
	I.	II.	III.	VII.	IV—VI. VIII—XII.	Summe	= 11	I.	II.	III.	VII.	XIII—XIX.	Summe	= 11	Summe	= 11
Verlängertes Mark	1	1	2		3	7	4,14								7	
Kl. Hirn. Oberfläche	1		1		4	6	3,33				1	3	1	7	7	
Substanz	1		6		7	14	5								14	
Insgesamt	2	2	7	11	20	42	3,88				1	3	4	3,75	46	3,86
Brücke				6	5	11	2,72								11	
Großhirnstamm			1		3	4	6								4	
Seitenhöhlen	12	41	8	3	8	72	3,51	9	3	6			18	2,22	90	3,25
Gefäßgeflechte					8	8	3,62								8	
Vierhügel				1	1	2	4								2	
Schühügel	2		2	6	6	16	3,25								16	
Streifenhügel	4			16	2	22	3,27				1		1	5	23	
Zirbel				5	6	11	5,45								11	
Hirnanhang			1		3	4	13,75								4	
Schädelwand				4	4	4	2,25								4	
Gewölbe				9	1	10	1,90								10	
Balken				6	3	9	3,22	1		5			6	1,50	15	
Mantel. Oberfläche	5		2		3	10	2,70	10		3			13	1,92	23	
Substanz	4		3		4	11	2,63			8			8		19	
Insgesamt	9	18	5	13	28	73	3,73	10	3	11	5	1	30	1,70	103	3,14
Oberlappen. Oberfl.					1	1	5	11		11		7	29	1,51	30	
Substanz	3		9		7	19	2,25	4		13		12	29	1,82	48	
Insgesamt	3		9	13	22	47	2,74	15	1	24	4	33	77	2,07	124	2,33
Unterlappen			5	3	5	13	2	3		3		1	7	2,57	20	2,26
Hinterlappen Oberfl.								2		1			3	2,33	3	
Substanz	3		5		8	2		1		6			7	1,28	15	
Insgesamt	3		5	7	9	24	3,08	3	1	7	2	2	15	2,60	39	2,89
Vorderlappen Oberfl.	1				1	2	3,50	6		5			11	2,36	13	
Substanz	2		5		7	14	1,21	2		11			13	2,07	27	
Insgesamt	3		5	4	12	24	3,20	8	2	16	6	22	54	2,75	78	2,89
Summe	59	62	81	107	179	488	3,51	85	10	133	17	84	326	2,34	615	
= 11	1,33	1,01	1,25	1,55	1,95			1,69	1,65	1,78	1,75	3,10				

XII. Tabelle.

A p o p l e x i e.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	aus 11
Verlängertes Mark	5		1					1				1				8	4.
Kleines Hirn. Häute													1			1	15.
Oberfläche	5		2													7	3,85
Substanz	13		1							2						16	4,43
insgesammt	18	2	3				8			2		1				34	5,23
Brücke	1				1		6									8	3,75
Großhirnstamm			1		1		1			1				1		5	5,40
Seitenhöhlen	37	24								2						63	4,36
Höhlenhaut						2	1			1						4	4,50
Gefäßgeflecht							2			1	7	1				11	2,63
Bindearme	1						1									2	2.
Vierhügel	1															1	11.
Schlägel	11		3	2	1		10	1			1					29	1,82
Streifenhügel	15		5				18			1	1					40	1,92
Zirbel		1														1	60.
Hirnanhang				2			1	1								4	13,75
Scheidewand						1	1	1								3	3.
Gewölbe							4									4	4,75
Balken							2									6	6,33
Mantel. Haut				1						1	1		1			7	8,85
Oberfläche	12					4			1	1						13	4.
Substanz	4		1							2						7	5.
insgesammt	16	31	1	2	4	4	5	5	1	4						73	4,43
Oberlappen. Haut									1				1			2	12.
Substanz	13		5							1						19	1,84
insgesammt	13		5		7		14	3	1	1	1				1	46	6,28
Unterlappen. insgesammt	1				1			3	1							6	7,33
Hinterlappen. Oberfläche	1															1	10.
Substanz	7		1													8	3,12
insgesammt	8		1		1		8			1					1	20	5,65
Vorderlappen. Haut									2				1			4	6,25
Oberfläche	2									1						9	11.
Substanz	4		3							2						3	4,88
insgesammt	6		3				6			4			1		1	23	9,82
Summe	195	58	36	7	16	11	91	13	8	30	12	7	1	3	506	4,88	
aus 11	1,88	4,79	4,95	1,16	1,65	5,42	5,32	6,81	10,50	11,55	1,20	0,20	8	1,26			

XIII. Tabelle.

Geistesschwäche und Blödsinn.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XIX.	Summe = 1 :
Verlängertes Mark	1							2		1									4 8.
Kleines Hirn, Häute										1		1							2 7,50
Oberfläche			1																1 27.
Substanz			1							2									3 23,66
insgesamt			2	1			7	6		3		2							21 8,47
Brücke							1	3											4 7,50
Großhirnstamm			1	4				3									1		9 3.
Seitenhöhlen	1	20	2									3							26 10,57
Höhlenhaut							3												3 6.
Gefäßflecht								1			1								2 14,50
Endarme								1											1 4.
Vierhügel								1											1 11.
Schädel								1	1	1									4 13,25
Streifenhügel	1		2	1															4 19,25
Zirbel				2			3		3										8 7,50
Hirnanhang		1						3	2			1							7 7,85
Balken	1			3				4	2		1								11 3,45
Mantel, Häute							5			2	4		1						12 5,16
Oberfläche	3																		3 17,33
Substanz			1							1									2 17,50
insgesamt	3	9	1	3	2	5	4	10	2	5	1	1							46 7,04
Oberlappen, Häute																			2 12.
Oberfläche										1									1 49.
Substanz										2									2 48.
insgesamt				1	1		1	1		5	1			1		1			12 24,08
Unterlappen, insges.								1											1 44.
Hinterlappen, Häute									1	1		1							3 4.
Substanz	2		2																4 6,25
insgesamt	2		2	1			7	1	1	4		1	1			1			21 5,38
Vorderlappen, Häute										1		1							2 12,60
Substanz			1							1									2 22.
insgesamt			1				1			2		1	1	2	2			1	11 20,54
Summe	10	30	11	16	3	11	31	36	6	22	3	13	2	3	2	2	1	1	196 9,75
= 1 :	25,25	9,25	25	1,88	5,66	4,99	9,77	2,47	14	5,81	17	5,11	1,50	17,46	5,00	5,00	8	19	

Tabelle XIV. Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 1:
Kleines Hirn. Hinte										1						1	15
Oberfläche			1													1	27
Substanz										3						3	23,66
insgesamt			1			3				4						8	22,25
Brücke						1										1	30
Seitenhöhlen	1	8									1					10	27,50
Vierhügel			3									1				4	2,75
Sehhügel	2			1			1									4	13,25
Streifenhügel	1						1									2	38,50
Gewölbe							1									1	19
Balken	1			1												2	19
Mantel. Haut						1			1							2	31
Oberfläche				1												1	52
Substanz	1		2													3	11,66
insgesamt	1	7	3			1		2	1							15	21,60
Obclappen. Oberfläche			1													1	49
Substanz	1		1													2	48
insgesamt	1		2	1	1											5	57,80
Hinterlappen							1								1	2	56,50
Vorderlappen. Substanz				1												1	44
insgesamt				1									3	3		7	32,28
Summe	9	15	17	3	1	2	8	2	2	8	1	1	3	3	1	61	31,34
	30	8,55	27,50	20	20	35	57,87	50,50	42	51	51	46	3,66	17,66	27		

Tabelle XV. Schwäche oder Verlust des Gedächtnisses.

	bey dynamisch veranlassenen Anormitäten.							bey mechanisch veranlassenen Anormitäten.						
	I.	III.	VII.	III. IV. VI. VII. XII.	Summe	me	me	I.	III.	VII.	XII. XIX.	Summe	me	me
Kleines Hirn und Brücke		1	4		9	21,44								
Seitenhöhlen	1				9	10	25,30							
Vierhügel		2			1	3	2,66	1				1	3	
Sehhügel und Streifenhügel	3			2	1	6	20,66							
Gewölbe				1		1	19							
Balken					1	1	29							
Mantel. Oberfläche								1					1	9
Substanz	1					1	29		1				1	25
insgesamt	1			1	10	12	22,75		2				2	3
Obclappen		1			2	3	43		3				3	17
Hinterlappen									1				1	160
Vorderlappen			1			1	77			1	1	2	2	19,50
Summe	6	3	8	28	47	30,76		1	8	1	7	17	35,50	
	33,30	15,50	54,22	21,17				25	29,40	30	30,10			

XVI. Tabelle.

Affection des Gefühls.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	XIX.	Summe == 1
Verlängertes Mark	1									1										2 16.
Kleines Hirn. Hinte									1	1		1								3 5.
Kleines Hirn	2	1								2										5 32,60
Brücke			1							1										2 15.
Großhirnstamm								1		1										2 13,50
Seitenhöhlen		17								1	1	1								20 13,75
Gefäßgeflecht										1										1 29.
Vierhügel			3				1													4 2,57
Schlügel					1		1													2 26,50
Streifenhügel	3		2				3													8 9,62
Zirkel		1	1				3			2										12 5.
Hirnanhang				1			1	1			1									5 11.
Scheidewand							2													2 4,50
Gewölbe							3			1										4 4,75
Balken							1			1										2 19.
Mantel, Hinte							2					2								4 15,50
Mantel	7	12					1	2		1						1				24 10,91
Oberlappen, Hinte												1								1 24.
Oberlappen	1		4		3		3	1				1			1					14 13,32
Unterlappen, Hinte										1										1 5.
Unterlappen					2															2 19,50
Hinterlappen, Hinte										1										1 12.
Hinterlappen	1		2		2			2		2	1		1					1		12 8,41
Vorderlappen, Hinte						1					1									2 12,50
Vorderlappen	2	1	4				3				1			1	1			1		14 14,34
Summe	17	32	17	1	8	7	22	9	1	17	3	8	1	1	2	1	1	1	1	149 128,9
== 1:	0,89	0,68	0,77	0,06	0,23	0,12	0,37	0,38	0,01	0,79	0,17	0,75	0,11	0,75	0,50	0,8	0,8	0,8	0,8	

XVII. Tabelle. Gesichtsschwäche und Blindheit.

	L.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	Summe	= 1 :
Verlängertes Mark				1				2	2							5	6,40
Haut des kleinen Hirns										3						3	5.
Kleines Hirn	1		2	1				2	1	5					1	13	12,53
Brücke				1				2	1	2						6	5.
Seitenhöhlen			23							1	2					26	10,57
Vierhügel				1	1			1								3	3,66
Schühügel	1		1	8				2	1	3	1					17	3,11
Streifenhügel	1			4				7	1	1						14	5,50
Zirbel						2										2	30.
Hirnanhang				1	1					1						2	27,50
Häute des Mantels	4							1								1	62.
Mantel			5			2		2		4	1					19	13,78
Häute des Oberlappens									2	2						2	12.
Oberlappen	3		3		1			5		2	1			1	3	19	13,94
Unterlappen									1							1	39.
Häute des Hinterlappens									1	2						2	6.
Hinterlappen				4	1			2		4						12	8,41
Häute des Vorderlappens										1						1	25.
Vorderlappen	3		1						5	1	1	1	1	3	1	16	12,56
Summe	13	28	13	18	3	2	23	8	39	6	1	1	1	4	5	164	11,65
= 1 :	10,33	22,31	10,43	14,33	2,30	1,66	18,30	6,33	31,66	5,33	0,66	1,33	0,66	3,33	4,33	124,33	7,70

XVIII. Tabelle. Schwerhörigkeit und Taubheit.

	L.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	Summe	= 1 :
Verlängertes Mark			1					2								3	10,66
Haut des kleinen Hirns									2							2	7,50
Kleines Hirn		1	3	1	1				1				1			8	20,37
Brücke								1	2							3	10.
Seitenhöhlen			4	2							1					7	39,28
Vierhügel				2												2	5,50
Streifenhügel	1					2										3	25,66
Zirbel						1			1							2	30.
Hirnanhang				1												1	55.
Haut des Mantels									1							1	62.
Mantel			2	1		1			2							6	43,66
Haut des Oberlappens									2							2	12.
Oberlappen				1		2					1			1		5	53.
Haut des Unterlappens									3							3	1,66
Unterlappen				1												1	39.
Haut des Hinterlappens									1							1	12.
Hinterlappen	1				1	2										4	25,25
Haut des Vorderlappens									1							1	25.
Vorderlappen												2		1		3	67.
Summe	2	7	12	2	9	3		16	1	1	1	1		3		58	32,66
= 1 :	1,66	5,66	10,66	1,66	6,66	2,33		13,66	0,66	0,66	0,66	0,66		2,33		128,66	8,23

XIX. Tabelle. Allgemeine Lähmung der Gliedmassen.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	X.	Summe	= 1:
Häute des kleinen Hirns									1	1	15
Kleines Hirn	1			1			1		1	4	40,75
Brücke				1			3		1	5	6
Großhirnstamm				1						1	27
Seitenhöhlen		7					1			7	39,28
Subhügel							3	1		2	26,50
Streifenhügel			1				1			4	19,25
Gewölbe							1			1	19
Balken				1						1	38
Mantel		2			1		3		1	7	37,42
Oberlappen							2			2	132
Häute des Unterlappens									1	1	5
Hinterlappen				1						1	101
Summe	1	9	1	5	1	14	1	5	37	51,67	
= 1:	252	30,80	273	15,60	15	31,64	89	43,30			

XX. Tabelle. Allgemeine Krämpfe und Epilepsie.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	Summe	= 1:
Verlängertes Mark	1		2				2			3									8	4
Häute des kleinen Hirns								1		2		3							6	2,50
Kleines Hirn	7	4	6	3		6			15								1		42	3,88
Brücke				1		3	1			3									8	3,75
Häute d. Großhirnstammes										1									1	3
Großhirnstamm			1	7					1	1									9	2,66
Seitenhöhlen	9	63	8						4	1					1				86	3,19
Höhlenhaut						3													3	5
Gefäßgeflecht							1		2	3									6	4,83
Vierhügel	1		1	2								1							5	2,20
Schhügel	1			1		4	1												7	7,75
Streifenhügel	1		2			7	1		2										13	6,92
Zirbel		1	1	8		3	7	2		2	1								25	2,40
Hirnanhang		4		5		2	8	4		3									26	2,11
Scheidewand						1	1												1	9
Gewölbe				1		2													3	6,33
Balken	2			3		5	1			1									12	3,16
Häute des Mantels						1			1	3		2							7	8,85
Mantel	8	22	15	1		6	6			6	2								66	3,96
Häute des Oberlappens										7		1							8	3
Oberlappen	7		18	1	1		3	1		6	2	1		1	4	3	1	1	50	5,30
Unterlappen			4			1								1	2				7	5,57
Häute des Hinterlappens									2			1							3	4
Hinterlappen	1	1	7			3	2			5	1	1				1	1	2	25	4,04
Häute des Vorderlappens										3									3	8,33
Vorderlappen	4	1	14			6				6	2	1	4	4	4	2	1		46	4,36
Summe	42	96	79	33	1	9	62	22	4	75	12	11	1	5	11	6	4	3	476	4,01
= 1:	6	2,32	5,48	2,56	5	1,88	1,04	10,58	8,88	9,25	1,18	11	20,60	6,03	6,18	3,57	4,60			

XXI. Tabelle.

K r a m p f e

der oberen Gliedmassen.

der untern Gliedmassen.

	I.	II.	III.	IV.	X.	Summe		I.	III.	X.	XIV.	Summe	
Seitenhöhlen	1	2				3	94,68	Seitenhöhlen	1			1	275
Mantel		3			1	4	65,50	Häute des					
Häute des Oberlappens					1	1	24	Oberlappens		1		1	24
Oberlappen	2		2	1		5	53	Unterlappen	1			1	39
Unterlappen			1	1		2	39	Vorderlappen		1		1	2
Häute des Hinterlappens					1	1	12	Summe	1	2	1	1	5
Hinterlappen	1		1	1		3	33,66						
Vorderlappen					1	1	201						
Summe	4	5	4	3	2	19	100,63						

XXII. Tabelle.

Lähmung beyder Gliedmassen einer Seite.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	Sum- me.	=
Verlängertes Mark	2		1					1		2							6	5,33
Kleines Hirn	5	1	1				7	1									15	10,86
Brücke					1		5	1	3								10	3
Haut des Großhirnstammes									1	1							1	3
Großhirnstamm				1	2				1								4	6
Seitenhöhlen	23	20	6			2				1	2						54	5,09
Häutchen																	2	9
Gefäßgeflechte							6	1		2		2	1				3	9,66
Schädel	9		3	1													22	2,40
Steißknöchel	10		9	1			16	1	2								39	1,97
Zäbel							1										1	60
Hirnanhang							2										2	27,50
Scheidewand								1									1	9
Gewölbe							2										2	9,50
Balken	3		1				2										6	6,33
Häute des Mantels						2			1								3	20,66
Mantel	13	11	9				7	1		1	1						43	6,09
Häute des Oberlappens										5							5	4,80
Oberlappen	11	1	20		6		20	2	6	1		2	9	1			79	3,35
Häute des Unterlappens									1								1	5
Unterlappen	2		2		3		3	1					1	1			13	3
Häute des Hinterlappens									3			1					4	3
Hinterlappen	5	1	8		1		7	1	1			1		1			26	3,88
Häute des Vorderlappens										1							1	25
Vorderlappen	4	2	10				7		1					3	1	2	30	6,70
Summe	89	36	71	4	11	4	85	12	1	30	6	3	6	12	3		373	5,59

Dritter Band.

XXIII Tabelle. *Verwandelnde oder ausschliessliche Löhnung.*
der oberen Gliedmassen. II *der unteren Gliedmassen.*

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	XVI.	Summe	= 1 :	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 1 :
Vorlängeres Mark																	2	16.															2	16.	
Hinter d. H. Hirns																	8	20,37															8	20,37	
Kleines Hirn																	2	15.															2	15.	
Brücke																																			
Cerebralarstamm																	12	22,91															12	22,91	
Seitenhöhlen																	1	29.															1	29.	
Gefäßengeleite																	2	5,60															2	5,60	
Vierhügel																	4	13,25															4	13,25	
Sechshügel																	10	7,70															10	7,70	
Streckenhügel																	2	30.															2	30.	
Zirbel																																			
Hirnanhang																	2	9,60															2	9,60	
Gewölbe																																			
Balken																																			
Hinter d. Mannichs																	9	29,11															9	29,11	
Markel																	13	17,66															13	17,66	
Oberrücken																	9	11,22															9	11,22	
Hinterlappen																	1	25.															1	25.	
Hinter d. Vorderl.																	7	28,71															7	28,71	
Vorderlappen																																			
Summe	14	12	17	1	20	2	13	2	2	2	1	86	92,32	9	14	4	4	11	7	12	1	2	64	29,87	3	10,66	12	13,68	5	6.	3	8.	17	16,17	
= 1 :	14	12	17	1	20	2	13	2	2	2	1	86	92,32	9	14	4	4	11	7	12	1	2	64	29,87	3	10,66	12	13,68	5	6.	3	8.	17	16,17	

XXIV. Tabelle.
Kiefer.

A. <i>Lithomus</i> .							B. <i>Krampf</i> .							
	II.	III.	IV.	VII.	X.	Summe = 17.	I.	II.	III.	VII.	X.	XIV.	XV.	Summe = 17.
Veräugertes Mark				1	1	32.								
Haute des kleinen Hirns					1	15.					1			163.
Kleines Hirn					2	40,75					1			3
Brücke			1	1	1	30.				2	1			30,55
Seitenhäuben	1				1	137,50								2
Verhügel			1	1	1	11.				1	1			25,50
Schlingel				1	1	60.				1	3			4
Stirnhaubgel				1	1	77.								4
Zirbel				1	1	60.				1				1
Hirnschwanz				1	1	19.								55.
Gewölbe					1	19.								1
Ballen					1	62.								38.
Haute des Mantels					1									1
Mantel								1	1					6
Haute des Oberlappens											1			1
Oberlappen										1	1			24.
Unterlappen										1	1			8
Hinterrücken										1	1			33,12
Verdauungsorgan										1	1			39.
Verdauungsorgan										1	1			33,06

XXVIII. Tabelle.
Geichstimmigkeit

B. K r a m p f.

1. A. L. A. H. M. S. R.

[illegible]

XXVIII. Tabelle

Г. И. П. П. П.

A) der oberen Augenhälfte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

B) der Häubchen geräuchert
abgeräumt werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

C) der demnächst folgenden und unter-
suchungsbefehl.

[illegible]

	1	II	III	V	VII	VIII	X	XI	XV	XVII	Summe	II	III	V	VII	VIII	X	XI	XV	XVII	Summe	II	III	V	VII	VIII	X	XI	XV	XVII	Summe						
Kleines Horn	1																																				
Drucke																																					
Seitenhöhlen																																					
Vorhangel																																					
Schutzel	3																																				
Streichhangel	1																																				
Mantel																																					
Oberflappen																																					
Unterflappen																																					
Hinterflappen																																					
Vordorflappen	1																																				
Summe	6	4	2	2	6		2	1	3	2	1	2	1	2		2	1	3	2	1	29	65	38	2	1	2	5	302	1	7	1	1	1	2	5	18	100

XXIX. Tabelle.
Affection der Pupille.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Summe	= 31
Kleines Hirn			1				1		2					4	10,75
Brücke							3	1	3					7	4,28
Seitenhöhlen	1	6	2				1			1				10	27,50
Gefäßgeflechte	1		1											3	17,66
Streifenhögel		3	4				3							10	26,20
Mantel														5	53
Oberlappen	1		3					1						5	7,90
Unterlappen			3			1				1				5	33,66
Hinterlappen	1					2								3	67
Vorderlappen						1		1	1					3	67
Summe	4	9	14	12	1	1	1	7	1	2				50	38,24

XXX. Tabelle.
Gestörtes Atmen.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Summe	= 31
Verlängertes Mark	1							2						3	10,66
Kleines Hirn	1		1				3		1					7	23,28
Brücke	1						1							3	10
Seitenhöhlen	10	13	1											24	11,45
Gefäßgeflechte										3				3	9,66
Streifenhögel	1													1	77
Mantel														1	55
Strömung			1							2				3	20,15
Häute des Oberlappens	3	4									1			5	8
Oberlappen	3		1				2		1	1				8	33,12
Unterlappen	1													1	39
Hinterlappen	2		2				2				1	2		9	11,22
Häute des Vorderlappens							1							1	25
Vorderlappen	3	1	2				1		1		1	3		13	46,75
Summe	26	19	10	2	1	9	2	6	6	3	5			89	21,43

8.
15.
7,50
7,60
3.
24.
5,50
14,50
5,50
17,66
38,50
12.
27,50
19.
62.
8,18
10,19
7,80
7,76
6,28
9,06

1

B.) Durchfall,

Discussion

[illegible]

A) Gastriische Zufälle.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 11
Verlängertes Mark																1	403
Kleines Hirn																1	103
Brücke																1	103
Seitenhöhlen																1	103
Schlagel																1	103
Streifenhügel																1	103
Zirbel																1	103
Hirnanhang																1	103
Mantel																1	103
Oberlappen																1	103
Unterlappen																1	103
Hinterlappen																1	103
Vorderlappen																1	103
Summe	1	4	2	2	3	2	1	15	127	32	10	1	3	7	4	16	2
= 11	1	4	2	2	3	2	1	15	127	32	10	1	3	7	4	16	2

B) Abmagerung.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 11
Verlängertes Mark																1	8
Kleines Hirn																1	8
Brücke																1	8
Seitenhöhlen																1	8
Schlagel																1	8
Streifenhügel																1	8
Zirbel																1	8
Hirnanhang																1	8
Mantel																1	8
Oberlappen																1	8
Unterlappen																1	8
Hinterlappen																1	8
Vorderlappen																1	8
Summe	1	4	2	2	3	2	1	15	127	32	10	1	3	7	4	16	2
= 11	1	4	2	2	3	2	1	15	127	32	10	1	3	7	4	16	2

XXXIV. Tabelle.

A) Affection des Harnsystems.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 11
Verlängertes Mark																1	16
Kleines Hirn																1	16
Brücke																1	16
Großhirnstamm																1	16
Seitenhöhlen																1	16
Gefäßgeflechte																1	16
Schlagel																1	16
Streifenhügel																1	16
Zirbel																1	16
Hirnanhang																1	16
Balken																1	16
Mantel																1	16
Oberlappen																1	16
Unterlappen																1	16
Hinterlappen																1	16
Vorderlappen																1	16
Summe	5	10	5	2	7	7	3	1	1	2	1	1	1	1	1	44	16
= 11	5	10	5	2	7	7	3	1	1	2	1	1	1	1	1	44	16

B) Affection d. Geschlechtssysteme.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.	Summe	= 11
Verlängertes Mark																1	32
Kleines Hirn																1	32
Brücke																1	32
Großhirnstamm																1	32
Seitenhöhlen																1	32
Gefäßgeflechte																1	32
Schlagel																1	32
Streifenhügel																1	32
Zirbel																1	32
Hirnanhang																1	32
Balken																1	32
Mantel																1	32
Oberlappen																1	32
Unterlappen																1	32
Hinterlappen																1	32
Vorderlappen																1	32
Summe	5	10	5	2	7	7	3	1	1	2	1	1	1	1	1	44	16
= 11	5	10	5	2	7	7	3	1	1	2	1	1	1	1	1	44	16

XXXV. Tabelle. Collectivverhältnisse.

	Kleines Hirn		Großes Hirn		Hirn- stängel		Kleines Hirn		Großes Hirn	
	Stamm 2)	Mantel 3)	Stamm 2)	Mantel 3)	Stamm 2)	Mantel 3)	Stamm 2)	Mantel 3)	Stamm 2)	Mantel 3)
Schmerz	2,93	3,33	3,06	2,90	3,07	3,03	2,96	3,24	2,96	3,06
Schwindel	0.	29,06	29,03	35,57	42,00	32,76	34,23	40,00	33,66	34,63
Delirium	7,73	7,12	7,26	6,38	4,66	7,31	6,48	7,27	6,43	6,43
Verrücktheit	15,50	19,77	15,93	24,29	12,60	15,88	23,48	18,46	19,70	19,70
Betrübung	3,44	3,86	3,45	2,73	3,15	3,45	2,86	3,75	2,95	2,95
Apoplexie	3,88	5,23	3,18	5,92	9,00	3,26	5,81	4,80	4,59	4,59
Epödrum	7,76	8,47	9,89	10,94	6,63	9,58	10,48	8,27	10,77	10,77
Amnesie	62,00	22,25	24,70	34,34	42,00	26,47	34,72	26,66	31,07	31,07
Affection des Gefühls	15,50	22,25	13,33	13,28	6,30	13,56	14,14	20,00	12,24	12,24
Blindheit	5,63	11,12	8,23	13,64	63,00	7,82	13,19	8,88	41,97	41,97
Taubheit	10,33	17,80	41,16	36,88	63,00	30,88	31,72	15,00	39,31	39,31
Allgemeine Lähmung	12,40	35,60	35,28	90,54	63,00	20,26	73,37	24,00	69,85	69,85
Allgemeine Krämpfe	3,88	3,70	3,80	4,63	3,07	3,80	4,46	3,75	4,18	4,18
Arm-Krämpfe	0.	0.	104,66	62,25	0.	185,33	73,37	0.	85,52	85,52
Bein-Krämpfe	0.	0.	494,00	249,00	0.	556,00	293,50	0.	324,00	324,00
Hemiplegie	3,88	11,80	3,95	4,85	12,60	3,94	5,33	7,74	4,75	4,75
Arm-Lähmung	15,50	22,25	17,03	24,29	31,50	16,84	23,95	20,00	24,83	24,83
Bein-Lähmung	7,73	13,69	18,29	76,61	63,00	45,88	46,46	11,42	38,47	38,47
Kiefer-Lähmung	31,00	35,60	125,50	49,00	63,00	92,66	130,44	34,28	161,60	161,60
Kiefer-Krampf	20,66	178,00	32,93	36,88	126,00	30,88	41,92	60,00	37,58	37,58
Zunge-Lähmung	4,76	17,80	8,09	12,45	31,50	7,51	13,04	10,43	11,14	11,14
Schlingen-Lähmung	10,33	29,66	41,16	47,42	63,00	30,88	43,48	20,00	46,17	46,17
Nacken-Krampf	20,66	59,33	247,00	166,00	0.	111,20	130,44	40,00	202,00	202,00
Hals-Lähmung	31,00	0.	70,57	110,88	0.	61,77	130,44	120,00	101,00	101,00
Gesicht-Lähmung	20,66	44,50	19,76	24,29	0.	49,85	26,08	34,28	24,48	24,48
Gesicht-Krampf	15,50	44,50	44,90	49,80	63,00	37,06	48,91	30,00	49,96	49,96
Augenlid	20,66	0.	49,40	62,25	0.	42,76	73,37	80,00	62,50	62,50
Außere Augen-Muskeln	0.	0.	125,50	996,00	0.	133,00	1174,00	0.	323,20	323,20
Innere Augen-Muskeln	62,00	89,00	61,75	142,28	0.	61,77	130,44	80,00	107,73	107,73
Pupille	8,85	44,50	38,00	38,30	0.	27,80	39,13	21,81	41,43	41,43
Atmen	16,33	25,42	17,64	21,19	0.	16,35	21,74	18,46	21,54	21,54
Erbrechen	7,76	8,09	8,09	8,89	21,00	8,05	8,76	8,00	9,02	9,02
Verstopfung	31,00	25,42	19,76	62,25	0.	20,59	51,04	26,66	39,41	39,41
Durchfall	0.	178,00	247,00	89,60	0.	278,00	106,72	240,00	134,66	134,66
Unwillk. Anstoßung	0.	44,50	38,00	62,25	126,00	42,76	58,70	60,00	53,86	53,86
Gastrische Zufälle	0.	178,00	82,33	142,28	0.	92,66	146,74	240,00	124,30	124,30
Abmagerung	8,85	44,83	19,76	38,30	25,20	17,37	30,89	12,63	29,85	29,85
Harnbeschwerde	16,50	29,66	29,03	66,40	63,00	26,47	55,90	24,00	47,52	47,52
Affection der Genitalien	31,00	17,80	54,88	332,00	426,00	50,55	90,30	20,00	124,30	124,30

- 1) Stamm des kleinen Hirns: verlängertes Mark und Rücken.
- 2) Mantel des kleinen Hirns: mit den Ependymen.
- 3) Stamm des großen Hirns: mit den Ependymen, Vierhöhlen, Sechshöhlen, Streifenhöhlen und Seitenhöhlen.
- 4) Mantel des großen Hirns: mit den Ependymen.

- 5) Gehirnganglien: Zügel, Schilddrüse, Gerdien.
- 6) Hirnstamm: Nr. 1 und 5.
- 7) Hirnstamm: Nr. 2 und 4.
- 8) Kleines Hirn: Nr. 3 und 2.
- 9) Großes Hirn: Nr. 3, 4 und 5.

Zweyte Abtheilung.

Von den Systemen des Gehirns.

I. Graue und weisse Substanz.

§. 710. Nur durch Comparationen können wir die Dinge in ihrer Eigenthümlichkeit erkennen, und so kommt es denn auch hier darauf an, die Gegensätze im Gehirne aufzufassen. Der allgemeinste aber ist der zwischen der weissen und grauen Substanz (§. 13). Beyde sind im Allgemeinen, und wenn wir sie mit andern Körpertheilen vergleichen, einander gleich, und bloß relativ verschieden. Beyde finden sich in jeder Gegend des Gehirns: in dem Hirnstamme und seinen Ganglien ziehn sie sich durch einander hin, und im Mantel sind sie als Mark und Rinde auseinander gewichen; die graue Zirkel hat in ihren Stielen, und der Hirnhaubung im Trichter einen Marktheil; umgekehrt bekommt das markige Gewölbe in seinen Kugeln und im Ammonshorn, und der Balken in der Rinde seiner Strahlungen einen Antheil an grauer Substanz. Mithin scheinen Beyde, durch eine polarische Spaltung gegeben, zur vollständigen Hirnthätigkeit wesentlich nothwendig zu seyn.

§. 711. Je mehr diese Differenz entwickelt ist, um so reger und kräftiger muß die Hirnthätigkeit seyn. Dies ergibt sich, aus der Betrachtung der Thierreihe. Daß der fortschreitenden Vervollkommenng eine Zunahme des Marks entspreche (Willis *cerebr.* c. 10. p. 56), daß die graue Substanz bey den niedrigeren Thieren überwiegen sey, und die weisse erst bey den Säugethieren das Uebergewicht erhalte (Cuvier *Nervensystem* S. 223), daß die klügeren derselben mehr Mark haben (Taiffol in *Sömmering's Hirnlehre* §. 31.) und der Mensch das meiste besitze (Tiedemann *Zoologie* I. S. 106), stimmt durchaus nicht mit der Erfahrung überein. Denn bey Fischen, Amphibien und Vögeln fehlt die Rinde am großen Hirne gänzlich, und die graue Substanz im Hirnstamme und seinen Ganglien ist viel weniger ausgeschieden und entwickelt, als bey den Säugethieren. Was aber die Letztern betrifft, so gilt dasselbe von den Niedern unter ihnen ebenfalls, und bey den Höhern ist die Kleinheit des Mantels, wodurch die Rinde den Hirnganglien näher liegt, der Grund, warum man mehr graue Substanz zu sehen meynt. Bey dem Menschen ist mehr graue Substanz im Rückenmarke, und namentlich der graue Kernstrang stärker, als bey Thieren; Arsay fand bey dem Zitterrochen und Desmoulins (*Magendie Journal* III. p. 37. sq.) bey andern Fischen, so wie bey Vipern und Nattern gar keine graue Substanz im Rückenmarke. Es bleibt also nur die sichere Erfahrung, daß in der aufsteigenden Thierreihe der Gegensatz der Substanzen stärker wird.

§. 712. Auch das Gehirn des Embryo unterscheidet sich von dem des erwachsenen Menschen durch die Gleichförmigkeit seiner Substanz. Beyde Substanzen sind noch nicht von einander zu unterscheiden; Alles ist gleichförmig, weiß, röhlich. Nach Desmoulins (*Magendie Journ.* III. p. 373) entwickelt sich die graue Substanz im Rückenmarke

und am Mantel des Gehirns später, als das Mark. Die Differenz entwickelt sich nach Meckel (Anatomie III. S. 579) von unten nach oben, so, daß sie im achten Monate des Embryonallebens im kleinen Hirne, nach der Geburt im verlängerten Marke, später in den Streifenhügeln und den Hirnschenkeln sich zeigt. Ueberhaupt ist noch im Kindesalter die Marksubstanz röthler, die graue Substanz bleicher, mithin der Unterschied zwischen Beiden geringer. Es ist daher nicht genau ausgedrückt, wenn man dem kindlichen Gehirn mehr graue Substanz zuschreibt (Sömmerring *de basi* p. 24), und man schließt fehl, wenn man deshalb die graue Substanz für die Ursubstanz ansieht (Gall *systeme* I. p. 44), aus welcher sich das Mark entwickeln soll, wie der Knochen aus dem Knorpel (Spurzheim p. 20). Uebrigens nimmt im hohen Alter mit Bewegung und Empfindung auch die graue Masse des Rückenmarks ab.

§ 713. Pathologische Erfahrungen stimmen damit überein, da im Gehirn von Seelenkranken die Differenz beyder Substanzen geringer zu seyn pflegt. Nach Rosenthal, Marshal, Treviranus (Biologie VI. S. 165) und Georget (Verrücktheit S. 265) ist bey den meisten dieser Kranken die graue Substanz wie verschossen, bleich, gelblich, und die Marksubstanz weiß-gelblich und schmutzig. Erstre wurde gelblich und hieß aschgrau, gefunden bey Betäubung (Meckel in *ac. de Berlin* 1781. p. 60) und Blödsinn (ebend. 1764. p. 69. 77. 81). Letztre braun bey Apoplexie und Verrücktheit, besonders im höhern Alter (Morgagni IV, 21. V, 15. 16. VIII, 9. XXXVII, 36).

§ 714. Fragen wir nun nach den eigenthümlichen Lebensverhältnissen beyder Substanzen, so müssen wir zuvörderst eine mechanische Erklärung von der Hand weisen. Nach Rolando (p. 10. 87) soll die graue Substanz dem Gehirn beygegeben seyn, um die Markfasern zu isoliren oder von einander zu trennen, damit sie ihre eigenthümlichen Bewegungen besser vollziehen können und ihre Ernährung leichter vor sich gehet. Aber abgesehen davon, daß Bewegungen, zu welchen ein solcher Raum nöthig wäre, ganz unwiesen sind, und daß die Nervenstämme, in welchen dergleichen Bewegungen eben so wohl Statt finden müßten, keine graue Substanz haben, so fehlt auch diese zwischen den Fasern des Mantels und des Balkens, wo sie doch am nöthigsten wäre, wenn es überhaupt eines solchen mechanischen Hilfsmittels bedürfte.

§ 715. Die graue Substanz ist reicher an Gefäßen; daher ist sie auch besonders zu Entzündungen geneigt (§. 246. Lallemand I. p. 81. 215), und die Eiterung, Erweichung (ebend. p. 443) und Blutung (§. 244) kommt am häufigsten in ihr vor, so wie im Marke die Verhärtung (Pinel *recherches sur l'endurcissement* p. 20). Dieser Reichthum an Blut kann entweder eine regere Lebendigkeit der Hirnsubstanz selbst, oder ein Uebergewicht der niedern, plastischen Thätigkeit bezeichnen. Man hat ihn meist auf die letzte Weise gedeutet. Wie Santorini (*obr.* p. 55) das Mark als den vorzüglichsten Sitz der Seelenthätigkeit betrachtete, so stellte auch Acker mann (Schädellehre S. 19 fgg.) die graue Substanz als ein noch unreines Mark, und als den Punkt dar, wo die Hirnsubstanz aus den letzten Enden des Gefäßsystems hervortritt. Wetzler (Beyträge z. prakt. Med. I. S. 8) behauptet, die Marksubstanz, als nur feine Arterienzweige erhaltend, müsse das Organ des Geistes seyn, da die Seelenverrichtungen nur in der einfachsten, feinsten, von höchst verfeinertem Blute gleichsam begeisterten Substanz vor sich gehn könnten; so soll die graue Substanz

noch Lenth (*Journal, compl. III, p. 39.*) nur vorbereitendes Organ seyn, und nach Trevirens (Biologie VI. S. 164) das Blut zu gewissen im Marke sich ereignenden Processen vorbereiten. Und zwar soll sie noch Vleussens (c. 6. p. 39) eine gereinigte Lymphe als Nahrungstoff des Marks bilden, nach Berengar (Fol. 431) die Lebensgeister des Bluts assimiliren und zur Umwandlung in thierische Geister vorbereiten, nach de le Boe (S. 28 sq. p. 20) die Geister wie durch Destillation entwässern und reinigen, nach Willis die thierischen Geister bereiten, die dann im Marke sich vertheilen und wirken, so daß dieses den Stamm, die graue Substanz die Wurzel, und die Nerven die Zweige darstellen. Gleiche Meynung hatten Diemerbroeck (*lib. III c. 4. p. 34.*), Ruysch (*theat. IX, p. 28.*), Heller (*stem. IV, p. 385. 392*) und Andre. Allein aus dem Gefäßreichthume läßt sich noch nicht mit Sicherheit auf die ausschließlich plastische Function der grauen Masse schließen: sie bleibt Hirnsubstanz, wenn auch eine gefäßreiche. Das Mark ernährt sich aus dem Blute seiner Arterien so gut, wie andre Organe, die wenig Gefäße haben: wo aber Ernährung ist, da ist auch Krafterzeugung, denn lebendige Masse und lebendige Kraft sind nicht verschiedene Wesen, sondern verhalten sich wie Aeußeres und Inneres. Es giebt erfahrungsmäßig keine besondere Kraftsubstanz, dergleichen die thierischen Geister seyn sollen, und somit auch keine besondern krafterzeugenden Organe. Daß die graue Substanz in keiner notwendigen und wesentlichen Beziehung zur Bildung von Masse wie von Kraft steht, sieht man daraus, daß sie in den starken Gliedernerven fehlt und in den schwächern Rumpfnerven sich findet; und daß in ihr keine vorbereitende Umwandlung des Bluts vor sich geht, erkennen wir daraus, daß, wo das Mark an der Oberfläche liegt, die Arterien auch unmittelbar in dasselbe eintreten, so in das verlängerte Mark, in die Schenkel des kleinen und großen Hirns, in die Brücke und in den Balken. — Dagegen haben wir erkannt, daß das Blut durch seinen lebendigen Gegensatz die Hirnthätigkeit erregt (S. 391 fgg.), und wir dürfen daher annehmen, daß die graue Masse, als eine blatreichere Hirnsubstanz eine stärkere Spannung hat, und durch eine regere Lebensthätigkeit von der Marksubstanz sich unterscheidet, was denn auch durch mehrere der oben (S. 711—713.) angeführten Erfahrungen bestätigt zu werden scheint. — Daß übrigens in der Nähe der Arterien Mark, in der Nähe der Venen graue Substanz sich bildet (Carus Gehirn S. 80), ist ein bloßer Einfall.

§. 716. Die zweyte und wesentlichere Differenz liegt in der Anordnung der Elementarkügelchen (S. 13. 15te Anmerkung). Die Markfasern haben eine bestimmte Richtung; ihre Thätigkeit muß dieser Richtung entsprechen, und die Beziehung verschiedner Organe ausdrücken. Wo sie aufhören, liegt graue Masse: im Kerne des Rückenmarks und des Hirnstamms, an den Centralenden der Nerven, am Ende der Stammfasern in den Hirnganglien, und am Ende der Strahlungen des Mentels; sie liegt besonders an den beyden Oberflächen, und zwar ganz vorzüglich in den Höhlen, wie sie denn schon im Rückenmarke ihre Verwandtschaft mit der Höhlenbildung äussert (S. 65). In ihr hört die bestimmte Richtung, die Beziehung auf ein Aeußeres auf; sie faßt als ein Gemeinsames, was ihr durch die Fasern mitgetheilt worden ist; so erscheint sie denn schon in den Nervenganglien, welche Concentrationspunkte einer niedern Ordnung sind (S. 17.). Also in der markigen und grauen Substanz finden wir den Gegensatz von Leitung, Richtung, und von innerer, regerer (S. 715.),

eigenmächtiger Thätigkeit. Nun finden wir in der Seele zwey Elementet: Richtung und Erkenntniß. Mithin glauben wir, daß in der Marksubstanz die Richtung, Sinn und Wille, in der grauen Substanz aber die Erkenntniß, Gefühl und Denkvermögen, ihr Organ finden. Wie beyde Substanzen, so sind auch Richtung und Erkenntniß wesentlich verknüpft und von einander abhängig: die Erkenntniß ist das eigentliche, wahre Leben der Seele, aber immer abhängig von der Richtung, so wie diese gegenseitig bedingend. — Mit dieser Ansicht stimmt einigermassen überein die Meynung von Bartholin (*lib. III. c. 3. p. 389*), daß die thierischen Geister für die Empfindung in der Rinde, die für Bewegung im Marke aufbewahrt worden. Näher stehen die Ansichten von Prochaska (*disquis. p. 81*), daß in der Rinde durch ihren Gegensatz zum Blute Electricität erzeugt und in den Markfasern geleitet werde; und von Wenzels (*cerebr. p. 69*), daß die graue Substanz der Sitz der Sensation, das Mark hingegen der Leiter der Eindrücke sey.

II. Hirnstamm und Hirnmantel.

§. 717. Nach dem Gegensatze der Substanzen betrachten wir den der Gebilde, und zwar zuerst den durchgreifendsten zwischen dem Hirnstamme und seinen Strahlungen oder den Hemisphären des kleinen und großen Hirns. — Der Hirnstamm ist die Fortsetzung des Rückenmarks in das Gehirn, gleichsam ein Rückenmark des Schädels; eine Säule, welche die Centralenden aller Nerven enthält, denn auch die Rückenerven gehören dem Stamme an, wie man dies bey Hemicephalen deutlich sieht, wo die Hemisphären mangeln. Er ist also derjenige Punkt, in welchem das Gehirn mit dem übrigen Körper durch sensible Substanz (Rückenmark und Nerven) unmittelbar zusammenhängt, wo also die Eindrücke des Körpers und der Aussenwelt auf die Seele sich sammeln, und von wo aus die Seele durch Rückenmark und Nerven auf den Körper wirkt: er ist das nächste Organ für Empfindung und Bewegung; also für das Periphere der Seelenthätigkeit, den äussern Sinn und den äussern Willen. Die Nerven senken sich quer in den Hirnstamm ein, während dieser die Längsaxe des Gehirns einnimmt: das erste und sechste Paar gehn zwar in der Längsrichtung, spalten sich aber im Hirnstamme in querlaufende Fäden. Die Axen der Nerven und des Hirnstamms durchschneiden sich also, und wir können die Thätigkeiten beyder als Bewegungen denken, die in rechten Winkeln zusammenstossen; oder deren Eine senkrecht auf die Andre wirkt, wodurch eben die regste Wechselwirkung bezeichnet zu werden scheint. Hier, wo die Nerven als Repräsentanten aller peripherischen Organe von einer dieselben überwiegenden Anhäufung sensibler Masse aufgenommen werden, kann die Gesamtheit derselben als das einzige, Alle umfassende Lebensgefühl hervortreten, in welchem zuerst die Seele erscheint: der somit erweckte Trieb muß von hier aus zurückwirken, und den Impuls zu Bewegungen geben. Somit ist, denn, der Hirnstamm der erste Weg zu vergleichen, in welchen das organische Leben seine Grundlage findet, und wo die gröbern Stoffe eingeführt und ausgestossen werden. Da ihm ist die Vermittelung noch vorherrschend; darum bat er die den Leitern eigenthümliche Längsrichtung und Walzenform: er ist das Aussenwerk des Gehirns; wird besonders von der andringenden Blutwelle bewegt (§. 269), und seine Thätigkeit bezeichnet die Gränze der körperlichen und geläutigen Welt, ist aber dadurch die Basis aller höhern Seelenthätigkeit.

Der Mantel ist gleichsam ein Auswuchs des Rückenmarks, eine Organisation, welche über die Bildung des Rückenmarks hinaus geht und mit diesem keine Aehnlichkeit mehr hat. Er ist auf den Hirnstamm aufgesetzt, mit dem übrigen Körper in keiner unmittelbaren organischen Verbindung, sondern mehr selbstständig und eigenthümlich. Die Seelenthätigkeiten, die in ihm ihren Sitz haben, müssen dem Verkehre mit der Aussenwelt mehr entrückt, theils Fortsetzungen und Steigerungen jener äussern Seelenthätigkeiten, ein Hinsuehen über sie, theils Anfangspankte der durch sie zu vermittelnden Reaction und Impulse für dieselben seyn.

§. 718. Diese morphologische Deutung liegt so nahe, daß man sie längst schon aufstellte, und namentlich den Hirnstamm, den man nur mit verschiedenen Namen bezeichnete für das *σφαῖρον αἰσθητικόν* oder *Sensorium commune* erklärte. So heisst es bey Varoli (p. 12.): die vier Wurzeln des Rückenmarks entspringen aus dem grossen und kleinen Hirne, indem das *Sensorium* Fortsätze nach aussen hervorstreckt, um die ihm bestimmten Eindritcke aufzunehmen. Bestimmter spricht es zuerst Piccolemini (*lib. V. lect. 6. p. 269*) aus, der Sitz der empfindenden Seele oder das *Sensorium commune* müsse da seyn, wo alle Sinnesnerven zusammentreffen, also in der „*Medulla oblongata*.“ Diese ist nach Willis (*cerebr. c. 13. p. 61*) die Hauptstrasse für die thierischen Geister zwischen dem Gehirne (Mantel), wo sie gebildet werden (*ib. §. p. 45*), und den Nerven, indem sie nach innen gehn bey der Empfindung, und nach aussen bey der Bewegung. Eine ähnliche Ansicht hatten Wharton (p. 141), Hoboken, Molinetti (p. 89), Boerhaave (*praelect. IF. §. 354*), Zinn (*Haller disput. VII. p. 427*), Haller (*elem. IF. p. 395*), Prochaska (*adnotat. III. p. 114 199*), zum Theil auch Mayer (Gehirn S. 45). Sömmerring (Seelenorgan S. 34) war im Grunde derselben Meynung, indem er den Hirnstamm als den Boden der Hirnhöhlen betrachtete. — Nur Garcia wurde zuweilen gefehlt, daß man das *σφαῖρον αἰσθητικόν* für das Seelenorgan überhaupt nahm, und der höhern Seelenthätigkeit kein Organ zugestehn wollte.

§. 719. Daß aber der Mantel den höhern Functionen diene, lehrt die Zoöthéie. Er fehlt bey den wirbellosen Thieren, indem hier nur andeutende Rudimente eines Hirnstamms mit seinen Ganglien sich finden. Bey den Fischen sitzen auf dem überwiegenden Hirnstamme Kugeln, welche ein Mittelding von Ganglien und Hemisphären, und daher bald diesen, bald jenen kühlicher sind: gewöhnlich hält man die hintern dieser Kugeln für Sehganglien; dann muß man aber auch die vordern, die man Hemisphären zu nennen pflegt, für Ganglien erklären, da sie jenen ähnlich, ja selbst noch gangliumartiger sind, indem sie meist keine Höhle haben, sondern solid sind. Weiter aufwärts in der Thierreihe nimmt der Mantel gegen den Hirnstamm mehr zu; bey überwiegendem Hirnstamm zeigt sich bloß lebhafte Sensation und Bewegung; bey mehr entwickelten Mantel hingegen mehr Klugheit. Spix (p. 47) hat diese fortschreitende Zunahme der Geistes nach oben, vorne und hinten treffend geschildert; aber der Mantel nimmt eben so auch nach unten zu und grübt sich immer tiefere Gruben in der Grundfläche des Schädels. Am grössten ist der Mantel bey dem Menschen (Wenzel *cerebri pl. 265*); darum erkannte schon Autenrieth (*III. §. 1049*) ihn als das Organ des höhern thierischen Lebens an, welches weniger mit dem Gemeingefühle zusammenhängt und von den thierischen Geistes an-

bängiger ist, und Proehaske (*disquis. p. 80*) stellt den Satz auf: daß die Menge und Mannichfaltigkeit der Vorstellungen der Größe des Mentels entspricht.

§. 720. Eben so sehen wir, daß bey dem Embryo der Mantel erst später sich ausbildet. Schon Stenson (*Mangelus II. p. 98*) schloß aus der Betrachtung eines wasserköpfigen Kalbs, bey welchem die obere Theile des Gehirns unvollkommen entwickelt, die untern hingegen normal waren, daß sich des Wasser angehäuft habe, als Letztre schon entwickelt waren, daß folglich diese früher sich ausbilden. Dies ist durch die Untersuchungen von Döllinger (S. 5 — 9.) und Tiedemann (Gehirn S. 15. 19.) bestätigt worden: während der Hirnstamm bereits entwickelt ist, stellt der Mantel noch im dritten Monate eine schmale und kurze, dünnwandige Blase dar, welche erst allmählig en Masse und Ausbildung zunimmt. Noch bey dem neugeborenen Kinde ist der Mantel weich und breyerig, und nur der Hirnstamm fester geronnen. — Bey Hemicephalen fehlt oft nur der Mantel: nie aber kommt dieser ohne Hirnstamm vor.

§. 721. Nach den in der XXXV. Tabelle zusammengestellten pathologischen Beobachtungen verhält sich der Hirnstamm zum Mantel in Beziehung zu den verschiedenen Symptomen auf folgende Weise:

- 2, 11. Affection des Harnsystems.
- 1, 78. Affection der Genitalien, und Apoplexie,
- 1, 77. Abmagerung.
- 1, 68. Blindheit.
- 1, 64. Abnorme Darmausleerung (Durchschnitt der XXXII. Tabelle).
- 1, 58. Gastrische Abnormitäten und Lähmung (Durchschnitt der XXII — XXVIII. Tabelle).
- 1, 47. Verrücktheit.
- 1, 32. Affection des Athmens
- 1, 19. Amnesie.
- 1, 15. Krampf (Durchschnitt der XX. XXI. XXIV. XXVI. XXVII. Tabelle).
- 1, 09. Krödsinn.
- 1, 08. Erbrechen.
- 1, 04. Schwindel und Affection des Gefühls.
- 1, 02. Taubheit.
- 0, 82. Betäubung.
- 0, 88. Delirium.
- 0, 97. Schmerz.

§. 722. Wenn, nach diesen Beobachtungen zu urtheilen, der abnorme Zustand des Hirnstamms überhaupt viel häufiger das Leben stört, so gilt dies ganz vorzüglich in Beziehung auf des Leben des Rumpfs. Der Hirnstamm steht in näherer Beziehung zu demselben, und wirkt auf pflanzliche Weise auf ihn ein. Seine Verletzung ist daher meist tödlich, und zwar um so eher, je weiter noch hinten die Stelle ist, welche sie trifft. Extravasate und andre Abnormitäten sind an der Basis des Schädels und in den Hirnhöhlen am gefährlichsten, während bey Geschwüren und andern Desorganisationen des Mantels das Leben geraume Zeit bestehen kann. Am meisten übertrifft der Hirnstamm den Mantel (nach §. 721.) in seiner Einwirkung auf den plastischen Proceß innerhalb des

Darmcanale; dann auf die Geschlechts- und Harnorgane; und auf die Ernährung und Darmbewegung. Dies Uebergewicht des Hirnstamms vermindert sich in Betreff des Athmens, und verliert sich fast gänzlich in Hinsicht auf das Erbrechen. Also die Magenverdauung und das Athmen, als die beyden plastischen Functionen, welche am meisten von der Seele, und namentlich von dem Willen mit Bewußtseyn bestimmt werden, sind es gerade auch, auf welche auch das pflanzliche Leben des Mantels am stärksten einwirkt. Da das Athmen verhältnißmäßig mehr durch pflanzliche Hirnthätigkeit, die Verdauung mehr durch geistige Thätigkeit bestimmt wird (§. 547—553), und Jenes bey Abnormitäten des Hirnstamms häufiger, als bey denen des Mantels, diese aber bey beyden fast in gleichem Verhältnisse gestört wird, so muß im Hirnstamm verhältnißmäßig mehr das pflanzliche, im Mantel mehr das psychische Leben wirken.

§. 723. Das Gemeingefühl ist im Hirnstamme reger, als im Mantel, weil in Jenem mehr der Gegensatz, in diesem mehr ein inneres Leben walhet (§. 374). Nach den zahlreichen Versuchen von Haller, Arneemann, Flourens und Fodera äussern die Thiere keinen Schmerz wenn man den Mantel sticht, schneidet, zerreißt oder stückweise hinwegnimmt; je tiefer die Verwundung eindringt, um so mehr zeigt sich Schmerz: namentlich entsteht dieser, wenn der Boden der Hirnhöhlen, die Hirnschenkel, die Brücke und das verlängerte Mark verletzt wird (Autenrieth III. §. 403g). Fodera (*Magen: die Journ. III. p. 192*) will die Hemisphären von einer Seite zur andern bis zur Quetschung gedrückt haben ohne Schmerz; bey einem senkrechten Drucke aber; wo die Wirkung auch den Hirnstamm traf, entstanden Schmerzen. — Nach den pathologischen Beobachtungen (§. 721) scheinen innerliche Abnormitäten des Mantels häufiger Schmerz zu erzeugen, als die des Hirnstamms.

§. 724. Das Gemeingefühl des Körpers wird im Hirnstamme aufgenommen; denn wenn dieser allein vorhanden; der Mantel aber entweder gar nicht entwickelt oder zerstört ist; wirken noch die auf den Körper gemachten Eindrücke. — Daß auch die Perception der Sinnesindrücke mit dem Hirnstamme in einer nähern Verbindung steht, als mit dem Mantel, ergibt sich aus den pathologischen Beobachtungen (§. 721): die Abnormität von Jenem verursachte häufiger Taubheit und Blindheit, als die von diesem. Offenbar wirken die Sinnesindrücke zunächst auf den Hirnstamm; aber faßt dieser sie eigenmächtig auf, oder muß der Mantel mit wirken, um sie zur Anschauung zu bringen? die Anschauung setzt Bewußtseyn voraus: wenn nun dieses vom Mantel abhängig ist, so wird auch dessen Thätigkeit zur vollständigen Sensation erfordert. Wir dürfen vermuthen, daß der Sinnesindruck in seiner Einzelheit vom Hirnstamme percipirt, in seiner Verbindung mit andern Vorstellungen aber als wirkliche Wahrnehmung vom Mantel aufgenommen und fest gehalten wird. Die Sinnesindrücke können noch zum Bewußtseyn kommen, nachdem sie schon vorübergegangen sind, wenn sich die Aufmerksamkeit auf sie wendet; wenn man z. B. leise schlummert oder in einer Gesellschaft zerstreut oder in Gedanken vertieft ist, und man erwacht plötzlich mit dem Willen, an der Unterhaltung Theil zu nehmen, so percipirt man noch die letzten Worte, welche gesagt worden sind: ist es hier nicht, als ob die durch die Sinnesindrücke verursachte Erregung jetzt von dem Mantel aufgefaßt würde? Wenn dagegen nach einem Sinnesdrucke das Bewußtseyn

aufgehoben wird, so scheint derselbe nicht den Mantel zu erreichen oder von demselben nicht fest gehalten zu werden: es kommt zu keiner vollständigen Wahrnehmung, oder diese erlischt wieder, und so kann man sich der vor der Hirnerschütterung oder vor dem Einschlafen erlebten Ereignisse nicht mehr erinnern (§. 381.).

§. 725. Ein Blick auf die Resultate der pathologischen Beobachtungen (§. 721.) in Hinsicht auf die Seelenthätigkeiten lehrt uns, daß die chronische Verrücktheit, die Amnesie und die Apoplexie am häufigsten von Abnormitäten des Hirnstamms abhängt. Was Erstere betrifft, so stimmt dies ganz mit der Erfahrung überein, daß der Wahnsinn im niedern Leben zu wurzeln pflegt, und man bey ihm häufiger Abnormitäten in den Rumpf eingeweiht, als im Gebirne findet; die Apoplexie aber ist eine Cessation der Hirnthätigkeit, sowohl in ihren psychischen Ausseerungen, als in ihrer pflücklichen Einwirkung auf Rumpf und Gliedmaßen. Der Einfluss von Abnormitäten des Hirnstamms auf Blödsinn und Affecten des Gefühls nimmt verhältnißmäßig immer mehr ab; die Betäubung endlich und das Delirium kommen häufiger bey Abnormitäten des Mantels, als bey denen des Hirnstamms vor. So scheint es denn, daß das Bewußtseyn, die freye Kraft der Seele in dem Mantel wirke und nur vermöge des organischen Zusammenhangs desselben mit dem Hirnstamme von diesem aus affectirt werden könne. — Nach Parent (p. 22 — 26. 207) bewirkt die Arachnoide Depression der Seelenthätigkeit und weniger Störung derselben, so daß der Kranke noch im zweyten Zeiträume Bewußtseyn hat und über Kopfschmerz klagt, dagegen mehr Affecten der Sinnesorgane und endlich Betäubung, wenn sie an der Basis, also am Hirnstamme oder in seiner Nähe ihren Sitz hat; dagegen verursacht sie immer Störung der Seelenthätigkeit und Delirium, wenn die Entzündung an der Wölbung, d. i. am Umkreise des Mantels vom großen und kleinen Hirne ihren Sitz aufgeschlagen hat. Larrey (*Gerson III. S. 243*) will bemerkt haben; daß Abnormitäten im Hirnstamme und in den Hirnhöhlen auf Empfindung, Sinneenthätigkeit und Bewegung störend eingreifen, während die Geistesenthätigkeit ungestört bleibt; daß dagegen bey der Nostalgie zuerst der Mantel an passiver Congestion und Entzündung leidet, welche Abnormität dann theils auf die Häute, theils auf den Hirnstamm sich fortpflanzt, und daß nun erst Störung der Sensation und der Bewegung, Verstopfung, Magen- und Darmenzündung u. s. w. eintritt. So soll auch bey der Epilepsie, wenn sie auf einer Abnormität im Mantel beruht, der Anfall mit Auslebung des Bewußtseyns beginnen, dagegen wenn die Ursache im Hirnstamme, in den Höhlen oder an der Basis des Gehirns ihren Sitz hat, ein Vorgefühl eintreten, und erst nach dem Hinfallen das Bewußtseyn verloren gehn. — Auch Thatsachen unseres Gemeingefühls scheinen diese Ansichten zu bestätigen. Wenn wir an rheumatischen Affectionen der Nerven, namentlich der Verzweigungen des fünften Hirnnerven leiden, scheint consensuell der Hirnstamm ergriffen zu seyn: wir fühlen uns matt; Lesen und Schreiben greift uns an, macht den Kopf schwer, heiß und schmerzhaft; die Anstrengung der Sinneenthätigkeit und des Aufnehmens fremder Gedanken ist schwierig und ermüdend. Dagegen scheint hierbey der Mantel frey zu bleiben, da derselbe nicht unmittelbar mit den Nerven zusammenhängt und darum auch erst bey einem höhern Grade der Krankheit ergriffen wird, und daher scheint es zu rühren, daß wir in jenem Zustande bey eigenem Nachdenken, bey innerer, freyer Thätigkeit des Verstandes und der Phantasie uns leicht und heiter im Kopfe fühlen. Vermöge des Gegensatzes und der Geschiedenheit bey-

der Systeme kann man öfters, den körperlichen Schmerz durch freyes Nachdenken besiegen, während man zu Anstrengungen der Sinne, zu aufmerksamen Untersuchungen und Beobachtungen äusserer Gegenstände und zu Verfolgung fremder Gedankenreihen bey'm Lesen und Hören ungeschickt ist.

§. 726. Der Hirnstamm muß zunächst auf die Nerven und durch deren peripherische Enden auf die verschiedenen Organe reagiren; diese Einwirkung kann aber auch durch ihn bloß vermittelt werden und vom Mantel ausgehen, denn dessen Abnormitäten bewirken auch Lähmung der Muskeln und der Sinnesorgane. Diese Verhältnisse sprechen sich mit ziemlicher Klarheit bey Vivisectionen aus: Wenn man die Marksubstanz des Mantels in der Nähe der Oberfläche reist oder verwundet, so zeigt sich keine Veränderung der Muskelthätigkeit; kommt man tiefer, so tritt Muskelschwäche oder leichte Zuckung ein; trifft man aber den Hirnstamm, so erfolgt wirkliche Lähmung oder Contraktion. In diesen Sätzen stimmen alle Beobachter überein; nur in der Bestimmung des Punktes im Hirnstamme, wo die unmittelbare Wirkung auf die Bewegung anhebt, finden sich einige Abweichungen: Haller (*elem. IV. 25. 299*) giebt die Sehnhügel; die Schenkel des großen Hirns und das verlängerte Mark an; Appermaan (S. 126. fgg. 173 — 176) die Seitenhöhlen und Streifenhögel; Autanvieth (S. 1039) den Boden der Seitenhöhlen, die Hirnschenkel, die Brücke und das verlängerte Mark; Spurzheim (p. 125) die Streifenhögel und Sehnhügel; Florens (*Magendie Journal II. p. 380 199*) nur die Vierhögel; wie er, so will auch Foderà (*ibid. III. p. 192. 199*), von Reizung der Sehnhügel und Streifenhögel nie, von Reizung des verlängerten Marks hingegen immer Convulsionen gesehen haben, und zwar um so heftigere, je weiter nach unten dasselbe gereizt wurde. Nur wenn Foderà einen ungleichförmigen, auf einen Punkt beschränkten Druck auf die Hemisphären anbrachte, entstanden Convulsionen. Florens (p. 18. 30. 149) sah bey Reizung und Verletzung des Mantels, vom großen, wie vom kleinen Hirne weder Convulsionen, noch Lähmung; er behauptet (p. 22), daß alle Theile, welche die graue Substanz innen und das Mark aussen haben, die Bewegung bestimmen; und die, welche die graue Substanz aussen, das Mark innen haben, keinen Einfluß auf die Bewegung äussern: er spricht dadurch den Gegensatz des Hirnstamms (mit Ausnahme der Streifenhögel) gegen den Mantel aus. Auch die Bewegungen der Iris fand er vom Mantel unabhängig (p. 29. 90). Wohl aber bemerkte er den Einfluß desselben auf die Kraft der Bewegung: nach Wegnahme einer Hemisphäre entstand Schwäche in den entsprechenden Gliedern, die aber bald mehr, bald weniger bedeutend war und immer in Kurzem vorüber ging (p. 29. 52.); nach Wegnahme beider Hemisphären erfolgte allgemeine Schwäche (p. 30); dies galt vom großen, wie vom kleinen Hirne (p. 36. 53 sq.). — Die Lähmung hat nach den pathologischen Beobachtungen (§. 721.) um ein Bedeutendes häufiger im Hirnstamme, als im Mantel ihren Grund; bey Krämpfen ist der Unterschied nicht so groß, da sie häufig von der Reizung sensibler Theile herrühren, die in keiner nähern Beziehung zur Bewegung stehn.

§. 727. Was die Relation der Bewegungen betrifft, so müssen wir hier dasselbe Verhältniß finden, welches zwischen Gemeingefühl (§. 723) und vollständiger Wahrnehmung mit Bewußtseyn (§. 724) in Beziehung auf Hirnstamm und Mantel von uns anerkannt worden ist. Der bewußtlose Trieb, welcher als eine bewußtlose Reaction auf Erregung des

Gemeingefühle erscheint, und in dem Athmungsbewegungen, so wie in den ungewöhnlichen Stellungen sich äussert, hat seinen Sitz im Hirnstamm; der Wille hingegen, der mit Bewusstsein wirkt, von Vorstellungen ausgeht und auf Urtheile sich gründet, wirkt im Mantel. Manche Hemicephalen, bey welchen bloß der Hirnstamm entwickelt ist, äussern den dem Gemeingefühle entsprechenden Trieb; schreien, schlucken, was man ihnen einflösst, und halten fest, was man ihnen in die Hände giebt (z. B. Nr. 296); — Wir finden hier nun auch das organische Verhältniss: vermittelst dessen die Ausführung des bewussten Willens bewußtlos wird (§. 596 — 602). Nämlich alle normale Muskelbewegung kann nur durch den Hirnstamm bestimmt werden; dieser wirkt für sich, pflanzlich und bewußtlos wird aber der Durchgangspunct für den Impuls des im Mantel wirkenden bewussten Willens; bey solchem Eintritte in das Gebiet des Bewußtlosen verliert nun der Impuls seinen früheren Charakter, und der Hirnstamm vollzieht auf pflanzliche Weise, wozu er vom Mantel ausgeregt worden ist.

III. Markstamm und Stammganglien.

§. 708. Der Hirnstamm schließt einen neuen Gegensatz in sich in seinem Marke und seinen Ganglien. Die Letztern sind die kuglich angeschwollenen obern Enden der Rückenmarks, im Gegensatze zu dessen unfrem, spitzem Ende, welches in leitenden Fäden erblickt. Sie sind Sammlungs- und Concentrationspuncte: die Leitung wird in ihrer grauen Masse theils unterbrochen; indem Markfasern darin endigen; theils beschränkt; indem die Fasern vereinzelt hindurchlaufen (§. 716). Ihren allgemeinen Charakter näher zu bestimmen, ist schwierig; da sie nicht alle gleiche Bedeutung haben können, indem sie in ihrer Lage, Größe, Gestalt, Farbe und Textur verschieden sind. Wenn wir es uns überhaupt nicht verhehlen; daß unsere aus der Mehrheit der pathologischen Beobachtungen gezogenen Folgerungen an und für sich keinesweges zuverlässig sind (§. 657), so gestehen wir es uns, daß in Beziehung auf die Ganglien der vor uns liegende Stoff aus der pathologischen Anatomie vorzüglich unvollkommen ist, da wir von Abnormitäten der Oliven, der Ciliarkörper, der Linsenganglien und der Mandelkerne keine Beobachtungen haben, und nur von Abnormitäten der Vierhügel, Sehhügel und Streifenhügel wissen. In Beziehung auf diese Ganglien geben aber die obigen Tabellen folgende Resultate:

Symptome:	Ganglien.		Verhältniß der Ganglien.	
	Zahl der Fälle unter 141.	= 1:	zum Stamme	zum Mantel
Blindheit	34	4,14	1,88	3,18
Anisese	10	12,10	1,87	2,24
Hemiplegie	61	2,31	1,70	2,50
Apoplexie	70	1,01	1,62	2,89
Affect des Gefühls	14	10,97	1,34	1,40
Gastrische Zufälle	2	70,50	1,31	2,08
Taubheit	5	28,20	1,09	1,12
Verrücktheit	9	15,66	1,01	1,49
Betäubung	41	3,45	1,00	0,85
Affect. d. Harnsystems	5	28,20	0,93	1,98
Schmerz	40	3,52	0,86	0,84
Delirium	16	8,81	0,82	0,73
Schwindel	3	47,00	0,69	0,72
Blödsinn	9	15,66	0,61	0,66
Erbrechen	7	20,14	0,59	0,43
Affect i. Genitalien	1	141,00	0,55	0,64
Abn. Darmausleerung	3	47,00	0,38	0,46
Abmagerung	2	70,50	0,24	0,45
Krampf	6	24,06	0,12	0,14

§. 729. Die Hirnganglien müssen, da sich die Sinnesnerven in ihnen endigen; die erste Perception des sinnlichen Eindrucks vermitteln; man hat sie daher als innere Sinnesorgane anerkannt und Sinnes Hügel genannt. Ihre Größe entspricht der Stärke ihrer Nerven und der Schärfe der ihnen entsprechenden Sinne; ihre Abnormitäten sind häufiger, als die des Stamms und des Mantels mit Blindheit und Taubheit vergesellschaftet (§. 728.). — Indes gilt dies zuvörderst nicht von allen Ganglien: die Oliven, die Ciliarkörper, die Streifen Hügel, die Linsenganglien und die Mandelganglien zeigen keine unmittelbare Verbindung mit Nerven. Unter denen aber, welche Sinnesnerven aufnehmen, ist eine auffallende Ungleichheit der Größe: die Ganglien für die Hörnerven sind kaum bemerkbare Hügelchen; die Sehhügel müssen bey ihrer Größe, und da die Ausbreitung der Sehnerven in ihnen den kleinsten Theil derselben ausmacht, noch eine andre Beziehung haben. Auch kommen Fälle vor, wo bey Atrophie der Sehhügel und Streifen Hügel (Nr. 381. 395) die äussere Sinnes thätigkeit ihre Normalität behauptet.

§. 730. Wir dürfen ferner annehmen, daß in den Hirnganglien das Gemeingefühl zu Stande gebracht wird und der ihm entsprechende Trieb erwacht. Das Rückenmark hat durch Aufnahme seiner und der Rumpfnerven die Eindrücke von den einzelnen Theilen des Rumpfs gesammelt, seine Strömungen brechen sich in der grauen Substanz der Ganglien, werden hier innerlich aufgenommen zum Ganzen des Selbstgefühls, und der Reflex davon tritt als Instinct hervor. — Betrachten wir z. B. die Riechganglien in der

Thierreihe, so finden wir diese Ansicht bestätigt. Bey den Fischen machen sie auf der untersten Stufe den größten Theil des Gehirns aus, vertreten die Stelle der Hemisphären, und bestehen aus mehreren Kugelpaaren; im Aufsteigen der Bildung vermindert sich die Zahl derselben, es wird ein einziges Paar, und dies nimmt allmählig den Charakter von Hemisphären an. Diese sind bey Amphibien und Vögeln entwickelt, aber die Riechganglien machen noch ihren vordersten Theil aus. Bey den niedern Säugethieren sind die Ganglien groß, mit dem übrigen Gehirne verwachsen und einen großen Theil derselben ausmachend; bey höhern Säugethieren, so wie bey dem menschlichen Embryo und dem Kinde, fangen sie an, vom Gehirne sich abzusecheiden durch die Riechstreifen, aber sie ragen noch meist über das Gehirn hinaus und sind noch von bedeutender Größe. Dies verliert sich erst auf der höhern Entwicklungsstufe des Menschen. Wir sehen also, daß diese Ganglien in demselben Maße zurücktreten und der Mantel vorherrschend wird, in welchem das Uebergewicht von Gemeingefühl und Instinct beschränkt und die niedere Kraft der Seele der höhern untergeordnet wird. — Einige pathologische Beobachtungen scheinen auf den Zusammenhang mit dem Gemeingefühle hinzudeuten: bey Affection der Vierhügel (Nr. 709. 930) war dasselbe erhöht; bey Extirpation (Nr. 197) und Verhärtung (Nr. 857) der Schlägel und Streifenbügel war es vermindert. — Uebrigens zeigten die Ganglien selbst (nach §. 728.) etwas weniger Empfindlichkeit, als Stamm und Mantel.

§. 751. Wenn in den Ganglien die erste Perception der Sinnesindrücke vor sich geht, so wird auch die Wiederholung der gleichen Thätigkeit oder die Erinnerung des Empfundnen in ihnen Statt finden. Nach der obigen Uebersicht (§. 728.) haben die Ganglien mehr Einfluß auf das Gedächtniß, als Stamm und Mantel. Blindgewordene träumen zuletzt nicht mehr von sichtbaren Gegenständen, hängt dies mit der Atrophie der Schlägel zusammen, welche bey der Blindheit einzutreten pflegt? (Marshal (p. 168) fand dagegen bey einem Manne, der blödsinnig geworden war, aber ein gutes Gedächtniß behalten hatte, die Ganglien sehr hervorragend, die Rindwürste aber flach, die Furchen meist verwischt. — Abnormitäten der Ganglien bewirken (nach §. 728.) häufiger, als die des Mantels, Verrücktheit, Affection des Gefühls und Apoplexie, seltner hingegen Betäubung, Delirium und Blödsinn. —

§. 752. Der nächste Impuls zu willkührlichen Bewegungen scheint ebenfalls von den Ganglien auszugehen; nach obiger Uebersicht (§. 728.) verursacht ihre Abnormität häufiger, als die des Stamms, und noch häufiger, als die des Mantels, Hemiplegie; diese ist aber bloß beyspielsweise aufgeführt, denn da ihre Abnormitäten in verschiedenen Gliedern gleichzeitig Lähmung verursachen, so übertrifft, wenn wir die XXII — XXVIII Tabelle zusammennehmen, die Frequenz der von ihnen ausgehenden Lähmungen selbst die Frequenz ihrer Abnormitäten. Wenn sie seltner Krämpfe erregen, so steht dies vielleicht in Beziehung zu ihrer geringern Empfindlichkeit. — Im Ganzen wirken sie nach jener Uebersicht schwächer, als der Stamm auf die Rumpfmuskelgewölde; nur gastrische Zufälle bewirken sie häufiger. Dagegen hat die Abnormität des Mantels mit Erbrechen, Abmagerung und Affection der Geschlechtsorgane häufiger zur Folge, als die der Ganglien.

§. 735. Die Ganglien erscheinen überhaupt als Mittelglieder zwischen Stamm und Mantel, so daß sie in psychischer Hinsicht jenen beherrschen und diesem untergeordnet sind. Denn sie sind die Brennpuncte der Strahlungen für den Mantel. In der aufsteigenden Thierreihe nehmen sie an der Bildung desselben durch das Ausstrahlen von Fasern immer mehr Antheil: so bestehen die Sebkugeln bey Fischen, Amphibien und Vögeln für sich ohne Beziehung auf Hemisphären; bey den niedern Säugethieren geben die unbedeckten Vierhügel und Sebhügel weniger Faserung in den Mantel, als bey höhern; und bey dem Menschen mehr, als bey den Thieren, weshalb auch bey ihm die Hinterlappen stärker entwickelt sind. In demselben Maasse aber, als die Ganglien mehr in den Mantel einstrahlen, nehmen in der aufsteigenden Thierreihe Erstere ab und Letztere zu (Wenzel *cerebr.* p. 259. Carus *Nervensystem* S. 240, 255).

IV. Stammstrahlung und Belegungssystem.

§. 734. Der Mantel zerfällt wieder in die Stammstrahlung und des Belegungssystem. — Aus dem Hirnstamme treten zweyerley seitliche Entwicklungen hervor: eine periphere in die Nerven; und eine centrale in den Mantel, weshalb denn auch die Fasern in diesem von manchen ältern Anatomen nicht ganz unpassend Nerven genannt worden sind. Wie nun diese letztere Strahlung über den Hirnstamm und seine Ganglien sich erhebt, so muß auch die mit ihr in Verkehr stehende Seelenthätigkeit über die durch die Ganglien vermittelte erste sinnliche Rührung hinausgehen und in einer höhern Function sich lossern, welche nicht so unmittelbar von dem eignen Leibe und von der Aussenwelt modificirt wird, sondern mehr eigenmächtig und selbstständig ist. Nun ist aber die Stammstrahlung nichts als eine Entwicklung der Ganglien: folglich muß ihre Thätigkeit auch nur eine höhere Entfaltung und weitere Ausbildung der in den Ganglien gegebenen Sensation seyn, mit ihr Verwandtschaft haben und sich an sie anschließen. An die sinnliche Rührung schließt sich aber das Vermögen an, den sinnlichen Stoff zu einem Gesamthilde aufzufassen, während dabey die einzelnen Momente geschieden und gesondert werden; wo nicht bloße Affection Statt findet, sondern das Aeußere durch Selbstthätigkeit aufgelöst wird; wo es durch die geistige Bildungskraft der Seele zu bestimmter Gestaltung kommt, kurz, das Vermögen der Vorstellungen. — Die Strahlung ist eine fächerförmige Entfaltung: wenn ihre Thätigkeit von den Ganglien ausgeht, so wird der in ihnen gewonnene sinnliche Stoff in seine Elemente aufgelöst, und gleich der Lichtmasse in Strahlen zerlegt. Aber die Strahlung bildet ein Ganzes, und die Spitzen ihrer Fasern tauchen in die gemeinsame Rinde, welche das Getrennte wieder in Einheit aufnimmt; der besondre Eindruck wird zu einem allgemeinen, und das Specifische des einzelnen Sinnes erlischt. So ist denn Beides gegeben, Sonderung und Einheit, und somit steht die Vorstellung in ihrer Klarheit da. Wie die Strahlung von den Ganglien ausgeht, die Grundlage der Hemisphären abgibt und durch den ganzen Mantel sich erstreckt, so beginnt alles Seelenleben mit Sinnenthätigkeit, und so ist die Vorstellung der durch dasselbe in seiner Gesamtheit sich verbrauchende Stamm. — Wenn die Sinnesorgane Saugrüssel sind, welche den Stoff für das innre Leben einziehen, und wenn die Ganglien die ersten Wege abgeben, welche demselben sich entgegen stellen und ihn in ein Inneres,

dem Organismus Entsprechendes, in Chylus verwandeln, so sind die Strahlungen den zweyten Wegen zu vergleichen, in welchen die dort begonnene Aneignung vollendet, und ein dem Ganzen Gleiches, Blut, geschaffen wird.

§. 735. Wenn bey der Reaction die Thätigkeit in umgekehrter Richtung wirkt, und von der Peripherie der Strahlungen convergirend gegen die Ganglien sich wendet, durch diese aber mittels der Nerven den Leib bestimmt, so müssen Bewegungen hervortreten; welche von Vorstellungen ausgehn. Findt in den Ganglien bloß die Reaction auf den sinnlichen Kitzel, und der bewußtlose Trieb Statt, so werden sie hier dem Höhern, dem Bewußtseyn, untergeordnet: sie hören auf, eigenmächtig als bloßer Instinct, zu wirken; indem sie Durchgangspuncte für die Thätigkeit der Strahlungen werden; es ist der von bestimmten Vorstellungen ausgehende Wille, der nun die Nerven des Hirnstammes durchdringt und die der Vorstellung entsprechenden Bewegungen in den Muskeln hervorbringt. Die Strahlung kann aber nur mittels des Hirnstammes des hewürken; da nun in diesem der Instinct, der bewußtlose Trieb, das Pflanzliche der psychischen Reaction wirkt, so muß bey solchem Durchgange der Thätigkeit der Strahlungen durch den Hirnstamm auch die Klarheit der Vorstellung erlöschen und das unfreye, pflanzliche Wirken sich der Willensäußerung beymischen: wir erkennen aber wirklich, daß nur das eigentliche Wollen oder der Impuls zu unsern Bewegungen frey ist, das Vollbringen dagegen der pflanzlichen Wirkksamkeit überlassen bleibt (§. 566.).

§. 736. Die Strahlung ist also das Organ sinnlicher Vorstellung und sinnlichen Willens. Sie ist eine Wiederholung und Potenzirung des Hirnstammes im Mantel, wie die Vorstellung eine weitere Entwicklung und höhere Steigerung der sinnlichen Rührung, der Wille aber ein sich klar gewordener Trieb ist. Was im Hirnstamme die Markstränge sind, ist hier die markige Strahlung, und was dort die Ganglien sind, ist hier die Rinde. Graue und weiße Substanz wirken immer in und mit einander: bey der Vorstellung ist das eigentlich Thätige die Rinde, welche als ein Allgemeines die Einzelheiten in sich aufnimmt (§. 726.), aber um diese in ihren bestimmten Beziehungen zu empfangen, der Markstrahlung bedarf; Letztere ist das eigentlich Thätige bey dem Willen, indem sie leitet und überträgt, aber das Erregende dazu liegt in der Rinde, und es nimmt bey diesem Acte die Thätigkeit die bestimmte Richtung vom Allgemeinen zum Besondern an.

§. 737. Je zahlreicher die Fasern der Strahlung sind; um so mehr wird der sinnliche Eindruck zerlegt; um so umfassender wird das Gesamtbild, welches sich in der Rinde gestaltet; um so größer wird die Fläche, welche bey dem Wollen bestimmend durch die Ganglien auf Hirnstamm und Nerven wirkt. Je länger die Fasern der Strahlung sind; um so mehr wird die Rinde den Ganglien entrückt und in einen schürfern Gegensatz zu ihr gestellt; um so bestimmter scheidet sich die Vorstellung von der sinnlichen Rührung; um so mehr wird das Gefühl über das leibliche Gemeingefühl hervorgehoben und zu einem Gefühle des Ichs; um so mehr wird der Wille von dem eigenen Ich und von der Vorstellung bestimmt; mit einem Worte, um so mehr wird das Aeußere verarbeitet und durch das eigentlich Innere bestimmt. Es gilt vom ganzen Gehirne, was Cuvier (*Bulletin de la société philomatique. 1. part. 2. 19*) von den vordern Lappen sagt: die Thiere sind um so verständiger, je mehr die Fortsetzungen der Streifenhügel in die He-

isphären entwickelt sind; bey dem Menschen sind sie am dicksten und am ausgebreitetsten. Bey den Thieren ist die Strahlung kürzer und schmaler: die äussere Perception überwiegt; der Gegensatz zwischen Ganglien und Rinde ist geringer, und die Thätigkeit schließt von jenen zu dieser, die ihnen so nahe liegt, hindurch; die Ganglien überwiegen, und mit ihnen ist mehr Gemeingefühl, als Selbstbewußtseyn, mehr Beziehung der Objecte auf den eigenen Körper, als reine Vorstellung derselben, mehr blinder Trieb, als eigentlicher Wille gegeben.

§. 738. Zur Strahlung des Hirnstamms kommt das Belegungssystem hinzu, um mit ihr gemeinschaftlich das ganze Gehirn darzustellen. Es besteht aus Fasern, welche dem Gebirne eigenthümlich sind, in ihm Anfang und Ende haben, und in keiner Verbindung mit dem Leibe und der Aussenwelt stehn. Wenn nun die Stammstrahlung die Beziehung der Seele zur Aussenwelt, die sinnliche Vorstellung und den leiblichen Willen ausdrückt, so muß das Belegungssystem die innere, eigenmächtige Thätigkeit der Seele, den innern Sinn und den innern Willen bezeichnen. Da es das eigentlich Centrale des sensiblen Systems, das, was nicht über die Centralmasse hinaus reicht, also das Gehirn im Gehirn ist, so muß auch das eigentlich freye und selbstständige Seelenleben hier seinen Sitz haben. — Das Belegungssystem liegt sich überall an die Strahlung des Hirnstamms an, gewinnt an ihr eine feste Haltung, wie an einem Gerippe, welches mit lebendiger Masse bekleidet wird. Es ist hier Anlage und Contiguität, so daß überall ein Glied auf das andre wirken kann. So tritt die eigenmächtige Thätigkeit der Seele, durch die sinnlichen Antriebe geweckt, hervor; indem ihr die durch die sinnliche Vorstellung empfangenen geläuterten Stoffe als Grundlage dienen, und umgekehrt wirkt sie hinwiederum auf das Leibliche zurück, durch die Strahlung Handlungen ausführend, welche ihrem Zwecke entsprechen. — Das Belegungssystem besteht aus sprenkelartig gebogenen Markfasern, welche an beyden Enden in Rinde tauchen: es sind also hier zwey Pole in eben so vielen Puncten des Organs der psychischen Bildung, und der Conflict derselben wird durch die dazwischen liegende, leitende Markfasern vermittelt. — Was wir hier morphologisch abgeleitet haben, finden wir durch Erfahrungsgründe bestätigt (§. 739—741.).

§. 739. Das Niedere ist in der Erscheinungswelt der Zeitfolge nach überall das Frühere. Nun ist der Hirnmantel bey dem Embryo zuerst eine dünnwandige Blase, welche bloß aus Stammstrahlung besteht; erst im sechsten Monate bildet sich nach Tiedemann (Gehirn S. 151) die Belegungsmasse, welche er peripherische Strahlung nennt, indem sie gleichsam schichtweise auf die Stammstrahlung aufgetragen wird und als eine auf jener senkrecht stehende Faserrang erscheint; eben so bildet sich die Brücke, das Gewölbe und der Balken später. Mithin zeigt sich das Belegungssystem als das Höhere, als das spätere Ziel der Bildung.

§. 740. Je mehr dasselbe ausgebildet ist, um so lebendiger ist das Ganze, um so mehr bekommt das Hirnleben Eigenmächtigkeit und Uebergewicht über den Hirnstamm. Es gilt von diesem ganzen Systeme, was Treviranus (Biologie VI. S. 84) von den zu ihm gehörigen Commissuren aussagt, daß es nämlich in der aufsteigenden Thierreihe vorgerückt und vervollständigt wird. Beym Menschen ist es am stärksten entwickelt; bey ihm finden wir unzählige Fasern desselben, die durch ihre beyderseitigen Enden in Spannung

stehn, und dem Ganzen mittels der vielfältigen Partialspannungen eine kraftvolle Totalspannung geben müssen.

§. 741. Nach der XXXV. Tabelle ist das Verhältniß des Mantels zum Belegungssystem folgendes:

19,34 Erbrechen,	Verstopfung,	Durchfall,	unwillkürliche Ausleerung,	gastroische Zufälle,
4,61 Blindheit.				
2,00 Lähmung.				
1,70 Taubheit.				
1,52 Apoplexie.				
1,22 Amnesia.				
1,18 Schwindel.				
1,15 Betäubung.				
1,05 Schmerz.				
1,00 Krampf.				
0,94 Affection des Harnsystems.				
0,73 Delirium.				
0,65 Abmagerung.				
0,60 Blödsinn.				
0,51 Verrücktheit.				
0,47 Affection des Gefühls.				
0,37 Affection der Genitalien.				

Wir sehen hier, daß die genannten Belegungsorgane weniger Einfluss auf den Magen, den Darmcanal und die Lungen, haben, als der übrige Mantel sammt seiner Belegungsmasse, ja ihre Abnormitäten treffen so selten mit einer Störung dieser plastischen Functionen zusammen, daß wir diese für zufällig beygestellt erklären können. Dasselbe gilt von der Lähmung und der Störung der äußern Sinnesthätigkeit. Schon Stenson (*Magetus II. p. 98*) bemerkte, daß die vereinigenden Theile (Gewölbe, Scheidewand und Balken) zur Empfindung und Bewegung nicht schlechthin erfordert werden, da sie bey einem Kalbe fehlten, welches mehrere Wochen mit Empfindung und Bewegung lebte, und (Lallemand (*I. p. 278*) zählt fünf Fälle von Hirnentzündung auf, wo keine Lähmung eintrat, und wo man fand, daß die Entzündung allein auf die genannten Gebilde sich beschränkte. Dagegen verursachen Abnormitäten derselben häufigen Krämpfe; sie fanden auch in jenen 5 Fällen Statt, und Lallemand bemerkt, daß sie hier durch eine Fortpflanzung der Reizung entstehen können, wie bey der Meningitis. Seltner, als der Mantel, verursacht das Belegungssystem nach unsrer Uebersicht Apoplexie, Betäubung und Gedächtnißschwäche; dagegen häufiger Delirium, Blödsinn, Affection des Gefühls und Verrücktheit.

V. Längensystem und Quersystem.

§. 742. Das Belegungssystem ist das Organ der höhern Seelenthätigkeit. Da es aber die Thiere mit dem Menschen gemein haben, wiewohl es bey ihnen unvollkommener ist,

so muß es der Sitz derjenigen höhern Seelenthätigkeiten seyn, welche schon bey Thieren sich innern; und in Hinsicht auf welche der Mensch bloß quantitativ von den Thieren sich unterscheidet: dies sind: dies ist aber die Phantasie, der Verstand, das Gefühl der Verhältnisse und die Willkühr, also die Glieder der zweyten psychischen Sphäre. Für die höchsten, dem Menschen ausschließlich zukommenden Seelenthätigkeiten giebt es keine Organe: denn das Organ überhaupt ist die Fixirung im Endlichen; jene Thätigkeiten aber haben bloß das Unendliche zum Gegenstande. Das Unendliche kann nicht als Einzelnes Reales hervortreten; da es aber dem Endlichen zum Grunde liegt, so kann es in der Idee erscheinen, wenn Letzteres zu seiner größten Höhe ausgebildet ist. Mit der klärern Vorstellung und dem schärfern Verstande entwickelt sich bey dem Menschen die Vernunft; wiewohl, als ob sie das Erzeugniß oder das Resultat jener niedern Seelenthätigkeiten wäre, sondern weil sie ihnen als das wahrhaft Ursprüngliche zum Grunde liegt, und da, wo sie in ihrer vollen Kraft wirken, sich selbst wieder findet, so wie die Bedeutung an einem Kunstwerke nicht selbst als Einzelnes, sondern nur in der Gesamtheit der Einzelheiten, weil diese eben von ihr ausgegangen sind, sich offenbart.

§. 743. Das Belegungssystem scheidet sich in den Gegensatz des Längen- und Breiten- oder Quersystems: Erstes erstreckt sich parallel der Axe des Gehirns, in die Länge von vorne nach hinten. Wie die Länge überall die Vielheit und den Gegensatz ausdrückt, so auch das Gehirn in dieser Richtung verschieden auf jedem Punkte seines Durchmessers von vorne nach hinten zeigt es Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten. So breitet sich denn das Längensystem über mannichfaltige, ungleichartige Gebilde aus, und bringt sie in Zusammenhang: jede seiner Fasern berührt mit ihren beyden Enden zwey heterogene Hirtheile. — Das Breitenystem kreuzt sich mit ihm, und bildet dadurch den entschiedensten Gegensatz zu ihm. Die Breite überhaupt bezeichnet die Uebereinstimmung des auseinander Liegenden, und namentlich ist die Symmetrie an einem mannichfaltigen Formen enthaltenden Ganzen der Ausdruck der Uebereinstimmung zwischen dem Seitlichen, der Einheit des in gleicher Höhe und Länge Liegenden, aber Geschiedenen. So geht denn das Breitenystem quer über die Mittellinie herüber, um die gleichartigen seitlichen Gebilde zu spannen und zu vereinen.

§. 744. Beyde Systeme verhalten sich also zu einander wie Vielheit und Einheit; da nun in der zweyten psychischen Sphäre, welcher sie angehören, die Vielheit durch Phantasie und Verhältnißgefühl, die Einheit aber durch Verstand und Willkühr sich ausspricht, so ist dadurch die Bedeutung beyder Systeme gefunden. Die Phantasie geht auf Mannichfaltigkeit aus, indem sie das Verschiedene, Ungleichartige zu neuen Bildungen combinirt, und ist ideell dasselbe, was das Längensystem räumlich darstellt. Der Verstand hingegen faßt bey dem Begreifen, Urtheilen und Schließen die zusammenstimmenden Momente in Einheit auf, erkennt die innere Uebereinstimmung des in der Erscheinung Getrennten, und findet sein leibliches Gegenbild im Breitenysteme; wie er durch Begründung der Vorstellungen Alles deutlicher macht, so bindet, begränzt und concentrirt das Breitenystem die vagen Strahlungen des Hirnstammes.

§. 745. Die Phantasie ist in ihrem Wirken buntfarbig und vielgestaltet, der Verstand einförmig und sichtlich: so erscheint das Längensystem in wechselndem Spiele der

Formen, das Breitensystem einfach und gediegen; Vergleichen wir z. B. Gewölbe und Balken mit einander; so erscheint uns Erstres in seinen phantastischen Formen als die Poesie des Gehirns; an der Oberfläche eines Stammganglions entspringend, geht es, dasselbe durchdringend, abwärts zur untern Oberfläche des Gehirns, taucht hier aus demselben hervor, beugt sich um, löst zurück, tritt aus dem Hirnstamme von Neuem heraus, steigt als schlankes Säulenpaar, welches erst einander sich nähert, dann von einander weicht, in zierlichem Bogen aufwärts, wendet sich nach hinten, senkt sich herab, beugt sich hier nach vorne, und stellt einen aus grauer Substanz und Mark vielfältig gemischten Theil, das bunteste Hirngebilde, dar: Einfacher, aber stärker, strenger und gediegener breitet sich der Balken über dem Gewölbe aus.

§. 746. Die Phantasia ist warm und lebhaft; organisch mit dem Blutlaufe verknüpft, wird sie aufgeregt durch den raschern Wechsels des Bluts, welcher eine größere Spannung im Gehirne hervorbringt. Der Verstand hingegen ist kühl und bedächtig; jede stürmische Bewegung ist ihm feindselig; nur eine mäßige Spannung, nur eine gelinde Wärme ist die Bedingung seiner freyen, eigenmächtigen Thätigkeit. — So ist nun auch das Längensystem mit dem Blutgefäßen enger verbunden; wo es sich durch die Hirnböhlen zieht, sind die Gefäßgeflechte an dasselbe geknüpft; es muß, indem es reger wirkt, mehr Blut in die Gefäßgeflechte ziehn, ungefähr wie die verstärkte Thätigkeit der Netzhaut bey scharfem Sehen eine Congestion in der Aderhaut und ihren Fortsätzen veranlaßt; und es muß umgekehrt durch den raschern, kräftigern Blutlauf in den Gefäßgeflechten selbst zu höherer Thätigkeit erregt werden. Das Breitensystem hingegen steht in keiner besondern Beziehung zum Gefäßsysteme; die stärkern Arterienzweige liegen mehr oberhalb des Balkens, wo sie Raum genug finden, bey ihrer Diastole sich nach oben auszudehnen, ohne den Balken zu erschüttern, und sie verzweigen sich bald, um zum Mantel zu gelangen.

§. 747. Die Phantasia ist dem Gefühle näher verwandt, und stimmt mit ihm überein; sie wird durch dasselbe aufgeregt, und jede ihrer Thätigkeiten wirkt auf dasselbe; das Gefühl aber steht ebenfalls mit dem Blatsysteme in näherer Beziehung. Die Willkühr hängt mehr mit dem Verstande zusammen, denn sie wird durch Urtheile bestimmt, und so wird sie auch durch Unruhe im Blute nur gestört, indem dann der vom sinnlichen Gefühle ausgehende Trieb mehr hervortritt. Somit glauben wir denn; Grund zu haben für die Annahme, daß das Verhältnißgefühl mit der Phantasia im Längensysteme, die Willkühr aber mit dem Verstande im Breitensysteme wirkt.

§. 748. Phantasia und Gefühl der Verhältnisse stehen in einer nähern Beziehung zur Sinnlichkeit, und werden durch die äußern Eindrücke mehr unmittelbar erregt; dagegen ruhen Verstand und Willkühr auf klaren Vorstellungen. Dem entsprechend steht das Längensystem mit den Stammganglien, als dem Organe der Sensation und des sinnlichen Gefühls in einer nahen Beziehung, während das Breitensystem vielmehr an die Strahlungen, als das Organ der Vorstellungen sich anschließt; jenes ist mehr eine Zuthat zu den Ganglien, dieses zu den Strahlungen. Die Phantasia mit dem Verhältnißgefühl steht daher mit dem Hirnstamme in Consensus, beschleunigt dadurch Athmen und Kreislauf, wirkt überhaupt stark auf den Körper ein, und wird durch äußere Stoffe am meisten afficirt. Verstand und Willkühr stehen mehr in Antagonismus zu demselben; bey dem Nach-

denken pausirt der Hirnstamm, die Sinnenthätigkeit, und die Bewegung, das Athmen und die Verdauung werden schwächer;

§. 749. Die Commissuren oder die Glieder des Quersystems bilden sich in der Thierreihe und im Embryo am spätesten, und fehlen häufiger, als andre Hirntheile (Meckels Anatomie III. S. 569); dies sind Thatsachen, welche offenbar beweisen, daß sie die höchsten Organe des psychischen Lebens sind. Während des frühesten Embryonalens ist noch keine Spur von ihnen zu finden (Meckels Archiv. I. S. 56), und geraume Zeit dauert es, ehe sie sich vollkommen ausbilden (Carnus Nervensyst. S. 82.). Die wichtigsten Glieder des Quersystems, Brücke und Balken, sind nur den Säugthieren eigen, und nur bey dem Menschen vollkommen entwickelt.

§. 750. Die Bedeutung der Commissuren wurde von einigen Physiologen mit mehr oder weniger Klarheit erkannt; so sollen sie nach Willis (*cerebr. a. r. 3. p. 63*) die leere oder verworrene Vervielfältigung der Hirnthätigkeiten hindern; nach Mayer (Gehirn S. 45) zur Verbindung der Eindrücke und zur Vereinigung der einzelnen Thätigkeiten; und nach Gall (Untersuchungen S. 68) zur gegenseitigen Verknüpfung der paarigen Organe dienen. Dagegen müssen wir es für falsche Deutungen erklären, wenn man einen Zusammenhang derselben mit Nervenansprüngen vermuthete (Haller *elem. IF. p. 399*), da ein solcher durchaus nicht zu finden ist; oder wenn man (ebendaa.) meynete, sie seyen dazu bestimmt, die Vertretung eines kranken Organs durch ein gesundes möglich zu machen, da wir von solchen Supplementarorganen oder angeborenen Krücken nichts wissen. Morgagni (XIII, 21) Zinn (p. 442) und Haller (*elem. IF. p. 400*) suchen in ihnen den Grund, daß bey Verletzung der einen Seite des Gehirns die andre Seite des Körpers gelähmt wird, und daß wir oft beyde Augen und Glieder zugleich bewegen; allein 1) stehen sie nur in Contiguität mit den Stammstrahlungen; 2) wird die Lähmung der entgegengesetzten Seite des Körpers dadurch gar nicht erklärt, denn, da sie quer herüber gehn, so könnte zwar durch sie die entgegengesetzte Seite des Gehirns consensual, aber nicht stärker, als die, welche der wirkliche Sitz der Abnormalität ist, afficirt werden; 3) finden sich auch Querfasern am Rückenmarke, und doch werden bey Abnormalitäten desselben nur die Glieder der entsprechenden, nicht der entgegengesetzten Seite afficirt. Reil (Archiv XI. S. 112) vermuthet, daß die Commissuren nur Conductoren, nicht Motoren der Erregbarkeit seyn, da sie keine große Substanz hätten; aber sie haben diese in der Rinde. Wenn endlich Carnus (Nervensystem S. 247) behauptet, sie verhielten sich zum Hirnstamme wie Nerven, wie periphere Glieder zum Centralen, so liegt offenbar eine irrige Ansicht von dem, was Centrum ist, zum Grunde, und man muß vermuthen, daß bloß die äussere Aehnlichkeit der vordern Commissur mit einem Nerven diese Behauptung veranlaßt hat.

YL. Centrale und periphere Oberfläche.

§. 751. Die centrale Oberfläche bildet sich da, wo der Hirnstamm sein Ende und seine höchste Entwicklung erreicht, indem er in eigenthümliche Organe, die Ganglien, sich erhebt, von welchen dann der Mantel ausgeht; die periphere Oberfläche aber nimmt so wohl die letzten Enden der Stammstrahlung, als die beyderseitigen Enden der Belegungsfasern auf, und ist so das Ende des Mantels. Beyde Flächen sind also Culmi-

nationspunkte: die centrale für das niedere Leben der Seele, und für ihren Verkehr mit der Aussenwelt; die peripherische für das höhere, eigenthümliche, innere Leben der Seele. In den freyen Räumen, welche an diese Flächen angränzen, tritt die Plasticität stärker hervor, aber in ihrer Beziehung zum Hirnsystem.

§. 752. Die Höhlen entstehen durch innere Gegensatzung. Auf der untersten Stufe der Bildung ist die ganze Masse solid; so die Ganglien des Nervenrings bey wirbellosen Thieren, die vordern Hirnkugeln bey den meisten Fischen, und die Nervenganglien bey dem Menschen. Hierauf entstehen Höhlen im Rückenmark, in Stamganglien und in Nerven: so ist das Rückenmark hohl bey den Thieren und dem menschlichen Embryo; die Sehkugeln sind es bey Fischen, Amphibien und Vögeln, und die Riechkolben bey Säugethieren. Mit diesen Partialhöhlen ist auch das Partiale herrschend; bey dem Menschen tritt dies zurück und wird es dem Ganzen mehr untergeordnet, indem jene Höhlen verschwinden und nur an den Punkten des regsten Lebens eine Gesamthöhle übrig bleibt.

§. 753. Die Höhle wird bey ihrem ersten Erscheinen durch einen bloß allgemeinen Gegensatz, durch das Auseinanderweichen gleichartiger Wandungen gegeben; es entstehen Canäle oder Blasen, wie der Canal des Rückenmarks oder die Hirnkugeln der niedern Fische. Dann treten die Wände in besondern Gebilde hervor, welche in die Höhlen hinein ragen. Anfangs sind diese Vorrugungen nur einzeln und gering, und die Höhlen sind sehr groß: so bey Vögeln und Amphibien, in Vergleich mit den Säugethieren, und bey dem Embryo in Vergleich mit dem erwachsenen Menschen. Wie die Wände sich verdicken und die herein ragenden Gebilde sich vervielfältigen, wird der Durchmesser der Höhlen verengert. So erweitern sich umgekehrt die Höhlen krankhaft durch Atrophie des Gehirns ohne Ausdehnung durch Wasser (Haslam S. 46), so wie sie auf der andern Seite auch darum eng seyn können, weil der Hirnstamm sich nicht genug entwickelt und abgeschieden hat, und die Ganglien daher zu klein sind (Groding II. S. 399).

§. 754. Die Höhlen des menschlichen Gehirns sind also dadurch gegeben, daß einzelne Gebilde als eigenthümlich begründet, folglich als eigenmächtig und selbstständig sich behaupten und Gegensätze zu einander bilden. Indem die Strahlungen vom Hirnstamme, die Ganglien von einander, die Belegungsorgane vom Mantel und Hirnstamme sich abscheiden, ergeben sich die Höhlen, und diese wurden daher von Varoli, Willis (*cerebr. s. II. p. 55*) und Haller (*elem. JP. p. 401*) mit Recht für Folgen der Hirnbildung, für Lücken zwischen den Hirnorganen erklärt. Was aber durch das Leben gebildet ist, wirkt auch auf dasselbe zurück und dient demselben. Die Höhlenhaut ist der Sitz eines Bildungsherganges, da sie eine Fortsetzung der äussern plastischen Hülle ist, so vermittelt sie auch, wie diese an der peripherischen Fläche, die Ernährung und Absonderung, wie dies schon Monro (*p. 21*) und Tiedemann (Gehirn S. 162) anerkannten, und die Höhlen dienen in dieser Hinsicht zu Vergrößerung der Fläche der plastischen Hülle, und zu Erweiterung des Umkreises der Plasticität. Von den Arterien treten hier Zweige in die Hirnsubstanz, und Venen aus dieser sammeln sich hier in Stämme. Vorzüglich bezieht sich dies Verhältniß der Gefäße auf die Ganglien; da nun der Mantel von seiner peripherischen Fläche, das Rückenmark vom verlängerten Marke aus, und der Hirnstamm

von seinen Ganglien her vorzüglich seine Arterien erhält, so dürfen wir es als ein allgemeines Gesetz anerkennen, daß die sensibeln Centralorgane vornehmlich von dem Punkte ihrer höchsten Entwicklung aus mit Blut versehen werden.

§ 755. Der seröse Dunst, welchen die Höhlenhaut bildet, ist nichts Eigenhämliches, sondern auf dieselbe Weise gemischt und secernirt, wie in andern Räumen, und muß demnach auch gleiche Beziehung auf das Leben haben. 1) Er hält also den Gegensatz und die Geschiedenheit der einander berührenden Organe aufrecht, und verhütet die Verschmelzung und Verwachsung derselben; so erkannte schon Haller (*elem. IF. p. 43*), daß durch ihn Boden und Decke der Höhlen auseinander gehalten werden. 2) Im normalen Zustande ist das Serum dunstförmig expandirt. Littre (*ac. de Paris 1707. p. 166*) will gesehen haben, daß, wenn er eine kleine Oeffnung in die Höhlen machte und auf das Gehirn drückte, die Flamme eines davor gehaltenen Lichtes bewegt wurde. Die Richtigkeit dieser Beobachtung wollen wir dahin gestellt seyn lassen; zuverlässiger sind Arne-manns (S. 192 — 197) Beobachtungen. Wenn er bey Hunden große Stücke vom Mantel abgeschnitten hatte, oder in diesem ein Geschwür entstanden war, so fand er nach-mals die Höhlen erweitert. Der Mantel drängt sich also von innen nach aussen, wenn hier eine Lücke in ihm entstanden ist; folglich muß etwas Ausdehnendes, Spannendes in der Hirnhöhle vorhanden seyn, wodurch sie über das Normalmaas erweitert und der Mantel noch aussen gedrängt wird, wenn dieser an einer Stelle weniger Widerstand leistet. Diese dehnende Gewalt in den Höhlen mag in Verbindung mit der von den Arterien herrührenden Hirnbewegung das Entstehen der Hirnbrüche und Hirnswülmme bey Schädelwunden mit Zerzeugung der festen Hirnhaut bewirken. Dies Dehnende kann aber nichts Andres seyn, als der seröse Dunst. Dieser muß folglich die Wandungen der Höhlen in einem gespannten Zustande erhalten, wie schon Malpighi (*Mangetus II. p. 59*) annahm. Vermöge des verschiedenen Grades dieser Spannung kann nun der seröse Dunst allerdings auch die Thätigkeit der an den Höhlenwänden liegenden Organe modificiren, die Thätigkeit des Einen zum Andern leiten, und sie unter einander in Beziehung bringen, wie Wenzels (*cerebr. p. 79*) lehren. Nur geht Erhard (Hufelands Journal XIV. 2. St. S. 64. fgg.) zu weit, wenn er dies für das Wesentliche der Sensation ansieht. Er meynt, die Sinne müßten zum Behufe des Denkens unter einander in Verbindung stehen; diese Verbindung werde durch den Höhlendunst bewerkstelligt; mittels seiner Schwingung erzeuge jede Vibration eines Sinnesnerven das Bewußtseyn aller; sein Mangel an Elasticität bewürke Blödsinn, seine zu große Spannung erzeuge Raserey. Allein die verschiedenen Sinnesganglien sind schon im Hirnstamme vereint, und sie bedürfen ausserdem keines besondern Mittelgliedes; die durch den serösen Dunst hervorgebrachte Spannung bezieht sich also wohl nur auf den Grad der Regsamkeit der an den Höhlen liegenden Gebilde. 3) So wie der seröse Dunst überall die Bewegung der aneinander gelagerten Gebilde unterstützt, so mag er auch die Möglichkeit begründen, daß die Hirngebilde sich expandiren und bewegen können, daß namentlich bey der Hirnbewegung der Boden der Höhlen gegen die Decke ansteigen und so der Hirnstamm tiefer in den Mantel sich eintanzen kann.

§ 756. Irrige Ansichten mußten daraus entspringen, daß man die Hirnhöhlen nicht

als übrig bleibende, freye Räume, analog denen der scroßen Häute, zwischen Herz und Herzbeutel, zwischen Lungen und Brustwand, zwischen Baucheingeweiden und Bauchwand, sondern als Behälter eines eigenthümlich Lebendigen betrachtet. So stellt Dörlinger (S. 18) die Hirnhöhlen den Leibeshöhlen gleich, und behauptet, es gebe vier Höhlen für das pflanzliche Leben: die des kleinen Hirns, die Brust-Bauch- und Beckenhöhle; und eben so viele für das sensorielle Leben, nämlich die Höhle des großen Hirns, der Nase, des Mundes und des Kehlkopfs. Allein die Hirnhöhlen haben nicht fremdartige Wände und von denselben umschlossene Eingeweide, wie die Rumpfhöhle; noch empfangen sie von aussen her einen Stoff als Inhalt, den sie weiter verarbeiten und fortleiten, wie die aus Schleimhäuten gebildeten Höhlen. — Was das Nähere der Hypothesen über die Hirnhöhlen betrifft, so behauptete: 1) Galen (*de utilitate respir. c. 8. p. 225 sq*), da die Luft nicht, wie Erasistratus meynete, durch die Arterien in das Gehirn gelange, indem die Unterbindung der Carotiden das Bewußtseyn nicht aufhebe; da ferner (*de odoratus instrum. c. 6. p. 112*) bey dem Niesen Luft aus dem Gehirn komme, und (*c. 4. p. 111*) eingeogene Riechmittel ganz innen im Kopfe Empfindungen erregen und bey Schwere des Kopfs sich hülfreich bewiesen; da endlich das Gehirn überhaupt das Athmen erzeuge, um die Wärme des Herzens zu mäßigen: so müsse es auch selbstthätig; und durch eigne Bewegung ein- und ausathmen, um sich abzukühlen und um Schädliches auszustossen; die bey dem Durchgange durch das Riechbein erwärmte Luft (*de usu part. lib. VIII. c. 7. p. 148*) komme demnach in die Hirnhöhlen und werde mit Schleim von ihnen wieder ausgetrieben. Dem Galen folgend, behauptete Columbus (*lib. VIII. p. 191*), die Luft verweile eine Zeitlang in den Stirnhöhlen und Keilbeinhöhlen, ehe sie durch das Riechbein gehe; nach Aranzi (*c. 5. p. 46*) sollte sie auch in das Unterhorn kommen; nach Fracassati (*Mangelus II. p. 70*) sollte das Gehirn, als das eigentlich pneumatische Organ, wegen dessen das Athmen Bedürfnis sey, eine feinere Luft, als die Lungen, bekommen, und diese sollte nach Malpighi (*ibid. p. 59*) die Hirnfasern gespannt erhalten. Dagegen behauptete Riolan, sie gelange nicht in die Hirnhöhlen, sondern kühle nur die feste Hirnhaut ab, und nach Littre (*ac. de Paris 1707 p. 166*) sollte sie nicht von aussen kommen, sondern von Drüsen der Gefäßgeflechte secretirt werden, um die Höhlen ausgedehnt, das Serum darin flüssig, und das Gleichgewicht gegen die Luft zwischen der Gefäßhaut und der festen Hirnhaut zu erhalten, endlich in den Hirnanhang getrieben und von da dem venösen Blute beygemischt werden, um dessen Rückkehr zu befördern. — 2.) Indem man die Erscheinungen bey Verletzung des Hirnstamms und seiner Ganglien aus einer Störung des Inhalts der Hirnhöhlen erklärte, nahm man an, daß in diesen thierische Geister ihren Sitz hätten, welche aus Luft und Blut gebildet, und bey der Bewegung aus dem Gehirn in die Nerven getrieben würden. Galen, der diese Ansicht hatte (*de mil. respir. c. 5. p. 225 sqq. de Hipp. et Plat. lib. III. c. 8. p. 247*), nahm an, der Sitz der Seele sey in der Hirnsubstanz selbst, und die thierischen Geister in den Höhlen seyen bloß das erste Werkzeug derselben. Columbus (*lib. VIII. p. 191*), Piccolomini (*lib. F. lect. 3. p. 253. lect. 6. p. 269*), Vesal (*lib. VII. c. 6. p. 547*), Bartholin (*lib. III. c. 3. p. 326*) Descartes und Andre glaubten ebenfalls an eine Erzeugung der thierischen Geister in den Höhlen. Nach Vesling

(p. 217) sollten die Geister in der Hirnsubstanz durch die Luft in den Höhlen belebt werden, und nach Fracassati (*Mangetus II. p. 70*) sollte diese Luft mit dem Nervensaft sich mischen und ihm durch ihre Elasticität die Stärke geben, um bey Eindrücken erschüttert zu werden und Empfindung zu bewirken. Der seröse Dunst sollte nach Willis (*cor. c. 22. p. 57*) das Vehikel der in der Hirnsubstanz erzeugten Geister seyn und dann in die Höhlen gelangen, nach Viennensis (*c. 17. p. 110*), aber die zu schnelle Bewegung und das Entweichen der Geister hindern. — Bauhin und Wepfer, besonders aber Caspar Hoffmann (*comment. lib. VIII. p. 195 de thorace lib. II. p. 71*) widerlegten die Erzeugung und das Daseyn der thierischen Geister in den Höhlen; Willis (*cor. c. 11. p. 65*) hielt diese Geister für zu fein, als daß sie hier sich aufhalten könnten; Highmor (*lib. III. pars 1. c. 9. p. 330*) und Diemerbroeck (*lib. III. c. 10. p. 377*) beruften sich darauf, daß nicht jede Verletzung der Höhlen tödlich ist. — 3.) Wie die Araber und ihre Nachfolger die Seelenkräfte an die verschiedenen Hirnhöhlen vertheilt sich slachten, so nahm Massa. (*c. 34. fol. 75*) an, daß in Letztern überhaupt die Seelenkräfte ihren Sitz haben müßten, da hier die meisten thierischen Geister sich finden, und Landi (p. 56) suchte in den Höhlen den *seamus communis* oder das Wahrnehmungsvermögen. Sömmerring (vom Seelenorgane) lehrte, in den Höhlen sey das Centralende aller Nerven, mithin auch das Seelenorgan; dieses könne kein fester Theil seyn, denn die Empfindung sey von der Nervenaction verschieden, und da diese durch feste Theile geleitet werde, so müsse die Empfindung in einem flüssigen Theile, nämlich dem Höhlendunste vor sich gehn. So soll auch nach Eschenmayer (*Psychologie S. 217*) der Aether des Organismus in den Hirnhöhlen am reinsten und kräftigsten fließen, und die Seele in ihren freyen Zeugungen sich niederlassen. Rudolphi war es besonders, der die Sömmerringsche Hypothese widerlegte. Wäre der Höhlendunst das Wesentliche, so brauchte der Mantel bloß eine Blase zu seyn, und die dicke Wandung desselben wäre überflüssig; da die Höhlen nichts Andres, als Oberfläche sind, so wäre, wie Autenrieth (§. 1040) bemerkt, das Seelenorgan ausserhalb des Gehirns; bey Thieren und bey dem Embryo sind die Höhlen größer, als bey dem ausgebildeten Menschen; Geschlossenheit der Höhlen ist zur Empfindung und Bewegung nicht nöthig (*Mangetus II. p. 98. Autenrieth §. 1039*) und die Ergießung in denselben hebt nicht immer das Bewußtseyn auf. — 4.) Endlich vermuthete Galen (*de odoratus instrum. c. 2. p. 110. c. 6. p. 112. de usu part. lib. VIII. c. 6. p. 168*), daß im Normalzustande zu Verhütung der Apoplexie ein schleichendes Excrement aus den Hirnhöhlen in die Nase und den Mund geführt werde, weil er theils eine mechanische Communication zwischen diesen Organen zu finden glaubte, theils die Wirkung des Niesens bey Schwere des Kopfs falsch deutete. Wenn Einige (Piccolomini *lib. V. lect. 2. p. 253*) diese Excretion bloß als einen Nebennutzen betrachteten, so sahen Andre (Bartholin *lib. III. c. 3. p. 306*) sie als die wesentliche Function der Hirnhöhlen an. Diese sollten also zum Absatze von Unreinigkeiten bestimmt (Vareoli p. 8) oder Cloaken (Willis *cor. c. 10. p. 60*) seyn. Das Anzulockernde sollte der Ueberrest von Ernährung des Gehirns und von Erzeugung der thierischen Geister seyn (Bauhin) und zur Bildung des Speichels für die Verdauung, und zur Anfeuchtung der Luftwege dienen (Diemerbroeck *lib. III. c. 6. p. 350*).

§. 757. Wenn Alles auf die erregende Kraft des Bluts hindeutet (§. 391. gg.), wenn unter Andern das Blut auf diejenigen Punkte der sensibeln Centralmasse am mächtigsten wirkt, wo das Leben derselben am regsten ist, so müssen auch die Gefäßgeflechte für die Erregung des Hirnlebens wichtig seyn. Da sie besonders gestaltet sind, so müssen sie außer der allgemeinen Function der Ernährung, Ausdünstung und Einsaugung auch noch eine besondere haben. Sie gehören im Allgemeinen zu den besonders Ausbreitungen des Gefäßsystems, deren erhöhte Lebendigkeit sich durch Turgescenz äußert. Ein solcher Gefäßapparat kommt in den schwammigen Körpern mehr gebunden und mit der übrigen Masse verschmolzen, mehr zellig und venös vor. Die Iris und der Strahlenkörper sind schon freyere Entwicklungen, und als eine potenzierte *Chorioidea* zu betrachten, welche von der Wandung des Augapfels sich nach innen schlägt und in die Hölle desselben sich erstreckt. Die Gefäßgeflechte sind ähnliche Potenzirungen und Einwärtsfaltungen der Gefäßhaut, aber völlig frey, selbstständig und überwiegend arteriell; sie müssen also durch Turgescenz oder *Collapsus* sich bedeutend ändern können, und diese Veränderung muß in einem bestimmten Verhältnisse zur Seelenthätigkeit stehn. Ihre Turgescenz muß die Spannung der Hirnthätigkeiten erhöhen und auf eine Stufe heben, welche die verzeitelten Haargefäße nicht vermitteln können. Da nun die durch das Blut gegebene Spannung vorzüglich das Gefühl aufragt und die Phantasie steigert; da ferner diese Seelenkräfte in Organen sich äußern, welche mit den Gefäßgeflechten organisch verknüpft sind (§. 746.); so werden Letztere mit der Phantasie in näherer Beziehung stehn und namentlich auch bey den Gemüthsbewegungen anschwellen. Ihre arterielle Natur ist dabey mit im Anschlag zu bringen; wie wir denn auch sehen, daß Spuren von Phantasie und Gemüthsbewegung schon bey denjenigen Thieren der niedern Classen sich zeigen, bey welchen die Luforgane mehr entwickelt sind; namentlich bey den Insecten. Die Gefäßgeflechte haben selbst einige Aehnlichkeit mit Athmungsorganen, und können gewissermaßen als Hirnkienien betrachtet werden. Sie fehlen bey den Fischen, bey welchen zugleich die Iris unbeweglich ist, indem wir an diesen Thieren auch keine deutlichen Aeußerungen von Phantasie und Gemüthsbewegung bemerken, und nur die an das Wasser gebundene Luft respirirt wird; nur bey einigen Knorpelfischen zeigt sich etwas Aehnliches in der Rautengrube. Bey den Amphibien erscheinen Gefäßgeflechte, aber noch als einfache Verzweigungen; bey den Vögeln hingegen, wo theils ein längerer Verkehr mit der Luft, theils eine größere Spannung und Regsamkeit des Gehirns, eine thätigere Phantasie in den Kunsttrieben und eine stärkere Aufregung des Gemüths in den geselligen Verhältnissen sich offenbart, sind die Gefäßgeflechte entwickelt. Bey dem Maulwurfs und mehreren Nagern, als denjenigen Säugethieren, wo das Gehirn am unvollkommensten entwickelt, und die Beziehung zur Luft beschränkter ist, bilden sie bloß Stränge ohne Verschlingung und netzartige Verbindung. Bey dem menschlichen Embryo erscheinen sie erst im dritten Monate, nehmen dann aber so schnell an Umfang zu, daß sie schon im vierten Monate die Höhlen beynahe ausfüllen (Meckels Archiv I. S. 81. 84. Tiedemann Gehirn S. 21. 33. 63). — Bey Delirium und Raserey findet man sie oft von Blut strotzend und schwärzlich (Morgagni VII. 4. VIII. 23. X. 17. XXI. 35.), bey Blödsinn, Melancholie, Hirnwassersucht, blutleer, misfarbig, weißlich oder mit Hyda-

tiden (Morgagni I. 10. Marshäl p. 158. 158. Häslam S. 25. 32. 37). In einem unvollkommen entwickelten Gehirne (Nr. 64g.) fehlten sie mit den Belegungsorganen, der Scheidewand, dem Gewölbe, den Ammonshörnern, der Zirbel und dem Balken.

§ 53. Daß die Gefäßgeflechte nächststen: (Ruyssch *observ. dec. I. p. 13. epist. XII. p. 22*), und einsaugen (Varoli p. 9. 136), und zwar beyde Functionen zugleich verrichten (Willis *cerebr. c. 14. p. 168* Meckels Archiv II. S. 75), ist wohl nicht zu bezweifeln: nur kann ihre Thätigkeit nicht darauf beschränkt seyn. Dagegen können wir nicht annehmen, daß sie das bey Erweichenen zusammengeschrunpft Modell seyen, über welchem die Natur im Embryo die Hemisphären baue (Autenrieth §. 845); oder daß sie bestimmt seyen, die Verwachsung der Höhlen zu hindern (Wharton p. 143); oder daß sie die Centraltheile des Gehirns ernähren (Berenger fol. 437); oder zur Erhaltung der Circulation der Geister erwärmen (Willis *ver. b. p. 45. c. 14. p. 68*); oder daß sie dem Gehirne Bewegung geben (Wharton p. 148); oder die Bildung der thierischen Geister vorbereiten (Bartholin lib. III. c. 3. p. 346: Feeling p. 217. Willis *cerebr. c. 7. p. 38* Molinetti p. 80); oder dieselben wirklich bilden (Aranzi c. 2. p. 44) und somit das Seelenorgan darstellen (Mossa c. 38. fol. 85); oder den Durchgang der Geister durch die Wasserleitung öffnen und schließen, (Berenger fol. 427. Benedetti lib. IV. c. 13. p. 136), oder dieselben zur Zirbel leiten (Descartes p. 105); oder den Zufluß des Bluts mäßigen (Wünsch *cer. p. 91*). Ihre psychisch erregende Kraft hat nur Treviranus (Biologie VI. S. 468) anerkannt.

§ 54. Bey den meisten Säugethieren finden wir noch einen andern Gefäßapparat, ein Gefäßnetz, welches, wenn das, was seines Gleichen nicht hat, Verwunderung erregen muß, wohl den Namen des *rete mirabile* verdient. Die innre Carotis, von zwey Blättern der festen Hirnhaut eingeschlossen, zwischen dem Ganglion des fünften Pairs und dem Sattel liegend, spaltet sich in mehrere Zweige, welche mit Fäden des Rumpfnerven versehen sind, und wieder zu einem Stamme zusammentreten, der sich dann an das Gehirn verzweigt. 1) Die erste Meynung über das Netz geht dahin, daß die Auflösung und Reconstruction des Stamms, ein Analogon zu dem Verhältnisse der Arterien bey einigen Foulthieren, den Andrang des Bluts nach dem Gehirne vermindere und dessen Thätigkeit beschränke. Das Blut vertheilt sich hier, wie Willis (*cerebr. c. 8. p. 40*) es ausdrückt, in kleine Bäche, die kaum Mühlen zu treiben vermögen, während es bey dem Menschen in einem Strome wogt, der Schiffe mit vollen Segeln trägt; daher ist das Gefäßnetz größer bey den Wiederkäuern, als bey fleischfressenden und verschlagenen Thieren (Willis *cerebr. c. 4. p. 23*), und fehlt bey dem Pferde, dem Biber und dem Elephanten (Haller *incoen. VII. p. 3*). Allein es ist nicht denkbar, daß die Natur mit demselben eine Retardation im Fortschreiten ihres Lebens und eine Hemmung der Hirnthätigkeit im Allgemeinen bezwecken sollte. 2) Wahrscheinlicher ist daher die zugleich von Willis aufgestellte, von Diemerbroeck (*lib. III. c. 8. p. 364*) und Brunner (Haller *bibl. I. p. 597*) bestätigte und auch von Treviranus (Biologie VI. S. 168) angenommene Meynung, daß das Gefäßnetz auf das Herabsinken des Kopfs bey dem Aufsuchen der Nahrung sich beziehe, und den Andrang des Bluts, der bey dieser Stellung die Hirnthätigkeit stören würde, vermindere. Indessen fehlt es bey dem Pferde, und kommt dagegen bey

Thieren vor, deren kürzer Hals nicht als Gliedmaass dient. Wenn wir also auch diese Meynung bezweifeln müssen, so dürfen wir 3) die Hypothese aufstellen, „dass diese Verzweigung der Arterien auf den Hirnanhang und das Ganglion des fünften Nerven, zwischen welchen Theilen sie liegt, sich bezieht; dass sie in denselben eine grössere Lebensspannung erregt, ihnen dadurch ein Uebergewicht ertheilt, und dann wieder in einen Stamm sich vereint, um mit voller Kraft auf das Gehirn zu wirken.“

§. 760. Die Rinde ist die gemeinsame letzte Endigung aller Hirnfasern, indem die Strahlung des Mantels, so wie das Belegungssystem, hier in ein Gemeinschaftliches ausgeht. Hier ist also das wahre Centrum, wo die partiellen Thätigkeiten in Einheit aufgenommen werden, und das gemeinsame Ergebniss Alles sich darstellt. Bestätigt wird diese Ansicht zunächst durch die Thatsachen in Betreff der Entwicklung und des Gemeingefühls. Als Höheres entwickelt sich nämlich die Rinde zuletzt am Gehirne; erst nach der Geburt wird sie auf die Oberfläche aufgetragen (Fiedemann's Gehirn S. 55). Eben so ist das Gehirn in der Thierreihe bis zu den Vögeln herauf noch dem Rückenmark ähnlich; indem das Mark des Mantels nackt bleibt, und erst bey Säugthieren wird dieser mit Rinde belegt. — Die Rinde ist unempfindlich gegen äussere Verletzungen (§. 374), aber auch die ihr zunächst liegende Marksubstanz; bloß die Verletzung der in der Tiefe liegenden Theile erregt Schmerz, doch nie so heftigen, als die der Nerven. Dieser von Arncmann (S. 126) aufgeführte Ausspruch der Erfahrung ist bedeutungsreich: das Gemeingefühl ist am stärksten in den peripherischen Enden der Nerven; schwächer in den Nervenstämmen; noch schwächer in dem Hirnstamme, seinen Ganglien und im Anfange ihrer Strahlungen; am schwächsten gegen den Umkreis des Mantels und so der Rinde. Das Gemeingefühl nimmt also stetig ab mit der Annäherung zum Centrum, und die Rinde zeigt sich hier als das Centrale. Die Erfahrungen über den krankhaften Zustand der Gefäßhaut (§. 772) bestätigen dies. *Foville* und *Pinel Grandchamp* (p. 1) haben daher auch die Rinde für den Sitz der Intelligenz erklärt.

§. 761. Die im Anhang gesammelten Beobachtungen können über die Verschiedenheit der Rinde vom Marke keine sichern Resultate geben, denn bey den hier erwähnten Abnormitäten der Oberfläche war, ohne Zweifel ausser der Rinde oft auch das Mark in einem abnormen Zustande. Die Resultate sind aber folgende:

Symptome:	Rinde:		Substanz:		Verhältniß der Rinde zur Substanz:
	Zahl der Fälle unter 171.	= 1:	Zahl der Fälle unter 271.	= 1:	
Verrücktheit	4	42,75	5	54,20	1,27
Schwindel	6	28,50	9	30,11	1,05
Betaubung	26	2,25	123	2,20	0,97
Delirium	31	5,51	50	5,62	0,98
Schmerz	57	3,00	100	2,71	0,90
Apoplexie	24	7,12	59	4,39	0,64
Blödsinn	5	34,20	13	20,84	0,62
Gedächtnisschwäche	3	59,00	9	30,11	0,54

Ueber die Proportion der Rinde zum Marke haben wir noch nicht genug pathologische Beobachtungen; indess da beyde Substanzen immer zusammen wirken, läßt es sich vermuthen, daß jede Disproportion unter ihnen für die Seelenthätigkeit nachtheilig wirkt. Man fand die Rinde bey einigen Verrückten (Nr. 655. 1036) sehr dünn, und bey Blödsinnigen (Nr. 739), Epileptischen (Nr. 220) und bey unvollkommen entwickeltem Gehirn mit Seelenlosigkeit (Nr. 649) überwiegend; verhärtet fand man sie nach Betäubung (Nr. 1091), Blödsinn (Nr. 867) und Melancholie (Nr. 513). — Lombard (p. 51 sq.) behauptet, bey Contusion der Rinde beobachte man lebhaftere Schmerzen, reichlichen Abgang von hellem Harn, rollen und harten Puls und starken Durst; bey Contusion von Rinde und Mark hingegen bloß stumpfen Schmerz oder vielmehr Schwere des Kopfs, sparsamen Abgang eines stark gefärbten Harns, kleinen und wellenförmigen Puls, Mangel an Durst, und Zusammenziehung des Kiefers. Wenn diese Beobachtungen richtig sind, so beziehen sie sich wohl darauf, daß die Affection der Rinde eine stärkere Entzündung erregt. Abercrombie (S. 63) bemerkt: die oberflächliche Vereiterung des Gehirns verursache zuweilen seltsame Convulsionen und eine Art Veitstanz. — Mayer (Gehirn S. 53) sucht in der Rinde den Sitz des Gedächtnisses, 1) weil dieses bey Kopfverletzungen und Schlagfluß häufiger als andre Seelenkräfte leidet, die hier Statt findenden Abnormitäten auf Stockung und Ergießung von Flüssigkeiten beruht, diese aber vorzüglich in der gefäßreichen Rinde vorkommen; 2) wo die Urtheilskraft ihren Stoff aus dem Gedächtnisse nimmt, ist das Denken langsamer, als wenn sie auf unmittelbare Sinnesanschauungen sich bezieht, weil die Rinde mehr entfernt ist; 3) nach Anstrengung des Gedächtnisses entsteht Schmerz am Umfange des Kopfs; 4) bey tiefem, abstrakten Nachdenken, wo das Gedächtniß am meisten mitwirkt, hat man ein eignes Gefühl im Hinterkopfe, weil im kleinen Hirne die Rinde am reichlichsten und am meisten mit Mark verwebt ist. Auch Home (*philos. transact.* 1821.) hält die Rinde für den Sitz des Gedächtnisses, weil jeder Druck auf den vordern und obern Theil des Gehirns das Gedächtniß schwächt. Alle diese Gründe haben indess wenig Beweiskraft; durch die obigen Resultate der pathologischen Beobachtungen werden sie nicht unterstützt.

§. 762. Die Randwülste können wir weder mit Gall als häutige Ausbreitungen der ausstrahlenden und rückstrahlenden Fasern, noch mit Meckel (Cuvier II. S. 116) und Cuvier (Nervensystem S. 292) für Einwärtsfaltungen des Mantels oder Einsenkungen der ursprünglichen Hirnblase betrachten. Am kleinen Hirne, wo sie einander parallel liegen, zeigt es sich ganz deutlich, wie sie dadurch entstehen, daß die Strahlungen gegen die Peripherie hin sich spalten und auseinander weichen, und von sprengelförmig gebogener Belegungsmasse bekleidet werden. —

§. 763. Daß sie bestimmt seyen, Schleim von der Gefäßhaut zu den Höhlen zu führen (wie Schneider lib. II. c. 4. p. 38 anführt) oder den thierischen Geist auf der Gefäßhaut in die Hirnsubstanz zu leiten (*Corpus fol.* 431), bedarf keiner Widerlegung. Nach Gennari (p. 44) sollten die Furchen den Druck von den anschwellenden Gefäßen, und durch ihr Serum die Friction bey Bewegung des Gehirns verhüten, und nach Lucæ (*de cerebri motu* p. 13) sollen die Randwülste, den gelappten Lungen analog, eine gleichmäßige Ausdehnung des Gehirns möglich machen; aber man sieht nur ein Auf- und Ab-

steigen des Gehirns im Ganzen, kein Anschwellen und Einsinken der einzelnen Theile, wie bey den Lungen. Sie sollten nach Piccolomini (*lib. F. sect. 2. p. 267*) das Gehirn gegen den Druck des Schädels sichern, nach Vesal zur Ernährung des Gehirns, nach Vioussens (p. 33) zur Aufnahme der Arterien, nach Riolan zur Leitung ihrer kleineren Zweige, nach Tiedemann (*icones p. 49*) zum bequemern Gefangen derselben an das Gehirn, dienen, und nach Ackermann (*neru. syst. p. 211 sq.*) durch die Gefäße gehen seyn: aber weil Furchen da sind, treten auch Gefäße in dieselben, doch gehen sie über viele auch hinweg; es ist keine constante Beziehung zwischen den Gefäßen und Furchen zu bemerken, und kein Organ wird um des Ausserwesentlichen willen auf solche Weise in seiner Gestaltung bestimmt; die Gefäße kommen auch ohne Furchen eben so gut zum Gehirne.

§. 764. Offenbar wird durch das Daseyn der Randwülste und Furchen die periphere Fläche, also die Ausbreitung des Endes der Markfasern und die Rinde (*Hellen elem. IF. p. 402*), folglich auch die Gefäßhaut vergrößert; da nun die periphere Oberfläche auf die höhern Geistesthätigkeiten sich bezieht, so müssen diese auch, wo Randwülste vorhanden sind, stärker sich äussern. Die Randwülste beruhen auf Spaltung dessen, was in der Tiefe einig ist; die Spaltung drückt Gegensätze aus; je mehr aber die Gegensätze an einem Organe entwickelt sind, ohne daß die Einheit dadurch gestört wird, um so mehr ist sein Leben gesteigert; mithin müssen auch die Randwülste auf eine höhere psychische Entwicklung hindeuten.

§. 765. Dies Verhältniß spricht sich in der Thierreihe aus, indem die Randwülste im Ganzen genommen dem Fortschreiten der Organisation parallel sich ausbilden. Sie fehlen bey den Fischen und Amphibien; erscheinen bey den Vögeln bloß am kleinen Hirne; sind am großen Hirne bloß angedeutet bey den Nagern, den Fledermäusen, den Beutethieren, den Zahnlosen, und bey dem Maulwurf, und Igel; selten und oberflächlich bey den Faulthieren und dem Marder; etwas zahlreicher bey den Dickhäutern und Raubthieren; sie nehmen zu bey den Affen, Einhufern und Wiederkäuern, und am meisten bey dem Seehunde und Delphine. Bey dem Menschen sind sie am vollkommensten entwickelt, wie dies schon Erasistratus bemerkt, und zuletzt Desmoulins (*Joann. compl. XIII. p. 212*) bestätigt hat. Nach Lotstrem mag sich die durch die Furchen vergrößerte Oberfläche des menschlichen Gehirns zur Fläche der Schädelhöhle wie 12 zu 1 verhalten. Galen, Columbus und Piccolomini bezweifelten dies Gesetz; indem sie sich darauf beriefen, daß auch der Esel viel Randwülste, und mehr, als das Pferd, habe; allein man hat, und wohl nicht ohne Grund, die Seelenkräfte des Esels, namentlich des in der Freyheit lebenden, dagegen in Schutz genommen. Und wenn Treviranus (*Biologie VI. S. 139. Schriften III. S. 8*) einwendet, daß der Mensch vom Affen viel mehr durch seine Geisteskräfte, als durch die Randwülste seines Gehirns, sich unterscheidet, und daß die List und Gelehrigkeit der Thiere nicht im Verhältnisse steht zur Zahl der Randwülste, so bemerken wir dagegen erstlich, daß diese nur ein Moment der Entwicklung des Gehirns sind, und nicht für sich allein als allgemeines Normalmaas gelten können; zweytens, daß es nicht bloß auf ihre Zahl, sondern auch auf die Tiefe der Furchen ankommt, welche z. B. auch bey dem Delphin noch bedeutend seichter sind, als bey dem

Menschen; endlich, daß die Schlantheit nicht den Inbegriff der Seelenkraft ausdrückt. Die Vermuthung, daß die Randwülste auf die übrige mehr zusammengesetzte Organisation sich beziehen könnten, kann auf keine Thatsache gestützt werden.

§. 766. Ihre Entwicklung im Laufe des Lebens erfolgt ziemlich spät. Im dritten Monate des Embryonalens zeigen sich zuerst an der innern Fläche und am innern Rande der obern Fläche des Oberlappens schwache Risse, welche sich in den folgenden Monaten zu Furchen ausbilden. Bey dem reifen Embryo, so wie während des Kindesalters, sind die Randwülste schmal und die Furchen leicht.

§. 767. Die Randwülste verflachen sich, und die Furchen werden verwischt, so daß die Oberfläche eben wird, wenn irgend eine dehnende Gewalt innerhalb des Gehirns wirkt. An der ganzen Wölbung erfolgt diese Ebenung bey der Wassersucht des Hirnbühnen; auf einzelne Stellen ist sie beschränkt bey Eiterung (z. B. Nr. 556) und Aftergewichten (z. B. Nr. 999). — Die Randwülste fehlen ursprünglich bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns (z. B. 650). — Sie sind bisweilen welk, klaffend, und nur ganz lose mit der Gefäßhaut verbunden nach Erschütterungen (Schumacher S. 392), besonders mit Substanzverlust (Tren p. 17), aber auch nach der Manie (Camerarius p. 202). Willis (*de morb. convuls.* p. 136) fand bey einem Blödsinnigen und bey einem Manne, der an erblicher Schwäche des Gehirns mit Lähmung und Convulsionen litt, wenige und flache Randwülste; bey einer epileptischen Säuerin (*acad. de Berlin* p. 60) fand sie Meckel fast ganz verschwunden; so sah auch Prochaska (*advotatt.* III, p. 197) bey Stumpfheit und Schwere des Kopfs mit Lähmung die Rinde der linken Hemisphäre sehr dünn, und fast gar keine Furchen; Wenzel's (Hirnanhang S. 47. 52. 59. 63. 68. 74) fanden bey Epileptischen die Randwülste überhaupt platt, oder breit und weit klaffend, oder die vordern breit und sparsam. Hier ist vielleicht die durch die Epilepsie bewirkte Schwächung der Geisteskraft im Anschlag zu bringen. Georget (Verrücktheit S. 263) bemerkt, daß, wenn bey Seelenkranken der Schädel sich verdickt, die Randwülste zusammengedrängt und schmal werden.

§. 768. Willis nimmt an, daß die Furchen (namentlich des großen Hirns) die sinnlichen Eindrücke (*species sensibilium*) aufbewahren, und so für Imagination und Gedächtniß wirken (*corcor.* c. 10. p. 49); komme der Eindruck zu den Randwülsten, so werde er dem Gedächtnisse übergeben; gehe der Impuls von ihnen aus, so entstehe Erinnerung und Thätigkeit der Phantasie (c. 11. p. 54); Vögel und Fische könnten nur eine Art von Dingen erkennen und lernen, da sie nicht verschiedene Zellen für verschiedene Gedanken hätten (p. 49). So sucht auch Treviranus (*Biologie* VI. S. 139. fgg.) in ihnen das Vermögen, die Modificationen der Sinnesgegenstände aufzufassen, und die sinnlichen Eindrücke zu verknüpfen und aufzubewahren; mit Ausbildung dieses Vermögens, in Beziehung auf das Sehen, erschienen die Randwülste am Oberlappen und Hinterlappen, in Beziehung auf den Geruch die des Vorderlappens, in Beziehung auf das Gehör die des kleinen Hirns. — Allein die Randwülste sind etwas Homogenes und Allgemeines, welches sich nicht auf die einzelnen Sinnesarten beziehen kann; sie gehören nicht den Stammstrahlungen, welche die Sensation vermitteln, allein an, sondern ganz eigentlich

dem Belegungssysteme, und stehen so nicht in einer unmittelbaren Verbindung mit der Sinnesperception, sondern mit dem Verstande und der Phantasie.

VII. Hüllen des Gehirns.

§. 769. Wie die Centralmasse des sensibeln Systems eine höhere Ausbildung der Nervensubstanz ist, so sind auch ihre Hüllen weitere Entwicklungen analoger Theile, die wir an den Nerven finden. Das Neurilema, welches den Nerven durchdringt, seine Gefäße leitet und seinen Bildungsbergang vermittelt, tritt am Gehirne in der Form einer plastischen Hülle auf, welche nicht mehr mit der sensibeln Masse verschmilzt, sondern an ihre peripherische und centrale Oberfläche geheftet ist. Die Nervenscheide aber wird hier zu einer eignen fibrösen Haut, und wenn der Nerv an den Knochen sich hinrankt, so bildet sich für die Centralmasse eine eigne Knochenhülle. Wir sehen also hier einen Gegensatz von Gebilden mit überwiegendem plastischem Leben, welche zunächst an die Oberfläche des Gehirns sich lagern, und von Gebilden, in welchen der Mechanismus vorwaltet, und die als Begränzungen weiter nach aussen gedrängt sind.

§. 770. Jede Hülle steht mit ihrem Organe in lebendiger Beziehung, und so muß denn auch das Leben der Hirnhäute im Verkehre mit der Seelenthätigkeit begriffen seyn. Indem man einerseits manche darauf sich beziehende Erscheinungen beobachtete, andererseits fand, daß das Gehirn gegen äussere Verletzungen unempfindlich war, so nahm man, auf falsche Ansichten vom Gemeingefühle gestützt, an, die Hirnhäute seyen empfindlich, ja der Sitz der Empfindung, und Gohl, Croone, Godart, Krüger, le Cat (Haller *elem. IP.* p. 358) erklärten sie für die Seelenorgane. Wenn Piccolomini, Highmor und Andre der Gefäßhaut eine hohe Empfindlichkeit zugeschrieben hatten, so erklärte Willis (*cerebr. c. 9* p. 47) mit mehr Vorsicht, daß sie im kranken Zustande schmerzhaft werden könne, wie dies unter Andern auch eine Beobachtung von Home (Meckels Archiv I. S. 117) bestätigt, und Costell (Ludwig *script. neur.* IX. p. 162), welcher sie ätzte, und Arnemann (S. 105), so wie früher Bohn, Lobstein, Hunter, Haller, Zinn bewiesen, daß sie im Normalzustande unempfindlich ist (Beyträge II. S. 238. fg.). Eben so hielten Columbus, Willis, Viennensis, Sievogt und Andre der festen Hirnhaut eine große Empfindlichkeit zugeschrieben, doch die genauern Versuche lehrten, daß sie nicht mehr, als andre Faserhäute empfindlich ist (Beyträge I. S. 95 — 98), und wenn Chaussier (p. 21) behauptet, daß Fäden vom Rumpfnerven mit der *Arteria meningea media* sich an sie verbreiten, so ist weder dies völlig erwiesen, noch der darauf gebaute Schluß auf ihre Empfindlichkeit begründet. Daß aber diese Häute durch Congestion und entzündlichen Zustand schmerzhaft werden können, stimmt mit unsern anderweitigen Erfahrungen vollkommen überein.

§. 771. Die Gefäßhaut, welche von Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 8.* p. 168) nicht unpassend mit dem Chorion und dem Gekröse verglichen wurde, dient dem Bildungsbergange im Gehirne durch Leitung der Gefäße. — Der Spinnwebhaut schrieb man ehemals hofs einen mechanischen Nutzen zu, das Gehirn in seiner Lage zu erhalten (Morgagni *LII.* 26.), oder das Austreten der in den Furchen enthaltenen Feuchtigkeit zu verhüten (Gennari p. 24), während man die Secretion an der Oberfläche den ver-

meintlichen Pacchionischen Drüsen zuschrieb (*Lectre in qd. de Paris 1704. p. 39. 1707 p. 467. Santorini tabb. p. 47*). Rowley (*on the dropsy of the brain p. 2*) legte ihr diese Absonderung bey, und Bichat bewies es durch die Bemerkung, daß man von der entblößten Spinnwebenhaut eines lebenden Thiers einen Dunst aufsteigen sieht, und daß sie, wenn man sie abgewischt hat, bald wieder feucht wird, auch an der Luft lange sich feucht erhält. Er erklärte sie demnach für eine seröse Haut, wie schon Columbus (*lib. VIII. p. 189*) ihr äusseres Blatt mit dem Herzbeutel verglichen hatte. Dieses Blatt, welches den innern, glatten und feuchten Ueberzug der festen Hirnhaut ausmacht, hat vollkommen den Charakter der serösen Häute. Weniger deutlich ist dieser in der innern, an die Gefäßhaut gehefteten Hälfte der Spinnwebenhaut, an der man im Normalzustande keine Blutgefäße entdeckt; daß an ihrer äussern Fläche, oder zwischen ihr und der Gefäßhaut so häufig seröse Ergießungen vorkommen, stimmt nicht mit der Natur einer serösen Haut überein. Da dergleichen Ergießungen oft auch unter der Gefäßhaut vorkommen, so muß diese Membran auch einen Antheil an der serösen Absonderung haben; und da es noch problematisch ist, ob Spinnwebenhaut, oder Gefäßhaut, oder beyde die Höhlenhaut bilden, so scheint es, als dürften wir beyde Häute nicht als streng geschieden betrachten, vielmehr sie unter dem Namen der plastischen Hirnhäute zusammenfassen.

§. 772. Diese Häute vermitteln die organische Verknüpfung der Bluthätigkeit und des psychischen Lebens. Da sie zunächst an der Rinde liegen, so wirkt ihre Abnormität so leicht auf Verstand und Phantasie störend ein, so daß dadurch eben Le Cat (*traité des sensations I. p. 122 sq.*) bestimmt wurde, sie für das Seelenorgan zu erklären. Ihrer Entzündung kommt das Irreden und die Raserey ganz eigentlich als charakteristisches Symptom zu, während die angebildete Entzündung der Hirnsubstanz selbst keine ähnliche Verwirrung der Seelenhätigkeit herbeizuführen pflegt (§. 361. 362.), was dann offenbar für die oben (§. 760.) gegebene Deutung der Rinde spricht. Bey Verrückten findet man fast immer Spuren einer noch bestehenden oder vorübergegangenen chronischen Entzündung der plastischen Hirnhäute (Georget Verrücktheit S. 262). Ergießung von Wasser, und Verdickung oder Undurchsichtigkeit der Spinnwebenhaut ist die häufigste Abnormität bey Manie (Haslam 26. 43. 45. 49. 61. Meckel in *acad. de Berlin 1761. p. 72. 86. Simmons in auserl. Abhh. XI. S. 136. 140. 141. 142. Marshal p. 151. 153. 178. 181. 200.*), Wahnsinn (Haslam S. 29. 33. 35. 46. 52. 53. Simmons S. 139. Marshal p. 149. 154. 162. 176. 187. 191.), Melancholie (Haslam S. 38. 41. 47. 54. 57. Marshal p. 146. 158. 160.) und Blödsinn (Meckel a. a. O. p. 76. 77. 78. 79. 81. Haslam S. 37. 42. 56. 59. Simmons S. 138. Marshal p. 180. 189. 198). Greding fand unter 216 seiner Kranken eine seröse Ergießung in 120 Fällen zwischen den beyden Häuten der Spinnwebenhaut, und in 57 Fällen unter der Gefäßhaut. Letztere scheint besonders bey solchen Personen vorzukommen, die anfangs geraset haben, zuletzt betäubt geworden und an Abkehrung oder Apoplexie gestorben sind (Beyträge I. S. 258 — 262. II. S. 216. fgg.). Daß der Zusammenhang der Gefäßhaut mit der Rinde nach Delirium und Manie geschwächt oder aufgehoben ist, bemerkt schon Camerarius (p. 197). Hydatiden am Äussern, die feste Hirnhaut bedeckenden Blatte der Spinnwebenhaut, brin-

gen erst später Zufälle hervor, und tödten vorzüglich durch Apoplexie; sitzen sie aber am innern, der Gefäßhaut zugewendeten Blatte, so findet dabey fast immer eine Störung der psychischen Functionen, Manie, Wahnsinn oder Blödsinn Statt (Beyträge II. S. 107, fgg. 287 — 291). Uebrigens bestätigt die pathologische Beobachtung auch, daß die Hirnhäute so wie die Rinde in keiner besondern und öftlichen Beziehung zur Bewegung stehn, denn die Meningitis erregt bloß Krämpfe auf beyden Seiten des Körpers, die Encephalitis hingegen Lähmung, und zwar meist in der einen Körperhälfte (Lallemand I. p. 475).

§. 773. Daß die feste Hirnhaut zur Begränzung und zum Schutze des Gehirns, so wie durch Leitung der Gefäße zur Ernährung des Schädels dient, ist seit jeher anerkannt worden, und es konnten dagegen die Meynungen nicht aufkommen, daß sie als ein Stützzeug die Ausdünstung gestatte (Zerbis Fol. 111), oder das Ausströmen des Blutdrustes und der thierischen Geister hindre (Viennensis c. 3. p. 13), oder durch Muskelkraft das Gehirn bewege (II. Bd. S. 220, 276). Wird sie verletzt, so tritt das Gehirn durch ihre Wunde hervor, und verliert seine normale Gestalt. Sie wird aber vorzugsweise vom Gehirne bestimmt. Daß bey Hemicephalen ihr Wölbungstheil mit Sichel und Zelt fehlt, scheint in der unvollkommenen Entwicklung des Gehirns seinen Grund zu haben, und zugleich für die ursprüngliche Schwäche der Bildungskraft bey dieser Monstrosität zu sprechen, da die regelmäßige Umbeugung der festen Hirnhaut an den Rändern der Basis des Schädels und ihr stetiger Uebergang in die äussere Beinhaut die Annahme einer Zerstörung durch Wasser nicht gestattet. Diese Haut regenerirt sich ferner, wenn sie an einer Stelle zerstört ist, vom Gehirne aus. Sie dehnt sich mit ihm allmählig aus bey chronischer Hirnwassersucht und bey dem Hirnbruche, folgt ihm auch, wenn es atrophisch zusammensinkt, so daß sie nach Manie und Melancholie öfters faltig und vom Schädel gelöst gefunden wird (Beyträge II. S. 114. fg. 150), oder auch bey Geschwüren des Gehirns in die dadurch entstandne Vertiefung sich einsenkt (Greding II. S. 95).

§. 774. Der Schädel ist in Verbindung mit ihr das Beschränkende und die Normalform durch Begränzung Erhaltende; wo sie zerstört sind, wachert das Gehirn in schwammigen Massen hervor. Der Schädel aber wird vorzüglich vom Gehirne und zunächst von der festen Hirnhaut bestimmt (§. 258). Letztre zeigt sich wenig abhängig vom Schädel, und bleibt oft bey dem Beifrasse desselben gesund, wirkt aber ungleich stärker auf ihn ein. Granulationen der plastischen Hirnhäute (§. 269.) und Aftergebilde der festen Hirnhaut (§. 258.) breiten ihre Wirkungen ungleich stärker nach aussen gegen den Schädel, als nach innen gegen das Gehirn aus. Von der festen Hirnhaut aus erzeugt sich der Schädel offenbar bey der Regeneration, und wenn sie von ihm abgelöst wird, so stirbt er an dieser Stelle gemeinlich ab, falls nicht die Gefäße im Umkreise derselben zur Ernährung hinreichen. Das Gehirn zeigt sich aber als das eigentlich Bestimmende für beyderley Gebilde. Wie jedes eigenthümliche Organ sich eine zellgewebige oder häutige Umgebung schafft, so wird mit dem Daseyn des Gehirns der Schädel, namentlich der Wölbungstheil desselben gegeben, denn seine Grundfläche besteht sich zugleich auf die Sinnesorgane, wie der Körper der Wirbelthiere auf die Rumpfgeweiße. Bey mangelndem oder unvollkommen entwickelten Rückenmarke fehlen die Bogen der Wirbel, und bey

unvollständiger Entwicklung des Gehirns fehlt gewöhnlich die Schädeldecke; während die Grundfläche kurz und breit ist und die Schläfebeine wegen des Mangels an dem verbindenden, bindenden Principe seitlich auseinander stehen. In den seltenen Fällen, wo eine Schädeldecke sich findet, ist sie auf die Basis herabgesunken (Nr. 290: 291. 634. 635. 636). Der Schädel, gleichsam ein erstarrtes peripherisches Zellgewebe, bildet sich also in Uebereinstimmung mit dem Gehirne aus, und wird, durch diese in seiner Form bestimmt, wie alle knöchernen Umgebungen nach ihren Formen sich fügen. Dies ist von Albin (odot. lib. IV. p. 19), dann von Sömmerring (Hirallehre S. 22) und endlich von Gall erwiesen worden. Abgesehen von der unmittelbaren mechanischen Einwirkung des Gehirns auf den Schädel, welche bey Betrachtung von dessen innerer Fläche unwiderleglich sich ausspricht, bemerken wir selbst eine Harmonie zwischen der Gestalt des Gesichts und der des vordern Theils des Gehirns; wir finden in diesem Theile, wenn wir ihn aus dem Schädel genommen haben, gleichsam den Prototyp des Schnabels bey Vögeln; der Schnauze bey Säugethieren, und des frey entwickelten Antlitzes bey dem Menschen. — Jede einzelne Idee geht unter bey plumper Behandlung und bey der Voraussetzung, daß die Wirklichkeit in ihren Ketten liege. Weil jedes Gesetz, das wir erkennen, doch immer nur ein Einzelnes und nicht das Ganze ist, so zeigt sich auch die Natur nicht unbedingt von ihm beherrscht, nicht sklavisch an dasselbe gebunden. Wenn also das Aeusere durch das Innere gegeben und bestimmt wird, so zeigt es doch wieder einige Freyheit und Unabhängigkeit, da Allem, auch dem Geringsten im Leben, das Streben nach selbstständigem Seyn inwohnt. So bildet sich der Schädel von verschiedenen Punkten aus, auf eine Weise, die nur im Ganzen genommen mit der Entwicklung des Gehirns übereinstimmt. Die zerstreuten Knochenkerne vereinigen sich allmählig zu einem harmonischen Ganzen. Die einander erreichenden Schädelknochen beharren dabey von einander geschieden, indem sie, nicht als ein mechanischer, Zug für Zug nachbildender Abdruck, sondern als eine freye Nachbildung des Prototyps in eigenthümlicher Sphäre die Hauptabtheilungen des Gehirns andeuten. Daher sind denn bey Hemicephalen zuweilen (Nr. 638) die Schädelknochen in eine Masse zusammengewachsen; daher sind die Näthe bey dem Menschen um Vieles mehr ausgebildet, als bey den Thieren; daher verwachsen sie erst, wenn das bildende Leben des Gehirns sinkt. Bey dieser ihrer eigentlichen Bedeutung gestalten nun die Näthe allerdings dem Gehirne Wachsthum, und einigermaßen auch Ausdehnung, wie Meibom (*de sutura cranii humani. Aldorffii 1591. 4*) bewies; einigermaßen können wir sie auch mit Hippokrates (*de senile ecet.* 17. p. 304) und Galen auf die Gefäßverbindung oder mit Letztem, Aristoteles (*de part. anim. lib. II. c. 7. p. 605*) und Vesal (*lib. VII. c. 11. p. 551*) selbst auf die Ausdünstung beziehen; nur werden wir nicht mit Galen (*de nov. part. lib. IX. c. 7. p. 173. c. 17. p. 176*) behaupten, daß sie zur Bildung des Perikraniums und zu Verhütung eines Drucks der festen, Hirnhaut auf das Gehirn bestimmt sind; noch weniger aber mit demselben ihren Zweck darin finden, daß sie die Schädelbrüche begränzen, oder mit Mondini (*Carpius fol. 408*) darin, daß Arzneimitteln zum Gehirne gelangen können. — Vermöge der eigenthümlichen Lebensfähigkeit der Knochen können sie auch in einen gewissen Gegensatz zu den höhern Organen treten; so sind bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns

die Schädelknochen zuweilen (Nr. 290) sehr dick und fest; und bey später eintretender Atrophie des Gehirns findet man sie bald dünn und selbst atrophisch, bald verdickt und eisenbeinartig verdichtet. Bey dem Wasserkopfe ist die Verknöcherung gewöhnlich gestört; die Schädelknochen sind ausgedehnt, auseinander getrieben, ohne Näthe, dünn, großentheils häutig und durchscheinend; wenn aber die Krankheit nur langsam fortschreitet und nicht die gesammte Lebenskraft niedrdrückt, so wachert dagegen der Schädel um so mehr: er wird nicht bloß sehr groß, sondern zugleich auch dick, und seine Näthe verwachsen schon in der Zeit der Geschlechtsreife.

§. 775. Abnormitäten im Lebenszustande des Schädels wirken mittels der plastischen Häute störend auf die Hirnthätigkeit ein. Beinahe desselben verursachte Verwirrung und Betäubung, welche durch Entfernung der verdorbenen Knochenstücke gehoben wurde (Marchetti's *obs.* 18. p. 34); bey der Trepanation in einem ähnlichen Falle fand Billguer (S. 85) bloß die Diploe verdorben, die feste Hirnhaut gesund. Die Fälle, wo Delirium und Betäubung bey Caries des Schädels entstehen, sind nicht selten (Nr. 543. 544. 545. 837). Die Trepanation schafft an und für sich öfters Erleichterung bey Hirnleiden, und man hat Beispiele, wo Epilepsia durch sie gehoben wurde, und wieder eintrat, als sich die Wunde geschlossen hatte (Queasay in *acad. de chir.* I. p. 373). — Bey dem Uebergewichte der Plasticität und Irritabilität ist der Schädel dicker: so zersprangen die besten Klängen der Spanier an den Schädeln der zu unterjochenden und zu bekehrenden Wilden Westindiens; so ist er auch bey sensibeln Thieren dünner, als bey muskelstarken. Widerständiglich verdrückt er sich theils durch anhaltende Congestionen, theils im Gegentzute zum Gehirn bey dessen Collapsus und Atrophie: so bey Blödsinn (Nr. 394. 653. 854. 855. 856. Greding II. S. 381. Meckel in *ac. de Berlin* 1764. p. 69), bey Stumpfsein und Schlafsucht (Nr. 756), bey Gedächtnisschwäche und melancholischer Verrücktheit (Nr. 689), bey Delirium und Manie (Nr. 693), bey Wahnsinn (Greding II. S. 401. 493. 446. *Acad. de Berlin* 1764. p. 73. Haslam S. 24. 33. 51), und bey der Trunksucht (Morgagni III. 2. IV. 16. XIV. 35. LX. 12). Auch fand man ihn bey Blödsinnigen (Nr. 378. 691) besonders fest. Zuweilen wird er nach Wahnsinn (Greding II. S. 103. Metzger's Schriften I. S. 53. Haslam S. 25. 36.) und Blödsinn (Haslam S. 37) atrophisch und dünn gefunden. — Bey Kindern verwachsen bisweilen die Suturen; das Gehirn wird dadurch in seiner Thätigkeit, seiner freyen Expansion und seinem Wachsthum beschränkt, und es erfolgt Betäubung und Blödsinn. Solche Fälle beobachteten Hunauld (*ac. de Paris* 1734. p. 26), Trilon (*observations med. chir.* Lugd. Bat. 1743. 4. p. 23), Desessartz (Nr. 690). Es kommt auf dasselbe heraus, man mag die Symptome von der Enge der Schädelhöhle (Morgagni LI. 30) oder von der Hypertrophie des Gehirns ableiten. Häufig verwachsen auch die Suturen bey der chronischen Hirnwassersucht (Nr. 392 bis 395).

§. 776. Das Perikranium steht mit der festen Hirnhaut in naher Verbindung, übt aber verhältnismäßig nur einen geringen Einfluß aus: wenn es an einer Stelle zerstört ist, ohne Nebenverletzungen; so leiden Schädel und feste Hirnhaut gewöhnlich nicht dabey. Allerdings fehlt eine solche Einwirkung nicht gänzlich: das Durchschneiden des Perikraniums ist ein wirkames Mittel, die Zufälle bey Entzündung der festen Hirnhaut

zu vermindern, und man hat gesehen (Slevogt in *Haller Diss. II. p. 817*), daß ein gewaltsames Abreißen des Erstern durch Ziehen an den Haaren, eine Blutergießung auf der festen Hirnhaut und eine Trennung derselben vom Schädel zur Folge hatte. Aber noch stärker ist der Einfluß, welchen die letztere Haut ausübt. Wenn nämlich die feste Hirnhaut durch Erschütterung oder Tabescenz, oder durch Ergießung von Blut oder Eiter auf ihr, vom Schädel getrennt ist, so stirbt dieser an derselben Stelle oftmals ab, und noch häufiger löset sich das Perikranium von ihm.

§. 777. Das Leben des Gehirns wirkt durch die Hirnhäute auf das Perikranium. So fand Haslam (S. 24, 25, 26, 29, 33, 38, 40, 59) dieses nur lose auf dem Schädel liegend nach langen und heftigen Paroxysmen von Wahnsinn und Manie. Umgekehrt kann aber auch der Lebenszustand des Perikraniums die Hirnthätigkeit afficiren. Eine eitrige Geschwulst unter demselben verursachte Kopfschmerz, und Lähmung des Arms (*Aerel II. S. 457*). Nord beobachtete nach einer Kopfwunde Vorboten des Wahnsinns; ein Kreuzschnitt in die schon zugeheilte Wunde hob alle Zufälle (*Pinel über die Geistesverwirrung S. 436*).

§. 778. Der Schädel bekommt endlich eine Belegung von willkürlichen Muskeln mit der Sehnenhaube, und von äusserer Haut mit Haaren. Auch dieser äusserste Bezirk kann auf das Gehirn wirken, wie denn eine in der Kopfhaut erregte Eiterung bey organischen Fehlern des Gehirns oftmals von Nutzen ist, und eine rothlaufartige Entzündung der Sehnenhaube sich auf die feste Hirnhaut fortpflanzen kann. Aber noch deutlicher ist die Abhängigkeit dieser äussern Gebilde von den innern. Bey der Wirbelspalte und bey der Hemicephalie ist auch die Haut an der Stelle, wo die Knochensubstanz fehlt, nicht gehörig entwickelt, sondern ganz dünn, roth, oder bläulich, oder braun, ohne Haare und leicht blutend. Eben so ist das Ergüssen und Ausfallen der Haare oft die Folge von Tabescenz des Gehirns und des Schädels; daß bey dem Menschen allein der längere und reichlichere Haarwuchs auf den Kopf sich beschränkt, hängt ohne Zweifel mit der überwiegenden Lebendigkeit seines Gehirns zusammen.

§. 779. In Hinsicht auf die Umgebungen des Gehirns bieten sich uns noch zwey Bemerkungen dar. Erstlich: ein abnormes Uebergewicht des Blutlebens bewirkt, wenn es in den Aussenwerken des Gehirns seinen Sitz hat, mehr Aufregung; wenn es hingegen in der Hirnsubstanz selbst Statt findet, mehr Oppression der psychischen Thätigkeit, und die räumliche Entfernung bestimmt entsprechende Abstufungen: die Raserey ist bey Entzündung der festen Hirnhaut am heftigsten und am reinsten mit dem Charakter der Synocha bezeichnet; bey Entzündung der Hirnsubstanz selbst ist sie geringer, und nach einer Verstimmung, welche den Anfang der Krankheit bezeichnet, tritt bald Betäubung ein; die Entzündung der plastischen Häute endlich bildet das Mittelglied zwischen Perimenigitis und Encephalitis (§. 360—362). — Zweytens: mechanische Gewalt bringt vornehmlich in den Aussenwerken des Gehirns Abnormitäten hervor, dynamische Momente erregen mehr in der Hirnsubstanz selbst dergleichen: dies gilt von Blutung (§. 244.); Entzündung (§. 246.) und Eiterung (§. 249.).

Dritte Abtheilung.

Von den Dimensionsverhältnissen des Gehirns.

I. Von der Einheit in den Hirnorganen.

§. 780. Im Gehirne verbindet sich Alles unter einander, wie sein Bau überhaupt die in der Mannichfaltigkeit der Gebilde vorwaltende Einheit ausdrückt (§. 87.): die Fasern der einzelnen Stränge ziehen sich durch einander hin; die Faserungen der verschiedenen Systeme legen sich mit ihren Flächen an einander, und Alle endigen in die gemeinschaftliche graue Substanz der Gänglien und der Rinde. Es war eine schiefe Ansicht des Lebens, wenn man meyne, diese Einrichtung sey bloß darum getroffen, damit im Falle des Erkrankens jedes Gebilde seine Function dem andern übertragen könne (Haller *elem. IV. p. 399. Scarpa adnotat. I. p. 105*). Denn besondere Organisationen für Krankheitsfälle giebt es nicht, und es geht im übrigen Organismus vicarirende Thätigkeiten vor sich, ohne an eine mechanische Verbindung geknüpft zu seyn; übrigens sind auch ganz heterogene Hirnorgane mit einander verknüpft, die für einander nicht vicariren können. Diese Einrichtung muß vielmehr auf ein Zusammenwirken der verschiedenen Gebilde, auf Verknüpfung der einzelnen Thätigkeiten zu einem Ganzen sich beziehen. Indem die verschiedenen Hirnelemente im Mantel an einander gelagert sind, ist durch solche Contiguität der gegenseitige Uebergang und die gemeinsame Wirkung möglich; es bedarf keiner Continuität, sondern bey der Flächenanlagerung der verschiedenen Systeme kann ein Verhältnis von dem einen auf das andre übertragen werden.

§. 781. Diese Beziehung spricht sich in Erscheinungen der Sympathie aus. Bey Affection eines Hirngebildes leiden die übrigen mit, und wenn eins derselben besonders empfindlich ist, so wird dieses besonders ergriffen: darum wird selten ein Hirngebilde allein im abnormen Zustande gefunden, und dies macht eben die pathologische Anatomie so zweydeutig und unsicher. Die Erschütterung trifft das ganze Gehirn (§. 271.) und die Abnormität eines einzelnen Theils derselben stört oft die gesammte Hirnthätigkeit.

§. 782. Bey den wirbellosen Thieren bildet der Centraltheil des Nervensystems einen Ring, welcher die Einheit ausdrückt. Die kreisförmige Verbindung der Arterien, welche da sich findet, wo Gegensätze zusammentreten, um in einander zu greifen und gemeinschaftlich zusammen zu wirken, erscheint am freysten, und nicht auf die Endzweige beschränkt, sondern durch die Stämme selbst gegeben, am Gehirne. Dieser Gefäßring, welcher namentlich den Hirnanhang in sich schließt, zeigt das umgekehrte Verhältnis jenes Ganglienrings, der ein plastisches Organ umfließt. Die Ringform des sensibeln Centralpunctes wird bey den Wirbelthieren durch die Kugelform der Ganglien und des Mantels, als den Ausdruck höherer Einheit, verdrängt, ist aber doch auch hier noch angedeutet, indem der Mantel des kleinen Hirns mit der Brücke einen Ring bildet, durch welchen theils die vierte Höhle, theils der Brückenhirnstamm sich erstreckt; eben so bildet

der Großhirnstamm mit seinen Ganglien und Strahlungen einen oben offenen Halbring, welcher durch den Balken ergänzt und geschlossen wird.

§. 783. Durch die Kugelgestalt wird die innige Verknüpfung der verschiedenen Theile schon mechanisch begründet. Der sogenannte Gegenstoß beruht auf einem durch Mechanismus bedingten Consensus und Antagonismus; vermöge der mechanischen Einheit der verschiedenartigen Gebilde, pflanzt sich der mechanische Eindruck, welcher eins derselben unmittelbar trifft, auf das Ganze fort, und tritt am stärksten an dem gerade entgegengesetzten Punkte hervor. An keinem Theile kommen aber die Gegenstöße so häufig vor, als am Kopfe. Vermöge seines gewölbten Baues ist der Schädel der ganz eigentliche Sitz der Contrafractionen und Contrafisuren. Aber auch in den Hirngefäßen zeigen sich die Gegenstöße: nach einem Falle auf den Hinterkopf fand sich Extravasat am Vorderlappen (Stoll III. p. 225); nach einem Falle auf die Stirn fand es sich am Hinterlappen und am kleinen Hirne (Stöck I. p. 125); nach einem Falle auf das linke Scheitelbein hatte es seinen Sitz unter dem rechten Unterlappen (Saucerotte in *Pris de chir.* X. p. 366). Ähnliche Fälle von Extravasat und selbst von Sugillation (§. 245.) sind nicht selten (Beyträge II. S. 9. 114. fg.). Henckel (Abh. S. 62) sah nach einem Schläge auf's Hinterhaupt Zerreißung des Vorderlappens und (S. 66) nach einer Wunde am linken Scheitelbeine eine Zerreißung in der rechten Hemisphäre. Auch ohne Trennung des Zusammenhangs entsteht auf der der Verletzung entgegengesetzten Stelle häufig Entzündung der Rinde und der plastischen Häute (Lallemand I. p. 443); so fand Morgagni (II. 28) nach einem Falle auf's Hinterhaupt Eiterung am Vorderlappen, und Pagray (*de chir.* II. p. 144) nach einem Schläge auf den Scheitel ein Geschwür an der Basis des Gehirns. Eben so entstehen Aftergebilde am kleinen Hirne (Nr. 930. 934. 953), oder am Hinterlappen des großen Hirns (Nr. 1023. 1024) nach einem Stosse, Schläge oder Falle auf die Stirne. Auch ohne eine mechanische Gewalt äussert eine krankhafte Thätigkeit des Gehirns oft ihre Wirkungen antagonistisch im entgegengesetzten Punkte: so verursachen Aftergebilde im kleinen Hirne Schmerzen in der Stirne (§. 1045.); eins (Nr. 1023) in der linken Hemisphäre machte Schmerzen in der rechten Seite, und ein Geschwür im rechten Streifenhügel (Nr. 454) verursachte rechts Schmerzen.

§. 784. Solchergestalt finden wir in dem Gewebe, so wie in den Vitalitätsverhältnissen des Gehirns ein sprechendes Bild der Seele, in welcher ebenfalls alles Einzelne gegenseitig verknüpft ist, in einander übergeht, auf einander einwirkt und zu einem gemeinsamen Producte sich vereint. Die mancherley Seelenkräfte sind allerdings von einander verschieden, und existiren als einzelne Elemente; aber sie vereinigen sich immer zu einem Ganzen, so wie überall die Elementarorgane zu einem bestimmten Gebilde, und die Elementarthätigkeiten zu einer Gesamtfunktion sich verknüpfen. Die Verdauung z. B. setzt voraus die Secretion einer organischen Flüssigkeit und den chemischen Conflict desselben mit den Nahrungstoffen einen sensibeln Act, welcher das Vorstättengehn dieses Hergangs bedingt, und eine irritable Thätigkeit, wodurch das Product aufgesogen und der Ueberrest ausgestoßen wird: es bestehen diese Acte wirklich neben einander, und werden durch besondere organische Gebilde vollzogen; aber die Verdauung selbst, als wirkliche Function, ist das Gänzzutergange aller dieser Momente. So ist nun jede einzelne

Seelenkraft, wie jedes einzelne Hirngebilde, nichts wirklich Selbstständiges und Eigenmächtiges, sondern ein mit der Gesamtheit organisch verknüpftes Moment, welches die Merkmale des Ganzen, wiewohl auf besondere Weise, in sich trägt. Jeder psychische Act ist die Combination von mancherley Elementarthatigkeiten, und je nachdem diese an sich und in ihren gegenseitigen Proportionen verschieden sind, muß auch das Gesamtergebnis verschieden ausfallen. Ein Vorbild dieses Wirkens, wo das Ganze, von einem Punkte aus ergriffen, in verschiedene Sphären zerfällt, deren harmonische Thätigkeit ein Gesamtergebnis giebt, erblicken wir in den Klangfiguren.

II. Rechts und Links.

§. 785. Die Duplicität ist ein zu tief eingreifendes organisches Verhältniß, als daß wir ihren Grund in einem minder wesentlichen Umstande finden, und z. B. annehmen könnten, daß sie die leichtere Vertheilung der Gefäße bezwecke (*Picolesmini Ab. F. lect. 2. p. 248*): auch zum ungetheilten, kuglichen Gehirn könnten Gefäße dringen; Duplicität erscheint schon bey den Fischen, wo die Gefäße des Gehirns noch sehr sparsam sind, und manche Hirntheile, z. B. die Sehkugeln der Vögel liegen viel weiter auseinander, als zur Aufnahme von Gefäßen nöthig wäre.

§. 786. Gegen die Mittellinie hin ist Alles im menschlichen Körper mehr contrahirt: theils sind daselbst wirkliche Lücken, theils Einschnitte und Längenervertiefungen; theils Vertiefungen der Masse. Nach demselben Verhältnisse ist das Thal am kleinen Hirne, die Farche der Brücke und der Großhirnschenkel, der Längeneinschnitt des großen Hirns, der Körper des Balkens und die Scheidewand gebildet (§. 87). Indem von der Mittellinie aus nach beyden Seiten hin die Masse freyer sich entwickelt, tritt die paarige Bildung hervor. Unpaarig läßt sich am Gehirn mit dem meisten Rechte noch der Hirnanhang nennen: indessen hat doch auch der zu ihm gehörige Trichter einen Längeneinschnitt und eine Fortsetzung von der rechten und linken Hälfte des Hirnstamms. Die Zirbel hat ihre paarigen Markstiele; Balken, Brücke und vordere Commissur gehn zwar über die Mittellinie herüber, haben aber paarige Strahlungen in beyden Hemisphären; die Scheidewand besteht aus zwey, bloß an einander sich heftenden, den beyden Hemisphären angehörigen Blättern, und bey dem Gewölbe ist die Duplicität noch augenscheinlicher. Im Grunde ist also Alles im Gehirn paarig.

§. 787. Die Duplicität im Gehirn ist offenbar der Ausdruck höherer Entwicklung. Die Eröffnung des Hirnstamms durch das Aufschließen seines Canals zu seitlicher Entwicklung, ist eine Steigerung seiner Bildung; nur die höhern Sinnesnerven treten zu eröffneten Hirnstamms, während sein ungespaltnen Theil die niedern Nerven aufnimmt. Das Wesentlichste erscheint schon im Beginnen des Lebens, aber auf unvollkommenere Weise; das Gehirn besteht ursprünglich aus zwey seitlichen Hälften, welche dann zu einer ungetheilten Masse verschmelzen, bis endlich an dieser Duplicität mit Einheit verknüpft, sich entwickelt. Bey monströser Unvollkommenheit des Gehirns (Nr. 649. 651), wo das Leben ohne Empfindung und willkührliche Bewegung bestand, war das Gehirn ungetheilt; vermöge dieses Mangels an Duplicität fehlten bey einigen blödsinnigen Kindern die dritte und vierte Höhle (Klein in Siebolds Journ. f. Geburtshülfe. I. Bd. 2. St.). Davon ist wohl zu unterscheiden die Verwachsung beyder Hemisphären mittels ihrer Häute, in Folge

einer Meningitis. Bey Hemicephalen fehlt gewöhnlich die Sichel; diese aber ist nichts Andres, als der Ausdruck der Duplicität, nicht, wie man seit Vienssens (c. 3. p. 14.) zu sagen gewohnt ist, eine Unterlage, welche, wenn wir auf der einen Seite liegen, die Hemisphäre der entgegengesetzten Seite hält, daß sie die andre nicht drückt. — In der aufsteigenden Thierreihe sehen wir auch die Duplicität zunehmen. Je höher die psychische Entwicklung ist, desto mehr ist der Hirnstamm seitlich entfaltel: so geht die Schenkel des großen Hirns bey den Säugethieren mehr parallel, bey dem Menschen mehr divergirend nach vorne und oben, und eben so ist auch das kleine Hirn bey ihm breiter. Die Sichel fehlt bey den Vögeln noch gänzlich; bey den Säugethieren fehlt sie zum Theil ebenfalls, oder sie ist nur schwach entwickelt; und die kleine Sichel fehlt fast immer; erst bey dem Menschen sind beyde Sichel vollständig ausgebildet. Bey den niedern Säugethieren sind die Markkugeln verwachsen, bey den höhern von einander vollkommen getrennt. — In den Nerven sehen wir ein ähnliches Verhältniß während der sympathischen und der zehnten Hirnnerven im Rumpfe mehr unpaarig ist, indem die Stämme beyder Seiten durch Querzweige sich verbinden und weniger symmetrisch sind, verharren die Nerven, in welchen die Sensibilität reiner sich ausspricht, in Duplicität und Symmetrie.

§. 788. Das seitlich Entwickelte besteht auf der höhern Stufe der Bildung, aber es erlangt Vereinigungspuncte in der Mittellinie, theils durch das Zusammentreffen der sich verlängernden paarigen Gebilde, theils durch das Eindringen unpaariger Theile zwischen ihnen. Letztes erfolgt am Gehirne, indem die Commissuren zwischen den Hemisphären sich erzeugen. Die Sehnerven, als die sensibelsten und am höchsten entwickelten Nerven, verbinden sich im Chiasma commissurenartig. Durch das Fortwachsen der seitlichen Theile erfolgt die Vereinigung in der Mittellinie am Antlitz und Rumpfe. Bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns ist dies auf die höhere Ausbildung sich beziehende Fortwachsen gehemmt, und es bleiben Spalten in der Mittellinie: häufig sind alle Wirbel, oder doch die des Halses und der Brust ohne Bogen, und es ist eine Wirbelspalte dadurch gegeben (Nr. 355. 602. 604. 606. 610. 611. 613. 614. 615. 621. 629. 635); oder es ist Hasenscharte und Wolfsrachen vorhanden, indem die seitlichen Theile der Lippen, des Gaumens und selbst der Nase sich nicht vereinigen (Nr. 626. 628. 630. 635. 642); oder es bleiben die Wände des Bauchs oder des ganzen Rumpfs, indem das Brustbein fehlt, nach vorne offen, so daß die Eingeweide unbedeckt, oder nach aussen liegen (Nr. 605. 609. 618. 638).

§. 789. Es gibt eine gewisse Duplicität der Seele: bildet sich diese etwa in der Duplicität des Gehirns ab? 1) Das Selbstbewußtseyn enthält den Gegensatz des Anschauenden und des Anschaulichen: betrachtet vielleicht die Seele in der einen Hemisphäre, was sie in der andern wirkt? Und wird die gegenseitige Beziehung beyder, das Anschauen der Identität des Denkenden und des Gedachten durch die Einheit der Commissuren vermittelt? Das Lauschen auf die eignen Gedanken, das Grübeln über den Gang der Vorstellungen strengt sehr an und führt leicht zur Verrücktheit: geschieht dies dadurch, daß bey jenem Acte eine gezwungene, widernatürliche Spannung zwischen beyden Hemisphären Statt findet und eine Disbarmonie derselben entsteht? Wir percipiren den uns aufgedrungenen, krankhaften Zustand der Seelenenthätigkeiten: Moser (Tiedemanns Untersuchungen über den Menschen III. S. 357) erzählt, daß er in einem solchen Falle einige Stunden lang in

der linken Hemisphäre phantasirt, in der rechten hingegen verständig gedacht und das Phantasiren bemerkt, und richtig beurtheilt habe. Indess ist dies eine isolirte Thatsache des Gemeingefühls, welches so leicht täuschen kann: Moser fühlte einen abnormen Zustand, vielleicht Druck, Hitze, Spannung in der linken Seite, und fühlte sich in der rechten frey; er wurde dabey sich seines Deliriums bewußt, aber daß Delirium und Bewußtseyn an die beyden Hemisphären vertheilt waren, setzte er hypothetisch hinzu. Alles Uebrige abgerechnet, was sich auf die Natur des Selbstbewußtseyns bezieht, so kommt diese Gegensetzung, diese höhere Steigerung des Bewußtseyns offenbar nur dem Menschen zu, und doch sind jene Commissuren auch bey den höhern Thieren vorhanden, was freylich keine entschiedne Widerlegung, aber doch einigen Grund zum Zweifel giebt. — 2.) Autenrieth (S. 1048.) wirft die Frage auf: ob nicht die Hemisphären sich wie ein doppelarmiger Hebel verhalten, und dem allgemeinen Gegensatz in unsrem Denken entsprechen? In beyden, fährt er fort, entsteht die gleiche Thätigkeit, aber zugleich die entgegengesetzte; denn sonst könnte keine Wahl Statt finden. Nun müssen sie ungleich seyn, da nirgends zwey Dinge einander gleich seyn: wenn in beyden Hemisphären A und B ist, so muß in der einen AAB, in der andern ABB seyn. — Nach dieser scharfsinnigen Conjectur würden die Hemisphären den Gegensatz von Phantasie und Urtheilskraft, und den Streit zwischen Sinnlichkeit und Verstand ausdrücken. Die Commissuren, würden dann die feste Unterlage des doppelarmigen Hebels seyn, und das eigentlich Entscheidende müßte darin bestehen, daß diese Unterlage bald auf diese, bald auf jene Seite gerückt würde, oder daß am einen oder am andern Arme das Gewicht sich vermehrte: es bedürfte dann also immer noch der Hinzukunft eines andern Moments. Uebrigens sehen wir aber die Nothwendigkeit der ganzen Conjectur nicht ein: in jeder Hemisphäre selbst schon sind Gegensätze des Gleichartigen, so wie des Niedern und Höhern, so daß hier schon ein solcher Kampf eintreten und durch die stärkere Thätigkeit des Einen oder des Andern geschlichtet werden kann.

§. 790. Wenn wir nun mit den Sinnesorganen der einen Seite Eindrücke aufnehmen, so muß nur die eine Hälfte des Hirnstammes afficirt werden, und wenn wir die Glieder der einen Seite bewegen, so muß der Impuls auch nur von einer Seite des Hirnstammes ausgehn: gleichwohl ist die Vorstellung eine einzige, auch wenn beyde Seiten thätig sind. Wir bemerken indess 1) daß die Einheit der Wahrnehmung mittels eines paarigen Sinnesorgans keine absolute ist, sondern zu gleicher Zeit verschiedene Eindrücke percipirt werden können. Am meisten gilt dies vom Geste, einigermaßen aber auch vom Gesichte. Wenn wir die Augen in zwey verschiedene Richtungen bringen, so sehen wir einen Gegenstand doppelt, oder zweyerley Gegenstände zugleich; wird das Schielen habituell, so sieht man nur mit einem Auge. Doppeltsehen entsteht bald, wenn ein Bewegungsnerve des Auges afficirt ist, z. B. durch den Druck von Ahergebilden (Nr. 957), bald bey Abnormitäten des Hirnstammes (Nr. 975) oder des Mantels (Nr. 14. 31. 492. 568. 999. 1027. 1030), wo, wie es scheint, eine Ungleichheit der Thätigkeiten beyder Seiten zum Grunde liegt. — 2) Die nächsten Organe der Empfindung und Bewegung, die Ganglien, sind weniger von einander geschieden, sondern sitzen auf dem Hirnstamme, in welchem die beyden seitlichen Hälften mehr mit einander ver-

bunden sind. Uns ist zwar die Freyheit gegeben, bald die Glieder der einen Seite allein, bald die beyder Seiten zugleich und in verschiednen Richtungen zu bewegen; aber vermöge der Einheit des Hirnstammes ist es immer leichter; beyde Seiten harmonisch zu bewegen, entweder in bestimmtem Rhythmus wechselnd, oder gleichstättig in entsprechender Richtung; mit beyden Seiten zugleich ganz entgegengesetzte Bewegungen hervor zu bringen ist sehr schwer. Wenn ein Mensch, der an halbseitiger Lähmung leidet, sich anstrengt, die kranke Seite zu bewegen, so gelingt es ihm besser, wenn er zugleich die gesunde bewegt. So scheint denn bey der Thätigkeit der einen Hälfte die andre mitzuwirken: Foderà (*Magendie Journ.* III. p. 200) sah, dafs nach senkrechter Spaltung des Rückenmarks die Empfindung und zum Theil auch die Bewegung auf beyden Seiten erschollen war.

§. 791. In der höhern Sphäre des Hirnlebens finden wir das Gegentheil vom Hirnstamme, nämlich größere Spaltung und vollständigere Duplicität im Organe, und höhere Einheit in der Thätigkeit. Diese Einheit kann durch die Commissuren gegeben werden. Indefs sehen wir zwar, dafs diese bey Menschen stärker entwickelt sind, als bey Thieren, aber doch findet bey denjenigen Thieren, welchen sie fehlen, schon eine gewisse Einheit der Vorstellungen Statt, und bey denen, wo sie schon ziemlich entwickelt sind, bey Weitem nicht die Einseitigkeit des Denkens, wie bey dem Menschen. — Die psychische Thätigkeit ist eine dynamische Wirkksamkeit (§. 457); analog den äussern dynamischen Naturerscheinungen, gibt sie zwar an dem Räumlichen vor, und wird durch dasselbe bedingt, aber besteht nicht im Räumlichen; sie ist die Gesamtwirkung der Glieder, welche die von einander geschiedenen Entfaltungen eines Gemeinsamen sind. Wir können die Hemisphären mit den beyden Aermen eines Hufeisenmagnets vergleichen, deren Vereinigungs- und Indifferenzpunkt im Hirnstamme liegt: in den räumlich getrennten Gliedern ist eine ungetheilte dynamische Wirkksamkeit, und somit ist Descartes Voraussetzung, dafs das Denken in einem unpaarigen Hirntheile seinen Sitz haben müsse, ungegründet. Im ganzen Organismus zeigt sich ein Consensus der Symmetrie oder ein Einklang der Duplicität. Wie die Bildung und Ernährung in beyden Körperhäften im Ganzen genommen übereinstimmend vor sich geht, so tritt in Krankheiten diese Aeusserung zuweilen eben so deutlich hervor: ist durch äussere Schädlichkeit ein Zahn caries geworden, so wird es oft der entsprechende der andern Seite auch, und ist ein Auge durch äussere Gewalt zerstört, so erblindet nicht selten auch das andre; Aneurismen entstehen bisweilen an den gleichnamigen Arterien beyder Seiten; Geschwüre an der einen Parotis oder an der einen Schulter haben oft dergleichen an der andern Seite zur Folge; Treviranus (*Biologie* V. S. 370) führt selbst Fälle an, wo die Reizung der einen Seite Schmerzen in der andern erregte. Die von der Abnormität der einen Hemisphäre herrührende Hemiplegie geht öfters in Lähmung beyder Seiten über (§. 351.). Dafs es bey diesen Erscheinungen nicht etwa blofs auf die räumliche Einheit der Centralenden beyder Seiten ankommt, lehren uns die Bewegungen des Augapfels. Im ganzen Bereiche der Lebenserscheinungen giebt es keinen unbedingten herrschenden, keinen allgemeinem und bleibenden Consensus, als den zwischen den Bewegungen beyder Augäpfel: wenn wir rechts blicken, so bewegen sich nothwendig beyde Augäpfel rechts, also der rechte nach

ausen durch den Äußern; der linke nach innen durch den innern geraden Augenmuskel; der innere Muskel des einen Auges steht also im innigsten Consensus mit dem äußern Muskel des andern Auges. Nun wird der äußere Muskel durch den sechsten Hirnnerven bestimmt, welcher unter der Brücke aus dem verlängerten Marke entspringt, der innere hingegen durch den dritten Hirnnerven, der sein Centralende oberhalb der Brücke in den Scheukeln des großen Hirns hat; folglich muß der rechte Großhirnschenkel mit der linken Hälfte des verlängerten Marks und umgekehrt in einem solchen Consensus stehen, daß keiner dieser Theile für sich allein wirken kann. Wir sehen also hier die innigste Harmonie zwischen zwey Hirnorganen, die sowohl nach oben und unten, als nach rechts und links räumlich getrennt sind. So muß denn nun auch in den beyden Hemisphären, als Entfaltungen des einzigen Hirnstammes, trotz aller Geschiedenheit die Einheit des Gedankens hervortreten können. Duplicität ist Entwicklung in Gegensätze mit innerlicher, dynamischer Einheit; die Zweyheit bezeichnet die Geschiedenheit, die Vielheit, $1 \neq 1$; die Symmetrie ist $1 = 1$. Also bey der symmetrischen Duplicität ist Gegensatz und Identität zugleich gegeben, und wie durch den Gegensatz Alles klarer wird, so muß durch den der Hemisphären das Denken vollkommener werden. Somit ist gewissermaßen richtig, was Varoli (p. 7) freylich durch zu sinnliche Bilder ausdrückt: es sey Duplicität im Gehirne, damit seine Theile bey ihrer Weichheit und Größe sich nicht verwirren, sondern gleich zwey getrennten Wassertropfen neben einander bestehen.

§. 792. Wenn das Denken mit einer gleichzeitigen und harmonischen Thätigkeit beyder Hemisphären verknüpft ist, so muß es auch durch die Abnormität der einen Hemisphäre im Ganzen gestört werden können. Wir finden in der That eine Bestätigung unserer Ansicht in einer großen Menge von Beobachtungen, wo bey Apoplexie, Betäubung, Delirium bloß in der einen Hirnhälfte ein abnormer Zustand vorhanden war. — Kann aber auch eine Hälfte für sich allein wirken? Hippocrates (*de morbo sacro sect. 6. p. 330*) sagt: da das Gehirn getheilt ist, so schmerzt zuweilen eine Hälfte allein. Aber auch im Ungetheilten kann ein einzelner Punct schmerzen. — Wie nach dem Abbrechen des einen Arms von einem Hufeisenmagnete, oder nach Wegnahme der einen Hälfte von einer galvanischen Säule, dieselbe dynamische Wirkung sich fernerhin äußert, indem Indifferenz und Polarität nur auf andre Puncte übertragen wird, und wie nach Verengerung eines Gefäßes das ihm entsprechende Gefäß der andern Seite für dasselbe vicariirt (§. 228), so muß auch das Denken in einer Hemisphäre nach Zerstörung der andern bestehen können. Zahlreiche pathologische Beobachtungen bestätigen dies. Auch Flourens (p. 94) Versuche stimmten damit überein: eine Henne, welcher er die rechte Hemisphäre des großen Hirns und die linke Schkugel genommen hatte, und die noch zwey Monate lebte, war auf beyden Augen blind, aber hörte und gab Zeichen von Verstand und Willen, ging selten und mit Vorsicht, suchte und wählte die Nahrung. Es kann also die eine Hirnhälfte für die andre vicariiren, so wie überhaupt im Organismus ein einzelnes unverletzt gebliebenes Glied die Function des Ganzen, zu welchem es gehört, über sich nehmen, und das Leben bis auf einen gewissen Punct sich von der räumlichen Organisation unabhängig zeigen kann. Aber eine ganz schiefe Ansicht war es, wenn man mit Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 10. p. 169*) und Willis (*cerebr.*

z. 10. p. 48) die Duplicität überhaupt aus dem Zwecke erklärte, damit, wenn die eine Hälfte verletzt sey, die andre noch wirken könne. Diese Erklärung ist gerade so, als wenn man sagte, der Mensch habe deshalb zwey Beine, damit er nach dem Verluste des einen auf dem andern noch hinken könne; könne noch ein drittes hinzu, welches nach Verlust der beyden andern in Wirksamkeit treten könnte, so müßte dadurch die Organisation noch einmal so vollkommen seyn. Jede Einrichtung in der Natur ist zu vielerley Dingen und bey mancherley Zufällen nütze; aber der Zweck der Natur liegt in der Sache selbst unmittelbar, und kann sich nicht auf solche Zufälligkeiten beziehen. Wenn der Anatom durch seine Ungeschicktheit die eine Hemisphäre für die Untersuchung verdorben hat; so wünscht er sich Glück, daß ihm noch die andre Hemisphäre übrig geblieben ist; aber er wird sich darum nicht einbilden, daß die Duplicität des Gehirns zum Behufe eines ungeschickten Anatomen geschaffen sey.

§. 993. Eine gewisse Ungleichheit beyder Hirnhälften läßt sich mit einer höhern Entwicklung der Kraft vereint denken. Es ist nicht bloß das eine Auge gewöhnlich stärker, als das andre, sondern es zeigt sich auch eine qualitative Verschiedenheit an den entsprechenden Sinnesorganen: wenn man das äussere Ohr mit dem Finger schnellt, oder mit dem Finger im Gehörgange bohrt, so vernimmt man in dem einen Ohre einen höhern, im andern einen tiefern Ton. Die Disharmonie der einzelnen Ohren scheint sich durch das Zusammenwirken beyder in eine höhere Harmonie aufzulösen; findet nicht dieses Verhältniß auch im Gehirne Statt? Die Beschaffenheit der Randwülste scheint dafür zu sprechen: bey den Affen, den meisten Raubthieren und den Nagethieren sind sie völlig symmetrisch; dies nimmt ab bey den Wiederkäuern, Einhufern, Dickhäutern, bey dem Bäre und Dachs, und noch mehr bey dem Seebunde und Delphine; am meisten unsymmetrisch sind die Randwülste bey dem Menschen, indem hier die symmetrischen Hauptzüge durch die zahlreichern Blätter der Belegungsmasse unscheinbarer gemacht werden. Daher meynte schon Willis (cer. c. 10. p. 49), ihre unbestimmte Ordnung bey dem Menschen drücke seine höhere geistige Freyheit aus, während das Thier mit symmetrischen Randwülsten bloß das denke, was dem Bedürfnisse und dem Instincte entspricht. — Man bemerkt sehr häufig, auch bey den Gesündesten, eine ungleiche Grösse der Hemisphären (Sömmerring's Hirnlehre S. 27) und eine Schiefe der Hirnschale; und es ist weder bewiesen, noch glaublich, daß dies, wie Haller (elem. IV. p. 147), Vetter (pathol. Anat. S. 58) und Gall (*systeme II.* p. 358) glauben, von der Gewohnheit herrührt, die Kinder immer auf dieselbe Seite in die Wiege zu legen. Die häufige Ungleichheit der Hemisphären des kleinen Hirns erkennt man schon aus der Verschiedenheit ihrer Gruben im Hinterhauptsbeine und aus der Neigung der kleinen Sichel gegen die eine Seite (Mayer Anat. VI. S. 25). Wenzel's (cerabr. p. 121, 301. Hirnanhang S. 51, 71) fanden die Sehhügel und Streifenhügel auf beyden Seiten einander öfters ungleich. Vieq-d'Azyr (p. 9) bemerkte solche Ungleichheit am Gewölbe und am Hinterhorne. Sie wurde ferner beobachtet an den Hügeln der Hirnnerven (Wenzel cer. p. 186), an den Centralenden des Riethstreifens (Gordon p. 87), und am vierten, fünften und sechsten Hirnnerven (Sömmerring de basi p. 57. 78. 85).

§. 794. Ist aber die Ungleichheit zu groß, so muß die Harmonie im Ganzen aufgehoben werden: ist die Verschiedenheit in der Stimmung der Ohren zu bedeutend, so fehlt es an Feinheit des musikalischen Gehörs; bey großer Ungleichheit der Sehkraft auf beyden Augen sieht man schärfer, wenn man das eine zudrückt, und eben so riecht man bey halbseitigem Schnupfen besser, wenn man das kranke Nasenloch zuhält. So kann denn auch die zu große Ungleichheit der Hemisphären eine allgemeine Störung der Seelenenthätigkeit bewirken oder begünstigen. Bey Verrückten ist oft die eine Seite des Schädels viel stärker gewölbt, als die andre (Georget Verrücktheit S. 258). Bey einem höchst geistreichen und verdienten Gelehrten, welcher in Theorie und Praxis manche Widersprüche zeigte, und in den letzten Jahren seines Lebens in den Wahnsinn der Eitelkeit verfiel, fand man bey übrigen vorzüglicher Bildung den Schädel sehr schief.

§. 795. Was die Differenz beyder Seiten anlangt, so findet man im Ganzen genommen die rechte Seite des Gehirns häufiger überwiegend ausgebildet, als die linke. Dies fand im Allgemeinen Günz (Haller elem. IV. p. 13); Georget (a. a. O.) bemerkte es bey Verrückten; Autenrieth (§. 1048.) bey Halberstinen, indem hier die linke Hälfte des Schädels am meisten verengt ist; so fand auch Reil (Beyträge II. S. 76–82) bey zwey Blödsinnigen rechts die Schädelhöhle größer und den Schädel dünner, links den Schädel nach innen verdickt, die Höhle und die Löcher für die Nervendurchgänge enger. Indem aber die Seite, welche nach vorn mehr entwickelt ist, nach hinten sich weniger ausgebildet zeigt, scheint es häufiger zu seyn, daß bey schiefen Schädeln links die Stirne und rechts das Hinterhaupt hervorrage, als umgekehrt. — Auch die Nervenstämme der rechten Seite sind oft stärker, als die der linken (Sömmerring de basi p. 13), wie dies auch besonders bey nahe liegenden Nervenzweigen, z. B. an der Speiseröhre, sichtbar ist. Die rechte Wirbelerterie und Carotis ist gewöhnlich stärker, als die linke (Sömmerring ebend. und Gefäßlehre §. 1063.); dasselbe gilt vom rechten Querbahleiter (Haller IV. p. 147), und da von der rechten Drosselader der Weg zum Herzen gerader und kürzer ist, als von der linken, so erstreckt sich eine Anhäufung von Blut im rechten Herzen vorzüglich leicht über die rechte Hemisphäre des Gehirns (Autenrieth §. 855.), wie denn auch die rechte Carotis mehr in der geraden Richtung der Aorta fortgeht, als die linke (Bicheteau in Journ. compl. I. p. 289). Aus diesen Umständen ergibt es sich denn, daß Abnormitäten, welche auf einem Uebergewichte des Blutsystems beruhen, auf der rechten Seite häufiger vorkommen müssen. Das Verhältniß der rechten zur linken Seite war in Hinsicht auf Frequenz bey der Entzündung nach Lohlemaund (l. p. 215) wie 12:9, bey Eiterung nach Mehlis (p. 12) wie 28:9, bey Blutergießung nach Morgagni (III, 18) wie 10 zu 3. Auch Erweichungen, Verhärtungen und Aftergelbte kommen nach Mehlis häufiger rechts vor. Dagegen sind nach seinen Bemerkungen auf der linken Seite häufiger, als auf der rechten (== 43:19) die serösen Ergießungen (p. 12), ferner (== 4:2) die Hydatiden (ebend.); halbseitige Kopfschmerzen (p. 38), Zittern (p. 27), Taubheit der Glieder (p. 23), Veitstanz (p. 32), und die *anxia epileptica* (p. 39). Wenn Wenzels (ser. p. 97) behaupteten, daß das Gehirn bey Lähmung der Glieder häufiger links leidet, so gilt dies nach Mehlis (p. 20) vorzüglich von der Hemiplegie, welche die Folge nervöser Apoplexie ist.

§. 796. Wir betrachten nun die Verhältnisse der beyden Hemisphären zur Bewegung der rechten und linken Gliedmaassen, und erkennen zuvörderst als allgemeines Resultat, daß die Erfahrung ein solches Verhältniß allerdings nachweist, folglich auch der Wille schon eine örtliche Beziehung im Gehirne nimmt. Die Lähmung tritt A) bey Abnormitäten in der einen Hemisphäre a) gewöhnlich in den Gliedern der entgegengesetzten Seite ein, wie denn schon Hippocrates solche Fälle bemerkte. Daß eine Hemisphäre nicht auf die Glieder ihrer, vielmehr auf die der entgegengesetzten Seite wirken sollte, war Einigen so unglaublich, daß sie lieber andre Erklärungsarten jener Erschütterung versuchten. So meynete denn Dulaurens (*lib. X. c. 10. p. 540*), da der Kranke gewöhnlich auf der Seite liege, auf welcher das Gehirn gesund ist, so fließe der Eiter auf dieselbe herüber von der kranken Seite, oder die verletzte Hälfte ziehe bey der in ihr eintretenden Blutung, Entzündung oder Eiterung die Geister aus der gesunden Hemisphäre an sich, so daß in dieser so wie in den Gliedern ihrer Seite Lähmung entstehe. Boerhaave wollte die Erscheinung deduciren erklären, daß die Erschütterung von der zunächst getroffenen Hemisphäre auf die andre sich fortpflanze. Barthéz (*science de l'homme. II. p. 132*) leitete die Lähmung der Glieder von einer Reizung und krampfhaften Zusammenziehung der Hemisphäre derselben Seite ab, welche antagonistisch durch die Schwächung der andern verwundeten Hemisphäre erregt werde. Metzger (*advers. p. 44. 299.*) meynete endlich, daß in der nicht verletzten Hemisphäre eine nicht bemerkte Abnormität Statt finde, welche die Glieder ihrer Seite lähme. Allein 1) die ansichbare Abnormität kann doch nicht stärker seyn, als die sichtbare; namentlich kann dies nicht der Fall seyn, wo ein innerer Krankheitsbergang und keine mechanische Erschütterung zum Grunde liegt. 2) Die Erklärung durch den Gegenstoß paßt auf diese Fälle gar nicht, und übrigens nur auf die Fälle, wo die mechanische Gewalt von der Seite her, nicht aber auf die, wo sie von oben, oder vorne, oder hinten her wirkt. 3) Reizung des Gehirns kann allerdings in einzelnen Fällen Lähmung verursachen, allein ungleich häufiger und gewöhnlich rührt diese von Schwäche desselben her. 4) Von thierischen Geistern und von Krämpfen des Gehirns wissen wir nichts. 5) Lähmung der Glieder der andern Seite erfolgt bey Menschen viel zu häufig, als daß sie von einem zufälligen Umstande abhängen könnte, und 6) sie tritt auch bey Thieren ein, wo mit Vorsicht und ohne Erschütterung, Ergießung und Entzündung die Hemisphären verletzt werden; unmittelbar noch der Operation sind die Glieder der entgegengesetzten Seite geschwächt (Armenan S. 4. 12. 18. 20. 25 u. s. w.); wird noch mehr Hirnsubstanz weggenommen, so werden diese Glieder völlig gelähmt und die Thiere fallen auf die Seite derselben (*Molinelli in comm. Bonon. I. p. 139.*). Sie legen sich auf die der Hirnwunde entgegengesetzte Seite, springen, wenn sie auf die Seite der Wunde gelegt werden, schnell auf, um sich wieder auf jene Seite zu legen; werden sie auf der gelähmten Seite unterstützt, so können sie etwas gehn; wenn sie späterhin sich erholen, und von selbst zu gehn anfangen, so füllen sie bey jedem kleinen Stöße immer auf die der Hirnwunde entgegengesetzte Seite (Rolando p. 37). Die an einer Hemisphäre verletzten Thiere drehen sich im Kreise, wie die Schafe bey Blasenbandwürmern in den Seitenhöhlen: und somit scheint denn das Vermögen in gerader Richtung fortzuschreiten mit durch das Gleichgewicht beyder Hemis-

sphären bedingt zu seyn. Hunde, welchen viel Hirnsabstanz genommen worden war, liefen sogleich nach der Operation im Kreise herum (Arneemann S. 14. 27. 31. 43. 66.); hatten sie weniger Hirnsabstanz verloren, so erfolgte dies erst wenn Fütterung oder ein Hirnschwamm entstand (ebend. S. 16. 28. 30); Kaninchen sprangen gegen die eine Seite (ebend. S. 50), nur Hühner drehten den Kopf nach einer Seite, oder steckten ihn unter den einen Flügel (ebend. S. 67. 69). Tauben drehten den Kopf auf diejenige Seite, auf welcher das Gehirn verletzt worden war (*Lorry in mém. prés. III. p. 374*), und Hunde krümmten sich auf dieselbe Seite kuglich zusammen (*Saucarotte in prix de chir. X. p. 344. Serres in Magendie jour. III. p. 146 499*). Nun sollte man erwarten, daß, da bey halbseitiger Lähmung die gesunden Glieder weiter ausschreiten, als die gelähmten, diese Drehung oder seitliche Bewegung auch gegen die gelähmte oder der Hirnwunde entgegengesetzte Seite vor sich gingen: allein in allen jenen Fällen, welche Arneemann beobachtete, erfolgte das Gegentheil; die Seite, auf welcher das Gehirn verletzt und die Glieder geschwächt waren, wurden die Angel, um welche die Thiere sich drehten, und die der Hirnwunde gegenüber liegenden, geschwächten Glieder mußten größere Schritte machen. Dasselbe beobachtete auch Foville (p. 20) und Serres (a. a. O.). Dies scheint nur durch die Annahme erklärlich, daß entweder die stärkere Seite den Stützpunkt des ganzen Körpers ausmacht und als Angel bey diesen drehenden Bewegungen dient, oder daß die Thiere bey diesen Bewegungen der Richtung des Halses und Kopfs folgen: wenn nämlich die Muskeln des Halses auf der der Hirnwunde entgegengesetzten Seite gelähmt waren, so mußte Hals und Kopf durch die antagonistisch stärkere Wirkung der gesunden Muskeln der andern Seite auf die Seite der Hirnwunde gezogen, und das Thier dadurch bestimmt werden, nach dieser Seite hin sich zu drehen. b) Selten hat man beobachtet, daß Menschen auf derselben Seite gelähmt werden, auf welcher die Abnormität des Gehirns ihren Sitz hat. Hat man aber nicht vielleicht eine Abnormität in der andern Hemisphäre, welche die Lähmung begründete, übersehen? Man könnte dies vermuthen, da man bey den vielen an Thieren angestellten Versuchen, meines Wissens, nie eine gleichseitige Lähmung bemerkt hat. Indes würde es doch zu weit gegangen seyn, wenn man die Richtigkeit jener Beobachtungen gänzlich leugnen wollte (*Treviranus Biologie VI. S. 120*). c) Die Lähmung auf beyden Seiten tritt, wie es scheint, dann ein, wenn eine Abnormität in der einen Hemisphäre sehr stark ist. Daher geht ihr gewöhnlich halbseitige Lähmung, und zwar meist ungleichseitige (Nr. 88. 134. 215. 454. 909. 924), selten gleichseitige (Nr. 593), voren. Wenn sie gleich anfänglich erscheint (Nr. 886), so macht sie bisweilen, wenn die Abnormität, z. B. das Extravasat sich vermindert, der halbseitigen Lähmung Platz. B) Bey Abnormitäten in beyden Hemisphären nimmt a) die Lähmung gewöhnlich beide Seiten ein; b) seltener ist sie halbseitig, indem die Abnormität der einen Hemisphäre ohne Einfluß auf die Bewegung bleibt.

§ 797. Was die Krämpfe anlangt, A) bey Abnormität in einer Hemisphäre, so erscheinen die Convulsionen a) in der Regel auf der entgegengesetzten Seite, und zwar entweder für sich allein (Nr. 121. 517. 597. 819. 902. 1037. 1080), oder als Vorläufer späterhin eintretenden Lähmung derselben Seite (Nr. 62. 213. 490. 1013). Bey einem Drucke auf die kranke Seite des Gehirns sah man Zucken im Mundwinkel (Nr. 233), con-

vulsivisches Zittern am Fuße (Nr. 67), und Convulsionen in den Gliedern (Nr. 903) der entgegengesetzten Seite. Arneemann (S. 50) sah, daß bey einem Kaninchen unmittelbar nach der Verletzung des Gehirns Convulsionen eintraten, welche auf der entgegengesetzten Seite am stärksten waren, und bey einem Hunde (S. 23), daß bey der mit der Hirnreiterung eintretenden Epilepsie die Glieder der entgegengesetzten Seite zuerst in Convulsionen geriethen. b) Selten treten die Convulsionen auf derselben Seite ein, wo die Abnormität im Gehirne ihren Sitz hat (Nr. 26. 445. 538). c) Häufiger breiten sie sich über beyde Seiten aus. B) Sie erscheinen auch in den Gliedern beyder Seiten, wo beyde Hemisphären in abnormem Zustande sind. So nehmen sie denn auch beyde Seiten ein bey der Meningitis, da diese über beyde Hemisphären sich zu verbreiten pflegt, während sie bey der Encephalitis häufiger auf eine Seite sich beschränken. — Die tonischen Krämpfe, bey welchen die Glieder im Zustande der Beugung oder Streckung erstarren, sind bey der Encephalitis gewöhnlich halbseitig, und zwar ungleichseitig, bey der Meningitis hingegen beyderseitig. — Wenn die Convulsionen mit Hemiplegie verbunden sind, so sind sie selten in der gelähmten Seite selbst. Gewöhnlich treten sie auf der Seite der kranken Hemisphäre ein, während die entgegengesetzte Seite gelähmt ist: sie werden also (A, a.) hier nicht vom Gehirne unmittelbar bestimmt, sondern treten vielmehr antagonistisch gegen die Lähmung und vermöge des aufgehobenen Gleichgewichtes ein. Die tonischen Krämpfe sind der Lähmung näher verwandt, und sind daher zuweilen in Bezug auf die Hirnabnormität ungleichseitig, während die Convulsionen gleichseitig sind (Lallemand l. p. 105). Selten ist gleichseitige Lähmung mit ungleichseitigen Convulsionen verbunden, und diese können dann entweder unmittelbar von der Hirnabnormität bestimmt werden, oder auf Antagonismus beruhen.

§. 798. In der Regel findet also eine gekreuzte Wirkung des Gehirns auf die Glieder Statt, und der Wille muß, um auf der einen Seite Bewegung zu erregen, in der Hemisphäre der andern Seite den Impuls ausüben. Aretaeus und Casserius nahmen eine Kreuzung der Hirnfasern als Ursache dieser Erscheinung an; Petit und Mischelli wiesen dieselbe in den Pyramiden nach, und wirklich finden wir außer dieser und dem Chiasma keine deutliche Kreuzung am Gehirne, denn die Kreuzung der Olivenstränge (§. 389) ist wenigstens nicht so augenscheinlich. Wenn nun die gekreuzte Wirkung des Gehirns auf die Glieder auf einem materiellen Grunde beruht, so kann derselbe nur in der Pyramidenkreuzung mit Zuverlässigkeit angenommen werden. Das Thatsächliche nämlich ist, daß die eine Hirnhälfte mit den Gliedern der entgegengesetzten Seite in Consensus steht. Nun ist der Consensus nichts Andres, als die bestimmte Beziehung einer Thätigkeit auf eine andre, wodurch Jene auf Diese bestimmend einwirkt und durch deren Modification sie ihren eignen Zustand äussert. Indem der Consensus dynamisch begründet ist, vermag er allerdings auch ohne ein besondres Mittel der Continuität zu wirken: aber als ein Ursprüngliches schafft er sich auch dergleichen Mittel, und das dynamische Wechselverhältniß zwischen zwey Organen drückt sich durch eine materielle Verknüpfung aus, welche die Bahn der Leitung bezeichnet, so wie überall das innre Lebensverhältniß durch die äussere Gestaltung sich offenbart und dadurch zugleich das Mittel seiner Äusserung und seines Bestehens erzeugt. Wo also einem Consensus zweyer Organe

eine bestimmte Continuität derselben entspricht, da werden wir diese zwar nicht als den Grund, wohl aber als sein Product, wodurch er sich bethätigt, betrachten müssen. Folglich haben wir denn den Consensus zwischen einer Hirnhälfte und der andern nebst den zu ihrer Seite gehörigen Gliedern aus der Vereinigung derselben im Hirnstamme, so wie in den Commissuren zu erklären. Daß aber die Wirkung der einen Hirnhälfte gar nicht in den Gliedern derselben Seite, sondern lediglich in denen der andern Seite sich äußert, ist hierdurch nicht erklärt, sondern setzt, wenn es überhaupt materiell bedingt ist, voraus, daß die leitenden Fasern von der einen Hirnhälfte direct zur entgegengesetzten Seite des Rückenmarks und seiner Nerven gehn. Mithin muß die Pyramidenkreuzung diesen spezifischen Consensus vermitteln. Dies wird wahrscheinlich gemacht 1) dadurch, daß unter den Pyramiden, am Rückenmark als eine gekreuzte Wirkung sich zeigt, sondern nur gleichseitige Convulsionen und Lähmungen bewirkt werden, wie die Versuche Florenus (p. 112) und viele andre Erfahrungen beweisen; 2) dadurch, daß die Pyramiden ausser den Kreuzungsfasern auch auf der gleichen Seite verharrende Fasern enthalten, so daß, wenn der Einfluß des Gehirns diesen folgt, eine gleichseitige Lähmung oder Convulsion bewirkt werden muß: es ist also hier die Möglichkeit der gleichseitigen sowohl, als der ungleichseitigen Einwirkung, welche die Erfahrung zeigt, nachgewiesen. Wir bemerken aber, daß die Pyramiden mit den grauen Seitensträngen, welche zunächst mit den Centralenden der Rückenmarksnerven im Zusammenhange stehen, nicht unmittelbar verbunden sind, denn die Grundfasern kommen vom grauen Kernstrange, welcher zwischen den vier seitlichen grauen Strängen mitten inne liegt; die Kreuzungsfasern aber kommen vom Seitenmarkstrange. Da indeß hier nur von Leitung des Impulses die Rede ist, und diese überhaupt durch die Markfasern vermittelt wird, so dürfen wir es auch nicht anders erwarten. Wenn nun der Impuls der Hirnthätigkeit zur Bewegung durch die Pyramiden geleitet wird, so müssen wir die vordern Stränge als hier vorzüglich wirksam anerkennen: denn die Grundfasern der Pyramiden liegen an der vordern Fläche des grauen Kernstrangs oder zwischen dem rechten und linken vordern grauen Strange; der Seitenstrang aber, welchem die Kreuzungsfasern angehören, liegt zwar zwischen der vordern und hintern Wurzelreihe, wendet sich auch oben ganz zur letztern, ist aber doch nach unten mit den vordern grauen Strängen mehr verbunden.

§. 799. Da dieser Gegenstand von Einfluß auf unsre Untersuchungen ist, so wollen wir die Resultate der im Anhang verzeichneten Beobachtungen in Betreff des Einflusses von einseitigen Abnormitäten der einzelnen Hirnhälfte auf gleichseitige oder ungleichseitige Lähmung der Glieder hier zusammenstellen; wo die Beobachter bloß Hemiplegie angeben, ohne die Verhältnisse der Seite zu bemerken, werden wir dies als unbestimmt bezeichnen. A) Verlängertes Mark: ungleichseitig 2 (Nr. 922. 924); unbestimmt 3 (Nr. 403. 840. 920, a) Lorry (*mém. prés. III* c. 344) Saucerotte (*prés de chir. X*, p. 344 und Fodéré (*Magendie Journ. III* p. 211) beobachteten bey Thieren nach Verletzung des verlängerten Marks ungleichseitige Lähmung und gleichseitige Convulsionen; Florenus (p. 115); hingegen gleichseitige Lähmung und Zuckung. B) Kleines Hirn: gleichseitige Lähmung 2 (Nr. 416. 418); ungleichseitige 11 (Nr. 134. 147. 148. 201. 432. 724. 726. 928. 931. und mit gleichseitigen Convulsionen: 143. 929.); unbestimmte 2 (Nr. 137. 926.); beyderseitige 2 (Nr. 134. 886).

Bey Thieren sah Fodera (*Magendie Journ. III, p. 194*) nach Verletzung eines Kleinhirnschenkels, und Rolando (p. 46) nach Verletzung einer Hemisphäre des kleinen Hirns gleichseitige Lähmung; Flourens (p. 114) sah nach Reizung der Oberfläche der Letztern ungleichseitige Zuckungen, und nach dem Abschneiden derselben ungleichseitige Lähmung, nach Verletzung des Wurms aber beyderseitige Lähmung. Schon Arne-
mann (S. 174. fg.) hatte — C) Brücke: ungleichseitige Lähmung 7 (Nr. 729. 752. 756. 956. 957. 961. 971); unbestimmte 5 (Nr. 733. 735. 850.). D) Großhirnstamm: ungleichseitig 2 (Nr. 855. 856); unbestimmt 1 (Nr. 891). — E) Reizung der Vierhügel verursachte ungleichseitige Zuckungen, Verletzung derselben ungleichseitige Lähmung (Flourens p. 115.). — F) Sehhügel: ungleichseitige Lähmung 8 (Nr. 196 bis 200. 661. 740. und mit gleichseitigen Convulsionen: 970.). — G) Streifenhügel: ungleichseitige Lähmung 36 (Nr. 145. 154. 204. 205. 207. bis 209. 211. 213. 215. 452 bis 456. 458. 460. 462. 463. 662. 743. 746. 748 bis 751. 753. 972. 973. 976. mit gleichseitigen Convulsionen: 194. 212. 742. 747. 752. 754); gleichseitige 2 (Nr. 206. 663); unbestimmte 2 (Nr. 756. 857). — H) Seitenhöhlen: ungleichseitig 18 (Nr. 169 bis 172. 174. 176. 179. 180. 186 bis 190. 443. 1036. ferner mit ungleichseitigen Convulsionen: 1065. und mit gleichseitigen Convulsionen: 177. 968.); gleichseitig 1 (Nr. 444); beiderseitig 3 (Nr. 173. 335. 337). — I) Oberfläche des Mantels: ungleichseitig 3 (Nr. 218. 219. 481); gleichseitig 2 (Nr. 216. 1069); unbestimmt 2 (Nr. 475. 492.). Bey Compression des Gehirns von Hunden sah Bichat ungleichseitige Lähmung entstehen. — K) Substanz des Mantels: ungleichseitige Lähmung 12 (Nr. 224. 225. 261. 484 bis 486. 490. 710. 800. 854. 999. und mit gleichseitigen Convulsionen: 1002.); gleichseitige 3 (Nr. 193. 228. 795); unbestimmte 1 (Nr. 1069); beyderseitige 1 (Nr. 228). Bey Thieren sah Flourens (p. 111) immer ungleichseitige Lähmung. — L) Oberfläche des Oberlappens: ungleichseitig 18 (Nr. 113. 118. 120. 238. 317. 503. 507. 508. 510. 901. 904. 906. 1003. 1005. 1007. 1073. 1075. und mit gleichseitigen Convulsionen: 903); gleichseitig 1 (Nr. 898); unbestimmt 1 (Nr. 898). — M) Substanz des Oberlappens: ungleichseitig 50 (Nr. 17. 36. 61 bis 63. 66 bis 68. 70. 77. 78. 150. 245. 247 bis 254. 515. 518. 521 bis 523. 525. 527. 529 bis 531. 533 bis 537. 539. 689. 685. 687. 688. 805 bis 808. 875. 1013. 1014. und mit gleichseitigen Convulsionen: 520. 538. 1048); gleichseitig 3 (Nr. 44. 246. 506); unbestimmt 3 (Nr. 499. 809. 1015); beyderseitig 1 (Nr. 804). — N) Unterlappen: ungleichseitig 6 (Nr. 19. 83. 263. 265. 810. und mit gleichseitigen Convulsionen: 548); unbestimmt 1 (Nr. 908). — O) Oberfläche des Hinterlappens: ungleichseitig 4 (Nr. 909. 1031. 1100. und mit gleichseitigen Convulsionen: 552.); unbestimmt 1 (Nr. 266). — P) Substanz des Hinterlappens: ungleichseitig 17 (Nr. 88. 269. 270. 273. 556. 562. 565. 708. 811 bis 814. 1023. 1029. und mit gleichseitigen Convulsionen: 272. 555. 567); gleichseitig 1 (Nr. 817); unbestimmt 3 (Nr. 559. 817. 1115.). — Q) Oberfläche des Vorderlappens: ungleichseitig 5 (Nr. 129. 267. 274. 277. und mit gleichseitigen Convulsionen: 569); unbestimmt 2 (Nr. 128. 919); beyderseitig 1 (Nr. 920). — R) Substanz des Vorderlappens: ungleichseitig 17 (Nr. 31. 46. 48. 282. 296. 321. 322. 585. 586. 592. 823. 1040. ferner mit ungleichseitigen Convulsionen: 583. 1056. und mit gleichseitigen Convulsionen: 53. 94. 584); unbestimmt 2 (Nr. 594. 598. a.); beyderseitig 2 (Nr. 593. 1012.).

§. 800. Wir haben also hier 268 Fälle, wo nur auf einer Seite des Gehirns eine Ab-
Dritter Band. 47

normität bemerklich war; darunter waren 10 mit Lähmung beyder Seiten und 258 mit Hemiplegie; unter diesen waren 15 mit Lähmung der Seite, auf welcher das Gehirn litt, und 216, oder wenn man die 27 Fälle, wo die Angaben unbestimmt sind, der größern Wahrscheinlichkeit mit dazu rechnen will, 243 mit Lähmung der entgegengesetzten Seite. Also tritt bey Abnormität in der einen Seitenhälfte des Gehirns am häufigsten ungleichseitige ($=1:1,10$), seltener gleichseitige ($=1:17,86$), am seltensten beydersseitige ($=1:26,80$) Lähmung ein. Die Convulsionen fanden in 25 Fällen auf der Seite der Hirnabnormität, in 3 Fällen auf der entgegengesetzten Seite Statt. — Mithin müssen die Kreuzungsfasern der Pyramiden, und durch sie die Seitenmarkstränge in einer nähern Beziehung zur Bewegung stehn, als die auf ihrer Seite verbleibenden Fasern.

§. 801. Die Pyramidenstränge gehn durch das verlängerte Mark, die Brücke, den Stamm des großen Hirns, die Streifenhügel in die Oberlappen und Vorderlappen. Diese Theile sind es nun gerade, deren Abnormitäten häufiger Hemiplegie, als beydersseitige Lähmung, und ungleichseitige häufiger, als gleichseitige Lähmung erregen. Es kamen nämlich von ihnen 164 Fälle vor; darunter waren 160 mit Hemiplegie ($=1:1302$) und 4 mit beydersseitiger Lähmung ($=1:41,00$); es waren ferner darunter 137, oder mit Zurechnung der 17 unbestimmten 154 mit ungleichseitiger ($=1:11,19$ oder $1:11,06$), und 6 mit gleichseitiger ($=1:27,33$) Lähmung Abnormitäten der übrigen Theile, zu welchen die Pyramidenfaserung nicht unmittelbar gelangt, mit Ausschluss des Mantels überhaupt (24 Fälle), da dieser beyderley Theile enthält, kamen in 80 Fällen vor; darunter waren 75 mit Hemiplegie ($=1:11,06$) und 5 mit beydersseitiger Lähmung ($=1:16,00$); und es waren unter den Fällen von Hemiplegie 64 oder mit Zuzählung der 7 unbestimmten 71 mit ungleichseitiger ($=1:11,25$ oder $1:11,12$) und 4 mit gleichseitiger ($=1:20,00$) Lähmung.

§. 802. Betrachten wir nun diese letztern Theile näher, so finden wir, dafs das kleine Hirn aus den hintern grauen und markigen Strängen und aus dem hintern Theile der Seitenmarkstränge sich entwickelt. Da nun seine Abnormität häufiger ($=1:12$) auf die entgegengesetzte, als auf die gleiche Seite wirkt, so mufs in solchem Falle der Impuls von ihm aus durch dessen Schenkel abwärts in den Seitenmarkstrang, dann durch die Kreuzungsfasern aufwärts in die Pyramide der andern Seite, und von da abwärts durch das Rückenmark, also im Zickzack, oder wie der Blitz sich verbreiten. — Der Pyramidenstrang ist kein Element des Schühügels, sondern streicht unter ihm hin; wenn also dessen Abnormität ungleichseitige Lähmung verursacht, so mufs der Impuls durch dessen Substanz bis zum vordern oder untern Theile des Großhirnstamms dringen. — Gleiches gilt von den Seitenhöhlen, in deren Wandung keine Strahlung der Pyramiden tritt, da selbst die Streifenhügel mit grauer Substanz und Faserung der Schühügel belegt sind. — Die Pyramidenfaserung gelangt nicht in den Hinterlappen und Unterlappen, ungeachtet doch auch deren Abnormitäten ungleichseitige Lähmung der Glieder zu bewirken pflegen. Sie macht überhaupt nur einen kleinen Theil des Stabkranzes im Mantel aus, und es läßt sich nicht denken, dafs in den 132 Fällen, wo bey Abnormität des Mantels die entgegengesetzte Seite gelähmt war, die Abnormität gerade im Stabkranze, und zwar gerade in der Pyramidenfaserung desselben ihren Sitz gehabt hätte.

§. 803. Das Resultat von dem Allen ist nun, daß die Pyramiden die Wirkung des Gehirns auf die entgegengesetzte Seite des Rückenmarks und der irritablen Seite des Rumpfs übertragen; daß, da diese ungleichseitige Wirkung die gewöhnliche ist, die seltener gleichseitige Wirkung aber durch die Grundfasern der Pyramiden vollzogen werden kann, diese Organe wahrscheinlich die willkührliche Bewegung an Rumpf und Gliedmaßen überhaupt vermitteln; daß aber der Impuls des Willens nicht innerhalb des Pyramiden-systems zu seyn braucht, sondern auch von irgend einem Punkte des Gehirns aus daselbe erreichen kann; daß das den Impuls gebende Gehirn auf die entgegengesetzte, daß den Impuls fortleitende Rückenmark auf die gleiche Seite wirkt; daß, der Wille, wenn er die Bewegung eines Gliedes bestimmt, in der entgegengesetzten Hemisphäre wirkt, und daß nur ungewöhnliche organische Verhältnisse, die wir nicht näher kennen, die Einwirkung auf die Glieder derselben Seite veranlassen. — Was übrigens die Rinde betrifft, so hat sie überhaupt weniger Einfluß auf die Bewegung, als die Marksubstanz (§. 760. fg.), und ihre Abnormität veranlaßt also, auch seltener Hemiplegie (nach obigen Beobachtungen = 33:103), aber wenn sie wirkt, so bezieht sich ihr Einfluß ebenfalls in der Regel auf die entgegengesetzte Seite der Gliedmaßen, was Tréviranus (Biologie VI. S. 118) leugnet, denn in obigen Fällen erfolgte bey Abnormität der Oberfläche des großen Hirns die gleichseitige Lähmung ebenfalls viel seltner, als die ungleichseitige (37:50 = 1:10), ja selbst noch seltner, als bey Abnormität der Substanz (7:96 = 1:13); auch führt Home (auserlesene Abhh. f. Aerzte XXV. S. 557) drey Fälle von örtlicher chronischer Entzündung der festen Hirnhaut an, wo an den Gliedern der entgegengesetzten Seite Geschwulst und Schmerzen entstanden.

§. 804. Was die Gesichtsmuskeln betrifft, so bilden sie ein sternförmiges Ganzes, dessen Strahlen im Ringmuskel der Lippen convergirend zusammentreffen. Ist nun die eine Hälfte der Gesichtsmuskeln gelähmt, so kann sie denen der gesunden Hälfte nicht hinlänglichen Widerstand entgegensetzen, und wird von diesen herübergezogen. Daher nehmen wir, wenn der Mund auf die eine Seite gezogen ist, dies als ein Zeichen an, daß die Muskeln der entgegengesetzten Seite gelähmt sind. Allerdings kann zwar auch ohne Lähmung, und nur durch einen tonischen Krampf der Mund verzogen werden und zwar auf die Seite, welche eben kräftigst affectirt ist; allein dies ist theils seltner der Fall, theils von kürzerer Dauer. Wo also bey anhaltender Schiefheit des Mundes die Beobachter nicht unterscheiden, ob sie spastischer oder paralytischer Natur war, müssen wir sie für die Wirkung einer Lähmung der entgegengesetzten Seite halten. — Bey Abnormität in einer Seite des Gehirns erfolgte Lähmung der Gesichtsmuskeln A) auf der entgegengesetzten Seite in 28 Fällen; nämlich a) mit ebenfalls ungleichseitiger Lähmung der Glieder in 23 Fällen, und zwar bey Abnormität des kleinen Hirns in 1 (Nr. 724), der Brücke in 1 (Nr. 736), der Sehhügel in 1 (Nr. 999), der Streifenhügel in 4 (Nr. 212, 539, 743, 752), des Mantels in 1 (Nr. 1002), des Oberlappens in 9 (Nr. 134, 150, 248, 320 bis 322, 586, 807, 999), des Hinterlappens in 1 (Nr. 814), des Vorderlappens in 5 (Nr. 31, 282, 813, 1040, 1041) Fällen; b) mit Zuckungen in den ungleichseitigen Gliedern; Oberlappen 1 (Nr. 902); c) mit stärkerer Lähmung der gleichseitigen Glieder:

Oberlappen 1 (Nr. 228), d) ohne Affection der Glieder: Oberlappen 3 (Nr. 118, 1050, 1071); — B) auf der Seite der Hirnabnormität in 10 Fällen und zwar a) mit ebenfalls gleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen: Hinterlappen 1 (Nr. 1100); b) mit ungleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen in 7 Fällen: Sehhügel 1 (Nr. 200); Streifenhügel 2 (Nr. 218, 750); Oberlappen 2 (Nr. 805, 808); Hinterlappen 2 (Nr. 557, 564); c) mit beiderseitiger Lähmung der Glieder: Streifenhügel 1 (Nr. 459); d) ohne Lähmung der Glieder: kleines Hirn 1 (Nr. 149).

§. 805. Bey einseitiger Hirnabnormität erfolgte Lähmung des Augenliedes A) auf derselben Seite a) mit ungleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen in 4 Fällen: Chiasma 1 (Nr. 475); Mantel 1 (Nr. 999); Oberlappen 2 (Nr. 61, 308); b) ohne Lähmung der Gliedmaßen in 2 Fällen: Oberlappen (Nr. 32, 99); — B) auf der andern Seite mit ebenfalls ungleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen in 5 Fällen: Sehhügel 2 (Nr. 199, 740); Streifenhügel 2 (Nr. 212, 215); Mantel 1 (Nr. 486); — C) auf beyden Seiten in 2 Fällen ohne Lähmung der Gliedmaßen: Oberlappen (Nr. 1071, 1074).

§. 806. Bey einseitiger Abnormität des Gehirns erfolgte Lähmung der Halsmuskeln A) auf derselben Seite in 5 Fällen, und zwar a) mit ebenfalls gleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen: Streifenhügel 1 (Nr. 212); b) mit ungleichseitiger Lähmung der Glieder: Streifenhügel 3 (Nr. 458, 459, 754); Vorderlappen 1 (Nr. 813); B) auf der entgegengesetzten Seite mit ebenfalls ungleichseitiger Lähmung der Gliedmaßen in 3 Fällen: Sehhügel 1 (Nr. 199); Streifenhügel 1 (Nr. 454); Oberlappen 1 (Nr. 252).

§. 807. Bey einseitiger Abnormität des Gehirns wurden Augenmuskeln gelähmt A) auf derselben Seite in 8 Fällen und zwar a) mit ungleichseitiger Lähmung der Glieder: Brücke 1 (Nr. 957); Streifenhügel 1 (Nr. 552); Oberlappen 1 (Nr. 1014); Hinterlappen 1 (Nr. 564); b) ohne Lähmung der Glieder: Seitenhöhlen 1 (Nr. 445); Oberlappen 1 (Nr. 1006); Unterlappen 1 (Nr. 543); Vorderlappen 1 (Nr. 1039); B) auf der entgegengesetzten Seite mit ebenfalls ungleichseitiger Lähmung der Glieder in 4 Fällen: Sehhügel 1 (Nr. 970); Oberlappen 2 (Nr. 121, 551); Vorderlappen 1 (Nr. 95); C) auf beyden Seiten in 1 Falle: Oberlappen (Nr. 807).

§. 808. Bey einseitiger Abnormität im Gehirne war die Pupille gelähmt A) auf derselben Seite in 5 Fällen, nämlich a) mit Lähmung der beyderseitigen Glieder: Brücke 1 (Nr. 958); b) ohne Lähmung der Glieder: Oberlappen 2 (Nr. 33, 525), Unterlappen 1 (Nr. 434); Vorderlappen 1 (Nr. 29); B) auf der entgegengesetzten Seite in 5 Fällen, nämlich a) mit ebenfalls ungleichseitiger Lähmung der Glieder: Sehhügel 1 (Nr. 198); Chiasma 1 (Nr. 475); Oberlappen 2 (Nr. 522, 537); b) ohne Lähmung der Glieder: Vorderlappen 1 (Nr. 730).

§. 809. Wir stellen nun die Resultate über die einseitige Lähmung am Halse und Kopfe bey einseitiger Abnormität des Gehirns mit denen über die ähnlichen Lähmungen der Gliedmaßen (§. 799) in folgenden drey Tabellen zusammen:

Gelähmte Theile:	Gleichseitige Lähmung:	Ungleichseitige Lähmung:	Proportion:
Gliedmaßen	15	203	1 : 16,20
Antlitz	10	28	1 : 2,80
Pupille	5	5	1 : 1,00
Augenlid	6	5	1 : 0,83
Hals	5	5	1 : 0,60
Augapfel	8	4	1 : 0,50

Gleichseitige Lähmung des Kopfs.		Lähmung der Glieder.				Ungleichseitige Lähmung des Kopfs.		Lähmung der Glieder.			
Gelähmte Theile.	überhaupt	Harmo- nie	Gegen- seitig	Abweichung:		überhaupt	Harmonie	Gegen- seitig	Abweichung:		
				seitig	o				seitig	o	
Antlitz	10	1	7	1	1	28	24	—	1	3	
Hals	5	1	4	—	—	3	1	1	1	—	
Augenlid	6	—	4	—	2	5	5	—	—	—	
Augapfel	8	—	4	—	4	4	3	—	—	1	
Pupille	5	—	—	1	4	5	4	—	—	1	
Insgesamt	34	2	19	2	11	45	37	1	2	5	

Abnorme Hirnthelle:	Gleichseitige Lähmung:						Ungleichseitige Lähmung:						Proportion:		
	Glieder	Antlitz	Hals	Augenlid	Augapfel	Pupille	Summe	Glieder	Antlitz	Hals	Augenlid	Augapfel	Pupille	Summe	
Verlängertes Mark							0	2						2	0,2
Großhirnstamm							0	2						2	0,2
Unterlappen				1	1		2	6						6	13,00
Kleines Hirn	2	1					3	11	1					12	14,00
Brücke				1	1		2	7	1					8	14,00
Streifenhügel	2	3	4		1		10	36	4	1	2			43	14,30
Hinterlappen	1	3			1		5	21	1					22	14,40
Mantel insgesamt	10	5	1	5	5	4	30	132	21	1	1	3	3	161	15,36
Oberlappen	4	2		4	2	2	14	68	14	1		2	2	87	16,21
Sehhügel	—	1		1			2	8	1	1	2	1	2	15	17,50
Seitenhöhlen	1				1		2	18						18	19,00
Vorderlappen			1		1	1	3	22	5			1	1	29	19,06

§. 810. Um nun hieraus weitere Folgerungen (§. 810—817) zu ziehen, so ergibt sich zuvörderst, daß die Muskeln des Kopfs von denen der Gliedmaßen relativ verschieden sind: wenn die Glieder häufiger von der entgegengesetzten Hirnhälfte afficirt werden, so werden es die Muskeln am Kopfe häufiger von der gleichseitigen. Es findet also kein absoluter Unterschied Statt, und die Behauptung (Tréviranus Biologie VI. 116, 124), daß die Gesichts- und Augenmuskeln immer auf der Seite der Hirnabnormität gelähmt werden, ist unrichtig, wie schon die von Mehlis (p. 41) gesammelten Beobachtungen darthun; auch sah Arneemann (S. 23), daß die Convulsionen bey der Eiterung einer Hemisphäre zuerst am Ohre der entgegengesetzten Seite ausbrachen, und von da über die Glieder sich verbreiteten.

§. 811. Wenn nun in organischer Beziehung bloß ein relativer Unterschied Statt findet, so wird dasselbe auch in Hinsicht des Willens gelten. Für die Kopfmuskeln, welche am häufigsten, also in der Regel von der gleichseitigen Hemisphäre bestimmt werden, muß auch der Impuls zu willkürlicher Bewegung in derselben Hemisphäre enthalten seyn. Beyde Hemisphären bilden zwar dynamisch ein Ganzes, welches beym Denken, wie beym Wollen, wirkt; indem aber das Wollen eine örtliche Beziehung auf die eine oder die andre Seite nimmt, muß die Gesammthätigkeit in der einen oder der andern Hemisphäre stärker hervortreten. Jede Hemisphäre kann die beyderseitigen Muskeln von Kopf und Gliedmaßen bestimmen, aber mit ungleicher Kraft. Denken wir uns z. B. die Zahl der Fasern, welche sie zu den Muskeln schickt, oder die Summe der Kraft, mit welcher sie auf diese einwirkt, = 6, wovon 3 zu den diesseitigen Nerven gehn, die 3 übrigen durch die Pyramidenkreuzung zu den Nerven der andern Seite gelangen: so werden von den Letztern 2 an die Gliedernerven (Tafel X, c,) und an die Kopfnerven (Tafel X, d,) abgegeben werden, und dagegen von den 3, welche diesseits bleiben, 2 an die Kopfnerven (Tafel X, a,) und 1 an die Gliedernerven (Tafel X, b,) gegeben werden. So wird denn z. B. die rechte Hemisphäre gewöhnlich das rechte Auge und den linken Arm in Bewegung setzen, aber auch einen Einfluß auf das linke Auge und den rechten Arm ausüben, der unter besondern Bedingungen lähmend sich erzeugt. Es scheint zwar gegen die Einheit unsrer Vorstellungen zu streiten, daß von einem Punkte aus die Kopfteile der einen und die Gliedmaßen der andern Seite bewegt werden; auch ist eine solche Stetigkeit des Uebergangs von den Muskeln des Kopfs und des Halses zu denen des Rumpfs und der Glieder, daß eine feste Gränzlinie nicht angenommen werden kann. Indessen fallen diese Schwierigkeiten weg, wenn wir bedenken, daß die Verschiedenheit überhaupt nur relativ ist; daß beym Wollen eine gleichzeitige Thätigkeit beyder Hemisphären, nur mit relativem Uebergewichte der einen Statt findet; daß, wenn der auf einem Auge Erblindete das sehende Auge bewegt, und das blinde Auge dieselben Bewegungen macht, derselbe Willensact nicht bloß consensual Nerven der andern Seite, sondern vermöge des Gegensatzes des innern und äussern geraden Augenmuskels (§. 791.) auch ein andres Nervenpaar der entgegengesetzten Seite bestimmt, also zu gleicher Zeit von zwey ungleichartigen Theilen beyder Hirnhälften ausgeht.

§. 812. Wenn wir die obigen Proportionen (§. 809) als thatsächlich begründet und richtig anerkennen, und das müssen wir, so lange nicht aus einer größern Zahl mit Un-

helfenheit zusammengestellter Beobachtungen widersprechende Resultate sich ergeben, so schließen sich die Muskeln des Antlitzes an die der Glieder, und also auch der siehente Hirnnerv an die Rückenmarksnerven; ant der Wille bestimmt sie von der entgegengesetzten Hemisphäre aus, und der Impuls wirkt von dieser aus im Zickzack, erst abwärts in das verlängerte Mark und durch die Kreuzungsfasern auf dessen entgegengesetzte Seite, dann in dieser aufwärts bis zum Antlitznerven derselben; aber die Macht dieser Hemisphäre ist hier geringer, als bey den Gliedernerven, oder, was dasselbe heisst, der in der gleichseitigen Hemisphäre wirkende Wille nimmt mehr Antheil daran. Indem nun beyde Hemisphären verhältnismässig mehr mit gleicher Kraft auf das Antlitz wirken, äussert sich in diesem mehr Consensus beyder Hälften: während an den Gliedern die entgegengesetzten Bewegungen, z. B. die Biegung des Ellens mit Streckung des Andern am leichtesten erfolgen, können wir zwar die eine Hälfte des Gesichts willkürlich bewegen, während die andre ruht, aber nur mit grosser Schwierigkeit die gleichnamigen Antlitzmuskeln in gerade entgegengesetzte Thätigkeit versetzen; und z. B. auf der einen Seite die Bewegung des Lächelns, auf der andern die des Weinens hervorbringen. — Die Pupille wird eben so oft von der gleichseitigen, als von der ungleichseitigen Hemisphäre bestimmt: hier scheint also eine völlige Gleichheit beyder Hemisphären einzutreten, so dass jede derselben auf beyde Pupillen gleich stark wirkt; daher werden gewöhnlich beyde Pupillen gleichzeitig auf dieselbe Weise afficirt. — Augenlider, Hals und Augapfel werden von der gleichseitigen Hemisphäre stärker bestimmt, jedoch so, dass das Uebergewicht derselben über die ungleichseitige nur gering ist, also der gleichzeitige Impuls von beyden Hemisphären zwar nicht in gleichem Grade wie bey der Pupille, aber doch mehr, als bey den Antlitzmuskeln, und um Vieles mehr, als bey den Gliedmaßen, zur Bewegung einer Seite nöthig ist. Darauf gründet sich denn auch der Consensus der beyden Seiten dieser Gebilde: wir können nicht leicht das eine Auge fest ausschliessen, während wir das andre völlig öffnen; verschiedene Bewegungen an beyden Seiten des Halses sind mechanisch unmöglich; und beyde Augäpfel können wir nur mit grosser Anstrengung in die entgegengesetzte Richtung hringen.

§ 813. Vergleichen wir jene irritablen Gebilde miteinander, so erkennen wir, dass die Muskeln der Gliedmaßen und des Antlitzes, welche mehr von der einen und zwar von der entgegengesetzten Hemisphäre bestimmt werden, verhältnismässig reizbare Irritabilität äussern, oder der sensibeln Egestion dienen, indem sie, am freysten vom Willen bestimmt, das Innre äussern, und auf fremde Körper einwirken: wie die Gliedmaßen diesen Charakter stärker ausprägen, als die Antlitzmuskeln, so sind auch jene mehr, als diese, von der entgegengesetzten Hemisphäre abhängig. In der Iris zeigt sich die Indifferenz von Sensibilität und Irritabilität als Gefässgebilde zum plastischen Systeme gehörig, und doch höchst beweglich und von der Sensibilität bestimmt, so wie zur Sensation mitwirkend, ist sie in ihren Bewegungen unwillkürlich, und so bezeichnet sie sich auch als Indifferenzpunct dadurch, dass die Wirkungen beyder Hemisphären auf sie einander gleich sind. Die Bewegungen des Augenlids, des Halses und des Augapfels, welche ehenfalls durch beyde Hemisphären, jedoch mit einem Uebergewichte der gleichseitigen, bestimmt werden, dienen vornehmlich der sensibeln Ingestion: das Augenlid öffnet den

Sinnesindrücken den Zutritt zum Auge; die Bewegungen des Halses und des Augapfels an den Sinnesgegenstände, und richten die Sinnesorgane gegen dieselben. Der Augapfel ist am ausschließlichen in dieser Beziehung wirksam, und er wird auch am meisten von der gleichseitigen Hemisphäre bestimmt. — Wenn nun das Uebergewicht der reinen Irritabilität durch Ungleichseitigkeit der Wirkung sich bezeichnet, so scheint es darauf zu beruhen, daß die Glieder der entgegengesetzten Seite bey Thieren ohne Ausnahme, bey dem Menschen hingegen nur häufiger, als die der gleichen Seite durch die Verletzung einer Hemisphäre gelähmt werden (§. 796). — Wir haben ferner die rechte Seite überhaupt als die sensiblere anerkannt; wenn nun Mehlis (p. 42) bemerkt, daß die gleichseitige Lähmung der Gliedmaßen in neun Fällen von Abnormitäten der rechten Hemisphäre, und dagegen nur in einem Falle von denen der linken abhängt, so finden wir darin eine Bestätigung jenes Gesetzes, indem die sensiblere Hemisphäre auf die zu ihr gehörige Hälfte des Hirnstamms und Rückenmarks stärker, als auf die entgegengesetzte einwirkt. In den von mir gesammelten Beobachtungen ist zwar der Unterschied nicht so groß, wie ihn Mehlis angiebt, indessen doch bemerklich: von 44 gleichseitigen Lähmungen waren nämlich 25 auf der rechten, 19 auf der linken Seite.

§. 814. Haben wir auf diese Weise die Bedeutung gleichseitiger und ungleichseitiger Wirksamkeit wirklich gefunden, so ist uns dadurch auch die Bedeutung der Pyramidenfasern offenbar. Die Kreuzungsfasern, welche zur andern Seite übergehen, gehören bloß der Marksubstanz an, indem sie dem Seitenmarkstrange, und so dem Seitlichen, am meisten Excentrischen sich beymischen: ihre Thätigkeit ist überwiegend auf Leitung und Bewegung gerichtet, wie dies auch die Natur der Marksubstanz (§. 716.) mit sich bringt. Die Grundfasern der Pyramiden hingegen müssen verhältnismäßig durch ein Uebergewicht der reinen Sensibilität sich charakterisiren, da sie auf der gleichen Seite verharren, und in die graue Substanz, namentlich an das Centrale derselben, den Kernstrang, sich anlagern.

§. 815. Nach der obigen Uebersicht (§. 809.) ist das Bestimmte der entgegengesetzten Seite durch eine Hemisphäre am stärksten bey den Rückenmarksnerven, schwächer bey dem siebenten, noch schwächer bey dem sechsten, vierten und dritten Hirnnerven, und wie dieser Einfluß abnimmt, nimmt die gemeinsame Herrschaft beyder Hemisphären zu. Also die untern oder hintern Nerven werden im Ganzen genommen mehr von einer, und zwar der ungleichseitigen Hemisphäre bestimmt, und sind daher verhältnismäßig mehr auf Irritabilität bezogen; die obern oder vordern Nerven stehen mehr unter dem Einflusse beyder Hemisphären, vorzüglich aber der gleichseitigen, und in ihnen herrscht verhältnismäßig mehr reine Sensibilität vor. Dies Gesetz finden wir bestätigt, wenn wir die Hirnnerven in ihren Gegensätzen nach der unten (§. 851) gegebenen Uebersicht betrachten: in jeder Reihe liegt das sensible Glied weiter nach vorne, als das irritable, der Sehnerv mehr als der Hörnerv, der dreygetheilte mehr als der Antlitznerv, der Zungenschlundkopfnerv mehr als der Beynerv, der gemeinschaftliche mehr, als der schiefe Augenmuskelnerv.

§. 816. Blicken wir endlich auf das Verhältniß der einzelnen Hirnorgane in Betreff ihres Einflusses auf die entgegengesetzte Seite (§. 809.), so sehen wir, daß derselbe in den

hintern Theilen stärker ist, als in den vordern, und es schließt sich daran die natürliche Folgerung, daß in Letztern die Sensibilität reiner und potenzirter ist, als in Ertern. Bey Abnormitäten des verlängerten Marks, des Großhirnstammes, des kleinen Hirns und des Hinterlappens kam die Lähmung der entgegengesetzten Seite häufiger vor, als bey denen des größten Hirns, des Oberlappens, der Seitenhöhle und des Vorderlappens. Das verlängerte Mark mit dem Großhirnstamme einerseits, und der Vorderlappen anderseits bilden die strengsten Gegensätze.

§. 817. Uebrigens bemerken wir durchaus nicht, daß die Kopfmuskeln durch ein besondres Verhältniß zu den Gliedern bestimmt würden: sind jene auf der Seite der Hirnabnormität gelähmt, so stehn sie in der Regel im reinen Gegensatze zu diesen; sind sie aber auf der entgegengesetzten Seite gelähmt, so stehn sie in der Regel mit ihnen in Harmonie.

§. 818. Das Verhältniß der Lähmung der Zunge ist weniger klar. Wenn ich durch Durchschneidung des Antlitznerven die Lippenmuskeln gelähmt hatte, so legte sich die Zunge auf die gelähmte Seite. Damit stimmen die pathologischen Beobachtungen überein, wo, wenn der Mund auf die eine (ungelähmte) Seite verzogen war, die Zunge auf die andre (gelähmte) Seite herüberging (Nr. 31. 199. 282. 752. 753. 813). Es ist also hier ungewiß, ob die Zunge wirklich auf der Seite, wo die Antlitzmuskeln im Zustande der Integrität sich befanden, durch die Hirnabnormität wirklich gelähmt war, oder ob die Zunge nur durch das aufgehobene Gleichgewicht der Antlitzmuskeln dahin sich legte, wo diese gelähmt waren.

§. 819. Was endlich die Zuckungen in der einen Seite der Gesichtsmuskeln betrifft, so entstehen sie in Folge der Affection durch die Hirnabnormität auf der Seite derselben (Nr. 190. 584. 732. 747); zum Theil aber auch in der entgegengesetzten Seite, vielleicht vermöge des Antagonismus zur gelähmten Seite (Nr. 145. 807. 819. 902).

§. 820. Daraus, daß durch die Pyramiden die gekreuzte Wirkung auf die Bewegungsorgane vermittelt wird, läßt sich vielleicht folgern, daß sie überhaupt den Impuls des Willens zu leiten bestimmt sind. Daraus folgt aber nicht, daß sie dieser Leitung ausschließlich dienen, denn auch die Empfindung zeigt ein Verhältniß der Durchkreuzung, und wenn dies auch seltener Statt findet, so ist diese Seltenheit entweder aus dem obigen Gesetze (§. 813.) zu erklären, oder sie beweiset nur so viel, daß die Pyramiden in einer nähern Beziehung zur Bewegung, als zur Empfindung stehn. Wenn die der Hirnabnormität entgegengesetzten Glieder ihre Bewegung verloren haben, so sind sie in der Regel auch unempfindlich, namentlich wenn die Abnormität in Entzündung, Eiterung oder Extravasat besteht. Diese Unempfindlichkeit der ungleichseitigen Glieder wird auch bey Thieren nach Verletzung einer Hemisphäre beobachtet (Molinelli *comu. Bonon. I.* p. 139). Home (Samml. auserl. Abhh. XXV. S. 557) beobachtete 3 Fälle, wo bey örtlicher Entzündung der festen Hirnhaut Schmerz in den Gliedern der entgegengesetzten Seite eintret; in einem Falle (Nr. 70) erregte ein fremder Körper in der einen Hemisphäre Schmerzen im Auge der andern Seite. Nach einigen pathologischen Beobachtungen scheinen zuweilen die Gliedernerven auf die Hirnnerven der entgegengesetzten Seite zu wirken: so erzählt P. Frank (Auserl. Abhh. XV. S. 297), wenn er an dem einen

Fuße oder Schenkel ein Brennen empfand, so hörte er zugleich im Ohre der entgegengesetzten Seite ein starkes Summen. Einseitige Taubheit entsteht gewöhnlich zwar auf der Seite der Hirnabnormität (Nr. 437. 517. 654. 886. 894. 907. 1019), aber zuweilen (Nr. 747. 808) auch auf der entgegengesetzten Seite. In einem Falle (Nr. 31) war die Zunge auf der Seite der Hirnabnormität unempfindlich für Geschmackseindrücke; dagegen war in zwey Fällen (Nr. 31. 1069) der Geruchssinn in der entgegengesetzten Hälfte der Nasenhöhle aufgehoben.

§. 821. Die Verbindung der einen Hirnhälfte mit der Netzhaut des Auges oder andern Seite wird durch die Durchkreuzung der Sehnerven vermittelt. Es erfolgte Blindheit eines einzigen Auges A) auf der Seite der Hirnabnormität in 15 Fällen, und zwar a) rechts in 9 Fällen (Nr. 654. 660. 748. 804. 924. 969. 970. 1039. 1069), und b) links in 6 Fällen (Nr. 105. 235. 273. 539. 997. 1019); B) auf der entgegengesetzten Seite in 12 Fällen, nämlich a) bey Abnormität in der rechten Hirnhälfte in 6 Fällen (Nr. 78. 196. 527. 561. 659. 743), und b) in der linken Hirnhälfte in 6 Fällen (Nr. 212. 469. 744. 746. 1023. 1031). Die Folgerungen, die wir aus diesen Beobachtungen ziehen, stimmen mit unsern obigen ziemlich überein. Nämlich 1) das Sehen wird als ein rein sensibler Act bey dem Menschen häufiger durch eine gleichseitige, als durch eine ungleichseitige Hirnabnormität gestört (§. 813.). 2) Da die Blindheit eines Auges bald von der Abnormität dieser, bald jener Hirnhälfte herrührt, so müssen beyde Hälften auf jedes Auge, folglich auch jedes Auge auf beyde Hälften wirken, und somit auch die Perception des durch ein Auge vermittelten Lichteindrucks durch die übereinstimmende Thätigkeit beyder Hirnhälften zu Stande gebracht werden (§. 790. fg.). 3) Die rechte Hirnhälfte verursacht häufiger gleichseitige, als ungleichseitige Lähmung, und verursacht gleichseitige Lähmung häufiger, als die linke (§. 795. 813.). 4) Wenn bey Menschen die gleichseitige Beziehung zwischen Gehirn und Auge vorherrschend ist, so scheint bey Thieren die ungleichseitige stärker zu seyn: wenigstens wurde bey Floren's (p. 29. 43. 54) Versuchen an Thieren nach Verletzung einer Sebkugel oder Hemisphäre immer nur das entgegengesetzte Auge blind.

§. 822. Die Verhältnisse der Plasticität scheinen mit denen der Empfindung und Bewegung übereinzustimmen. Zuweilen zeigt sich nämlich ein gleichseitiges Verhältniß: so bey einem Blödsinnigen, dessen rechte Hemisphäre um $\frac{1}{4}$ kleiner und die rechte Körperhälfte schwächer genährt war, als die linke (Pinel im Nassen's Zeitschrift 1821. 4. St. S. 148); auch ist es nicht selten, daß gleiche Abnormitäten auf derselben Seite des Gehirns und des übrigen Leibes vorkommen (§. 275. 294. 323. 324). In andern Fällen zeigt sich ein ungleichseitiges Verhältniß: Cuvier (p. 415) fand bey einer Frau, die nur an der rechten Seite des Leibes wassersüchtig war, eine Wasserergießung in der linken Hirnhöhle, und Home (ausserl. Abhh. XXV. S. 557) beobachtete in 3 Fällen bey thronischer, örtlicher Entzündung der festen Hirnhaut eine Geschwulst am Arme oder Beine der entgegengesetzten Seite.

§. 823. Es fragt sich nun: wie wird es vermittelt, daß wir sämtliche Theile der einen Seitenhälfte unsres Körpers als zu derselben gehörig bey Empfindungen sowohl, als bey Bewegung anerkennen, wenn sie nicht gleiche Beziehung zu derselben Hirnhälfte haben? — Finden etwa bey sinnlicher Perception und körperlichem Willen gar keine

räumlichen Verhältnisse in der sensibeln Thätigkeit Statt? Dies ist nicht denkbar, denn flüssiger Sinn und Wille sind eben räumliche Richtungen der Seele oder Beziehungen derselben auf einen bestimmten Raum; wenn die Seele überhaupt ein räumliches Substrat, ein Organ hat, so muß es, wir mögen es übrigens uns denken, wie wir wollen, bey Sensation und Wollen auf eine den Verhältnissen der äussern Organe räumlich entsprechende Weise affectirt werden. Auch weist ja die Erfahrung (§. 795 — 821) eine solche Verknüpfung bestimmter Hirnthelle mit bestimmten Muskelpartien und Sinnesorganen deutlich nach: die Abnormität der einen Hirnhälfte hat Lähmung in den Sinnesorganen oder Muskelpartien der einen Seite zur Folge. — Oder steht die Seele mit den Organen in unmittelbarer Verbindung, und wirkt sie in den peripherischen Nervenenden, in den Sinnesorganen anschauend und in den Muskeln bewegend? Allein die Seelenthätigkeit beruht auf der lebendigen Beziehung von Peripherie und Centrum; die Einheit der Perception und des Willens kann nur in dem Alles vereinenden Centrum seyn, während die Peripherie das Vermittelnde ist. Auch wären bey jener Annahme manche Erscheinungen noch unerklärlich: geschähe z. B. die Perception in der Netzhaut, so müßten wir die Gegenstände verkehrt, das, was nach dem Aussprache unsers Tastsinns in gleicher Höhe mit unserm Kopfe sich befindet, unten, und was zu unsern Füßen liegt, oben sehen. — In der Hirnthätigkeit selbst müssen also räumliche Verhältnisse Statt finden, welche den räumlichen Verhältnissen der übrigen Organe, so wie der Aussenwelt entsprechen. Wäre nun alle Beziehung der Organe zum Gehirne gekreuzt, so würden wir, was an sich rechts wäre, nach der Form unsrer Anschauungsweise für links halten, und umgekehrt; doch würden wir bey der allgemein und folgerecht durchgeführten Täuschung die Verhältnisse richtig auffassen. Nun ist aber 1) an einigen Stellen eine gekreuzte, an andern eine gleichseitige Beziehung zum Gehirne, und gleichwohl fühlen wir die Continuität dieser verschiedenen Stellen derselben Seite: man fühlt den Schmerz auf der Seite, wo das Gehirn oder das Antlitz affectirt ist, und greift, auch unwillkürlich und noch in der Betäubung, dahin mit der Hand derselben Seite, ungeachtet sie von der entgegengesetzten Hirnhälfte bestimmt wird; und man vermag in Empfindung und Bewegung keinen Scheidopunct zwischen gleichseitiger und ungleichseitiger Beziehung zum Gehirne an der ganzen Seite zu entdecken. 2) Diese Scheidung ist keine absolute; sondern bezieht sich nur auf größere oder mindere Häufigkeit: dasselbe Glied, welches in der Regel von einer Hirnhälfte abhängig ist, kann unter gewissen Verhältnissen von der andern bestimmt werden, gleichwohl verwirrt sich dabey nicht das Gedächtniß des Räumlichen. 3) In einem und demselben Organe finden gleichzeitig beyderley Beziehungen Statt: von der Netzhaut desselben Auges gehn einige Fäden zur gleichseitigen, andre zur entgegengesetzten Hirnhälfte.

§. 824. Wenn wir dies Alles erwägen, so fühlen wir die Nothwendigkeit, im Gehirne ein räumliches Verhältniß zu vermuthen, welches diese Verschiedenheiten ausgleicht, das wir aber thatsächlich noch nicht erweisen können. Und so sey es denn gestattet, eine auf Gründe der Analogie gestützte Hypothese aufzustellen. — Wir haben (§. 791.) anerkannt, daß jede Hirnhälfte mit einer relativen Differenz im Sinne des ganzen Gehirns wirkt, und daß beyde Hemisphären zu einer Gesamtwirkung sich vereinigen. Wir haben ferner (§. 811.) anerkannt, daß jede Hirnhälfte in Beziehung zu beyden

Seiten des Körpers steht, sey es nun durch materielle Fasern, sey es durch dynamische Spannung. Beydes bestätigt sich bey'm Schachte. Die nach innen liegenden Fäden des Schnerren gehn zur andern Seite des Gehirns, die nach aussen liegenden bleiben auf ihrer Seite: die rechte Hirnhälfte nimmt die nach aussen oder rechts liegenden Fäden vom rechten, und die nach innen oder links liegenden Fäden vom linken Auge auf, empfängt also die Affection der rechten Seite beyder Netzhäute. Aber beyde Hirnhälften in Gemeinschaft nehmen die Gesamtaffection beyder Augen auf, und der Einäugige wird ebenfalls in der vereinten Thätigkeit beyder Hemisphären den Gesichtseindruck percipiren, da Beyde von demselben Auge Fäden bekommen. Wenn wir nun annehmen, daß in Beziehung zu den übrigen Organen dieselben Verhältnisse Statt finden, wie bey den Augen, so werden jene Schwierigkeiten gehoben. Um dies Verhältniß anschaulicher zu machen, erlaube ich mir eine Darstellung desselben auf der X. Tafel. Denkt man sich die hier mit Buchstaben bezeichneten Streifen als wirkliche Faserbündel, so hat man allerdings die Abbildung einer Hypothese vor sich, die, der anatomischen Begründung ermangelnd, vom strengen Zerghliederer ihr Verdammungsurtheil erwartet; denkt man sich aber darunter den Ausdruck der räumlichen Richtungen des Hirnlebens, so findet man hier eine auf Gnade rechnende Versinnlichung der erfahrungsmässigen Hergänge. Wir denken uns also Störungen der Hirnthätigkeit (§. 506) $\alpha - \delta$, $\alpha - \delta$, welche sich durch die Nerven A—D in Beziehung zu den peripherischen Organen setzen. Jedes der Letztern steht mit beyden Hemisphären in Verbindung, z. B. eins der rechten Seite sammt seinem Nerven A sowohl mit der rechten Hemisphäre durch α , als auch mit der Linken durch α . Es steht also auch jede Hemisphäre, nur mit besonderer Artung der Verhältnisse, mit allen Theilen in Verkehr, auf die Functionen Aller einwirkend und von Allen Eindrücke aufnehmend: wir haben hier ein räumliches Bild davon, wie jede Hemisphäre das Ganze in sich schließt, und Beyde zu einer Gesamtwirkung sich vereinigen (§. 791.). Die äussern Strömungen jeder Hemisphäre, α , β , γ , δ , bleiben auf ihrer Seite; die innern, ϵ , δ , α , β , gehn durch Kreuzung auf die entgegengesetzte Seite. A, D stellen die Nerven oberer, mehr sensibler Organe (Augapfel, Augenlid, Hals) dar, welche verhältnismässig mehr auf die Hemisphäre ihrer Seite sich beziehen (§. 809—811), und zwar weil die Strömung α und δ stärker und mehr direct ist, die Strömung ϵ und δ hingegen weniger Kraft hat, und mit A und D nur durch einen Reflex, α und δ in Verbindung kommt; ein solches Rückprallen aber, oder eine in der Richtung gegen den Impuls zurückkehrende Leitung mußten wir aber sowohl bey den Erscheinungen der Lähmung in Hinsicht auf Bewegung (§. 802.), als auch bey den Schmerzen in den Gliedern von Hirnabnormitäten in Beziehung auf Empfindung (§. 339.) erkennen. B und C bedeuten untera, zu mehr irritablem Organen, den Gliedmaßen und dem Antlitz gehörende Nerven, welche mehr den entgegengesetzten Hemisphären verwandt sind, weil die Strömungen β und γ stärker sind und in einer mehr directen Beziehung zu B und C stehn, als die β und γ . Nun ordnen sich sämtliche Strömungen in jeder Hemisphäre nach rechts und links in demselben Verhältnisse gegen einander, wie die peripherischen Organe, auf welche sie sich beziehn, also auch wie die Körper der Aussenwelt. Wenn z. B. eine Empfindung vom rechten Augenlide, A, erregt wird, so wird nicht nur der stärkere Eindruck durch

a in der rechten Hemisphäre in Vergleich zu d, sondern auch der schwächere Eindruck durch a in der linken Hemisphäre in Vergleich zu δ als auf die rechte Seite sich beziehend erkannt werden; und wenn wir mit der rechten Hand, B, tasten, so wird das Gestalt als rechts liegend in der linken Hemisphäre durch β im Gegensatze zu γ , und in der rechten durch b im Gegensatze zu c erkannt werden. Umgekehrt wird die Bewegung durch die vereinte Wirkung beyder Hemisphären bestimmt werden, aber die der Augenlieder A und D, hauptsächlich durch gleichseitige Strömungen, a, δ , und nur unter Mitwirkung der ungleichseitigen, α und d, die der Gliedmaßen, B und C, aber umgekehrt. Wenn nun eine Abnormität in der rechten Hemisphäre Statt findet, so wird am häufigsten A und C gelähmt seyn, ohne daß dadurch die Unterscheidung von rechts und links gestört wird: die rechte Hand wird durch den Gegensatz von b, β zu c, γ als der schmerzhaften Stelle des Gehirns entsprechend erkannt und nach derselben hinbewegt werden.

III. Vorne und hinten.

§. 825. In der Länge, oder nach vorne und hinten zeigt das Gehirn die größte Verschiedenheit in seinem Baue, und somit auch Differenz der Functionen (§. 87). a) Die Carotis entspringt unmittelbar aus der Aorta, entweder für sich, oder in einem gemeinschaftlichen Aste mit der Arterie des der Sensibilität mehr untergeordneten rechten Arms; die Wirbelarterie stammt dagegen aus der Armarterie; jene führt dem vordern, mehr sensibeln Theile des Halses und Kopfes Blut zu, diese dem Hinterhaupte und dem Nacken; Jene giebt Zweige an das Auge und die Nase, diese an das Ohr. Wenn nun Jene zum vordern, Diese zum hintern Theile des Gehirns geht, so dürfen wir der Analogie zufolge auch im vordern Theile des Gehirns eine reinere und gesteigere Sensibilität, und im Hintern ein relatives Uebergewicht der Beziehung auf Irritabilität vermuthen. b) Der hintere Theil des Hirnstammes ist dem Rückenmarke näher und ähnlicher, nimmt viele Nerven in sich auf, und diese ähneln dem Rückenmarksnerven in Hinsicht auf ihre dichtere Faserung und Theilung in Bündel; je weiter der Hirnstamm nach vorne sich fortsetzt, um so mehr wird er dem Rückenmarke unähnlich (§. 89), um so sparsamer werden seine Nerven, und um so eigenthümlicher werden diese. Dort ist also das Hirnleben mehr auf das Leibesleben bezogen, und mehr subjectiv; hier ist es mehr selbstständig und objectiv. c) Der hintere Theil des Gehirns ist empfindlicher seine Verletzung erregt mehr Schmerzen, als die des vordern (*Metzger in Ludwig script. neur. I. p. 123*). So hängt er auch mit dem Gemeingefühle überhaupt näher zusammen. Wenn nämlich bey einer Hirnkrankheit die Empfindlichkeit des Körpers so erhöht war, daß jede, auch leise Berührung heftige Schmerzen verursachte, so fand man vorzüglich Abnormitäten in den hintern Theilen, als Verwundung (Nr. 87) und Eiterung (Nr. 940) des kleinen Hirns, Erweichung der Vierhügel (Nr. 797), Eiterung (Nr. 861) und Erweichung (Nr. 817) der Hinterlappen. Eine besondere Fühllosigkeit des Körpers machte sich bemerklich bey einem Hirnhautwasserbruche am Hinterhaupte (Nr. 866), bey einer Verhärtung in der Brücke (Nr. 857) und bey einem Afterschildes am kleinen Hirne (Nr. 886). d) Wie die Gefäßthätigkeit und Wärmeerzeugung mit der Subjectiven Richtung der Seele in näherem Verkehre steht, so ist

auch der hintre Theil des Gehirns wärmer, als der vordere; dort ist die Temperatur nach Davy (Meckels Archiv II. S. 314) 105, 50, hier nur 103⁶. 6) Nach Gall's Beobachtungen verkündigen sich die Eigenschaften des Gemüths mehr am Hinterhaupte; die Geisteskräfte aber am Vorderhaupte. 7) Wie am ganzen Körper (§. 77), so haben auch das Gehirn nach den obigen Erfahrungen (§. 816) die vordern Theile verhältnismäßig einen mehr sensibeln, die hintern einen mehr irrtabeln Charakter. 8) Eben so lehren aus die gesammelten pathologischen Beobachtungen, daß die Abnormitäten der hintern Hirntheile verhältnismäßig häufiger Krämpfe, die der vordern häufiger Lähmung verursachen; folglich müssen die vordern Theile mehr den Einfluß des Willens vermitteln, die hintern hingegen mehr durch pflanzliche Thätigkeit auf die Bewegung einwirken.

§. 826. Fassen wir dies zusammen, so erkennen wir, daß in den vordern Hirntheilen die Sensibilität ihren Gipfel erreicht, und so das eigentlich innre Leben, die objectivc Erkenntniß, die geistige Thätigkeit und die freye Bestimmung des Leibes überwiegend ist; daß hingegen in den hintern Theilen pflanzliches Leben, subjective Erkenntniß und Gefühl vorwaltet. Wie aber diese Differenz bloß relativ ist, so findet auch keine absolute Geschiedenheit Statt, sondern jede Seelenthätigkeit kommt nur durch die vereinte Wirkung des gesammten Gehirns zu Stande. Wenn Flourens (p. 104 — 107) die vordern und hintern Theile durch einen Querschnitt trennte, so wurde die Seelenthätigkeit der Thiere dadurch für immer vernichtet; indem dadurch die Continuität der Stammstrahlung aufgehoben war; dagegen ausser eine Längenspaltung weder so starken, noch so bleibenden Eindruck, da hier jene Continuität nicht gestört wurde.

§. 827. In der Länge des Hirnstamms senken sich die verschiednen Nervenpaare in denselben ein; er muß also auch dem gemäß an seinen einzelnen Punkten einen verschiedenen Charakter erhalten, und da er in die Hemisphären sich entfaltet und die Grundlage derselben bildet, so muß auch in diesen eine der Localität entsprechende Verschiedenheit der Beziehungen hervortreten. Wir betrachten also hier die einzelnen Nervenpaare in Folge des über ihre Bedeutung aufgestellten Princips (§. 625). Sie erscheinen uns aber, wie schon früher (§. 95) angedeutet wurde, als ein System, welches Gegensätze mit Dretheit der Glieder in sich schließt.

§. 828. Der erste Hirnnerv ist der Sinnesnerv des Geruchs. Denn 1) hat er es mit dem Sehnerven und dem Hörnerven gemein, daß er, ohne an irgend andre Theile Zweige abzugeben, bloß an das Sinnesorgan sich verbreitet. 2) Seine peripherischen Enden nehmen den obern und mittlern Theil der Nasenhöhle ein, wo der Geruch ganz eigentlich seinen Sitz hat, während die Zweige des fünften Nerven mehr am Umkreise, nach unten, vorne und hinten liegen; er unterscheidet sich also von den höhern Sinnesnerven in Bezug auf die Hilfsnerven bloß deshalb, weil im Geruchorgane Centrum und Peripherie nicht so streng geschieden sind, wie im Auge und im Ohre. 3) Der erste Nerv wird als Sinnesnerv von Zweigen der Hirnarterie begleitet, indess neben den Nerven des fünften Paares Zweige der Arterialis gehn. 4) Pathologische Beobachtungen bestätigen es: bey einem Manne (Nr. 1033), der den Geruch ganz verloren hatte, war der erste Nerv durch ein Athergebilde gedrückt und abgezehrt; während die Nasenzweige vom fünften Paare ganz normal waren; bey einem Andern, der nie eine Geruchsempfindung

gehakt hatte, fehlte der erste Nerve (Carus: Gehirn S. 280). 5) Wo der Geruch sehr scharf ist, z. B. beim Jagdhunde, sind auch die Zweige des ersten Nerven stark entwickelt. Magendie (*Journal de Med.* p. 169) fand ihn bey Hunden gegen mechanische Verletzungen unempfindlich; daraus folgt aber noch keinesweges, daß er nicht Sinnesnerv seyn, denn die Sensation ist eben eine spezifische Richtung der sensibeln Perception, und Magendie (ebendas. p. 180) hat sich selbst überzeugt, daß auch die Zerreißung der Netzhaut wenig oder keinen Schmerz verursacht. Das Auftröpfeln von Ammonium verursacht Schmerz; daß dieser nach Magendie nur von Berührung des Ethmoidalnerven herrührte, war bloß Vermuthung. Auch äussert sich allerdings Gemeingefühl im ersten Nerven: bey einer Eiterergießung auf dem Siebbeine, am Riechstreifen (Nr. 589) fühlte der Kranke ein Klitzeln in der Nase. — Bey seiner unvollkommenen Entwicklung fehlt bisweilen die Nase (Nr. 652) oder ein Nasenloch (Sümmerring *de bas.* p. 3). — Der Riechnerv muß zu gleich mit dem Sehnerven und dem Hörnerven mehr auf die Subjectivität und das pflanzliche Leben wirken, dunkle Empfindungen und Begehungen wecken. Er bildet einen Gegensatz zum Endfaden des Rückenmarks; Beydes sind Nerven, aber auf eine zweydeutige Weise, so daß Erstere mehr gehirnartig, Letztere mehr sehnartig ist. Bey dem Ubergewichte des pflanzlichen Hirnlebens über das psychische ist der Riechnerv stärker entwickelt, legt noch mehr den Charakter eines Nerven ab, und wird noch deutlicher ein Hirntheil, in dessen Höhle die Seitenhöhlen sich fortsetzen: so bey dem Embryo und bey den Thieren. So fand auch Malacarne (*neurosees.* p. 142) bey einem Verrückten eine mit schleimigem Wasser gefüllte Höhle, indeß bey einem andern Blödsinnigen (Nr. 691) der Riechnerv fehlte.

§. 829. Daß der zweyte Nerve unmittelbar die Sensation des Sehens bedingt, geht aus der Betrachtung seines peripherischen Endes, so wie aus pathologischen Beobachtungen hervor: z. B. bey seiner Atrophie (Nr. 539, 545, 507, 817), bey einem Drucke von Aftergebilden auf ihn (Nr. 889, 890, 891, 933, 937, 988, 1049), bey Eiterergießung am Chiasma (Nr. 668) und bey Hydatiden am Sehstreifen (Nr. 1066) fand Blindheit. Statt Vermöge der partiellen Durchkreuzung im Chiasma findet man den Sehstreifen bald auf der Seite des blinden Auges, bald auf der entgegengesetzten Seite atrophisch. Wenzels (*ocelebr.* p. 124) haben beobachtet, wie bey dem Welken und der Zerstörung des Auges die abnorme Veränderung erst im Sehnerven bis zum Chiasma, dann im Sehstreifen bis zum Schlägel fortschreitet, und wie diese Gebilde auf der gesunden Seite durch Antagonismus zuweilen eine ungewöhnliche Stärke erlangen. — Malacarne (*meses Journ. d. anal. Lit.* II. 1. St. S. 189) sah, daß bey einem Kinde die Augen und auch die Sehnerven fehlten.

§. 830. Was den achten Nerven betrifft, so ist seine Bedeutung unzweifelhaft, wiewohl die pathologischen Beobachtungen hier seltner sind. Rosenthal (Horns Archiv 1819 II. S. 13) fand ihn bey einem Taubstammen sehr fest; Sandifort (*obs. path.* c. 9) sah ein Aftergebilde an ihm bey einem Tauben; Santorini (*tabul.* p. 24) bemerkte bey einem Blinden, dessen Gehör vermuthlich sehr scharf war, sehr hervorragende Markstreifen der Rautengrube. Die häufigen Varietäten dieser Streifen scheinen auf die verhältnißmäßig vorherrschende Subjectivität des Hörsinnes hinzuweisen. — Der Sehnerv und der Hörnerv legen sich an Hirnschenkel (Jener an die des großen, Dieser an die

des kleinen Hirns) an, umschlingen sie, und laufen an ihnen nach oben und innen; Beyde bilden Halbringe, der Sehnerv einen unten im Chiasma geschlossenen, oben offenen, der Hörnerv einen unten offenen, oben durch die Markstreifen der Rautengrube geschlossenen; Beyde legen sich in gleicher Linie mit einem andern Sinnesnerven an das Gehirn, der Sehnerv mit dem mehr nach innen und vorne gelegenen Nerven, der Hörnerv mit dem weiter nach aussen und hinten gelegenen fünften Nerven; Beyde stehen in entfernterer Beziehung zu Muskelnerven, der Sehnerv zu dem dritten, vierten und sechsten, der Hörnerv zu dem siebenten Nerven. So spricht sich denn auch in den Gestaltungsverhältnissen ihrer Nerven die allgemeine Uebereinstimmung und der besondere Gegensatz zwischen den beyden höchsten Sinnen aus.

§. 331. Die drey bisher betrachteten Hirnnerven haben ihre peripherischen Enden bloß in Sinnesorganen, und Jeder derselben vermittelt eine spezifische Sensation, und können daher als besondre bezeichnet werden. Sie stehen am höchsten, und sind die nächsten Pfortner für den Zutritt des Aeussern zum Innern. Indem sie aber ein Ganzes mit drey Gliedern ausmachen, spricht sich auch die allgemeine Dreyheit der Lebensrichtungen in ihrer Function, so wie in der Gestaltung ihrer peripherischen Enden aus. Der Sehnerv spannt sich als kugelige Netzhaut aus, und empfängt das Licht als die reinste dynamische Erscheinung; der Hörnerv zieht sich durch die gekrümmten und gewundenen Röhren der Bogengänge, und der Schneck, und nimmt den in innerlicher Bewegung der Körper bestehenden Schall auf; der fünfte Nerve brühet sich in den zusammengeroßelten und einander durchsetzenden Blättern der Nase aus, und giebt sich den Mischungsverhältnissen des Luftartigen hin. So verhalten sich demnach die drey besondern Sinne wie Licht, Schall und Luft, wie Kugel, Walze und Blatt, wie Sensibilität, Irritabilität und Plasticität.

§. 332. Der fünfte Hirnnerv vereinigt diese drey Richtungen in sich, jedoch in verschiednem Grade. Offenbar ist die Sensibilität, und in dem Kreise derselben das Gemeingefühl in ihm überwiegend. Es verbreitet sich mit dem siebenten Nerven an das Antlitz, vermittelt aber hier vorzugsweise die Empfindung, wie zuerst Bell (*Magendie's Journ. I. p. 389. II. p. 71*) gezeigt hat. Als Fodera (ebend. III. p. 207) ihn bey einem Kaninchen ganz durchschnitten hatte, waren Wangen, Augenlider, Nase, Gaumen, Zähne und Unterkiefer ganz fühllos. Bey Pferden konnte ich die Antlitzäste des siebenten Nerven kneten, stechen, durchschneiden, ohne dafs ein Zeichen von Schmerz erfolgte; berührte ich den *Infraorbitalis*, so entstanden Aeusserungen eines lebhaften Schmerzes, und beym Durchschneiden trat Zähnkürsch ein. Die galvanische Reizung des siebenten Nerven erregte heftige Zuckungen des Antlitzes; die des *Infraorbitalis* veranlafste bloß eine leichte Vibration in der Oberlippe, aber das ganze Thier wurde dabey mehr erschüttert. Auf der Seite, wo ich den siebenten Nerven durchschnitten hatte, war die willkürliche Bewegung, auf der, wo der *Infraorbitalis* durchschnitten war, die Empfindung vernichtet. Warren (Gerson VII. S. 147) beobachtete einen Gesichtschmerz, gegen welchen die Durchschneidung des *Infraorbitalis* und *Mentalis* wenig gefruchtet hatte; da sich der Schmerz längs des siebenten Nerven verbreitete, so wurde von diesem ein Stück abgeschnitten, aber das Gesicht wurde auf dieser Seite gelähmt, und der Schmerz wenig

erleichtert, von welchem erst das Ausschneiden eines Stücks vom Unterkieferaste des fünften Nerven gänzlich befreite.

§ 833. Da nun das Gemeingefühl die Wurzel aller Sinne ist, so ist auch der fünfte Hirnnerve der allgemeine Sinnesnerv, welcher die niedern Sensationen durch eigene Kraft vermittelt, und zu den höhern mitwirkt. Er ist demnach zuvörderst der Tastnerv des Kopfs, wie er zu den Cirrhien der Fische, zum Rüssel des Elefanten, zu den Barthaaren des Seehundes, der Katze, des Hasen u. s. w. (Shaw in *Magasin de Jour.* II. p. 87) geht, so begründet er das Tastvermögen der menschlichen Lippen, indem er mit dem siebenten Nerven zusammenwirkt, welcher die alles Tasten bedingende willkürliche Bewegung giebt.

§ 834. Wie der Gesichtsnerv eine Potenzierung von Gemeingefühl und Getaste ist, so giebt der fünfte Nerve auch den Geschmacksnerven ab, jedoch so, daß ihm dabey, außer dem die Bewegungen Bestimmenden zwölften Nerven auch noch ein sensibler, der neunste Nerve zu Hülfe kommt. Wenn der Zungenast des fünften Nerven gereizt wird, so entsteht Schmerz, aber kein Krampf der Zunge, und wird er durchschlitten, so verliert die Zunge nicht ihre Beweglichkeit, sondern ihre Empfindlichkeit (Mayo II. p. 1034. Foderà in *Magasin de Jour.* III. p. 305), und zwar besonders nur an der Spitze, denn der mittlere und hintere Theil derselben behält noch Geschmackfähigkeit (Magen die *Journ.* II. p. 181). Indem er aber vorzüglich die Zungenspitze mit seinen Zweigen versieht, sieht er nicht bloß mit der Localität, sondern auch mit der Qualität der Geschmacksempfindung in einer besonders Beziehung, da die Spitze besonders das Säuerstoffige, Süße und Säure, die Wurzel hingegen das Kohlenstoffige, Bittere und Schärfe percipirt. Uebrigens geht der fünfte Nerve zu der Schleimhaut des Mundes, zu Lippen und Gaumen, wo der Vorgeschmack sich bildet, und wo nach Verlust der Zunge noch einiger Geschmack sich äußert. Bey Vögeln tritt er nur zu den Schmeckwurzeln am Gaumen, nicht zur Zunge, da diese hier mehr ein Bewegungsorgan ist; dagegen versieht er bey Fischen allein die Zunge, da diese der freyen Bewegung ermangelt.

§ 835. Was den Geruch betrifft, so giebt der fünfte Nerve a) die Tastnerven der, namentlich nach Art einer Extremität, rüsselförmig verlängerten Nase ab. Bey der Mibildung, wo die Sehnerven, anstatt seitlich auseinander zu weichen, an einander durch die Siebplatte gehen und wo die Augen in eines verschmelzen, die Riechnerven aber gedrängt werden, wird die Nase durch das Ubergewicht des fünften Nerven zu einer rüsselförmigen Verlängerung, welche wie ein Tastorgan sich darstellt, wie bey den Cetaceen, wo der Riechnerv fehlt, die Nase nach außen getrieben wird. b) Der fünfte Nerve vermittelt ferner das bey dem Geruche mitwirkende Gemeingefühl und die Wirkung der Riechstoffe auf das pflanzliche Hirnleben. Durch ihn behielt die Nase bey Hunden, welchen der Riechnerv zerstört worden war, ihre Empfindlichkeit für Ammonium (Laven-dol u. s. w. (Magen die *Journ.* IV. p. 176); durch ihn behielt ein Mann bey Atrophie des Riechnerven (Nr. 1033) und bey gänzlicher Geruchlosigkeit, die Reizempfänglichkeit für den Schnupftabak. Ein analoges Verhältniß scheint bey einem Manne, welchen ich kenne, ursprünglich Statt zu finden: er kann sich nicht erinnern, jemals gerochen zu haben, aber die Gerüche wirken sehr lebhaft auf seine Hirnthätigkeit, und wie das Ammonium

einen starken Kitzel in seiner Nase erregt, so leistet ihm der Schnupftabak bey gelästigten Arheiten die ausgezeichnetsten Dienste, so daß er bey jeder schwierigen Aufgabe sich desselben bedienen muß. Bey einem Menschen, dessen fünfter Nerve auf der rechten Seite gelähmt war, erregte nach Shaw's Beobachtung die Reizung der rechten Nasenhöhle kein Niesen. c) Die specifische Geruchsempfindung, welche von der Erregung des Gemeingeühls und von der Befebung der pflanzlichen Hirnthätigkeit durch Gerüche wohl zu unterscheiden ist, wird zwar ganz eigentlich durch den ersten Nerven vermittelt (§. 818), da aber dieser mit den Nasenzweigen des fünften Paares anastomosirt, und die Bereiche beyder Nerven ohne Abgränzung in einander übergehn, so muß der letztre Nerve auch daran Theil nehmen und mitwirken. Er vermittelt den dynamischen Zusammenhang zwischen Geruch und Geschmack, vermöge dessen wir bey zu gehaltner Nase nicht so fein schmecken können. Einige besondre Geschmacksempfindungen scheinen durch den Geruch besonders bedingt zu werden, den eben erwähnte Mann, der keinen Geruch und übrigens einen sehr feinen Geschmack hat, vermag das dumpfige modrig und ranzig Schmeckende nicht zu unterscheiden; in der Nähe eines stark riechenden Düngehaufens empfindet er einen salzigen Geschmack. Bey einem Altergebilde am fünften Nerven (Nr. 858) empfand der Kranke vor jedem Krampfanfalle einen eignen unangenehmen Geruch. Bey den Cetaceen vertritt der fünfte Nerve die Stelle des ersten Nerven: Das aber Letzter überhaupt den Geruch nicht vermittelt, geht aus Magendie's (*Journ. IV. p. 173*) Versuch auch durchaus nicht hervor; wenn er zerstört war, so behielt die Nase noch das Gemeingeühl für Gerüche, aber nicht die specifische Perception, denn die Hunde, an welchen dieser Versuch gemacht wurde, machten zwar das Papier auf, in welches Fleisch gewickelt war, schienen aber das Futter nicht zu riechen, welches man, von ihnen ungesehen, hingelegt hatte.

§. 836. Der fünfte Hirnnerv nimmt einen geringern Antheil am Gehör, als der sechste. Indess schienen nach seiner Durchschneidung die Thiere schwerhörig zu werden (Magendie *Journ. IV. p. 181*).

§. 837. Am Auge vermittelt er a) das Gemeingeühl; die Oberfläche desselben wurde nach seiner Durchschneidung unempfindlich (Mayo II. p. 5), so daß angebrachtes Ammonium keine Schmerzen mehr erregte (Magendie *Journ. IV. p. 176*). b) da er sich an das Ciliarsystem verbreitet, ohne dessen Bewegungen direct zu bestimmen (§. 847) in diesem aber das Gemeingeühl specifisch sich artet als Lichtgefühl, so muß auch Letztes durch ihn vermittelt werden. Schon die Haut des Antlitzes hat eine Art Lichtgefühl, welches nur vom fünften Nerven abhängen kann: man empfindet, wie Colhorn (*American recorder VI. Nr. 1. Art. 5*) bemerkt, bey verbundenen Augen das Licht am Antlitze, nicht auf der Haut des übrigen Körpers. Die Lichtempfindungen, welche durch Congestion, Druck, Galvanismus erregt werden, gehen offenbar vom fünften Nerven aus, da sie theils bey Einwirkung auf die Gegend desselben entstehen, theils zuweilen seinen Verzweigungen folgen, theils auch bey völliger Lähmung des Sehnerven eintreten. c) Nüt ist die Lichtempfindung die Grundlage des Sehens, also auch die Thätigkeit des Sehnerven eine Bedingung des Sehactes: die Verwundung seiner Stirnzweige kann Blindheit verursachen, und eben so hat man Fülle beobachtet, wo die Zusammendrückung seiner

Stamms durch Aftergebilde Abnahme des Gesichts zur Folge hatte. Nach Magendie (*Journ. Exp.* p. 180) sehen Thiere, bey welchen er auf beyden Seiten durchschnitten ist, wenig oder gar nicht wie gehen, wie Blinde, die Schnauze auf der Erde hinschiebend, wissen aber nicht, wie bey andrer Blindheit, die Hindernisse durch das Gemeingefühl zu unterscheiden und zu vermeiden; sondern stoßen sich daran eher wund, als daß sie ausweichen. Endlich vertritt der fünfte Nerve die Stelle des fehlenden Schnerven bey dem Proteus, dem Maulwurfs, dem Goldmaulwurfs, der Spitzmaus und der Erdmaus (Serrès I. p. 350 sq.); also bey Thieren, welche im Dunkeln leben, und nicht sowohl deutlich sehen, als vielmehr durch das Licht im Allgemeinen afficirt und geblendet werden.

§. 838. Indem der fünfte Nerve durch das in ihm gesteigerte Gemeingefühl in die verschiedenen höhern Sinnessaiten eingreift, so muß er bey diesen seinen verschiedenen Richtungen die Einwirkung der Aussenwelt überhaupt auf das pflanzliche Hirnleben und auf die damit zusammenhängende Stimmung der Seele mehr, als die übrigen Nerven, vermitteln: die Erfrischung und die Betäubung durch Gerüche (§. 835); die Erquickung und der Ekel durch schmeckbare Substanzen (§. 834); die Belebung und die Blendung durch Licht (§. 837), und wahrscheinlich auch die Aufregung und Benommenheit durch den Schall (§. 836), ist seine Wirkung, wodurch er denn auch mit dem Instincte in nähere Beziehung treten muß.

§. 839. Verhältnißmäßig schwächer, doch an sich nicht gering; ist seine Beziehung auf Plasticität. Er verbreitet sich an die Schleimhaut der Mundhöhle, des Gaumensegels, des Rachens und der Eustachischen Röhre, und steht durch den Rumpfnerven in genauem Consensus mit dem Verdauungsorgane, wie denn die Erweiterung der Pupille, das Jucken der Nase und das Zähnkriechen bey Wurmbeschwerden auf eine Affection aller drey Aeste desselben hindeutet. Und wie die Ganglienbildung überhaupt an ihm stärker hervortritt, als an den übrigen Hirnnerven, mit Ausnahme des zehnten, so hat sowohl sein Stamm, als auch jeder seiner drey Aeste ein besonderes Ganglion, wodurch eine Verbindung mit dem Rumpfnerven zu Stande kommt — Er geht ferner zu dem plastischen Apparate der Kopfsinne, zu den Speicheldrüsen und Thränenrüsen: Foderà (*Journ. compl. XVI. p. 299*) sah, daß nach Durchschneidung seines Zungenastes das geistige Extract der Digitalis keine Verstärkung der Speichelabsonderung mehr hervorbrachte. Der Analogie nach zu urtheilen, werden seine Zweige im Gehörgange auf die Bildung des Ohrenschmalzes, und die an der Nase auf die Absonderung in den hier befindlichen größern Talggruben einen ähnlichen Einfluß ausüben. Am deutlichsten zeigt sich sein Einfluß auf das plastische Leben der Zunge und des Auges. Nach seiner Durchschneidung wird die Zunge weißlich, ihre Epidermis verdickt sich, und das Zahnfleisch weicht von den Zähnen; die Hornhaut wird am folgenden Tage trübe und allmählig weiß (was nicht eintritt, wenn bloß die Thränendrüse extirpirt wird, also nicht durch den Mangel an Thränenfeuchtigkeit herbeigeführt wird); die Bindehaut entzündet sich und sondert viel eiterförmigen Stoff ab; und an der entzündeten Iris bilden sich Gerinsel, welche die vordere Kammer ausfüllen; am den achten Tag löset sich die Hornhaut von der festen Augenhaut und eiert in der Mitte; die Augenfeuchtigkeit läuft aus, das Auge schrumpft zusammen, enthält käsige Substanz und man findet keine Netzhaut mehr. (Magendie *Journ.*

IV. p. 178 — 181). — Endlich begleitet und umschlingt der fünfte Nerve die Arterien sowohl des Antlitzes, als des Gehirns. — Wie er durch das pflanzliche Hirnleben auf das Unfreye der Seele wirkt (§. 838), so vermittelt er auch durch seine Herrschaft über diese plastischen Organe den unwillkürlichen, psychischen Ausdruck, nämlich die Schamröthe, das Weinen, das Speicheln und den Glanz des Auges, *von der Natur beobachtet*.

§. 840. Am beschränktesten ist sein Einfluß auf die Irritabilität. Nur die Bewegung des Kiefers, welche vorzüglich der Verdauung, dann aber auch dem Athmen dient, ist ganz von ihm, namentlich von seiner kleinen Wurzel abhängig; denn von dieser bekommen die Kaumuskeln ihre Nerven. Seine Entwicklung steht, wie Shaw (Froriep. Nr. 34) bemerkt, in geradem Verhältnisse zu den Kaurorganen, und ist daher bey Thieren verhältnißmäßig stärker, als bey dem Menschen. Bey einem Aftergebilde an seinem Stamme (Nr. 838) war der Kiefer gelähmt; dagegen blieb nach Durchschneidung des siebenten Nerven das Kauen ungestört (Bell in Magendie Journ. I. p. 354). Wenn nach Durchschneidung des fünften Nervenstamms der einen Seite die Kieferbewegung fort dauerte (Foderà in Journ. compl. XVI. p. 299), so geschähe dies wohl nur durch die Muskelwirkung der entgegengesetzten Seite; nach der Durchschneidung auf beyden Seiten hängt der Kiefer herab (Magendie Journ. IV. p. 181). — So bewirkt er auch die Bewegungen des Gaumensegels bey dem Schlingen und Athmen, wenn nicht etwa, wie Burdin (vom Menschen S. 172) und Shaw (Anleitung z. Anatomie S. 354) behaupten, die Nerven dieses Gebildes zum siebenten Paare gehören, was uns freylich durchaus noch nicht einleuchtet. — In den übrigen Theilen bewirkt der fünfte Nerve die willkürliche Bewegung nicht unmittelbar, doch muß er durch seine Verbindung mit dem siebenten eben so gut einen Einfluß darauf haben, wie er auf das Sehen einwirkt. Bey Vorhäufung der Brücke an seinem Austritte (Nr. 961), und bey Compression desselben durch Aftergebilde (Nr. 882 und Prohaska aduott III. p. 207) oder durch ein Extravasat (ebendas. p. 192) war die Sprache schwer, stammelnd und unarticulirt. — Nach Broughtons (Gerson VI. S. 354) Beobachtung verlieren die Lippen nach Durchschneidung des fünften Nerven ihre Spannung und Stellung, ohne jedoch gänzlich gelähmt zu werden. — Shaw sah in einem Falle seiner Lähmung auch das obere Augenlid zum Theil gelähmt. Nach Durchschneidung seines Stamms hörte die Bewegung des Augapfels und des Augenlids auf (Magendie Journ. IV. p. 177 sq.).

§. 841. Im siebenten Nerven ist vorzugsweise die Beziehung auf willkürliche Bewegung entwickelt. Nach dem von Bell, Shaw, Foderà, Mayo und mir angestellten Versuchen sind nach seiner Durchschneidung die Muskeln des Antlitzes, der Augenbrauen, der Augenlider, der Ohren, der Nase und des Mundes gelähmt. Das Auge kann nicht mehr geschlossen werden, doch zeigte sich in einem Falle (Magendie Journal II. p. 80) die verlorne Kraft nach einem Monate wieder; einmal war die Bewegung des Augenlids und der Augenbrauen nur geschwächt (ebendas. p. 136); in andern Fällen war sie ganz aufgehoben (ebend. p. 70). Das Ohr wird gelähmt und es zeigen sich die Zweige der Halsnerven an ihm ohne Einfluß auf die Bewegung (ebendas. III. p. 204). Die Bewegungen der Nasenflügel hören auf, und der Dunst von vorgehaltne'm Atmatorium wird nicht mehr eingezo gen (ebend. II. p. 136). Die Lippen sind ohne Bewegung, und bey dem

Verbluten entstehen keine Zuckungen in den Gesichtsmuskeln (ebend. II. p. 68 sqq.). Die Augenbrauen behielten nach Durchschneidung des Stirnzweigs vom fünften Paare ihre Bewegung, wurden aber bey einer Eiterung an den obern Zweigen des siebenten Nerven gelähmt (ebend. p. 71). Nach Mayo (II. p. 8) verursacht die Reizung der Zweige des fünften Nerven keine Bewegung im Bückenmuskel, so daß also auch dieser mittels des siebenten Nerven bewegt wird.

§. 842. Da nun die genannten Muskeln den psychischen Zustand verkündigen, so muß auch der siebente Nerve den willkürlichen oder unwillkürlichen mimischen Ausdruck des Antlitzes bestimmen. Nach Durchschneidung dieses Nerven ging der Ausdruck der Gesichtszüge verloren. Affen konnten, wenn sie gereizt wurden, nicht mehr grinsen (Magendie *Journal* II. p. 80); Hunde zeigten beym Jagen keinen Ausdruck des Zorns (ebend. p. 72), und bey der Furcht keine Zuckungen im Gesichte; Katzen spitzten, wenn sie aufgebracht wurden, nicht mehr die Ohren. Menschen, bey welchen der siebente Nerve der einen Seite gelähmt war, konnten auf dieser Seite nicht die Bewegungen des Lachens hervorbringen, und nicht pfeifen (ebend. p. 136). Der siebente Nerve ist, wie Shaw (ebend. p. 77) bemerkt, in Verhältnisse zum fünften bey dem Menschen am stärksten, schwächer bey den Affen; noch schwächer bey den Raubthieren; am schwächsten bey den Wiederkäuern und Einhufern. Er giebt bey dem Kampfhase Zweige an den Unterkieferkamm, der beym Zorne anschwillt. — Allein, es ist offenbar zu weit gegangen, wenn ihn Bell als den mimischen Nerven schlechthin betrachtet. Bedarf wohl die Seele, um ihren Zustand küssen zu können, noch eines eigenen Nerven? Spricht nicht der Augapfel, die Hand und der ganze Rumpf durch seine Stellung den Gemüthszustand aus? Und kann wohl die psychische Bedeutung der Zunge vom siebenten Nerven herrühren?

§. 843. Die Antlitzmuskeln nehmen Theil an den Bewegungen des Athmens (namentlich des Einathmens durch Öffnen der Nasenlöcher), und der Aufnahme der Nahrung (beym Öffnen des Mundes und bey dem Kauen). Der siebente Nerve dient also durch die Bewegung, welche er erregt, beyden Functionen, wie er dieselben auch durch die Zweige leistet, welche er an Muskeln der Zunge, des Zungenbeins, des Rachens und des Kiefers giebt. — Eine grundlose Hypothese war es, wenn Bell annahm, der fünfte Nerve diene allein den Bewegungen der Verdauung, der siebente allein denen des Athmens. Er wollte beobachtet haben (Magendie *Journal* I. p. 384, II. p. 67), daß nach Durchschneidung des *Infraorbitalis* die Lippen gelähmt und die Verdauungsbewegungen derselben aufgehoben seyen, und Shaw (ebend. II. p. 136) stimmt ein, daß der Schließmuskel der Lippen durch diesen Nerven bestimmt werde. Magendie's (ebend. I. p. 387) und meine Versuche lehren das Gegentheil. Bey dem Fischen fehlt der siebente Nerve, ungeachtet der ziemlich lebhaften Athmungsbewegungen. (Vgl. §. 293.).

§. 844. Die Sensibilität dieses Nerven ist verhältnismäßig gering, jedoch nicht ganz zu leugnen. Bell (Magendie *Journal* II. p. 68) behauptete zwar, er sey ganz fühllos, aber Magendie, Fodera (ebend. III. p. 206) und Mayo (II. p. 4) fanden ihn bey dem Durchschneiden empfindlich, wenn auch nicht in so hohem Grade, als den fünften; und Fodera bemerkte, daß er am küssen Ohre auch das Gemeingefühl vermittele, indem

nach seiner Durchschneidung die Gegend des Ohrs, die von ihm Zweige bekommt, gelähmt und fühllos ward. — Besonders trägt er aber zum Gehör bey, und zwar vielleicht gleich dem Ciliarnerven zum Sehen, durch Erregung von Schallgefühl. Bey seiner Eiterung (Nr. 407) und Atrophie (Nr. 1275) entstand Ohrensausen, und bey Aftergebilden, welche auf ihn drückten (Nr. 882, 888), nahm das Gehör ab. — Am unbedeutendsten ist die Beziehung dieses Nerven zur Plasticität.

§. 845. Offenbar ist im zehnten Nerven der Einfluß auf die Plasticität stärker, als in irgend einem andern Hirnnerven. Von seiner Thätigkeit sind die wichtigsten Functionen des pflanzlichen Lebens, Verdauung, Athmen und Harzschlag abhängig: und zwar hängt die Thätigkeit der Lungen unbedinget von ihm ab; für den Magen gehört er nur zu den bedingenden Momenten; auf Herz und Arterien aber ist er nur unter gewissen Umständen vermögend, einen Einfluß auszuüben. Bey den niedern Wirbelthieren, wo die Gegensätze noch nicht so ausgebildet sind, und das Rumpfleben stärker auf das Gehirn einwirkt, vertritt er zum Theil die Stelle des weniger entwickelten Rumpfnerven. — Er geht ferner zu willkürlichen Muskeln, aber nur zu solchen, die mit dem Athmen und der Verdauung in Beziehung stehn. Dafs er die Muskeln des Kehlkopfs bestimmt und dadurch die Stimme giebt, war schon dem Alterthume bekannt; ob in dem Gegensatz des obern Kehlkopfzweigs zum untern der Gegensatz der Empfindung zur Bewegung, wie Scarpa verimuthet, oder der Schließung zur Öffnung der Kehltritz, also des Ausathmens zum Einathmen, wie Magendie behauptet, oder der unwillkürlichen zur willkürlichen Bewegung sich ausspricht, bedarf noch einer nähern Untersuchung. Dafs aber der zehnte Nerve auf das Schlingen einwirkt, geht sowohl aus seiner Verbreitung, als aus physiologischen Erfahrungen hervor: das Schlingen wurde durch Durchschneiden seines Stammes (Haller *elementa* III. p. 409) oder seiner Kehlkopfzweige (Arnemans *Regeneration* 63 Vers., Mayo I. p. 114) erschwert, und wenn er oben am Halse galvanisirt würde, zogen sich die Muskeln des Speiseröhrenkopfs und der Speiseröhre zusammen (Cruikshank in Reils Archiv. II. S. 70). (Vgl. §. 312.). — Die Empfindlichkeit des zehnten Nerven ist gering: Broughton (Gerson VI. S. 351) bemerkte, als er ihn bey einem Pferde stach, kniff und mit der Scheere langsam durchschnitt, keine Aeusserung von Schmerz; dafs er aber nicht ganz unempfindlich ist, davon überzeugten sich Mayo (I. p. 114) und Foderà. Offenbar muß er das Gemeingefühl an der innern Oberfläche, wo der Organismus mit äussern Stoffen in eine chemisch-dynamische Wechselwirkung tritt, vermitteln.

§. 846. Fassen wir nun Alles zusammen, so erkennen wir, dafs das fünfte, siebente und zehnte Hirnnervenpaar eine eigne Classe von Nerven ausmachen, indem sie am mannichfaltigsten sich ausbreiten und auf alle drey Seiten des Lebens sich beziehen, weshalb wir sie denn auch als die allgemeinen Hirnnerven bezeichnen. Aber die Verhältnisse dieser drey Beziehungen sind bey ihnen verschieden. Die Sensibilität ist überwiegend im fünften Paare, welches das Gemeingefühl in der Haut des Antlitzes und das Gefaste dasselbst vermittelt, im Geschmacksorgane herrschend und central, im Geruchorgane mehr peripherisch, im Auge und Ohre vollkommen peripherisch und an die vermittelnde, irritable Sphäre, Iris und Trommelhöhle gewiesen ist; beschränkter zeigt sie

sich im siebenten Paare, welches nur mit dem Hörsinne in einer nähern Beziehung steht; und am schwächsten im zehnten Paare, welches an gar kein Sinnesorgan sich verbreitet, sondern bloß das Gemeingefühl der Ingestion in den specifischen Formen von Hunger, Wasserdurst und Luftdurst vermittelt. Die Irritabilität ist das Vorherrschende im siebenten Paare, indem dieses die willkürlichen Bewegungen am rüßern Umkreise der vier Sinnesorgane bestimmt, welche zunächst den Sensationen und dem mimischen Ausdrucke, dann aber auch der Ingestion für Athmen und Verdauung dienen; sie ist verhältnißmäßig mehr untergeordnet im zehnten Paare, welches die Bewegungen der Luftwege und namentlich die Stimme, als den lebendigsten Ausdruck des Innern, ferner die der Speisewege, und zum Theil auch die auf Athmen und Verdauung sich beziehenden des Zwerchfells, vermittelt; am meisten tritt sie zurück im fünften Paare, welches vorzüglich die der Verdauung und dem Athmen dienenden Bewegungen des Gaumensegels und des Kiefers erregt, wie es denn in die Substanz des Kiefers und der Zähne dringt. In Hinsicht auf Plasticität steht das zehnte Paar oben an; da es an das Centrum des Plastischen (Hirn und Arterienstämme), an sämtliche Luftwege (Kehlkopf, Luftröhre, Schilddrüse, Lungen) und an den obern Theil der Verdauungsorgane (Speiseröhrenkopf, Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, Leber, Milz, Pankreas) sich verbreitet; auf dieses folgt das fünfte Paar, welches die Secretionen am Umkreise der vier Sinnesorgane (Thränen, Ohrenschmalz, Nasenschleim, Nasentalg, Speichel) leitet; zu unterst steht das siebente Paar, dessen Beziehung zur Plasticität auf die Ohrspeicheldrüse beschränkt ist. Durch die willkürlichen Bewegungen, welche es vermittelt, wirkt das siebente Paar verhältnißmäßig mehr für das Athmen, das fünfte mehr für die Verdauung, das zehnte für beyde Functionen gleich. — Die Proportionen sind also, tabellarisch aufgefafst, folgende:

Grad der Wirksamkeit.	Fünftes Paar.	Zehntes Paar.	Siebentes Paar.
Höchster Grad:	Sensibilität.	Plasticität.	Irritabilität.
Mittlerer Grad:	Plasticität.	Irritabilität.	Sensibilität.
Unterster Grad:	Irritabilität.	Sensibilität.	Plasticität.
Höchster Grad:	Verdauung.	Athmen.	Athmen.
Mittlerer Grad:	Athmen.	Verdauung.	Verdauung.
Unterster Grad:		Blutlauf.	

§. 847. Eine dritte Reihe von Nerven finden wir in den drey Paaren, welche an die Muskeln des Augapfels sich verbreiten, und dadurch mit dem Gesichtssinne in Verbindung stehen, wie sie denn auch Sömmerring (Beillie S. 264) an einem blinden Auge dünner fand, als an dem andern, gesunden. Das dritte Paar zeigt verhältnißmäßig die meiste Sensibilität, indem es in das Ciliarganglion Zweige giebt und die Bewegungen der Iris erregt. Nach Mayo's (II. p. 4 sq.) Erfahrungen hängen diese Bewegungen bloß von ihm, nicht von den Fäden des fünften Paares, ab; wenn er den dritten Nerven kniff, so zog sich die Pupille zusammen; durchschnitt er ihn, so wurde sie gelähmt, während

das Auge empfindlich blieb. Die Bewegungen der Iris sind in einem gewissen Grade unabhängig vom Zustande des Sehnerven: wie eine chronische Entzündung der Rumpfeingeweide durch Eintritt von Fäden des Rumpfnerven in das Ciliarganglion die Pupille verengern kann, ohne daß die Sehkraft leidet; so ist die Iris zuweilen bey dem grauen Staare gelähmt und wird durch die Operation wieder beweglich; und dagegen behauptet sie bisweilen ihre Beweglichkeit bey der Amaurose. Gewöhnlich aber wird sie durch den Zustand des Sehnerven bestimmt, wie sie denn bey dessen Durchschneidung (Nr. 19) und bey einem auf ihn drückenden Aftergebilde (Nr. 958) gelähmt wurde. Dieser Consensus wird aber nur dadurch zu Stande gebracht, daß der auf den Sehnerven gemachte Eindruck auf den Großhirnstamm fortgepflanzt und von da auf den dritten Nerven reflectirt wird. Denn wenn Mayo (a. a. O.) den Sehnerven an einem abgeschnittenen Kopfe durchschneitt, und den Theil desselben, welcher am Auge hing, reizte, so entstand keine Veränderung im Auge; kniff er dagegen den mit dem Gehirne noch zusammenhängenden Theil des Sehnerven, so zog sich die Pupille eben so zusammen, wie bey Reizung des unverletzten Sehnerven; und wenn er den dritten Nerven durchschnitten hatte, so brachte die Reizung des unverletzten oder des durchschnittenen Sehnerven keine Veränderung in der Pupille hervor. Die geraden Augenmuskeln, an welche der dritte Nerv noch sich verbreitet, wirken nach Bell ganz willkürlich, und stehen im genauen Zusammenhange mit der Thätigkeit der Netzhaut. — Das vierte Paar ist ausschließlich der Irritabilität gewidmet, aber es giebt nach Bell's Beobachtungen vorzüglich die unwillkürliche Bewegung des Augapfels. So wird Willis Bemerkung bestätigt, daß es hauptsächlich den Einfluß der Gemüthsbewegungen auf das Auge vermittelt; auch bemerkte Camper (Sömmering *de basi* p. 783), daß es sein Leben am längsten behauptet, da sich das Auge bey Sterbenden nach oben und innen wendet. — Das sechste Paar bewirkt die willkürliche Bewegung im äußern geraden Augenmuskel, weshalb denn auch bey dem Drucke eines Aftergebildes (Nr. 957) auf dasselbe das Auge nach innen gezogen wurde und Doppelsehen entstand. Vermöge seiner Verbreitung an Arterien, und seines stärkern Zusammenhange mit dem Rumpfnerven charakterisirt es sich vergleichungsweise durch ein Uebergewicht der Beziehung auf Plasticität.

§. 848. Wir haben noch drey Nervenpaare unter einander zu vergleichen, welche wieder ein Ganzes ausmachen, indem sie zu den untern Theilen des Kopfes gehn und vorzugsweise der willkürlichen Bewegung daselbst dienen. — Am meisten sensibel ist unter ihnen das neunte Paar, denn es geht offenbar zu den hintern Geschmackswürzchen, und bildet so den Gegensatz zu dem mehr nach vorne sich ausbreitenden Zungenzweige des fünften Paares. Da die Spitze der Zunge vornehmlich durch das Süsse und Saure, die Wurzel derselben hingegen durch das Bittere und Laugensalzige afficirt wird, und da positive Electricität einen sauren, negative einen laugensalzigen Geschmack erregt, so scheinen die Zungenzweige des fünften und neunten Paares wie Positives und Negatives sich zu verhalten, welche in ihrer Verbindung die vollständige Geschmackspception geben: die Fische, bey welchen bloß der fünfte Nerve zur Zunge geht, scheinen durch den Geschmack weniger das Qualitative zu unterscheiden, als vielmehr nur das Beliehende oder Widerwärtige zu erkennen, oder mehr eine subjective Erkenntniß zu erlangen. Ausser-

den giebt dieses Paar auch Fäden in die Trommelhöhle, und steht so mit dem Gehöre in Beziehung; auch vermittelt es ohne Zweifel das Gemeingefühl an dem Kehldeckel und dem Speiseröhrenkopfe. — Nächstdem wirkt es auf die willkürliche Bewegung in dem Gaumensegel, dem Speiseröhrenkopfe, und zum Theil in der Zunge. Shaw durchschnitt es: die Zunge wurde nicht gelähmt, aber der Speiseröhrenkopf, und das Thier konnte lecken und hellen, aber nicht schlucken. Mayo (II. p. 12) reiste den neunten Nerven, und es erfolgte eine Bewegung im obern Theile des Speiseröhrenkopfs, im *Stylopharyngus* und im hintern Theile der Zunge. Uebrigens verbreitet er sich noch an Arterien und an die Mandeln.

§. 849. Ungleich stärker ist der Einfluß des zwölften Paares auf die Bewegung: Es dient dem Schlucken, so wie der Stimme durch die Bewegungen des Kehlkopfs und des mit ihm verbundenen Zungenbeins; der Aufnahme von Nahrung aber, so wie der Stimme durch die Bewegungen der Zunge. Mayo (I. p. 116. II. p. 11) und Fodera reisten den Nerven: es entstanden Convulsionen der Zunge mit einem Ausdrücke von Schmerz; sie durchschnitten ihn auf der einen Seite, und die entsprechende Hälfte der Zunge wurde gelähmt; sie durchschnitten ihn auf beyden Seiten, und die Zunge ward ganz bewegungslos. Wenn diese Bewegungen größtentheils unwillkürlich sind und auf Verdauung und Athmen sich beziehen, so dürfen wir in dem zwölften Nerven in Vergleich mit dem neunten und elften Paare eine überwiegende Verwandtschaft zur Plasticität annehmen, indem er noch an Arterien und an Speicheldrüsen sich verbreitet. Da er aber die Bewegung der Zunge bestimmt, und das Getaste nur durch Bewegung vermittelt wird, so scheint er der Tastnerve der Zunge zu seyn.

§. 850. Der elfte Hirnnerv verhält sich wie der Ast eines Rückenmarksnervens; verbreitet sich an periphere Muskeln des Halses und der Schulter, und giebt nur schwache Fäden an den Speiseröhrenkopf: somit scheint denn vergleichungsweise die Irritabilität in ihm überwiegen zu seyn. Bey seiner Reizung beobachtete Mayo (II. p. 13) sowohl Schmerz, als Bewegung. Bell (*Magendie Journ. I. p. 350*) wollte bemerken, daß nach seiner Durchschneidung nur die Athmungsbewegungen, nicht die willkürlichen Bewegungen des Halses und der Schulter, aufhörten.

§. 851. Wie wenig auch die Bestimmung des Verhältnisses der beyden letztern Nervenpaare (§. 849. 850.) auf den ersten Anblick gegründet zu seyn scheint, so ist sie doch in Betreff der übrigen zehn Paare so einleuchtend, daß kaum ein Zweifel an ihrer Richtigkeit Statt finden dürfte. Die sämtlichen Hirnnerven bilden also, wenn sie nach dem relativen Uebergewichte einer Lebensthätigkeit charakterisirt werden, folgendes System:

	Sensibles Glied	Indifferentes Glied	Irritables Glied
Sensible Reihe	Zweytes Paar	Erstes Paar	Achtes Paar
Indifferente Reihe	Fünftes Paar	Zehntes Paar	Siebentes Paar
Irritable Reihe {a}	Neuntes Paar	Zwölftes Paar	Elftes Paar
{b}	Drittes Paar	Sechstes Paar	Viertes Paar

Die Hirnnerven erscheinen hier als ein organisches Ganzes, von dessen Gliedern jedes Einzelne dadurch eine eigenthümliche Stellung gewinnt, daß in ihm die Eigenschaften, welche Allen gemeinschaftlich sind, in besondern Proportionen und Temperaturen erscheinen. Die besondern Nerven bilden die eine Polarreihe mit vorherrschender Sensibilität, ihr steht gegenüber die Doppelreihe mit überwiegender Irritabilität; dazwischen liegt die indifferente Reihe der allgemeinen Nerven. In den Gliedern jeder Reihe wiederholt sich dieselbe Dreyheit, und ihre Pole bilden Gegensätze zu einander, namentlich Sehnerv und Hörnerv, dreygetheilte Nerve und Antlitznerv, während dazwischen indifferente, der Plastizität zugewendete Mittelglieder liegen. Der Hauptcharakter eines Nerven wird durch die Reihe bestimmt, welcher er zugehört; sein besondrer Charakter von der Stelle, welche er als Glied einnimmt. Wo derselbe Charakter einem Nerven in beyden Hinsichten zukommt, da culminirt derselbe: so die Sensibilität im Sehnerven, die Indifferenz im herumschweifenden Nerven, die Irritabilität im Beynerven und Rollnerven, also in den beyden Nerven, welche, so beschränkt und speciell auch ihr Umkreis ist, doch am reinsten und ungemischtesten der Bewegung zugewendet sind. Der Charakter der übrigen Nerven ist gemischt: er ist indifferente Sensibilität für den Riechnerven, und irritable für den Hörnerv; sensible Indifferenz für den dreygetheilten und irritable für den Antlitznerv; sensible Irritabilität für den Zungenschlundkopfnerven und den gemeinschaftlichen Augenmuskelnerven, und indifferente Irritabilität für den Zungenfleischnerven und den äußern Augenmuskelnerven.

§. 85a. Nachdem wir uns nun eine wissenschaftliche Ansicht von den Hirnnerven verschafft haben, werden wir auch im Stande seyn, mit Hülfe desselben noch einige allgemeine Punkte zu beurtheilen. — Zuvörderst also, giebt es reine Empfindungsnerven und reine Bewegungsnerven? Nach der aufgestellten Ansicht haben alle Nerven gemeinsame Kräfte, und die einzelnen charakterisiren sich bloß durch eine besondere Proportion derselben: es wird daher Nerven geben, in welchen die Vermittlung von Empfindung ihr Maximum, und die von Bewegung ihr Minimum erreicht, und umgekehrt, aber die eine völlig ohne die andre wird nicht gefunden werden. Wie dies ganz den allgemeinen Principien der Physiologie entspricht, so wird es auch durch mittelbare und unmittelbare Erfahrung bestätigt. Empfindung und Bewegung ist Wechselwirkung von Mittelpunkt und Umkreis: in den Nerven wird Beydes nur vermittelt, und der Unterschied dieser Nervenenthätigkeit kann nur darin bestehen, daß sie bey der Empfindung von der Peripherie gegen das Centrum, bey der Bewegung in umgekehrter Richtung geht. Nun haben wir aber oben Thatfachen gefunden, welche darthun, daß die Nervenenthätigkeit bey der Empfindung auch gegen die Peripherie (§. 33g.) und bey der Bewegung auch gegen das Centrum zu (§. 348.) sich verbreitet: folglich muß Empfindung und Bewegung bloß relativ verschieden seyn, und der Nerve muß bey dieser, wie bey jener in beyden Richtungen durchdrungen werden, nur daß hier die eine, dort die andre überwiegt. Daher sehen wir denn nun erstlich, daß jeder Nerve ohne Ausnahme Empfindung vermittelt, wenn auch diese verhältnißmäßig gering ist: so ist z. B. Bell's Behauptung, daß der Antlitznerv bloß Bewegung vermittele und der Empfindung ganz unfähig sey, durch Magendie, Foderà und Mayo widerlegt. Eben so haben auch die Nerven, welche vorzugs-

weise der Empfindung dienen, Einfluß auf die Bewegung. Die Zweige des *Infraorbitalis* bringen zwar nicht unmittelbar Muskelbewegungen hervor, bestimmen aber doch die Muskelthätigkeit: als ich sie galvanisirte, entstanden Zuckungen, und nach ihrer Durchschneidung verlieren die Gesichtsmuskeln, ohne gelähmt zu werden, ihren Tonus, was aus ganz heftigen Gründen an den Lippen am sichtbarsten wird; Shaw ließ sich durch die Hypothese, daß der fünfte Nerve den Verdauungsbewegungen diene, verleiten, diese Erscheinung dahin zu deuten, daß dieser Nerve die Lippenmuskeln bewege. Selbst der Sehnerv bestimmt Bewegung, aber da sein peripherisches Organ derselben unfähig ist, nicht in diesem, sondern in dem dritten Nerven. Uebrigens bemerken wir, daß die Gangliobildung in dem Maasse an den Nerven hervortritt, in welchem die Beziehung auf das Gemeingefühl sich zeigt: am stärksten also im fünften, schwächer im neunten, zehnten und dritten Paare. Sie fehlt in den Nerven mit entschiedenem Uebergewichte der Irritabilität, so wie in der sensibeln Reihe, denn der Riechkolben ist mehr Hirnthheil, und hat nur entfernte Aehnlichkeit mit einem Nerveganglion, wodurch die Verwandtschaft des Geruchs mit dem Gemeingefühle angedeutet zu seyn scheint. — Auch die Beziehung zur Indifferenz des Lebens, zur Plasticität, ist allen Nerven gemein; bey der Lähmung des Sehnerven nimmt auch Ernährung und Absonderung im Auge ab. Am stärksten tritt diese Beziehung hervor in der indifferenten Reihe, und demnächst in der an dieselbe sich anschließenden ersten irritabeln Reihe. Jeder dieser sechs Nerven dient der Verdauung und dem Athmen, jedoch so, daß die sensibeln Glieder beyder Reihen (fünftes und neuntes Paar) am meisten auf die Verdauung, die irritablen (siebentes und elftes Paar) am meisten auf das Athmen, die indifferenten Glieder (zehntes und zwölftes Paar) aber auf beyde gleichförmig, und ausserdem, am meisten auf die Thätigkeit des Herzens und der Arterien sich beziehen.

§. 855. Die Lehre von den Schädelwirbeln gestaltet sich verschieden, je nachdem wir diesen oder jenen Standpunct wählen; für immer aber bleiben Schwierigkeiten; die nur durch Hypothesen beseitigt werden können. Wir wollen es jetzt versuchen, diese Wirbel nach den Centralenden der Nerven zu bestimmen. Wir haben gesehen, daß in Hinsicht auf die Richtung der Nerven Gehirn und Rückenmark ein Ganzes ausmachen, dessen Indifferenzpunct am obern Theile des Halses ist; und daß die Nerven unterhalb dieser Stelle deshalb zum Rückenmarke emporgehn müssen, weil dieses heraufgestiegen ist, und von den Wirbeln, welchen es entspricht, sich entfernt hat (§. 631.). Da nun die Nerven, um das Gehirn zu erreichen, von demjenigen Punkte aus, wo sie in die Schädelhöhle getreten sind, nach hinten laufen, so dürfen wir annehmen, daß der Hirnstamm sich von vorne nach hinten oder unten gezogen hat, so daß keine Uebereinstimmung mehr ist zwischen demselben und den Wirbeln. Der Durchgang der Nerven aber wird die Leitern bezeichnen. Namentlich müssen die Spalten die Gränze zweyer Wirbel bezeichnen. Während die Spalten den Zwischenwirbelpalten des Rückgrats analog sind, stellen die Schädelhöcher etwas dem Kopfe Eigenthümliches und Järum an den Halswirbeln Vorgebildetes dar, so daß die hier durchgehenden Nerven auch als die herrschenden in jedem Wirbel zu betrachten sind.

§. 854. Betrachten wir die Aufeinanderfolge der Centralenden der Nerven, und ihrer Durchgänge durch den Schädel, so begreift der erste oder hinterste Wirbel das verlängerte Mark bis in einiger Entfernung von der Brücke mit dem neunten bis zwölften Nervenpaare. Der Zapfenheil des Hinterhauptbeins macht den Körper des Wirbels aus. Die Nerven dieses Wirbels sind die der ersten irritablen Reihe (9. 11. 12. Paar) mit dem indifferenten Gliede der indifferenten Reihe (10. Paar). Das indifferente Glied der irritablen Reihe (12. Paar) dringt durch das Schädelloch, während die übrigen Nerven in der Hinterhauptfelsenbeinspalte ihren Ausweg finden.

§. 855. Die nächste Spalte ist die Felsenkeilbeinspalte: das zwischen ihr und der vorigen liegende Felsenbein muß also einem eignen Wirbel angehören. Der oberste, zunächst unter der Brücke liegende Theil des verlängerten Marks ist sein Centraltheil; seine Nerven sind die irritablen Glieder der sensiblen (6tes Paar) und der indifferenten Reihe (7tes Paar). Beyde gehen durch dasselbe Schädelloch. Allein diese Abtheilung bleibt unvollkommen, denn 1) haben die Felsenbeine keinen eignen Körper; 2) geht durch die Felsenkeilbeinspalte kein Hirnnervenzweig, sondern nur der Rumpfnerv; 3) das sechste Paar muß vielleicht zu diesem Wirbel gerechnet werden, und gehört doch in Hinsicht auf seinen Durchgang durch den Schädel dem folgenden Wirbel an.

§. 856. Dieser wird nach vorne begränzt durch die eigne Keilbeinspalte; ihm gehört also als Körper der hintere Keilbeinkörper, als Centraltheil der Großhirnstamm in und zunächst über der Brücke, als Nerven aber die zweyte irritable Reihe (3. 4. 6tes Paar) mit dem sensiblen Gliede der indifferenten Reihe (6tes Paar). Durch die Schädellocher geht vom Letztern der sensibelste (*Lingualis*) mit dem irritabelsten Theile (kleine Wurzel), und der vorzüglich dem Gemeingefühle gewidmete zweyte Ast; durch die Spalte aber dringt sein erster Ast mit den sämtlichen Nerven der irritablen Reihe.

§. 857. Die Basis des nächsten Wirbels ist der vordere Keilbeinkörper; seine Centraltheile sind die ersten Gänglien des Großhirnstamms, Vierbügel und Seihügel; sein Nerve, das zweyte Paar, dringt durch das Schädelloch.

§. 858. Bloß eine Andeutung von Spalte in den Ektymoidallöchern scheidet den Bereich des Sehnerven von dem des Riechnerven, und so ist auch der Hahnenkamm nur das Rudiment eines Wirbelkörpers. Diesem unvollkommenen und gleichsam verkrüppelten Wirbel würde das vordere Ende des Hirnstamms zukommen; seine Löcher sind vervielfältigt durch die vereinzelt austretenden Fäden des Riechnerven.

§. 859. Nach dieser Ansicht haben die polaren Reihen eigenthümliche Wirbel, und zwar so, daß jede irritable Reihe einen gemeinschaftlichen Wirbel hat, die erste nämlich den ersten (§. 854), die zweyte den dritten (§. 856) Wirbel; jedes Glied der sensiblen Sphäre aber einen eigenthümlichen Wirbel hat, nämlich der Hörnerv den zweyten (§. 855), der Sehnerv den vierten (§. 857), der Riechnerv den fünften (§. 858). Die Glieder der indifferenten Reihe sind vertheilt: das indifferente an den ersten, das irritable an den zweyten, das sensible an den dritten Wirbel.

§. 860. Nach dieser Ansicht entsprechen ferner die Schädelwirbel in der Zahl den Beckenwirbeln und den fünf besondern Sinnen. Jeder einzelne Wirbel hat einen Sinnesnerven, und diese gehn durch Schädellöcher. 1) Der erste oder Hinterhauptswirbel gehört dem Körper des verlängerten Marks, zeigt überwiegende-Irritabilität mit Indifferenz, denn er enthält die erste irritable Nervenreihe, und unter ihnen den Tastnerven der Zunge, welcher als der charakteristische desselben durch ein eignes Loch geht; ausserdem aber den zehnten Nerven, als den Culminationspunct der Indifferenz. 2) Vom Hirnstamme aus entfaltet sich hierauf das kleine Hirn, und unter dessen Hemisphären, am Gipfel des verlängerten Marks, tritt vorherrschende Sensibilität mit Irritabilität auf: der Gehörsin und der zweyte oder Felsenbeinwirbel ist hiermit bezeichnet; das Loch des Letztern nimmt das irritable Glied der sensibeln und der indifferenten Sphäre in sich auf. 3) Sodann wiederholt sich von der Brücke an bis in den Großhirnscheiteln ein nackter Hirnstamm ohne Ausstrahlungen, der sich zum großen Hirne verhält, wie der Körper des verlängerten Marks zu seinem Gipfel, dem kleinen Hirne. So ist denn auch der dritte oder hintre Keilbeinwirbel die Wiederholung des ersten: wie dort die erste, so tritt hier die zweyte irritable Reihe hervor; wenn jene sich mehr auf Verdauung und Athmen bezog, so ist diese von der plastischen Beziehung frey, und dient allein der Sensibilität; und wie dort der Tastnerv der Zunge herrschte, so wird dieser Wirbel durch den Geschmacksnerven bezeichnet: der Charakter desselben ist also überwiegende Irritabilität mit Sensibilität. 4) Darauf erscheinen die ersten Ganglien des großen Hirns mit ihren Ausstrahlungen; und mit ihnen tritt als Wiederholung des zweyten Wirbels der vierte oder der vordere Keilbeinwirbel auf, in welchem die Sensibilität culminirt, da das sensible Glied der sensibeln Reihe ohne alle andre Nerven hier waltet. 5) Nicht als ein eignes Ganzes, sondern bloß als das vordere Ende des Hirnstamms stellt sich die Gegend der Streifenhügel mit ihren vordern Strahlungen dar; und so ist auch der fünfte oder Riechbeinwirbel mehr ein ergänzendes und beschließendes Glied, als ein selbstständiges Gebilde. Hier aber ist das Reich des Geruchs oder der Sensibilität mit Indifferenz, und so bildet dieser letzte Wirbel den Gegensatz zu dem ersten, welcher durch Irritabilität mit Indifferenz sich bezeichnet. — Wir sehen also, daß hinten die Irritabilität, vorne die Sensibilität vorherrscht; daß, wie letztere reiner sich entwickelt, auch die Zahl der Nervenpaare abnimmt; daß in einem hintern Wirbel die irritable Seite Dessen erscheint, was in einem vordern als sensibel auftritt; die Stimmnerven im ersten, der Hörnerv im zweyten, die Augenmuskelnerven im dritten, der Schnerv im vierten Wirbel; daß im Hirnstamme überwiegende Irritabilität wirkt, und zwar mit Indifferenz im hintersten, ersten Wirbel, mit Sensibilität aber im vordern, dritten Wirbel; daß hingegen die Sensibilität da vorwaltet, wo der Hirnstamm in Hemisphären ausstrahlt, und zwar im zweyten Wirbel mit Irritabilität; im vierten in ihrer Reinheit und Culmination, und im fünften mit Indifferenz. — Diese Darstellung giebt demnach folgendes Schema:

Wirbel	Centraltheil	Nerven	Sinne	Charakter
Hinterhauptswirbel	Untere Hirnstamm	IX—XII	Gefühl	Irritabilität mit Indifferenz
Felsenbeinwirbel	Ausstrahlung des untern Hirnstammes	VII. VIII	Gehör	Sensibilität mit Irritabilität
Hinterer Keilbeinwirbel	Oberer Hirnstamm	III—VI	Geschmack	Irritabilität mit Sensibilität
Vorderer Keilbeinwirbel	Ausstrahlung des obern Hirnstammes	II	Gesicht	Reine Sensibilität
Riechbeinwirbel	Gipfel des Hirnstammes	I	Geruch	Sensibilität mit Indifferenz

IV. Oben und unten.

§. 861. Man ist geneigt, zwischen der räumlichen Höhe und der Höhe der Kräfte eine Uebereinstimmung anzunehmen. Nach dieser Voraussetzung hat man schon längst auch das Verhältniß der Hirntheile beachtet, so sagt z. B. Varoli (p. 12), das große Hirn liege über dem kleinen, weil das Sehen edler sey als das Hören, und Willis (cer. c. 6) erklärt dieses Lagenverhältniß daraus, daß im großen Hirne die Seelenenthätigkeit, im kleinen Hirne die Bestimmung des pflanzlichen Lebens ihren Sitz habe. — Wir haben (§. 78) die Bedeutung des Oben und Unten im Allgemeinen aufgefaßt. Wir finden ein damit übereinstimmendes Verhältniß der Lage der sensibeln Centralmasse: bey den wirbellosen Thieren, ist das pflanzliche Leben überwiegend, das bloß aus Ganglien und einzelnen Fäden bestehende Nervensystem untergeordnet und an der untern Fläche gelagert; wo eine wahre Centralmasse von den Nerven sich abscheidet, liegt sie nach oben, und zwar liegt bey den Wirbelthieren das Rückenmark, da es vermöge der vorwaltenden Beziehung zur Irritabilität das Herrschende ist, über den Eingeweiden; während bey dem Menschen das Gehirn mit der entschiedenen Herrschaft auch die senkrechte Lage oberhalb des ganzen Körpers gewinnt. Die aufrechte Stellung des Menschen aber sichert auf der andern Seite seinem Gehirne theils eine höhere Lebendigkeit, theils eine größere Selbstständigkeit, indem sie es vermittelt, daß das leichteste Blut zu ihm gelangt (§. 225), einen stärkern Impuls ausübt (§. 392), und leichter wieder abfließt (§. 231).

§. 862. So dürfen wir denn wohl auch ein gleiches Verhältniß unter den einzelnen Hirngebildn annehmen, d. h. die Höhe ihrer Lage als ein Moment ihres Ausdrucks, natürlich nicht als das allein Erreichende, betrachten. Unten liegt der Hirnstamm, oben der Mantel. Das Gehirn ruht mit seiner untern Fläche auf pulsirenden Arterienästen, und hängt daselbst mit Nerven und Rückenmark zusammen; hier steht es also mit dem Leibe in Gemeinschaft, und erfährt es die Einwirkung des Herzens. Daher sind die Verletzungen am untern Theile des Gehirns die lebensgefährlichsten, weil sie mit dem leiblichen

Leben nahe zusammenhängen; also eine niedrigere Function haben. Die obern Theile für überhaupt weniger wichtig zu erklären, wie Bichat (*anat. descript. III. p. 135*) thut, weil ihre Verletzung nicht leicht dem Leben gefährlich wird, ist ein Mißgriff. Aus der Entbehrlichkeit dieser Theile für das organische Bestehen leuchtet gerade ihre höhere psychische Bedeutung hervor: denn wie das Pflanzliche die Sedenthätigkeit gänzlich entbehren kann, so gehört auch nur ein Minimum von Seelenkraft dazu, die leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen, und die dazu gehörigen Mittel zu schaffen; bloß die niedre Seelen-thätigkeit sorgt für das Nöthige, die höhere aber ist solcher Nützlichkeit fremd und ein Pleonasmus für das leibliche Leben. — Bey erschwertem Denken fühlt man einen Druck besonders in den obern Theilen des Kopfs (Reils Beyträge I. S. 44); und bey den meisten Blödsinnigen ist vorzüglich der obre Theil des Gehirns unvollkommen entwickelt, Stirn und Schädel niedrig; daß man bey manchen Blödsinnigen den Kopf schmal und hoch findet, ist nur ein Beweis, daß die Höhe nicht allein und schlechthin das Bestimmende ist. — Auch Gall's Beobachtungen geben das Resultat, daß die Entwicklung der höhern Seelenkräfte mit einer größern Ausbildung der obern Gegend des Gehirns und Schädels verbunden ist, worauf schon Antennrieth (§. 1050) aufmerksam machte.

§. 863. Da der Hirnstamm nach vorne sich umbeugt; und die Fortsetzung der vordern Theile des Rückenmarks nach unten; die der hintern nach oben zu liegen kommt, so könnte dies als ein Beweis gelten, daß in den vordern Strängen die niedere, auf Irri-tabilität bezogene, in den hintern dagegen die höhere und reinere Sensibilität wirke. Allein dieser Schluß würde zu voreilig seyn, da der Olivenstrang sich in der Schleife nach oben schlingt, und somit das Vordre zum Obren wird, während die hintern Stränge in der Haube nach unten und aussen herabsteigen. Wir dürfen es daher versuchen, dies aus einem andern Verhältnisse abzuleiten. — Das Vordre entspricht überhaupt dem Obren, und das Hintre dem Untern: so liegt die obre Hohlvene vorne, die hintre hinten; die aufsteigende Aorta vorne, die absteigende hinten; so wird das, was bey den Thieren vorne liegt, bey Menschen durch die aufrechte Stellung in ein Oberes umgewandelt. Wenn nun zwey senkrecht hinter einander stehende Theile in die wagerechte Lage kommen, so beugen sie sich so um, daß das Vordre zum Obren, das Hintre zum Untern wird. Wenn sich dies bey senkrecht herabsteigenden Theilen schon aus der einfachen Umbeugung ergibt, wie in dem Verhältnisse der Harnblase und Harnröhre zum Mastdarne und After, so wird dies bey aufsteigenden Gebilden mittels eines Durch-ziehens bewerkstelligt: die Luftwege, vor den Speisewegen aufsteigend, müssen durch den Rachen sich hindurch ziehen, um in der Nasenhöhle oberhalb der Mundhöhle liegen zu können. Auf eine analoge Weise schlagen sich die Olivenstränge über die hintern Stränge hinauf, und die Vierhügel erscheinen als zu Gipfeln des Hirnstamms erhobene vordre Stränge. So liegt auch das von den hintern Strängen gebildete kleine Hirn unterhalb des vorzugsweise aus den vordern Strängen entwickelten großen Hirns.

§. 864. Die Verschiedenheit dieser Theile muß der Verschiedenheit der vordern und hintern Stränge des Rückenmarks entsprechen, und um diese zu erkennen, müßte die Function der vordern und hintern Wurzeln der Rückenmarksnerven erforscht werden. Ich stellte im Jahre 1818 darüber die oben (I. Bd. S. 263) erzählten Versuche an; deren

Resultat darin bestand, daß zur Wirkksamkeit eines Rückenmarksnerven, sey sie Empfindung oder Bewegung, die vereinte Thätigkeit der vordern und hintern Wurzeln nöthig sey; Später stellte Magendie (*Journ. II. p. 276 sqq. 366 sqq.*) ähnliche Versuche an, und glaubte zu finden, daß die vordern Stränge und ihre Wurzelnerven die Bewegung bestimmten, die hintern aber die Empfindung vermittelten. Er machte zugleich frühere Beobachtungen von Bell bekannt, welche damit übereinstimmten. Auch Fodera (*Journal complémentaire XVI. p. 300*) bestätigte dieselbe Meynung durch seine Erfahrung, und Desmoulins (Magendie *Journal III. p. 373*) unterstützte sie durch die Bemerkung, daß bey dem Menschen jeder Nerve des Armgeflechtes aus 2 vordern und 8 hintern Wurzeln sich bilde, insofern bey den Nattern nur vordere Wurzeln vorhanden wären. Ferner sprach für diese Meynung der Umstand, daß die hintern Wurzeln der Rückenmarksnerven mit denjenigen Hirnnerven, welche vorzüglich das Gemeingefühl vermitteln, die Ganglienbildung gemein haben, und daß sie die vordern Wurzeln eben so an Stärke des Volumens übertreffen, wie die sensibeln Hirnnerven in dieser Hinsicht die irritablen übertreffen. — Von der Beziehung dieser Meynung auf die Hirnnerven soll nechher die Rede seyn; zuerst wollen wir die Erfahrungen über das Rückenmark betrachten. — Ich habe, seitdem Magendie's Beobachtungen bekannt geworden sind, mit Herrn Prof. v. Baer die frühern Versuche wiederholt: warmblütige Thiere starben bey dieser gewaltsamen Operation zu bald, als daß wir sichere Resultate daraus hätten gewinnen können; die an Fröschen angestellten Versuche gaben aber immer ein gleiches Resultat.

§. 865. Zuörderst geht schon aus dem Obigen (§. 851.) hervor, daß wir Empfindung und Bewegung nicht in scharfer Scheidung, als selbstständige Thätigkeiten, an räumlich getrennte Particen des Nervensystems vertheilt uns denken können; die Centralorgane können in dieser Hinsicht bloß relativ unter einander verschieden seyn. Wenn also Magendie's Beobachtungen richtig sind, so können sie bloß so viel sagen: jeder Nerve des Rückenmarks äussert seine volle Lebendigkeit durch die organische Verknüpfung mit den vordern und den hintern Strängen desselben, welche eine relative Differenz äussern, und einen der positiven und negativen Elektricität analogen Gegensatz bilden, der sich als vorwaltende Beziehung auf Bewegung und Empfindung ausspricht. Ich sah in meinen letzten Versuchen, daß die Reizung der hintern Wurzeln Zuckungen erregte, und die Durchschneidung derselben Welkheit und Lähmung zur Folge hatte; nach Durchschneidung der vordern Wurzeln war die Lähmung allerdings stärker, aber die gelähmten Glieder zeigten auch keine Empfindung mehr. Einigermassen giebt auch Magendie (a. a. O. p. 368. sq.) dies zu, indem er sagt, die Reizung der vordern Wurzeln verursache weniger Schmerz, als die der hintern, und die der hintern erregte weniger Krämpfe, als die der vordern. Auch Ollivier (*de la moëlle épinière p. 71.*) fand bloß den Unterschied, daß die Krämpfe nach Reizung der vordern Wurzeln stärker sey, als nach Reizung der hintern.

§. 866. Was man bey jenen Versuchen beobachtet hat, läßt sich aber auch ganz anders deuten. Ich sah nach Durchschneidung der hintern Wurzeln eine der Lähmung gleiche Schwäche, nach der der vordern Wurzeln ein völliges Erlöschen des Lebens in den Gliedmaßen: sind also nicht die vordern Stränge das Mächtigere, Einflußrei-

chere, Sensiblere? Ich habe mehrere Gründe dafür aufgestellt (§. 76). Am stärksten spricht gegen Magendie der Umstand, daß bey Vögeln am Ursprunge der Flügelnerven; also an der Stelle, wo die stärkste Irritabilität und, da hier kein Tastinn Statt findet, die mindeste Sensibilität sich zeigt, bloß die hintern Stränge angeschwollen sind und die hintere Spalte geöffnet ist.

§. 867. Foderà's Beobachtungen sind keinesweges geeignet, uns zu einer unbedingten Annahme von Magendie's Meynung zu bewegen. 1) Einige Versuche zeigten gerade das Gegentheil. Die Verletzung der hintern Stränge in der Mitte der Rückenengegend (Magendie's Journal III. 3ter Versuch p. 197) und in der Halsgegend (6ter und 7ter Versuch p. 198) vernichtete die Bewegung in den entsprechenden Gliedern; und hatte in einem Falle (p. 200) selbst erhöhte Empfindlichkeit zur Folge; die Verletzung der vordern Stränge in der Mitte der Rückenengegend (4 und 5ter Versuch p. 198) verminderte bloß die Empfindung; und es zeigte sich Bewegung bey Anwendung von Reizen (9. Versuch p. 199). 2) In einem Falle, wo der hintere Strang verletzt worden war, stellte sich die anfangs geschwundene Empfindlichkeit in dem entsprechenden Gliede wieder her (2. Versuch p. 197). 3) Wenn nach Verletzung der hintern Stränge die Empfindung in dem entsprechenden Gliede vermindert schien, so war in dem gleichen Gliede der andern Seite die Bewegung aufgehoben; (1. Versuch p. 197); war die Empfindung in beyden (vordern) aufgehoben; so war es die Bewegung in den entgegengesetzten (hintern) Gliedern (7. und 8. Versuch p. 199); gleichwohl ist im Rückenmarks durchaus keine Kreuzung des Rechten und Linken, noch des Vordern und Hintern zu finden. — Magendie (ebend. p. 173) erzählt einen Fall, wo bey völlig aufgehobener Bewegung und ungestörter Empfindung in den obern Gliedern die hintern Stränge des Rückenmarks zerstört waren und ihre Nervenwurzeln bloß an die Gefäßhaut sich ansetzten; die vordern Stränge waren wenig verändert, und ihre Nervenwurzeln erschienen normal, hatten aber kein Mark. Hier ist es doch wohl natürlicher und ungewöhnlicher anzunehmen, daß die Empfindung durch die, wenn auch atrophischen, doch mit ihrem Centraltheile normal verbundenen Wurzeln, also durch die vordern Stränge vermittelt wurde, als daß sie, wie Magendie behauptet, von den hintern Wurzeln aus durch die bloße Gefäßhaut auf eine ganz getrennte obre Gegend der hintern Stränge übertragen worden wäre. Ein atrophischer Nerve kann doch gewiß eher die specifischen Eindrücke des Tastinns; der in diesem Falle noch vorhanden war, fortpflanzen, als die Gefäßhaut des Rückenmarks. — Ubrigens will Bellingart (*Bulletin med.* 1824 T. p. 299) gefunden haben, daß von den hintern Strängen und ihren Nervenwurzeln die Streckung, von den vordern aber die Biegung der Gliedmaßen bestimmt werde.

§. 868. Wenden wir uns nun zur Anwendung jener Erklärungen auf das Gehirn, so müßen wir vor allen Dingen bestimmen, wie die Fortsetzungen der vordern und hintern Stränge im Gehirn sich verhalten. Ich stelle daher die Resultate meiner Untersuchungen über diesen Gegenstand hier zusammen. — 1) Der Pyramidenstrang besteht theils aus Fasern, welche im vordern Einschnitte des Rückenmarks vor dem grauen Kernstrange desselben heraufsteigen, theils aus Kreuzungsfasern der Seitenstränge, bildet die Pyramide (§. 98), und, nachdem er durch die mittlere Brückenschicht gegen

gen ist (§. 134), mit dem innern Hülsestrange den Sehhügel des großen Hirns (§. 163) und die Grundlage des Streifenhügels (§. 177). 2) Der innre Hülsestrang geht am Rückenmark neben dem vordern Einschnitte der Mittellinie, am verlängerten Marke zwischen Pyramide und Olive, dann durch die mittlere Brückenschicht, und vereinigt sich dann mit dem Pyramidenstrange zum Schenkel des großen Hirns und zur Grundlage des Streifenhügels. 3) Der Olivenstrang ist der am verlängerten Marke nach vorne anschwellende und mit Marksubstanz sich bekleidende vordere graue Strang des Rückenmarks, welcher die Olive bildet (§. 100), in der hintern Schicht des Brückenhirnstamms aufsteigt (§. 135), die schwarzgraue Schicht zwischen Hirnschenkel und Haube (§. 164), und hierauf die Grundlage des Sehhügels giebt (§. 173), von da aus aber in den Streifenhügel eingeht. 4) Der äussere Hülsestrang, der am Rückenmark an der innern Seite der vordern Wurzelreihe liegt, bricht am verlängerten Marke durch dieselbe hindurch und kommt auf der äussern Seite derselben und der Olive zu liegen, geht durch die hintere Schicht des Brückenhirnstamms, bildet die Grundlage der Haube, die Schleife (§. 164), und die Vierhügel (§. 169) und geht endlich in Sehhügel und Streifenhügel ein. Uebrigens bildet das Olivenbündel die Gürtelschicht des Sehhügels (§. 173), welche in dem Streifenhügel sich fortsetzt. 5) Der Seitenstrang (§. 102) schält sich am Rückenmark von dem hintern grauen Strange glett ab, und scheint daher dem vordern Strange anzugehören; nachdem er die Kreuzungsfasern der Pyramiden gegeben hat, hört er auf, den Raum zwischen der vordern und hintern Wurzelreihe auszufüllen, durchbricht die hintere Reihe, und giebt einen Arm, der mit dem äussern Arme des Keilstrangs den Schenkel des kleinen Hirns darstellt, und einen andern Arm, welcher am äussern Theile der Reutengrube durch die hintere Schicht des Brückenhirnstamms verläuft (§. 135), und dann in die Haube (§. 164) und den Sehhügel (§. 173) tritt. 6) Der Keilstrang, der an der innern Seite der hintern Wurzelreihe liegt und den hintern grauen Strang enthält (§. 103), spaltet sich in einen äussern Arm, der, mit dem einen Arme des Seitenstrangs verbunden, den Schenkel des kleinen Hirns giebt, und einen innern Arm, der, in der Wand der Reutengrube, dann als Boden der Wasserleitung in der Haube aufsteigt (§. 164), unter dem Bindearme in den Sehhügel eintritt, und bis zu dessen vordern Ende in der Seitenwand der dritten Höhle verläuft. 7) Der zarte Strang, der an dem hintern Einschnitte der Mittellinie des Rückenmarks liegt, bildet die Schreibfeder an der Reutengrube und geht im äussern Theile von dieser, so wie in der Haube als Seitenwand der Wasserleitung fort (§. 164). 8) Der runde Strang ist der in der Reutengrube zur Seite der Mittellinie nackt hervortretende graue Kernstrang (§. 105), verläuft als Boden der Wasserleitung (§. 164) und der dritten Höhle, wo er das *Tuber cinereum* bildet und in den Trichter übergeht (§. 173). — Wir haben also fünf vordere Stränge, zwey hintere Stränge, und einen Kernstrang. Der Pyramidenstrang, aus Markfasern von der vordern Fläche des grauen Kernstrangs, und vom Seitenstrange abstammend, giebt den Gegensatz zum runden Strange, in welchem noch hinten der graue Kernstrang hervorbricht. Der Olivenkernstrang, eingeschlossen von den beyden Hülsesträngen, entspricht dem vordern, der Keilstrang mit dem nach hinten sich anlegenden zarten Strange, entspricht dem hintern grauen Strange. Der Seitenstrang gehört ursprünglich dem vor-

dem Stränge an, wendet sich aber oben auch zum hintern. — Dem vordern Stränge gehört der Trichter, dem Keilstränge das kleine Hirn, dem äussern Hülsenstränge der Vierbügel, dem Olivenkernstränge der Sehhügel, dem innern Hülsenstränge und dem Pyramidenstränge der Streifenhügel an, jedoch so, daß in jedes dieser Gebilde auch Theile der übrigen Stränge eintreten.

§ 86g. Bey mehreren Hirnnerven ist es sehr schwer, zu bestimmen, ob sie zu den vordern oder hintern Strängen des Hirnstamms gehören, indem sie ungetheilt bis zum Gehirne verlaufen, und in dessen Substanz erst in Fäden sich auflösen, hier aber so dünn und weich werden, daß es viel schwieriger ist, sie mit Bestimmtheit zu verfolgen, als die meisten Hirnfasern; weshalb denn auch so verschiedene Behauptungen von den Zergliedern aufgestellt worden sind. Da bey den niedrigsten Wirbelthieren, den Fischen, die Rückenmarksnerven sehr früh, und ehe sie noch die Wirbelsäule erreichen, in vordere und hintere Wurzeln auseinandergehen, um so gespalten zum Rückenmark zu treten, so scheint die erst im Centralorgane erfolgende Spaltung der Hirnnerven der Ausdruck einer höhern Bildung zu seyn, welche dem neunten bis zwölften Paare am meisten abgeht, und dem ersten, zweyten und achten Paare vorzüglich zukommt. — 1) Das erste Paar scheint bloß dem vordern Stränge anzugehören; ich habe es bey Menschen bis in die Gürtelschicht, also in des Olivenbündel, bey Thieren bis in den untern Theil des Stammlappens verfolgt; Büchel sah es bey einem Hemicephalen (Nr. 353) zwischen den Schenkeln des großen Hirns verlaufen. 2) Das zweyte Paar wurzelt vornehmlich im vordern Stränge. Dies ist offenbar bey Fischen, Vögeln und Amphibien, wo der Olivenstrang geraden Weges in die Sehgugeln sich ausbreitet; ich verfolgte ihn bey dem Menschen in die Gürtelschicht, die schwarzgraue Schicht und die Schleife, fand aber außer diesen dem Olivenbündel gehörigen Wurzeln auch hintere Wurzeln, die in den Keilstrang am Trichter treten. 3) Das dritte Paar hat vordere Wurzeln im Hirnschenkel, also im Pyramiden- und innern Hülsenstränge, aber auch hintere im Boden der Wasserleitung, also im Keilstränge. 4) Ungewiß ist es, ob das vierte Paar als vordere Wurzel in die Schleife endet, oder, was wahrscheinlicher ist, nur durch sie hindurch geht, um zu den darunterliegenden hintern Strängen zu gelangen. 5) Daß das fünfte Paar vordere und hintere Wurzeln hat, ist anerkannt; das nähere Verhältniß ist weniger klar. Der Analogie mit den Rückenmarksnerven nach müßte die größere, gangliöse Wurzel die hintere, und die kleinere, ohne Ganglien die vordere seyn; da jene die sensible, diese die irritable ist, so stimmt dies mit Magendie's Meynung überein; auch scheint bey Fischen das Verhältniß wirklich so zu seyn. Indes, soll ich den Augenschein nicht Lügen strafen, so muß ich bey Menschen und Säugethieren das umgekehrte Verhältniß anerkennen, denn immer habe ich hier mit der größten Bestimmtheit die große Wurzel in den äussern Hülsenstrang, die hintere aber in den Schenkel des kleinen Hirns und in den Keilstrang oder Seitenstrang verfolgen können. 6) Das sechste Paar gehört ohne Zweifel dem vordern Stränge, namentlich dem innern Hülsenstränge, und seine äussere Wurzel scheint nicht über den äussern Hülsenstrang hinauszureichen. 7) Das siebente scheint eine vordere Wurzel in den Olivenkernstrang; weniger gewiß ist eine hintere im Schenkel des kleinen Hirns. 8) Eben so hat das achte Paar außer seiner Hauptwurzel im Keilstränge

eine zweydenigere vordere Wurzel im äussern Hülsenstrange. 9) Auch das neunte Paar scheint zwar im Ganzen dem hintern Strange zu gehören, indessen scheint seine kleine Portion, die von der Gegend des siebenten Nerven herkommt, eine vordere Wurzel zu seyn. 10) Dem zehnten Paare werden gleichfalls vordere Wurzeln zugeschrieben, namentlich von Santorini, Sömmerring, Girardi, Vieq. d'Azyr und Chaussier; ungleich zahlreicher und bestimmter sind seine hintern Wurzeln. 11) Dafs das elfte Paar dem hintern, und 12) das zwölfte Paar dem vordern Strange angehört, ist augenscheinlich. Dafs das siebente, neunte, zehnte und elfte Paar weder vom vordern, noch vom hintern Strange, sondern zwischen beyden als eigenthümliche Athmungsoerven entsprängen, ist eine durchaus unzulässige Hypothese Bell's (*Magendie Journ. II. p. 364.*).

§. 870. Halten wir uns bey diesem noch einer weitern Untersuchung bedürftigen Gegenstände von der Hand an das Wahrscheinliche, so, dafs wir ein Nervenpaar, dessen Doppelwurzel nicht ganz evident ist, zu dem Strange rechnen, welchem es zunächst liegt: Gegen Magendie's Meynung streitet, dafs die sensibeln Nerven des ersten und zweyten Paares, so wie die grofse Wurzel des fünften Paares dem vordern Stränge angehören; dafs der rein irritable elfte Nerve und die kleine Wurzel des fünften Paares zu dem hintern Stränge gehören, und dafs dritte Nerve auch hintere Wurzeln hat. — Blicken wir auf unsere Charakteristik der Hirnnerven (§. 851), so scheint es, als ob jede Reihe ein Paar mit einer vordern, eins mit einer hintern, und eins mit einer doppelten Wurzel in sich schlofse, auf folgende Weise:

Doppelwurzel	Vordere Wurzel	Hintere Wurzel
II	VIII?	VIII?
V	VII?	XII?
IX?	XII	XI
III	VI	IV?

Die sensibeln Glieder scheinen Doppelwurzeln zu haben, doch ist dies vom neunten Paare ungewifs; die vordern Wurzeln wären den indifferenten Gliedern, aber in der indifferenten Reihe dem irritablen Gliede eigen; hintere Wurzeln bezeichnen das indifferente Glied dieser Reihe, und die irritablen Glieder der übrigen Reihen. — Wie uns hier das bestimmende Gesetz nicht ganz klar wird, eben so wenig ist es, wenn wir die Wirbel (§. 859.) zum Maßstabe nehmen. Hier würden sich die Wurzeln auf folgende Art ordnen:

	Hintere Wurzel	Vordere Wurzel	Doppelwurzel
Erster Wirbel	X? XI?	XII	IX?
Zweiter Wirbel	VIII?	VII?	
Dritter Wirbel	IV?	VI	III V.
Vierter Wirbel			II
Fünfter Wirbel		I	

Der erste und dritte Wirbel würden darin mit einander übereinstimmen, dafs von dem einfachen Hirnstamme Nerven mit hintern, vordern und doppelten Wurzeln ausgehn, und

sich dadurch unterscheiden, daß im ersten Wirbel die hintern, im dritten die doppelten Wurzeln zahlreicher wären. Der zweyte und vierte Wirbel, wo die Ausstrahlungen des Hirnstamms sich finden, würden ein einfacheres Verhältniß gemein haben, und zwar so, daß vordre und hintre Wurzel im zweyten Wirbel an zwey Nervenpaare vertheilt, im vierten aber von einem Paare umfaßt wären. Der fünfte Wirbel endlich würde sich als ein unvollkommner, bloß mit vordern Wurzeln versehener darstellen. — Dies wäre das freylich noch problematische Resultat der bisherigen Untersuchungen, welches fernere Forschungen berichtigen mögen! Uebrigens können wir das Verhältniß der Stränge des Rückenmarks vielleicht in den Strängen des Gehirns erkennen (§. 908.).

Vierte Abtheilung.

Von den einzelnen Hirngebildn.

I. Verlängertes Mark.

§. 871. Der Hirnstamm ist der unterste Theil des Gehirns, und zerfällt in eine untere Hälfte, die unter dem kleinen, und eine obere, die unter dem großen Hirne liegt. Jene begreift außer dem eigentlich sogenannten verlängerten Marke noch den Brückenhirnstamm in sich, und charakterisirt sich zuvörderst dadurch, daß sie die Centralenden von acht Nervenpaaren, enthält, während die obere Hälfte deren nur vier hat. Sie steht also in einer stärkern Beziehung zu den übrigen Körpertheilen, oder ist mehr dem Rückenmarke ähnlich. Die Nerven aber, welche in ihr wurzeln, sind 1) das irritable Glied der sensibeln Reihe (VIII.); 2) die ganze indifferente Reihe (V. VII. X.); 3) sämtliche Glieder der ersten irribablen Reihe (IX. XI. XII.); 4) das indifferente Glied der zweyten irribablen Reihe (VI.). Diejenigen dieser Nerven, welche ihre Centralenden in den hintern Strängen haben (VIII. IX. X. XI.), müssen stärker auf das kleine Hirn wirken und von ihm bestimmt werden, da dieses vornehmlich vom hintern Stränge aus sich bildet; und die, welche zu den vordern Strängen gehören (vordre Wurzel von V. VI. VII. XII.), müssen in einer nähern Beziehung zum großen Hirne stehen. Allein Letztre müssen, da ihre Stränge durch die Brücke gehn, auch mit dem kleinen Hirne in Verkehr stehn, und dagegen, muß der Hörnerv, indem er das Becken der Rautengrube erreicht, von wo Schichten in das große Hirn sich fortsetzen, auch auf dieses sich beziehen, so daß also jene Differenz nur eine relative ist. — Uebrigens gehen alle diese Nerven, mit Ausnahme des achten und ersten Paares, Verbindungen mit dem Rumpfnerven ein, so daß dieser in einem nähern Verhältnisse zum verlängerten Marke stehn muß, als mit dem obern Theile des Hirnstamms.

§. 872. Auf einer niedrigeren Bildungsstufe ist das verlängerte Mark an Masse mehr überwiegend, über das Rückenmark, während das übrige Gehirn weniger entwickelt ist.

Die Breite des verlängerten Marks verhält sich zu der des Rückenmarks, wenn wir diese als Einheit annehmen, bey dem zweymonatlichen Embryo wie 2 (Tiedemann's Gehirn S. 12. Meckel's Archiv I. S. 78), bey dem erwachsenen Menschen wie 1,33; bey dem Biber 1,40; bey Waschbär, *Nasua*, Meerachweinfisch, *S. cynomolgus* und *rhesus* 1,50; *S. capucina*, *sabaea*, *Lemur mongos*, Marmelthier 1,66; Löwe 1,71; *S. nemestrina* 1,75; Faulthier und Stachelschwein 2,00; Seehund 2,20; Ameisenfresser 3,00 (Tiedemann's Icones). Eben so verhält sich das Gewicht des verlängerten Marks zu dem als Einheit angenommenen des Rückenmarks bey dem Menschen wie 0,12; *Testudo serrata* 0,14; *Squalus galeus* 0,27; Maulwurf 0,33; *Styrax flammea* 0,43; *Rana rubus* 0,45 (Treviranus Biol. VI. 1. Tafel). — Was die Richtung betrifft, so ist das verlängerte Mark bey Fischen und Fröschen ganz platt, so daß es in einer Ebene mit Gehirn und Rückenmark liegt; bey Schildkröten, Eidechsen und Vögeln ist es nach unten gewölbt, indem es hier entweder anschwillt oder sich nach unten beugt, um dann vorn wieder etwas herauszu steigen. Bey den Säugethieren setzt sich der Hirnstamm vom Rückenmark aus wagrecht fort bis zum vordern Hirnende, so daß man am Schädel durch das Hinterhauptloch in die Nasenhöhle sehen kann: das Gehirn ist also dem Rückenmark nur entgegengesetzt, wie Vordres zum Hintern, wodurch denn die wagerechte Stellung des Kopfs und der vierfüßige Gang bestimmt wird. Bey dem Menschen beugt sich das verlängerte Mark so, daß es schräge nach vorne und oben verläuft; seine Axe durchschneidet also die des Rückenmarks, und die Strömungen beyder Theile treffen in einem Winkel zusammen: das Hinterhauptloch liegt mehr nach vorne, besonders bey dem Europäer (Sömmerring Neger S. 54), und eine von ihm ausgezogene gerade Linie trifft nicht auf die Siebplatte, sondern auf den Wölbungstheil des Stirnbeins. — Nach Malacarne und Foderé (Cretinen S. 100) bildet sich bey Cretinen, namentlich bey Rachitischen, ein stärkerer Winkel, indem das verlängerte Mark erst mehr senkrecht aufsteigt, und dann fast wagrecht nach vorne verläuft. Dasselbe ist der Fall bey dem menschlichen und thierischen Embryo, wo die Stelle der Umbiegung, welche in der Höhe des untern, spitzen Endes der Rautengrube liegt, nach hinten als Nackenhöcker hervorspringt. Wird dies Verhältniß durch die Beugung des Kopfs gegen die Brust bestimmt (Tiedemann's Gehirn S. 94)?

§. 873. Je schwächer das verlängerte Mark in Verhältniß zu dem von ihm ausgehenden Gehirn, je mehr es also von diesem abhängig und durch dasselbe bestimmt ist, um so mehr ist das psychische Leben entwickelt. Dem Gewichte nach verhält sich das Gehirn zu dem als Einheit angenommenen verlängerten Marke bey dem Menschen wie 200; bey Affen wie 43; Fuchs 23; Hirsch 21; Schaf, Hase, Igel 17; Truthenne 14; Reiber 13; Ratze, Hamster, Maulwurf 10, 5; Eule und Sparling 10; Hahn und Truthahn 9; Schwan 7; Fledermaus 6; Schildkröte 3; Schollen, Rochen und Triglen 2; Schellfisch und Kabliau 1 (Treviranus Biologie VI. 1. Tafel). — Das verlängerte Mark ist nebst den Vierhügeln in den frühern Zeiten des Embryonenlebens der größte Theil des Gehirns, und nimmt mit der Zeit verhältnißmäßig ab (Meckel's Archiv I. S. 355). In Hinsicht auf Breite verhält sich das große Hirn zu ihm bey dem zweymonatlichen Embryo wie 2,66 (Carus Nervensystem S. 287), bey dem erwachsenen Menschen wie 6 oder 7; Affen 4; Seehund 3; bey den meisten übrigen Säugethieren wie 2; Hayfisch 1,4;

Kahlen 1, 2. (Tiedemann *icones* p. 37. Treviranus *Biol.* VI 2 Tafel). Nur bey dem Delphin ist das große Hirn in Verhältniß zum verlängerten Marke noch breiter, als bey dem Menschen (Desmoulins in *Journal complém.* XIII, p. 211).

§. 874. Das Verhältniß des verlängerten Marks zum Gehirne überhaupt in Bezug auf die Frequenz der durch seine Abnormitäten erregten Symptome ist nach unsrer Sammlung pathologischer Beobachtungen folgendes:

- 6,58 Krampf des Nackens.
- 4,32 Lähmung der Pupille.
- 4,16 Lähmung aller Glieder.
- 3,93 Lähmung des Speiseröhrenkopfs.
- 3,85 Lähmung der Untern Glieder.
- 3,61 Lähmung des Kiefers.
- 3,41 Lähmung des Halses.
- 3,19 Lähmung der Augenlieder. Taubheit.
- 3,00 Krampf der Gesichtsmuskeln.
- 2,80 Affection der Harnorgane.
- 2,76 Abmagerung.
- 2,39 Lähmung der Zunge.
- 2,37 Affection der Geschlechtsorgane.
- 1,08 Affection der Athmungsorgane.
- 2,06 Blindheit.
- 1,92 Krampf des Kiefers.
- 1,70 Lähmung der innern Augenmuskeln.
- 1,43 Lähmung der obern Glieder.
- 1,41 Hemiplegie.
- 1,36 Lähmung der Gesichtsmuskeln.
- 1,25 Apoplexie. Verrücktheit. Blödsinn.
- 1,20 Verstopfung.
- 1,16 Erbrechen.
- 1,03 Schmerz. Allgemeine Krämpfe.
- 0,90 Betäubung.
- 0,87 Delirium.
- 0,82 Affection des Gefühls.
- 0,50 Amnesie.

§. 875. Um nun die einzelnen Functionen durch zu gehn, so sehen wir zuvörderst, daß das verlängerte Mark derjenige Hirntheil ist, welcher am nächsten mit dem Rumpfe und dem plastischen Leben zusammenhängt, indem theils seine Nerven allein an Rumpfeingeweide oder an ihre Anfänge sich verbreiten, und heynahe ausschließlich mit dem Rumpferren sich verbinden, theils sehr unmittelbarer Zusammenhang mit dem Rückenmarke eine solche Verknüpfung bewirkt. Daher scheinen denn Metastasen von Rumpforganen auf das Gehirn am häufigsten das verlängerte Mark zu treffen: so fand man diese in einem abnormen Zustande nach Unterdrückung der Ausdünstung (Morgagni II,

20), ferner von Hautausschlägen (Pyls Aufs. II, S. 15. Chambon p. 115. 113), von veralteten Geschwüren (Morgagni XII, a. Schärtschmidts Nachrichten III, S. 37), von Gicht und Rheumatismus (Lancisi de sub. mort. p. 218. Chambon p. 392), von Hämorrhoiden (Lancisi p. 207) u. a. w.

§. 876. Es bestimmt die Respiration, indem nicht bloß der eigentliche Athmungsnerve (X), sondern auch die Hülfsnerven des Gehirns für das Einathmen (VII, IX, XI) und Ausathmen (V, XII) in ihm wurzeln. Eine partielle Verletzung desselben ohne starke Blutergießung hebt das Leben nicht augenblicklich auf: wenn es durchstochen worden war, so lebten die Thiere zuweilen noch einige Zeit (Lorry *mem. pres.* III, p. 366), eine halbe Stunde (Zinn in Haller Disp. VI, p. 426) oder selbst bis zum fünften Tage (Méhée de la Touche p. 100), ja es soll auch nach seiner Verletzung durch eine Flintenkugel die Heilung erfolgt seyn (Zinn a. a. O. p. 443). Daß aber eine stärkere Verletzung das Athmen und dadurch das Leben alsbald vernichtet, lehrten die Versuche von Chirac, Kaulw (*impetum faciem* §. 327 sq.), Teubeler (p. 62 sqq.) Zinn (a. a. O. p. 443), Lorry (a. a. O.) und Andern. Mayer (med. chir. Ztg. 1815 I. S. 424. fgg.) sah, daß nach seiner Zerstörung das Schnappen nach Luft an dem abgeschnittenen Kopfe sogleich aufhörte. Dabey zeigt es nun eine gewisse Unabhängigkeit vom Gehirne, und es muß also auch der Impuls zum Athmen von ihm gewöhnlich ausgehen. Denn zuvörderst athmen manche Hemicephalen, bey welchen ein bloßer Markknopf ohne Hemisphären sich findet. Sodann sind die Verwundungen des Gehirns oberhalb desselben um Vieles weniger tödlich. Ferner, wenn Legallois (*expériences* p. 37) Kaninchen das große und kleine Hirn genommen hatte, dauerte das Athmen fort, und hörte erst nach Zerstörung des verlängerten Marks auf; dasselbe sah Treviranus (Schriften I. S. 103. Biologie IV, S. 65) bey Fröschen: in so fern kann man auch den Tod des Rumpfs nach der Enthauptung zunächst von dem vernichteten Einflusse des Gehirns auf das Athmen ableiten, indem dann, wie schon Chirac sah, das Leben des Rumpfs durch künstliches Athmen sich noch erhalten läßt. Daß endlich jeder Punkt des verlängerten Marks selbstständig die in ihm wurzelnden Nerven bestimmt, zeigen Flourens (p. 175) Versuche: wenn er dasselbe von oben her schichtweise wegnahm, so erlosch zuerst die Athmungsbewegung der Nase und des Kiefers (durch VII. und V.), dann, wenn die Centralenden des zehnten Paares zerstört wurden, die der Kehltritte; bey Zerstörung des Halsrückemarks die des Zwerchfells; und endlich bey der des Brustrückemarks die der Rippen. Trennte er (p. 178) den obern Theil des verlängerten Marks von dem untern durch einen Querschnitt einige Linien oberhalb des zehnten Paares, so dauerten die Athmungsbewegungen des Rumpfs, so wie des Kopfs, fort, jedoch ohne Uebereinstimmung unter einander; wurde das Rückenmark geritzt, so erfolgten Einathmungsbewegungen am Rumpfe.

§. 877. Das verlängerte Mark enthält das Centralende des zehnten Nerven, ist also der Punkt, wo der Magen, und zum Theil die Leber, die Milz, das Pankreas, der Zwölffingerdarm auf das Gehirn einwirken und von demselben bestimmt werden.

§. 878. In ihm wurzeln ferner allein diejenigen Hirnnerven, welche an die plastischen Organe des Kopfs und Halses; an die äussere Haut (V. VII. XI), an die Schleim-

haut (V. IX. X.), die Mandel (IX), die Speicheldrüsen (V. VII. XII), die Thriaseindrüsen (V.) und die Schilddrüse (X.) gehn.

§. 879. Es ist endlich der Centralpunct aller Hirnnerven, welche mit dem Gefäßsysteme in näherer Verbindung stehen, namentlich verbreitet sich das IX. und X. Paar an Herz und Arterienstämme, das V., VI., VII. XII. Paar an die Carotis. Und da seine Nerven auch mit dem Rumpfnerven in der vielfachsten Verbindung stehen, so muß seine Thätigkeit mit dem Gefäßleben inniger zusammenhängen, als die eines andern Hirnthells. Wenn Ens (Haller *disp. II. p. 409*) das verlängerte Mark mit dem Messer reizte, so wurde der Herzschlag vermehrt, und wenn es zerstörte, so hörte er auf.

§. 880. Blicken wir auf die Resultate der pathologischen Beobachtungen (XXXV. Tabelle), so sehen wir, daß die plastischen Functionen durch die Abnormitäten des verlängerten Marks häufiger gestört werden, als durch die eines andern Hirnthells, und zwar am häufigsten die Magenverdauung ($=1:7$), dann die Ernährung ($=1:8$), hierauf das Athmen ($=1:10$), sodann die Thätigkeit des Harnsystems ($=1:15$), am seltensten die Darmausleerung und die Thätigkeit der Geschlechtsorgane ($=1:31$). Stellen wir aber eine Vergleichung mit den übrigen Hirnorganen an (§. 874), so finden wir, daß die Beziehung des verlängerten Marks verhältnismäßig am stärksten ist zu den Harnfunctionen, zur Ernährung, zu den Geschlechtsfunctionen und zum Athmen, schwächer zur Verdauung. Hieraus ergibt sich denn, daß die Geschlechts- und Harnorgane mit dem Gehirn nur in einer schwachen Beziehung stehen, wie denn dieselbe auch nur durch das Rückenmark vermittelt wird, und daß diese mehr ödlich und auf den untern oder hintern Theil des Gehirns beschränkt ist; daß dagegen die Verdauung in einem genauern Verkehr mit dem Gehirn steht, und daß derselbe über die untern, zunächst berührten Theile weiter hinausgeht und mehr auf die vordern und obern Theile des Gehirns sich ausbreitet; daß endlich das Athmen in dieser Hinsicht mitten inne steht. — Die Differenz vom Großhirnstamme giebt ähnliche Resultate.

§. 881. Die Abnormitäten des verlängerten Marks verursachen am häufigsten ($=1:2,95$) Schmerzen, doch scheint dasselbe den Großhirnstamm und die übrigen Hirnthelle an Empfindlichkeit nur wenig zu übertreffen, da die Proportion (nach §. 874) nur $=1:1,03$ ist. Das verlängerte Mark muß dagegen die Perception vom Zustande des übrigen Körpers vornehmlich vermitteln. Schon das Rückenmark vermag dies einigermaßen: denn Thiere äussern nach Zerstörung des verlängerten Marks noch Schmerz, wenn man sie kneift (Flourens p. 183). Dies dunkle Gemeingefühl wird erst klarer werden, wenn es durch Fortpflanzung längs des ganzen Hirnstamms mit den übrigen Sensationen in Einklang gebracht wird. Der dem Gemeingefühle entsprechende Trieb muß auf gleiche Weise sich verhalten. Da, wenn die Hemisphären abgeschnitten sind, das Thier noch athmet, und der abgeschnittne Kopf noch Athmungsbewegungen macht, so muß der Impuls dazu, oder der Trieb zum Athmen im verlängerten Marke selbst wirken. So gehen auch von demselben die bewußtlosen und meist unwillkürlichen Muskelbewegungen aus, welche sich auf die Verdauung beziehen, denn in jenen beyden Fällen saugt und schlingt das Thier noch, wie der Betäubte, was ihm in die Mundhöhle oder in den Rachen gebracht worden ist. Aber wie der Einfluss der Verdauung über die höhern Theile des Gehirns sich

verbreitet; so muß Hunger und Durst zunächst zwar im verlängerten Marke empfunden, aber, durch dasselbe fortgepflanzt, in den obern Theilen des Gehirns deutlicher percipirt werden, und von diesen muß auch der Trieb zur Nahrung ausgehen, denn er erlosch nach Flourens völlig, wenn die Hemisphären des großen Hirns zerstört waren. Gehen die Fasern des zehnten Nerven, welche vom Magen kommen, weiter aufwärts in das Gehirn, während die von den Lungen kommenden im verlängerten Marke endigen? Es wäre möglich, ist aber weder zu erweisen, noch als nothwendig zu denken. Jedes Organ muß vermöge seiner specifischen Natur ein eigenthümliches Spannungsverhältniß zum Gehirn haben, vermöge dessen es ohne einen besondern Apparat, und auch bey Gemeinsamkeit der Nerven mit denen eines andern Organs auf besondere Weise das Gehirn erregt und von diesem wiederum bestimmt wird. So lassen sich keine Nervenfasern entdecken, welche von den Geschlechtstheilen in Stetigkeit zum Gehirn sich verbreiteten, und doch stehn diese Organe mit dem verlängerten Marke, und vorzüglich mit dem kleinen Hirne in eigenthümlichem Verkehr.

§. 882. Das verlängerte Mark ist der Centralpunct für den fünften Nerven, welcher besonders das Gemeingefühl, so wie das Getaste am Kopfe, vermittelt; ferner für sämtliche Nerven des Geschmacks und des Gehörs. In ihm müssen also auch diese Sensationen zunächst ihren Sitz haben. Zugleich steht es aber auch durch das fünfte Paar, als den Hilfsnerven des Geruchs und des Gesichts, mit diesen Sinnen in Verbindung und bedingt dieselben. Seine Abnormitäten bewirken nächst denen der Sehhügel und Vierhügel häufiger, als irgend ein andrer Theil ($=1:5$) Blindheit; es übertrifft hierin das Gehirn überhaupt (Proportion nach §. 874 $=1:206$), und, wiewohl weniger, selbst den Großhirnstamm. Eben so ist die Taubheit bey seinen Abnormitäten am frequentesten ($=1:10$), so daß in dieser Beziehung seine Proportion zum Gehirn überhaupt $1:3.19$ ist. Da gleichwohl Flourens Versuche lehren, daß die Hemisphären zur vollständigen Sinneswahrnehmung erforderlich sind, so muß das verlängerte Mark die erste Bedingung und Grundlage der Sensation überhaupt seyn, welche aber erst in den vordern und obern Hirntheilen vollendet wird. Es muß also den ersten Eindruck der sinnlichen Gegenstände empfangen, aber so daß dieser gleich dem von den Verdauungsorganen durch dasselbe zu den höhern Hirnorganen sich verbreitet. Was das Gemeingefühl betrifft, so sah Eimmert (Meckels Archiv. I. S. 181. fg.), daß nach Zerstörung des verlängerten Marks Lippen, Zunge, Gesichtsmuskeln, Nase und Augen ganz unempfindlich waren, während jede Reizung des äußern Ohrs noch Zuckungen erregte.

§. 883. Wie nun die Wahrnehmung im verlängerten Marke nicht zu ihrer Vollendung kommt, so kann es auch am Gedächtnisse keinen Antheil haben. Die Amnesie ist nicht nur dasjenige Symptom, welches bey seinen Abnormitäten am seltensten ($=1:62$) vorkommt, sondern es wird auch in dieser Hinsicht von den Hirntheilen überhaupt (Proportion $=1:0.50$) und namentlich vom Großhirnstamme mehr, als in jeder andern Beziehung übertroffen. — Beym Denken ist sowohl Verdauung, Athmen und Herzschlag, als auch die Rührung des Gemeingefühls und der Sinne schwächer, also die Lebensthätigkeit des verlängerten Marks herabgesetzt. Dies kann nur die antagonistische Folge einer gesteigerten Thätigkeit in andern Hirnorganen seyn: folglich müssen die Denkörgane über

dem verlängerten Marke hinans liegen. Bey seinen Abnormitäten ist die Betäubung (Proportion 1:0,96), das Delirium (Proportion 1:0,87), und die Verstimmung des Gemüths (Proportion 1:0,82) seltener, als im Durchschnitte bey Hirnabnormitäten. Frequenter ist dagegen Verrücktheit und Blödsinn (Proportion = 1:1,25), wir wissen auch, daß die Verrücktheit am häufigsten aus der Wurzel des Lebens sich entwickeln und öfter auf Abnormitäten der Rumpfeingeweide, als des Gehirns beruht. Eben so geht die Apoplexie häufiger vom verlängerten Marke, als von den Hirtheilen im Durchschnitte (Proportion 1:1,25) aus, da bey ihr mit dem Bewußtseyn auch das pflanzliche Hirnleben, und seine Beziehung zu den Rumpfeingeweiden, so wie zu den Muskeln und Sinnesorganen mehr oder weniger darnieder liegt.

§. 384. Das verlängerte Mark bestimmt durch seine Nerven unmittelbar alle Bewegungen am Kopfe mit Ausnahme eines Theils derer des Augapfels, so wie auch ein großer Theil derer am Halse von ihm abhängt. Daher erfolgt bey seinen Abnormitäten Lähmung des Nackens, des Kiefers, des Halses, des Angelieds, und des Rachsens, häufiger als ein andres Symptom, wie auch häufiger als bey Abnormitäten andrer Organe. Wenn (nach §. 374) die Differenz von den Hirtheilen überhaupt in Beziehung auf diese Bewegungen ziemlich bedeutend ist, so ist sie dagegen viel geringer bey den Bewegungen der Zunge, und der Gesichtsmuskeln, wahrscheinlich weil diese mehr mit Bewußtseyn und freythätig, also von höhern Theilen des Gehirns aus bestimmt werden. Wenn man bey Thieren das verlängerte Mark verletzt oder reizte, so entstand Zahnknirschen, stete Bewegung des Auges (Sancerotte in *prix de chir.* X. p. 344); oder Starren und Funkeln desselben (Lorry in *mém. présentés* III. p. 370), und Stimmlosigkeit (Lorry ebend. p. 363. *Kauw impetum faciens* §. 327); Thiere, welchen das ganze Gehirn bis auf das verlängerte Mark genommen worden war, bewegten sich und schrien noch, wenn sie gekniffen wurden; während die, denen bloß das verlängerte Mark verletzt worden war, sich bewegten, aber nicht schreyen konnten. Da nun der fünfte Nerve auf die Thränenorgane und die Gesichtshaut, der sechste auf den Augapfel, der siebente auf die Antlitzmuskeln, und der zehnte auf Stimme, Sprache, Aihnen, Herz und Verdauung wirkt, so ist das verlängerte Mark das Organ, welches nicht nur den mimischen Ausdruck, sondern auch überhaupt die Einwirkung des durch Affecte aufgeregten Hirnlebens auf die andern Organe vermittelt.

§. 385. Es wirkt aber zugleich auf die Gliederbewegung. Lorry (a. a. O. p. 366 — 369), Metzger (Ludwig *script. neur.* I. p. 125), Flourens, Fodera (Magendie *Journ.* III. p. 18 und 193. 211) bemerkten, daß seine Reizung bestimmter und heftiger Convulsionen erregte, als die andrer Hirtheile. Auch bewirkten seine Abnormitäten ungleich häufiger, als das Gehirn im Ganzen (Proportion 1:4,16), allgemeine Lähmung der Gliedmaßen. Lorry suchte deshalb in ihm den Ursprung der Bewegung, und Rolando (p. 65) erklärte, in ihm liege die Feder, welche die Ortsbewegungen hervorbringe, oder der Mechanismus, durch welchen die im kleinen Hirne erzeugte Elektricität auf die Nerven übertragen werde, wie denn die Ursache aller Lähmungen und Convulsionen entweder im kleinen Hirne, oder im verlängerten Marke, oder in den Nerven liege. Allein diese Ansicht ist offenbar irrig, da die pathologische Beobachtung zur Genüge zeigt, daß

auch das große Hirn, so wie das Rückenmark auf die Bewegung Einfluß hat. Das Verhältniß scheint vielmehr folgendes zu seyn: Vom Rückenmark geht der Impuls zur Bewegung aus, als organische Reaction gegen die ohne alles Gemeingefühl oder mit einer unbestimmten und schwachen Perception desselben erfolgte Reizung der Nerven, und es entstehen dann einzelne, unzusammenhängende, zwecklose Bewegungen. Im verlängerten Marke wirkt ganz eigentlich das Gemeingefühl und der ihm entsprechende blinde Trieb; dieser wirkt also von ihm aus durch das Rückenmark, und bringt übereinstimmende, zweckmäßige, den Forderungen des Gemeingefühls angemessene, aber bewußtlose Bewegungen hervor. Sollen aber diese bestimmten Vorstellungen entsprechen und ganz eigentlich willkürlich seyn, so muß der Impuls von den Hemisphären kommen und das verlängerte Mark und Rückenmark bloß als Durchgangspunkt dienen, in welchem die Vorstellung erlischt und der Act zu einem pflanzlichen Hergange wird (§. 727). Diese Ansicht wird durch Flourens (p. 83. seq.) Beobachtungen bestätigt: Thiere, welchen bloß die Hemisphären genommen worden waren, bewegten sich nicht freywillig oder durch Sinnesindrücke bestimmt, wohl aber in Gemüthsheit der Eindrücke auf das Gemeingefühl, und nahmen die diesem entsprechende Lage und Stellung an; war ihnen aber das verlängerte Mark genommen worden, so bewegten sie sich zwar, wenn sie gekniffen wurden, aber sie üsseten dabey kein Streben, sich im Gleichgewichte zu erhalten, und bemühten sich nicht, in die gehörige Stellung sich zu versetzen.

§. 886. Wir bemerken übrigens, daß das verlängerte Mark in Verhältniß zu andern Hirnorganen viel stärker auf die untern, als auf die obern Gliedmaßen wirkt, denn wenn es (§. 874.) in der Frequenz der von ihm ausgehenden Lähmung der untern Glieder zum Gehirn im Ganzen wie 1:3,85 sich verhält, so ist dagegen in Betreff der Lähmung der obern das Verhältniß wie 1:1,43. Also geht der Impuls zur Bewegung der untern Gliedmaßen verhältnißmäßig mehr vom verlängerten Marke, zu der der obern mehr von den höhern Hirnorganen aus. Dies kann seinen Grund haben 1) darin, daß die untern Glieder mehr bewußtlos und instinctmäßig, die obern hingegen mehr durch den bewußten, freyen Willen und den Vorstellungen entsprechend bewegt werden. So wird (§. 881.) die Bewegung der Zunge, als des sensibelsten und freysten Muskelgebildes verhältnißmäßig weniger durch das verlängerte Mark, und mehr durch die höhern Hirntheile bestimmt, als das mehr bewußtlose und dem Plastischen unmittelbar dienenden Schlängen. So ist im Magen verhältnißmäßig die Sensibilität und Ingestion überwiegend, in den Lungen hingegen die Beziehung zur Irritabilität und Egestion stärker; jener wird verhältnißmäßig mehr von den höhern Hirntheilen und weniger vom verlängerten Marke bestimmt, als diese. 2) Oder das verlängerte Mark wirkt stärker auf das Hintere und Untere, das darüber liegende Gehirn mehr auf das Vordere und Obere. Die Proportion des Erstern zu Letztem beträgt in Hinsicht auf Krampf des Nackens 6,85, auf Lähmung des Kiefers 3,61, und des Halses 3,41; hingegen in Hinsicht auf Lähmung der Gesichtsmuskeln nur 3,00. 3) Oder Breydes ist identisch: das am weitesten nach unten und hinten liegende verlängerte Mark hat mehr Beziehung zur Irritabilität (§. 816.) und wirkt stärker auf die nach unten und hinten liegenden Körpergebilde, in welchen die Irritabilität verhältnißmäßig überwiegend ist (§. 815.). So wirkt es im Plastischen verhältnißmäßig

am stärksten auf die am Ende des Rumpfs liegenden, den Charakter der vorwaltenden Egestion und Beziehung zur Irritabilität tragenden Harn- und Geschlechtsorgane, und am schwächsten auf die mehr ingestiven und sensibeln Verdauungsorgane. So hat es endlich einen weit stärkern Verkehr mit dem nach hinten liegenden, relativ irritablen Gehörorgane, als mit dem sensiblern Auge.

§. 887. Fassen wir nun dies Alles zusammen, so erkennen wir das verlängerte Mark als denjenigen Hirntheil an, welcher als das äusserste Glied das Psychische mit dem übrigen Leben zunächst verknüpft (§. 971.), selbst sehr empfindlich, das dunkle Gemeingefühl percipirt (§. 987.), die ersten Eindrücke des Geschmacks und Gehörs aufnimmt, überhaupt aber die Grundlage der Sensation (§. 882.) und somit die Basis des psychischen Lebens darstellt (§. 883.), und am meisten auf Irritabilität (§. 884.) und Plasticität (§. 873.) sich bezieht, und zwar so, daß es der Sitz des bewußtlosen Instinctes (§. 881.) und der Durchgangspunct für den Impuls des Willens (§. 885.), der Bestimmungsgrund des Athmens (§. 876.), der Hauptsitz der Wechselwirkung mit dem Gefäßsysteme (§. 879.), der Durchgangspunct für den Verkehr mit der Verdauung (§. 877. 880.) und der Reflexionspunct für die Harn- und Geschlechtsfunctionen (§. 880.) ist, und daß es endlich die untern und hintern Körpertheile mehr eigenmächtig, die obern und vordern aber mehr vermöge des ihm von den übrigen Hirntheilen übergebenen Impulses bestimmt (§. 886.). So ist es denn mit einem Worte die Grundlage des Hirnlebens, oder der Stamm, in welchem noch Irritabilität und Plasticität vorherrschen, und in welchem noch als Gemeingefühl und blinder Trieb dasjenige schlummert, was in seiner Entfaltung als Wahrnehmung, Bewußtseyn und Wille sich entwickelt. Daher ist denn auch das psychische Leben um so vollkommener, je weniger das verlängerte Mark das Bestimmende des Rückenmarks (§. 872.) und je mehr es selbst den höhern Hirnorganen untergeordnet (§. 873.) ist. — Im Allgemeinen übereinstimmend, nur theils unbestimmter, theils einschränker war es, wenn in ihm Bartholin (*Abh. III. c. 3. p. 317*) die Erzeugung der thierischen Geister, Mayer (*Gehirn S. 34*) den vorzüglichsten Sitz des Lebens, oder (*Anat. VI. S. 366. 372*) die genaue Verknüpfung mit der Lebenskraft suchte; wenn ferner Meckel (*Anat. I. S. 329. fg.*) in ihm so wie im ganzen untern und hintern Theile des Gehirns und im Rückenmarke die Bildungsstätte der lebenserhaltenden Nervenkraft, und Treviranus (*Schriften III. S. 94. Biologie VI. S. 76*) in ihm die Verbindung der vegetativen und sensitiven Sphäre, und den Mittelpunct des thierischen Lebens annahm.

§. 888. Daß die Pyramiden als Leiter des Impulses zur Muskelbewegung dienen, geht aus den Beobachtungen hervor, wo eine Abnormität im Gehirne, namentlich in den Streifenhöhlen, als den Fortsetzungen der Pyramiden, eine Lähmung der Glieder der entgegengesetzten Seite bewirkt, da die Pyramidenfasern allein vom obern Theile der einen Seite zum untern Theile der andern herübergehen. Dies scheint dadurch bestätigt zu werden, daß die Pyramiden aus Marksubstanz bestehen, indem diese vorzüglich auf Bewegung sich bezieht; und da sie dabey Anschwellungen, gleichsam Ganglien ohne graue Substanz, bilden, so dürfte man vermuthen, daß sie die Organe des Bewegungstriebes oder der Punct sind, von welchem der Impuls zur bewußtlosen Bewegung ausgeht. Allein 1) sie leiten nicht bloß die Impulse zur Bewegung, sondern auch die zur Empfin-

dung, da diese ebenfalls sich kreuzt (§. 820.); 2) die übrigen Stränge des verlängerten Marks stehn in einer noch nähern Beziehung zu willkührlichen und unwillkührlichen Bewegungserven. — Wenn Willis (*cer. c. 3. p. 18. c. 15. p. 77*) ihnen das Geschäft zuschreibt, die thierischen Geister aus dem kleinen Hirne durch die Brücke zum herum-schweifenden Nerven, und zu andern Nerven des verlängerten Marks und zum Rückenmarke zu führen, so ist damit ihre eigenthümliche Function weder genau, noch auch richtig bezeichnet, denn da sie durch die Brücke bloß hindurehgehn und erst in den Streifenhügeln und deren Strahlungen endigen, so müßten sie vielmehr von diesen Punkten aus bestimmt werden. — Nach Gall sollen sie die Ursprünge des großen Hirns seyn. Verstehn wir im Sinne des beschanenden Anatomen unter Ursprung den Punkt, wo ein Gebilde an ein andres grünt, und, von diesem aus betrachtet, zuerst sich zeigt, so ist diese Behauptung schon nicht richtig, da das große Hirn eben sowohl durch die Olivenbündel und durch die hintern Stränge, als durch die Pyramiden mit dem verlängerten Marke zusammenhängt. Nehmen wir aber den Ursprung als etwas Thatsächliches, so läßt sich unter jener Behauptung eben so wenig etwas Verständiges denken, als wenn Jemand sagen wollte, der wurmförmige Anhang am Blinddarme sey der Ursprung des Grimmdarms. Denn 1) welchen Einfluß kann ein kleines Knötchen auf die Entstehung eines entfernten, hundertmal größern Gebildes haben? 2) Das große Hirn entsteht in der Thierreihe, wie im Lebensalter früher, als die Pyramiden. — Die Zootomie lehrt uns bloß, daß diese Organe mit der zunehmenden Ausbildung des Gehirns sich entwickeln. Bey Fischen und Amphibien ist das verlängerte Mark glatt und ohne Kreuzung; bey Vögeln erscheinen einige Kreuzungslasern; bey den Nagern zeigen sich Pyramiden als schwache Vorrugungen, die bey den übrigen Säugethiern stärker hervortreten, und bey dem Menschen nicht gerade am größten, (denn nach Tiedemann sind sie bey ihm 8^{''} lang und 2^{''} breit, bey dem Löwen hingegen 11^{''} lang und 2¹/₂'' breit), wohl aber am schärfsten begrünt und am individuellsten ausgebildet sind. Wenn sie nach Willis (*cer. c. 18. p. 90*) in geradem Verhältnisse zur Brücke, oder nach Gall zu den Hemisphären entwickelt, seyn sollen, so drückt dies nur die Proportion zur Ausbildung des Gehirns überhaupt aus, und wir könnten eben so gut sagen, sie stehn in geradem Verhältnisse zum Balken. — Nach Tiedemann (Gehirn S. 28) wird die Kreuzung bey dem Embryo schon am Ende des ersten Monats sichtbar; die Pyramiden sind im vierten Monate platte Flächen, und bilden erst im fünften Vorrugungen, springen dann aber stärker hervor, als bey dem erwachsenen Menschen. Eben so wenig lehrt uns die pathologische Beobachtung: die Pyramiden fehlten bisweilen bey unvollkommener Entwicklung des Gehirns (Nr. 354. 650), und bey dem Drucke eines Aftergebildes auf dieselben (Nr. 957) trat außer einer Lähmung des innern geraden Augenmuskels kein auffallendes Symptom ein. Nach dem Allen müssen wir bey der einfachen Anschauung des Gestaltungsverhältnisses stehn bleiben, und die Pyramiden als die Theile des verlängerten Marks anerkennen, welche die vordersten Ganglien und Strahlungen des Gehirns theils mit der vordern Fläche der grauen Kernstränge, theils mit den Seitenmarksträngen in Verbindung setzen.

§. 829. Die Oliven sind als Ganglien der vordern grauen Seitenstränge zu betrachten und scheinen eine höhere Bedeutung zu haben, als die Pyramiden. Sie finden sich

erst bey den Säugethieren, aber meist noch unvollkommen entwickelt, flach, zum Theil ohne gezackten Kern, zum Theil ohne Markbedeckung, zum Theil äusserlich gar nicht hervortretend. Nur bey Delphinen, Seehunden und Affen sind sie mehr entwickelt, jedoch immer noch schwächer, als bey dem Menschen: bey diesem 4^{'''} lang und 2½^{'''} breit, verhalten sie sich zur Breite des verlängerten Marks wie 1:3,50; bey jenen sind sie 2 bis 3½^{'''} lang, 1 bis 1½^{'''} breit, und ihre Breite verhält sich zu der des verlängerten Marks wie 1:4,66 bis 1:9. — Bey dem Embryo sind sie nach Carus (Nervensystem S. 287. fg.) im vierten Monate inwendig hohl, oder graue Blasen; welche gegen den sechsten Monat mit Marksubstanz sich füllen; hierauf (Tiedemann Gehirn S. 60. 96) werden sie äusserlich sichtbar, bilden aber erst im siebenten Monate deutliche Vorsprünge. — Sie werden zum Theil bey Hemicephalen vermehrt (Nr. 650). Rudolphi (Berliner Akademie 1815 S. 27) fand bey einem Kinde, wo Pyramiden, Hirnschenkel und Vierhügel auf beyden Seiten gleich stark ausgebildet waren, die linke Olive kleiner, als die rechte, dagegen auf der rechten Seite den Schlägel; das Gewölbe und den Balken schwächer entwickelt, als auf der linken Seite, wobey der sechste und die vier ersten Nerven der rechten Seite fehlten. Die Olivenstränge geben den wesentlichsten Theil der Schlägel ab, und einige ihrer Fasern laufen am vordern Theile der Vierhügel bogenförmig in einander: durchkreuzen sie sich hier zum Theil? Hängt die Wirkung des hintern Theils des Gehirns auf die Glieder der entgegengesetzten Seite davon, und nicht von den Pyramiden ab? Die isolirte Beobachtung kann bloß als Fingerzeig für künftige Forschungen dienen. — Bey solcher Armuth an Thatfachen ist es schwer, irgend etwas über die Bedeutung der Oliven zu bestimmen. Nach Willis (cor. c. 15. p. 77) sollen sie mit den Pyramiden thierische Geister aus dem kleinen Hirne in die Nerven des verlängerten Marks führen, aber sie stehn mit dem kleinen Hirne in keiner nähern Verbindung; eher könnte man mit ihm (c. 18. p. 90) aus ihrer Beziehung zum zwölften Nervenpaare und aus ihrer stärkern Entwicklung bey dem Menschen schliessen, daß diese auf die Bewegung der Zunge zum Behufe der Sprache sich bezögen. Nach Carus (Nervensystem S. 288) sind sie für die vordern Stränge dasselbe, was die Cillarkörper für die hintern sind: Diese Vergleichung, welche schon Sömmerring angestellt hatte, ist allerdings gegründet, und wird dadurch einigermaßen unterstützt, daß in einem Falle (Nr. 143) beyde Theile zugleich in einem entzündlichen Zustande gefunden wurden; indess zeigt sie doch bloß die Uebereinstimmung der untersten Hirnganglien unter einander, und berechtigt keinesweges, die Oliven als einen Gegensatz zum ganzen kleinen Hirne zu betrachten. Daß sie das große und kleine Hirn vereinen und der Brennpunct für die Bewegungsnerven sämtlicher Sinnorgane seyn sollen (Schönlein S. 30. fg.), ist ganz aus der Luft gegriffen, und daß ihre Entwicklung in geradem Verhältnisse zur Zahl der Randwülste des großen Hirns stehn (Treviranus Schriften III. S. 67), gründet sich nur auf einseitige Betrachtung, da eine nähere Beziehung nicht nachzuweisen ist. — Gewiß ist, daß die Olivenstränge den wesentlichsten Bestandtheil der Vierhügel und Schlägel abgeben und vorzüglich das Centralende des reinsten Sinnesnerven, des Sehnerven, enthalten; somit scheinen denn die Oliven, wie auch ihr Bau und ihr Verhältniß in der Thierreihe bezeugt, vorzugsweise sensibel zu seyn, und es ist wohl kaum ein Zweifel, daß sie herr-

schende Centralpunkte (Ganglien) der vordern Stränge sind. Wenn man die Sensibilität im verlängerten Marke nicht höher, als zu den Anfängen der Sensation sich aufschwingt, so fragt es sich, ob nicht die Oliven der Punct sind, in welchem die durch das Rückenmark aufwärts fortgepflanzten Eindrücke vom Gemeingefühle oder vom Tastsinne aufgefaßt werden. Dafs die großen Wurzeln des fünften Paares dicht an, wenn nicht in dem Olivenstrange enden, spricht für Eins sowohl, als für das Andre; der Ursprung des zwölften Paares an den Oliven deutet auf deren Beziehung zum Getaste; dafs in obigem Falle (Nr. 143) bey einem Manne, der während der Begattung vom Schlagflusse getroffen und dabey von Priapismus befallen wurde, die Oliven entzündet waren, spricht vielleicht für die Beziehung auf das Gemeingefühl. Dafs übrigens auch das Gemeingefühl in seiner Gesamtheit bey dem Menschen höher entwickelt ist, bedarf keines Beweises.

§. 890. Die Rautengrube ist die Eröffnung des verlängerten Marks, welche die Kernstränge zu Tage bringt und durch das seitliche Auseinanderweichen der Kleinhirnschenkel hervorgebracht wird. Da sie auf diese Weise nothwendig entstehen mufs, wo es ein kleines Hirn giebt, so dürfen wir weder mit Tiedemann (Gehirn S. 115) sie aus dem teleologischen Grunde ableiten, dafs sie der Gefäßhaut mehr Fläche darbiete, um mehr Gefäße an die beschatteten Theile schicken zu können, noch auch mit den Alten ihr besondere Functionen zuschreiben. Herophilus hatte sie die edelste Höhle genannt, und Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 12. p. 170*) scheint ihm beyzustimmen, indem er sagt, sie sey enger, als die vordern Höhlen, weil sie mehr dynamische, als materielle Substanz enthalte, und (*de Hipp. et Plat. lib. VII. c. 3. p. 269*) ihre Verletzung sey am tödlichsten. Nach den Arabern und ihren Nachfolgern (Benedictus *lib. IV. c. 11. p. 1235*) sollte sie der Sitz des Gedächtnisses seyn, nach Berengar (Carpus fol. 447) aber die Geister zur Bewegung der Glieder aufnehmen. Nach Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 11. p. 269*) und Aranzi (*c. 7. p. 48 sq.*) sollte sie die in den vordern Höhlen bereiteten Geister durch die Wasserleitung empfangen; nach Huart (S. 68) Lebensgeister bereiten und in thierische Geister umwandeln, und nach Bartholin (*lib. III. c. 3. p. 526*) allein die thierischen Geister erzeugen.

§. 891. Die graue Leiste für den Hörnerven ist bey den Thieren, so wie bey dem Embryo, stärker entwickelt und liegt bey Vögeln gerade so, dafs sie in die Lücke zwischen dem vordern und hintern Theile des Wurms, also in den vom kleinen Hirne gebildeten Theil der vierten Höhle oder in das Zelt einpaßt. Dagegen fehlen, bey den Thieren, so wie bey dem Embryo, die auf den Hörnerven sich beziehenden Markstreifen der Rautengrube, (Wenzel *cerebr. p. 189. 320. Tiedemann Geh. S. 30. 113. fg.*). Für Commissuren der grauen Leisten (Cerus Nervensyst. S. 268) können wir sie schwerlich erklären, da sie weder an dem äussern Ende von den grauen Leisten ausgehen, noch mit dem innern Ende zusammen laufen, sondern in die hintre Spalte eindringen. Bezeichnen die grauen Leisten als Hörnganglien bloß die Empfänglichkeit für den Schall, und das Quantitative des Gehörs, die Markstreifen hingegen das Vermögen, die Töne nach ihrer Quantität und in ihrer Combination aufzufassen? Oder beziehen sich jene mehr auf die Subjectivität, auf das Gemeingefühl, auf die Lust oder Unlust an gewissen Tönen, und diese mehr auf die Objectivität und das Vermögen, die Töne in ihrer Reinheit und ihrer

Bedeutung aufzufassen? — Die Gefäßgeflechte der vierten Höhle fehlen nur bey Fischen, und sind heym Embryo verhältnißmäßig sehr groß. — Die blaue Stelle fehlt hey den Thieren. — Das Epithelium am untern Ende der Rautengruhe ist hey dem Embryo so wie bey Vögeln, und zum Theil bey Fischen ein Markblatt, welches die Schenkel des kleinen Hirns verbindet (Meckel's Archiv I. S. 357.). — Die Säugethiere haben unter der Brücke ein ihr paralleles Querband, welches Willis (*ceybr. c. 3. p. 18. c. 17. p. 82*) „*protuberantia circularis minor*“, Malacarne „*laure midollare*“, Treviranus (Schriften III. S. 12) „*trapezium, corpus trapezoidicum*“, Tiedemann (*icones p. 9*) „*protuberantia annularis minor*“ nennt. Es reicht von der äussern Seite jeder Pyramide his zu den Hörnerven. Den Namen einer Commissur, welchen ihm Gall (Untersuchungen S. 71) beylegt, verdient es nicht, da es nicht bis zur Mittellinie reicht; ich habe hey der sorgfältigsten Auffaserung es nur bis in das Olivenbündel verfolgen können. Das siebente und achte Nervenpaar treten aus ihm hervor; Erstres habe ich deutlich in seinen Fasern bis in jenes Bündel verfolgt; von Letztem scheint es die vordere Wurzel zu leiten. Liegt es bey dem Menschen mit in der Brücke, und wird es hey den Säugethieren bloß darum sichtbar, weil ihre Brücke schmaler ist? Und ist bey ihnen zugleich die vordere Wurzel des Hörnerven stärker entwickelt, als hey dem Menschen? — Treviranus (Schriften III. S. 35) will das Trapezium auch bey Vögeln gesehen und bis zur Mittellinie verfolgt haben; ich habe es hier nicht finden können.

II. K l e i n e s H i r n.

A) U e b e r h a u p t.

§. 892. Daß das große und kleine Hirn als Theile eines und desselben Organs im Ganzen genommen in ihren Functionen übereinstimmen und zu einer Gesamtfuction zusammenwirken, ist klar. Aber daß sie in ihren Functionen einander ganz gleich (Molinetti p. 88), und bloß darum geschieden seyen, damit die Blutgefäße durch die so entstandne Lücke in die Hirnmasse gleichförmiger sich verbreiten könnten (Piccolomini II. F. lect. 2. p. 248), oder damit das Eine noch wirken könne, wenn das Andre verletzt oder unhüthig sey (Highmor *lib. III. pars 1. c. 7. p. 218*. Haller *elem. IV. p. 352*), läßt sich durchaus nicht annehmen: beyde Theile sind in ihrem Baue und in ihren organischen Verhältnissen von einander verschieden, und müssen also auch eine relativ verschiedene Bedeutung haben. Weil aber auch hier nur eine relative Differenz Statt findet, so können wir die Bedeutung des kleinen Hirns allein durch Vergleichung mit dem großen Hirne erkennen.

§. 893. Beyde Theile haben im Ganzen genommen analoge Gestaltungsverhältnisse (§. 107.). Das Rückenmark in seiner überwiegenden Ausbildung ist ein walzenförmiger Körper, der einen Canal in sich schließt; durch Steigerung seiner Bildung und durch seitliches Auseinanderweichen seiner hintern Stränge schließt sich der Canal auf und verwandelt sich in eine Vertiefung, die Rautengruhe, in welche Gefäßgeflechte eindringen, und welche in die von ihrer Decke gebildeten seitlichen Buchten, die Nester, sich fortsetzt. Jene Stränge gehn durch ihre Strahlungen in das kleine Hirn über, dessen seitliche

Theile durch die Brücke, und dessen vordre und hintre Theile durch longitudinale Belegungsansätze verbunden werden. — Ueber dem kleinen Hirne zieht sich die Rautengrube wieder zusammen, als wollte die Höhlenbildung erlöschen: aber es sammelt sich der Hirnstamm nur, um zu seinem letzten Erzeugnisse zu gelangen. Der bis zur hintern Commissur reichende, untre Theil des Großhirnstamms mit seiner Wasserleitung ist eine Wiederholung des Rückenmarks mit seinem Canale; indem sein oberer Theil seitlich aneinander weicht, entsteht die dritte Höhle, welche als Analogon der Rautengrube, in die von Gefäßgeflechtem durchzogenen Seitenhöhlen, in welchen die Nester sich wiederholen, übergeht. In den Schenkeln des großen Hirns wiederholen sich die des kleinen, im Balken die Brücke u. s. w. Aber bey dieser Analogie erkennen wir 1) daß das große Hirn zwar eine Wiederholung des kleinen, jedoch mit gesteigerter Entwicklung ist, denn jeder Theil des Erstern ist stärker ausgebildet, als der ihm entsprechende Theil des Letztern. 2) Wir erkennen das Gehirn überhaupt als eine Entwicklung des Rückenmarks an; und wissen, daß in diesem die sensiblen Eindrücke von unten nach oben sich verbreiten, und die irritablen Reactionen von oben nach unten fortgehen, daß also das Obere zu dem Unteren wie Centrum zur Peripherie sich verhält. Da nun das kleine Hirn die erste Ausstrahlung des Rückenmarks, und zwar nur die von einem Theile seiner Stränge ist, da hingegen das große Hirn Fortsetzungen von allen Strängen in sich aufnimmt, und das Ende derselben, so wie der Höhlenbildung, enthält, so müssen wir Letzteres als das eigentlich Centrale betrachten. Das kleine Hirn, vom untersten Theile des Hirnstamms ausgehend, erscheint mithin als ein Vorbereitungsorgan für die höchste Entwicklung. Wie nun bey gehemmter Ausbildung das Niedere ohne ein Höheres erscheint, nicht umgekehrt, so erscheint auch häufig das kleine Hirn normal entwickelt bey unförmlichen Rudimenten des großen Hirns (Nr. 347. 352. 353. 354. 355. 361), während kein Beyspiel des Gegentheils vorkommt.

§. 89. Mit dieser Ansicht stimmt die Erfahrung überein, daß in der Thierreihe das Uebergewicht der Masse des großen über die des kleinen Hirns im Ganzen genommen mit der fortschreitenden Entwicklung zunimmt, und daß bey dem Menschen das kleine Hirn im Vergleich zum großen kleiner ist. — Bey den Fischen ist es verhältnißmäßig stark entwickelt, meist in der Form einer Kugel, mit einer eigenen Höhle, zum Theil mit seitlichen Aushängen, bey einigen selbst schon mit Quersfurchen. Seine Masse verhält sich zu der des großen Hirns (nach Treviranus Biologie VI. 1. Tafel) bey Rochen und Hayen wie 1:3, bey dem Kabeljau und Schellfisch wie 1:4, bey Triglen wie 1:6, bey Schollen wie 1:7. — In der Classe der Amphibien ist es dagegen wieder unvollkommener, und bildet nur ein einfaches Blatt, welches zum Theil nur ganz schmal ist, so daß es Desmoulins (Magendie Journal III. p. 363. 366) hier für eine bloße Commissur der Rautengrube ansieht. — Bey den Vögeln ist es ungleich mehr entwickelt und erscheint als der ausgebildetste Theil des ganzen Gehirns, indem es allein ein starkes Marklager mit baumförmiger Verästelung, Rinde und Randwülste hat. Der Masse nach verhält es sich zum großen Hirne bey Raubvögeln meist wie 1:3 oder 4, bey Sumpf- und Wasservögeln und bey Hühnern wie 1:4 oder 6, bey Singvögeln wie 1:5 oder 6, bey Klettervögeln wie 1:6 oder 7. — Bey den Säugethiereu verliert das kleine Hirn sein Ueberge-

wicht dadurch, daß das große Hirn mehr entwickelt wird. Das gewöhnlichste Verhältniß der Masse des Ersten zu der des Letztern ist bey Fledermäusen, Nagethieren und kleinen Raubthieren 1:2 bis 4; bey größern Raubthieren, Wiederkäuern und Einhufern 1:4 bis 7; bey Affen 1:6 bis 8, bey dem Menschen 1:9 oder 10.

Am 4. 1845. Die erste Bildung des kleinen Hirns erfolgt ziemlich spät, und zwar erscheint es nach Serres bey dem menschlichen Embryo in der 7ten Woche, da Vierhügel und Hemisphären des großen Hirns schon in der 5ten Woche sich hatten unterscheiden lassen; die Letztern Theile erschienen bey dem Knechtchen am 2ten Tage des Brütens, das kleine Hirn am 6ten Tage. Die Bildung geht aber so vor sich, daß aus den Kleinhirnschenkeln zwey Blätter hervorwachsen, welche späterhin in der Mittellinie auf einander stoßen und hier allmählig mit einander verwachsen, worauf sich neue Blätter nach vorne und hinten anlegen, so daß nun der Längendurchmesser wächst, und Quersurchen erscheinen und sich vervielfältigen (Meckel's Archiv I. S. 77—107. Serres I. p. 36—38, 115—119). Diese Entwicklung geht ziemlich rasch vor sich, so daß das kleine Hirn vor dem vierten Monate in Verhältniß zum großen Hirne seine größte Ausdehnung erhalten haben und dann wieder in der Ausbildung zurückbleiben soll (Döllinger S. 19). Gewiß ist es, daß in der Mitte der Schwangerschaft das kleine Hirn verhältnißmäßig am kleinsten; oder das Ubergewicht des großen Hirns über dasselbe am größten ist, und daß dies Ubergewicht in den spätern Monaten des Embryonallebens, so wie in den ersten Jahren der Kindheit, fortschreitend abnimmt, oder mit andern Worten, daß das kleine Hirn verhältnißmäßig stärker sich ausbildet, als das große Hirn. War das Verhältniß bey dem Embryo wie 1:24 bis 18, so wird es in den ersten Monaten nach der Geburt wie 1:17 bis 12, und ist bey dem Erwachsenen wie 1:6 oder 7. Dies letztere Verhältniß soll sich nach Wenzel's (*cerebr. p. 265* eg.) schon im dritten Lebensjahre feststellen. — In Hinsicht auf die Entwicklung des kleinen Hirns zeigt also das fortschreitende Lebensalter nicht das gleiche, sondern vielmehr das umgekehrte Verhältniß von der aufsteigenden Thierreihe: wenn es in dieser frühzeitig erscheint und im Ganzen mit der steigenden Entwicklung gegen das große Hirn mehr zurücktritt, so erscheint es dagegen in jenem spät, und nimmt in Verhältniß zum großen Hirne fortschreitend zu. In der aufsteigenden Thierreihe bekommt allmählig das große Hirn seine vollkommene Entwicklung und dadurch sein Ubergewicht über das kleine Hirn; in dem fortschreitenden Lebensalter aber nimmt sein anfängliches Ubergewicht allmählig ab, weil es sich früher entwickelt hat, als das kleine Hirn, welches nachwächst und erst spät sein höchstes Größenverhältniß erreicht. Wenn wir in der Thierreihe kein gleichmäßiges Fortschreiten der Proportion bemerken, so wird dies ebenfalls darauf beruhen, daß das kleine Hirn bald an sich mehr oder weniger entwickelt ist, bald in Verhältniß zur Entwicklungsstufe des großen Hirns mehr oder weniger zurücktritt.

§. 898. Das kleine Hirn hängt zunächst mit dem verlängerten Marke zusammen, und die Verwandtschaft heyder Organe spricht sich schon darin aus, daß sie in einem gemeinschaftlichen Wirbel des Schädels liegen, welcher nur schwache Spuren von Abgränzung zeigt. Das kleine Hirn ist aber eine höhere Entwicklung, welche bey fortschreitender Ausbildung in der Thierreihe wie im Lebensalter immer mehr das Ubergewicht

gewinnt. Das verlängerte Mark verhält sich dem Gewichte nach zum kleinen Hirne bey Fischen und Amphibien wie 110,2 bis 0,7, bey Vögeln wie 110,7 bis 2, bey Fledermäusen wie 111, bey Nagern und kleinen Raubthieren wie 117 bis 2, bey Wiederkäuern wie 112, bey Meerkatzen wie 115 (Trevisanus Biologie VI. 1. Tafel); und der Breite nach bey Fischen, Amphibien und Vögeln wie 110,5 bis 1; bey Nagern und kleinen Raubthieren wie 111, bis 1,9, bey grössern Raubthieren wie 111,8, bey Affen wie 112 bis 3, bey dem Menschen wie 114 oder 5 (Ebend. 2. Tafel. Tiedemann *icones* p. 52). — Eben so erlangt das kleine Hirn in der aufsteigenden Thierreihe allmählig das Uebergewicht über das Rückenmark, welches bey dem Menschen am grössten ist (Carus Gehirn S. 272). Daß übrigens beyde Organe in einem nähern Zusammenhange stehen, ergiebt sich unter Andern auch daraus, daß bey einköpfigen Doppelleibern ein doppeltes kleines Hirn und Rückenmark bey einem verschmolzenen grossen Hirne sich vorfindet (Sömmerring *de basi* p. 45).

§ 897. Wenn wir es als Grundsatz anerkennen dürfen, daß jeder Theil der Centralmasse durch die unter ihm liegenden Theile mit den daselbst wurzelnden Nerven und hierdurch mit dem übrigen Körper in näherer Verbindung steht, so muß auch das kleine Hirn zum verlängerten Marke und Rückenmarke und zu den Nerven beyder eine nähere Beziehung haben, als das große Hirn. Wie der Hirnstamm überhaupt in einer gewissen Unabhängigkeit von seinen Strahlungen besteht, so ist zwar die Thätigkeit der Nerven des verlängerten Marks durch das kleine Hirn nicht schlechthin bedingt, wie dies auch Zinn (Haller *Disp.* VII. p. 454) zu beweisen suchte, aber doch mit ihm in einem nähern Verkehr, als mit dem grossen Hirne. Da nun das verlängerte Mark überhaupt mehr Nervenenden enthält, als der Großhirnstamm und mit dem Rückenmarke unmittelbar zusammenhängt, so muß auch das kleine Hirn mit dem übrigen Körper in einer vielfältigern und stärkern Beziehung stehen. Namentlich muß dies von dem pflanzlichen Leben gelten, da die Nerven von Herz, Lungen und Magen theils unmittelbar im verlängerten Marke ihren Centralpunkt finden, theils, so wie die Nerven der übrigen Rumpfeingeweide mit den Rückenmarksnerven sich verbinden. Dies wird durch die allgemeine Erfahrung, daß Wunden des kleinen Hirns gefährlicher sind, als die des grossen Hirns, bestätigt (Morgagni *LII.* 26). Bohn, Vieussens (*Mé. I. c.* 20. p. 123); Ridley, Perrault (*mécanique des animaux* II. p. 403), Lorry (*mém. prés.* III. p. 344), Schultz (Haller *disp.* III. p. 655) sehen, daß Thiere nach Zerstörung des kleinen Hirns auf der Stelle starben. In andern Fällen erfolgte der Tod etwas später, nämlich auf gänzliche Wegnahme des kleinen Hirns bey einem Hunde nach einigen Minuten (Zinn in Haller *disp.* VII. p. 426), bey einem andern erst nach 24 Stunden (Chirac, in *philosoph. transact.* Nr. 226. p. 461), bey einer Katze nach 7 Minuten (Lorry in *Mém. prés.* III. p. 363. sq.), bey Schafen und Schweinen nach kurzer Zeit (Rolando p. 44), bey einer Schildkröte nach 12 Stunden, bey einer andern nach 2 Monaten, bey einer Ratte nach 5 Tagen (ebend. p. 47); Ferner auf Wegnahme eines Theils vom kleinen Hirne bey Hunden nach einer Viertelstunde (Lorry a. a. O. p. 362) oder nach 3 oder 6 Stunden (Petit) oder am andern Tage (Saucerotte in *précis de chir.* X. p. 344); auf Zerquetschung nach einigen Minuten (Zinn a. a. O. p. 448); auf Zerschneidung in verschiedenen Richtungen bey einer Ziege nach

24 Stunden (Rolando p. 44) auf Durchschneidung in der Mittellinie bey einem Hunde nach 2 Stunden (Saurerotte d. A. O.); auf Durchstechung bey Hunden nach 5 Minuten (Kauw *impetum faciens* §. 366. 2.), oder nach 2, 4 oder 8 Tagen (*Médec de la Touche* *écrits des Leçons de la mort* p. 80—88). Eben so starben Menschen auf Verwundung des kleinen Hirns nach 2 Tagen (Petit, *Questions in acad. de chir.* II. p. 136), nach 4 Tagen (Bower *repercutio* obs. 8. §. 8.), nach 6 Tagen (Tulpins *lib. I. c. 2. p. 3. 397.*), nach 11 Tagen (Monteggia in *Romer'sylloge opuscul.* I. Nr. 3) u. s. w. Alle leichtere Wunden des kleinen Hirns auch mit Substanzverlust nicht schlechthin unheilbar sind, versteht sich von selbst, und ist durch die von Le Maire (Platner *abstr.* §. 547. p. 344), La Motte (*chir.* II. p. 322), Evans (Harles neues Journ. d. anal. Lit. VI. 1. St. S. 191) und Andern beobachteten Fälle bestätigt worden: — Wenn aus diesen Beobachtungen und jenen Betrachtungen nur so viel sich ergibt, daß das kleine Hirn in Verhältniß zum großen Hirne eine nähere Beziehung zu dem leblichen Leben hat, so war es zu weit gegangen, wenn Willis annahm, daß es ausschließlicly die plastischen oder unwillkürlichen Functionen bestimme. Er führte für seine Meynung an 1) daß es nicht so freye Windungen, wie das große Hirn, sondern gleichförmige regelmässige Blätter, in welchen die Lebensgeister nach einem bestimmten Gesetze, wie in einem Automate wirken müßten; 2) daß der fünfte und sechste Nerve als Wurzeln des *Sympathicus*, und der zehnte Nerve von ihm entspringen; 3) daß es bey allen Thieren fast gleich gebildet ist, also auch gleiche Functionen, nämlich für die Eingeweide, Lungen und Herz haben müsse; 4) daß bey häufigen Ohnmaechten Schmerzen im Hinterhaupte entstehen (*cerebr.* c. 15. p. 73). Es soll die thierischen Geister, welche in seiner Rinde sich bilden und in seinem Marklager sich sammeln (p. 76) anhaltend und gleichförmig an die Eingeweide verbreiten, von denselben Eindrücke bekommen, den Sitz des Gefühls der körperlichen Verhältnisse abgeben, und bewußlos auf Herzschlag und Athmen zurückwirken; würden aber die Eindrücke durch die Bindearme dem großen Hirne mitgetheilt, so werde die Begierhung und der Instinct geweckt, dadurch aber willkürliche Bewegung erregt (c. 16. p. 78). Boerhaave (*Haller elem.* I. p. 475) und Lorry (a. a. O. p. 344) trugen der Meynung bey, daß die Vitafunctionen vom kleinen Hirne abhängen, indem sie sich vorzüglich darauf stützen, daß dasselbe dichter in seinem Gewebe, ohne Höhlen und fester verwahrt sey, auch in den Bewegungen des Gehirns keinen Antheil nehme, also überhaupt weniger Veränderungen erfahre und sich mehr gleich bleibe, mithin dem Charakter jener Functionen entspreche. Ridley (p. 159. 167) beruhte sich vorzüglich darauf, daß bey der Verletzung desselben Herzschlag und Athmen aufgehoben würden. Ackermann (*neru. syst.* p. 97. 115) erklärte es für das Werkzeug zu Erregung des Lebensprocesses in den automatischen Organen, den sympathischen und fünften Nerven aber für seine Wurzeln. Nach Döllinger (S. 18) soll die Höhle des kleinen Hirns für das anatomische Leben bestimmt seyn. Eschenmayer (Psychologie S. 206) beweiset dieselbe Ansicht daraus, daß das kleine Hirn zum großen Hirne bey dem Menschen sich verhält wie 1:8. Nämlich die Gröndzahl der physischen Natur ist 1, die der organischen 2, und die der geistigen 3; die physische Ordnung hat lauter Wurzelfunctionen, die organische quadrende, die geistige cubirende; nun verhält sich das kleine Hirn zum gro-

Isa wie Natur zum Geiste; also wie die arithmetische Wurzel der organischen Grundzahl (2) d. i. 1, zum Cubus von 2, d. i. 8. — Ueber die Triffligkeit dieser verschiedenen Gründe bedarf es keiner weitem Bemerkungen. Es ist klar, daß jener Ansicht etwas Wahres zum Grunde liegt, daß das kleine Hirn, verglichen mit dem großen Hirne, in einer nähern, aber, verglichen mit dem verlängerten Marke, in einer entferntern Beziehung zum plastischen Leben des Rumpfes steht, und daß es weder unbedingt diese Functionen bestimmt, noch auch seine ganze Wirkksamkeit darauf beschränkt ist.

§. 898. Der Zusammenhang mit dem plastischen Leben überhaupt zeigt sich in den Krankheitsverhältnissen. Unter 20 Fällen von Attergebilden im kleinen Hirne waren 6 (Nr. 944, 946, 948, 949, 950, 995), wo eine akrophulöse Diathese Statt fand, und 3 (Nr. 924, 942, 945), wo das Uebel nach Unterdrückung der Ausdünstung oder eines Anschlages oder der Hämorrhoiden entstanden war; Eben so wird die Ernährung durch Abnormitäten des kleinen Hirns viel häufiger gestört, als durch die des großen; das Verhältniß ist hey Janem wie 1:14, bey Diesem wie 1:58.

§. 899. Das kleine Hirn kann mittelbar einen Einfluß auf den Herzschlag ausüben: Wenn es hey Hundem mit Höllenstein geätzt wurde, erfolgte Beschleunigung des Herzschlags (Foville p. 20). Dagegen dauerte dieser, noch mehrere Stunden, wiewohl schwach, fort, wenn Jenes mit einem Trocker durchbohrt (Zinn a. a. O. p. 446), und einige Minuten lang, wenn es ganz herausgenommen worden war (cheud. p. 426 und Ens in Haller *disp.* II. p. 409). — Nach Nassé (Horn's Archiv 1821 S. 492) ist der Puls hey Abnormitäten im kleinen Hirne meist nicht gestört, und mehr bey denen in der Brücke verlangsamt (Leichenöffnungen S. 62. zu Atherosclerose S. 87); indessen wird er bey Blutergießungen im kleinen Hirne zuweilen klein und aussetzend (Morgagni III. 24.). Uebrigens scheint es, als ob das Blut stärker auf das kleine Hirn wirkte; wenigstens kommen Blutergießungen in diesem häufiger (1:6), als im großen Hirne (1:17) vor.

§. 900. Mit der Respiration verhält es sich ziemlich eben so. Sie dauerte in Zinn's (a. a. O.) Versuchen, einige Stunden, fort, nachdem das kleine Hirn mit einem Trocker durchbohrt war, und einige Minuten, nachdem es ganz weggenommen war; auch sah Serres (Magendie *Journ.* III. p. 149) keine Störung derselben, da er die eine Hemisphäre zerschnitt hatte. Dagegen üben seine Abnormitäten zuweilen einen Einfluß auf das Athmen aus, jedoch nach der XXXV. Tabelle etwas seltner ($\approx 1:25$), als die des großen Hirns ($\approx 1:21$). Wenn daher nach Serres (a. a. O. p. 137), bey einem Extravasate in der Gegend des kleinen Hirns der Tod, wie bey der Strangulation, mit allen Symptomen acuter Asphyxie erfolgt, so scheint dies mehr von der Affection des verlängerten Marks abzuhängen. — Daß das kleine Hirn hey Fischen mehr, bey Amphibien weniger, als das große Hirn entwickelt ist, bezieht Meckel (Archiv I. S. 366. fgg.) auf die stärkere Entwicklung von Kreislauf und Athmen bey Jenen, und von Muskeln und Knochen hey Diesen. Diese Parallele ist, aber, wohl zu, vag, als daß wir sie annehmen könnten.

§. 901. Schwarz (Haller *disp.* I. p. 313) sah besonders, wenn das kleine Hirn bey Hundem gestochen oder gedrückt wurde, antiperistaltische Bewegungen des Magens entstehen. Bey seinen Abnormitäten entstand, nach der XXXV. Tabelle, Verstopfung viel

häufiger, unwillkürliche Ausleerung ebenfalls häufiger, Erbrechen nur etwas häufiger, gastrischer Zustand seltner, und Durchfall viel seltner, als bey denen des großen Hirns. Die Verdauung überhaupt steht in einer nähern Beziehung zum großen, als zum kleinen Hirne. Bey vollem Magen hat nach Flourens (p. 129) die Verletzung des großen Hirns eher, als die des kleinen Hirns, den Tod zur Folge; und die Verdauung wird durch Wegnahme des großen Hirns verlangsamt, durch die des kleinen Hirns mehr beschleunigt.

§. 902. Wenn nach der XXXIV. Tabelle eine Affection der Harnorgane bey Abnormitäten des kleinen Hirns viel häufiger (1:29), als bey denen des großen Hirns (1:66) vorkommt, so ist in Betreff der Geschlechtstheile die Differenz ungleich größer, indem die Affection derselben unter 17 Fällen von Abnormität des kleinen Hirns, und unter 332 Fällen von Abnormität des großen Hirns einmal vorkam. Dies ist um so merkwürdiger, da nach diesen Berechnungen das kleine Hirn viel häufiger, als das verlängerte Mark, (1:31) auf die Genitalien wirkt, während die Abnormität des Letztern Störungen des Athmens, der Verdauung und des Harnens häufiger erregt, als die des kleinen Hirns. — Gall fand bey starkem Geschlechtstribe auch das kleine Hirn stark entwickelt; was durch die Erfahrung nicht selten bestätigt wird. Seipaut (*misc. nat. cur. Dec. I. ann. 2. obs. 104. p. 177*) beobachtete einen Fall, wo nach einer Verwundung am Hinterhaupte sowohl die Turgescenz, als auch der Geschlechtstrieb erlosch, und führte die alte Meynung an, daß häufige Blutausleerungen, hinter den Ohren angestellt, Unfruchtbarkeit nach sich zögen, und den schmerzweise gemachten Vorschlag, den Dämon die Ohren abzuschneiden, damit sie sich nicht fortplanzen könnten, wie denn auch in unsern Zeiten Ferrand das Ansetzen von Blutegeln am Nacken und hinter den Ohren bey der Erotomanie rühmt (Georg. *syphac. nervos. II. p. 164*). Fabricius (*cent. VI. obs. 59*) beobachtete Impotenz nach einem Schlage auf den Kopf, welcher zugleich Taubheit zur Folge hatte, so wie auch einen Priapismus nach Verletzung des Schlafmuskels. Larrey (*med. chir. Denkwürdigk. Leipzig 1813 S. 216*) erzählt, daß ein Mann durch eine Wunde am Hinterhaupte das Zeugungsvermögen verlor. Die Beobachtung Homö's (*phil. transact. 1821*), wo eine Satyrasis bey Depression am Stirnhirne entstand und nach Hebung derselben sich verlor, könnte vielleicht auf einer antagonistischen Reizung des kleinen Hirns beruht haben. Wichtiger ist es aber, daß man bey Abnormitäten, die ohne äussere Gewalt im kleinen Hirne entstanden waren, häufig über norme Zustände der Geschlechtsorgane bemerkt hat. In mehreren Fällen (Nr. 142 bis 147), wo während eines apoplektischen Zustandes die Zeugungstheile eine erhöhte Temperatur hatten und eine Erection Statt fand, die zum Theil mit Pollutionen verbunden war und selbst nach dem Tode fortanerte, fand man Blut im kleinen Hirne ergossen, und Serres stellte diese, noch am Leichname bestehende Erection, als das charakteristische Kennzeichen der *apoplexia cerebelli* auf (Magendie *Journal III p. 114—117*). Vielleicht gehört hierher der von Lancisi (*de cubic. mort. p. 207*) beobachtete Fall, wo nach einem apoplektischen Tode Congestion im Gehirne eine seröse Ergießung daselbst, die sich bis in den Rückenmarksanal erstreckte, und Erection gefunden wurde. Bey einer Entzündung des kleinen Hirns mit seröser Ergießung (Nr. 303) beobachtete Dugliss ein Priapismus. Bey 2 Vögeln, welche plötzlich gestor-

ben waren, fand Heusinger (Meckel's Archiv VI. S. 551) die Hoden angeschwollen, entzündet, von Saamen strotzend und Blutergießung am kleinen Hirne. Bey Eiterung (Nr. 429) und Atrophie (Nr. 654) des kleinen Hirns fand Atrophie der Hoden Statt. Bey sehr wollüstigen und anschwefelichen Menschen beobachtete man Blutergießung (Nr. 443, 147), Eiterung (Nr. 431), Verhärtung (Nr. 846) und Aftergebilde (Nr. 952) im kleinen Hirne. Bey einigen dieser Kranken (Nr. 122, 167) trat die Apoplexie während oder nach einer Begattung ein, und bey einem Aftergebilde im kleinen Hirne (Nr. 929) starb der Kranke, nachdem er in der Nacht vorher noch sich begattet hatte. Bey einer Frau, welche 3 Tage nach der Niederkunft die Milch verloren hatte und in Delirium verfallen war, fand Bang (Kopenhagener Abhh. S. 321) Congestion im kleinen Hirne. Rahn (Ludwig script. neurop. IV, p. 276) beobachtete, daß eine Frau, die an einem Geschwür im Uterus litt, Schmerzen im Hinterhaupte und Krampf im Nacken bekam, so oft sich neuer Eiter angesammelt hatte, und Selle (*medicina clinica* S. 391) stellte dies als eine allgemeine Befahrung auf. Georget (*systeme nerveux* II, p. 364) beobachtete eine Nymphomanie, bey welcher die Anfälle mit einem heftigen Schmerz im Nacken eintraten, welcher unmittelbar nach der Masturbation aufhörte. — Die Hälfte der Kranken, bey welchen Aftergebilde im kleinen Hirne gefunden wurden, hatte noch nicht das zwanzigste Jahr erreicht, und wir dürfen wohl fragen, ob sich dies nicht auf die Entwicklung der Pubertät bezieht? Auch wäre wohl zu untersuchen, ob der Mangel des Geschlechtstribs (Nr. 342, 346, 389) oder die zu starke Wirksamkeit desselben (Nr. 394, 398), bey Hirnwassersucht mit der Affection oder Integrität des kleinen Hirns zusammenhängt? In einem Falle (Nr. 388), wo es besonders fest gefunden wurde, waren die Geschlechtstheile nur schwach entwickelt. — Zum Theil läßt sich das Verhältniß des kleinen Hirns in der Thierreihe in Beziehung auf die Geschlechtsfunctionen deuten. Wenn es bey den Fischen stärker entwickelt ist, als bey den Amphibien, so bezieht sich dies vielleicht darauf, daß Jene durch eine überschwängliche Fruchtbarkeit und sehr stark entwickelte innere Geschlechtsorgane sich auszeichnen. Und wenn es bey den Vögeln das entschiedenste Uebergewicht hat, so kann dies einen Zusammenhang haben mit dem anhaltenden Zusammenleben beyder Geschlechter, mit der Heftigkeit der Brunst, mit dem Instincte des Nesterbauens und Brütens. Wenn es bey den Nagethieren in Verhältniß zum großen Hirne sehr stark, bey den Affen aber an sich mehr entwickelt ist, als bey andern Thieren, so kann dies Bezug haben auf die größere Fruchtbarkeit der Erstern und auf die Geilheit der Letztern. Nach Gall (*systeme* I, p. 268) soll bey Menschen und Thieren das kleine Hirn männlicher Individuen größer seyn, als das der weiblichen; die Angabe von Treviranus (VI. Bd. 1. Tafel. S. 83), in Beziehung auf Hahn und Henne, bestätigt diese Behauptung nicht.

§. 903. Es fragt sich nun, wie wir die obigen Erfahrungen wohl zu deuten haben? Gall erklärt das kleine Hirn geradezu für das Organ des Geschlechtstribs. Versteht er darunter denjenigen Punct des Seelenorgans, welcher mehr als alle andre mit den Geschlechtsfunctionen in Beziehung steht, und räumt er ein, daß dies Organ ausserdem noch andre Functionen hat, so sind wir ganz mit ihm einverstanden. Wie das leibliche Leben überhaupt einen allgemeinen Gegensatz zum gesammten Hirnleben bildet, so

müssen auch die einzelnen leiblichen Functionen in einem besondern Gegensatze zur Thätigkeit einzelner Hirntheile stehn, d. h. jede derselben muß nach dem Gesetze der Polarität mit einem bestimmten Hirntheile näher verwandt seyn, als mit dem übrigen, oder, was dasselbe sagt, in Consensus mit ihm stehn. Namentlich muß dies gelten von denjenigen leiblichen Functionen, welche nur durch die unmittelbare Mitwirkung des pflanzlichen oder psychischen Hirnlebens zu Stande gebracht werden können, nämlich von Athmung, Ernährung und Fortpflanzung. Die Organe dieser Functionen wirken auf bestimmte Hirntheile, machen einen ihrem Zustande entsprechenden Eindruck auf sie, welcher zunächst im Gefühle, dann aber auch in der Vorstellung zur Anschauung gebracht wird; und nachdem er so der Seele eine bestimmte Richtung gegeben hat, eine entsprechende Reaction, zuerst im bewußtlosen Triebe, sodann in der Willkühr erregt, welche nun für die Vollziehung der Function einwirkt. Alles überzeugt uns aber, daß das Leben nirgends von einem bestimmten Punkte ausgeht, sondern, weil es auf einem ideellen Grunde beruht, im Ganzen wirkt, daß es eine Mannichfaltigkeit organischer Kräfte und Gebilde entwickelt, welche, da sie in einem gemeinsamen Gedanken wurzeln oder durch eine prästabilierte Harmonie verbunden sind, theils einander gegenseitig erregen, theils zu dem gemeinsamen Zwecke einer Function sich vereinigen, theils endlich auch einzeln mit einer gewissen Selbstständigkeit auf diese Function einwirken. So entfaltet sich denn ausser der Kraft und den Organen des Athmens, der Ernährung und der Fortpflanzung im Rumpfe, auch der Trieb dazu im Gehirne. Dieser Trieb wird durch den Einfluß jener Organe geweckt, und bringt ihre Functionen, zu welchen er als das psychische Moment hinzutritt, zu Stande; aber er äussert sich auch mit einer gewissen Unabhängigkeit von den leiblichen Organen: der abgeschnittne Kopf macht Athmungsbewegungen ohne Lungen, und Ernährungsbewegungen ohne Mogen, und der Geschlechtstrieb äussert sich, vor der Entwicklung der Geschlechtstheile und nach dem Abwelken derselben, zeigt sich also unabhängig von der materiellen Kraft. Wir haben (§. 876. 881.) gesehen, daß das psychische Moment des Athmens im verlängerten Marke enthalten ist; den psychischen Gegensatz zu den Harn- und Geschlechtsorganen bildet das kleine Hirn. Diese Organe stehn im entschiedensten Gegensatze zum Gehirne überhaupt: sie gehn, wie dieser, an den entgegengesetzten Endpunkten über den Rumpf hinaus, und drücken schon dadurch ihre Polarität aus, welche in den Functionen noch deutlicher hervortritt, indem in ihnen die materielle Egestion und die leibliche Bildung, im Gehirne hingegen die dynamische Ingestion (Sensation) und die innerliche Bildung (Vorstellung) ihren Gipfel erreicht. Die Geschlechtsfunctionen zeigen sich aber in ihrem organischen Apparate, so wie in ihrem Producte und ihrem Zwecke viel höher stehend, als die Harnfunction, und hat daher eine ungleich innigere Beziehung zum psychischen Leben, und somit zum Gehirne. Diese Beziehung wird nun nicht durch einzelne Nerven, wie beym Athmen, sondern durch das gesammte Rückenmark vermittelt. Dieses ist gleichsam als der Gesamtnerve der Genitalien zu betrachten, welcher die von ihnen empfangenen Eindrücke auf das Gehirn überträgt, und den von diesem erhaltenen Impuls auf sie fortpflanzt. Dieser Totalnerv kann nun seinen centralen Endpunkt nicht im Hirnstamme finden, weil er diesem selbst schon gleich ist und keinen entschiedenen Gegensatz zu ihm bildet, sondern

nur in einer Strahlung, in welche derselbe übergeht und worin er sich endigt. Nun ist vom Rückenmarke aus die erste Strahlung das kleine Hirn: dies wird also den stärksten Gegensatz zu den Geschlechtstheilen abgeben und das psychische Moment für die Geschlechtsfunctionen enthalten. So wenig aber das verlängerte Mark bloß auf das Athmen sich bezieht, eben so wenig wird das kleine Hirn, welches $\frac{1}{10}$ des ganzen Seelenorgans ausmacht, weiter nichts, als das Organ des Geschlechtsgefühls und des Geschlechtstribs seyn; es muß vielmehr eine allgemeinere Bedeutung haben, welche diese besondre Beziehung in sich begreift, und zu deren Erkenntniß wir durch Auffassung der einzelnen Momente fortschreiten.

§. 904. Was die Eigenthümlichkeit des kleinen Hirns in Hinsicht auf seine Plasticität betrifft, so sehen wir aus der I. Tabelle zuvörderst, daß dasselbe seltner von Abnormitäten ergriffen wird, als das große Hirn. Dies kann von dem Größenverhältnisse abhängen, indem mit der kleinern Masse auch weniger Raum zu möglichen Abnormitäten gegeben wird. Ist dies der Fall, so erkrankt auf einer gleich großen Fläche das kleine Hirn häufiger, als das große Hirn, indem es sich zu diesem der Masse nach wie 1:9, der Frequenz der Krankheiten nach aber wie 1:5 verhält. Dann werden wir also dem kleinen Hirne eine größere Geneigtheit zu plastischen Abnormitäten zuschreiben müssen. Das Gegentheil würde Statt finden, wenn das Größenverhältniß keinen Einfluß hätte. — Unter einer gleich großen Zahl von Abnormitäten des großen und kleinen Hirns kommen in diesem viel häufiger vor erdige Concremente und Atergebilde, sowohl in der Substanz, als an den Häuten; geringer ist die überwiegende Häufigkeit der Erweichung, der Atrophie und der Verhärtung; am geringsten die der Blutergießung und der Eiterung. Dagegen ist am großen Hirne häufiger die Verwachsung und Verdickung der Häute, noch mehr die seröse Ergießung und die Hydatidenbildung, und am meisten die Entstehung von Höhlungen. Sonach ist denn das kleine Hirn mehr zu chronischen Degenerationen geneigt, das große Hirn aber mehr zu den unmittelbar auf den entzündlichen Zustand folgenden Abnormitäten, ferner zu abnormer Wasserbildung und zum Zurückbleiben von Höhlungen nach innern Blutungen, und da diese Höhlungen durch Resorption und Regeneration entstehen, so scheinen auch diese Lebensthätigkeiten im großen Hirne stärker zu seyn. Ueberhaupt also scheint in diesem die Activität des Bildungsprocesses mehr hervorzutreten, als in jenem. — Bey dem kleinen Hirne ist die Substanz viel häufiger der Sitz der Abnormitäten, als die Oberfläche, während bey dem großen Hirne in Betreff der Eiterung und der Atergebilde der Unterschied nicht so groß ist, die Blutergießung aber häufiger an der Oberfläche, als in der Substanz vorkommt. Somit scheint es, als ob verhältnißmäßig am kleinen Hirne die Substanz, und am großen Hirne die Oberfläche das Veränderlichere wäre.

§. 905. Was das Gemeingefühl betrifft, so scheint nach den an Thieren angestellten Versuchen (Saucerotte in *prix de chir.* X. p. 344. Foyille p. 19. 21. 22. 24) die Verletzung des kleinen Hirns entweder keine heftigen oder keine anhaltenden Schmerzen, doch mehr, als die des großen Hirns, zu erregen. Bey seinen Abnormitäten (siehe XXXV. Tabelle) ist auch der Schmerz das gewöhnlichste Symptom, während es bey denen des großen Hirns die Betäubung ist, doch erregen die, des Letztern nach derselben Tabelle

noch häufiger Schmerzen, als die des kleinen Hirns. Sie sind in diesem anfangs mehr verbreitet, fixiren sich dann, werden drückend und bohrend, nehmen bey der Bewegung zu, und werden bald durch Beugung des Kopfs nach vorne erleichtert und bey aufrechter Stellung heftiger, bald durch das Bücken verstärkt und durch die Rückenlage erleichtert. Sie sind oft periodisch, in andern Fällen dauern sie unausgesetzt fort, und bewirken eine bleibende Niederdrückung des Gemüths, oder werden unerträglich. Oft haben sie ihren Sitz im Hinterhaupte und Nacken (Nr. 415. 417. 922. 924. 943. 946. 953), oft aber auch in der Stirne (§. 1045.) — Seltner tritt Schwindel ein, doch nach der XXXV. Tabelle etwas häufiger, als bey Abnormitäten des großen Hirns.

§. 905. Das kleine Hirn steht in einer nähern Verbindung mit dem Rückenmarke; als das große Hirn, und ist durch seine Arterien mit den Gliedmaßen, das große hingegen mit dem Antlitze und seinen Sinnesorganen verknüpft; sein Schädelheil hat die stärkste Knochenmasse, ist von Muskeln umlagert, giebt die Gelenkverbindung mit der Wirbelsäule, und in dem Zitzenfortsatze den stärksten Hebel zu den Bewegungen des Kopfs. Wir dürfen also vermuthen, daß es in einer nähern Beziehung zur Bewegung, namentlich der Gliedmaßen steht. In der That sehen wir (XXXV. Tabelle), daß bey seinen Abnormitäten nächst dem Schmerze am häufigsten, und häufiger als bey denen des großen Hirns, kramphafte Zufälle erfolgen. Diese äussern sich zuerst als stete Bewegungen der Gliedmaßen (Nr. 87. 929); so sah Saucerotte (*prix de chir.* X, p. 347) bey einem Hunde, welchem er den Wurm durchbohrt hatte, die Glieder enthaltend in Bewegung, wie zum Kratzen. Es erfolgt ferner ein Zittern der Gliedmaßen (Nr. 397. 418. 930), und bey stärkerer Affection treten Zuckungen, Convulsionen, epileptische Anfälle oder tonische Krämpfe ein. Saucerotte (a. a. O. p. 348), Lorry (*mém. prés.* III, p. 358. 362), Zinn (*Heller disp.* VII, p. 447 sq.), Foville (p. 19. 20. 22. 23. 24) und Andre sahen, wenn sie bey Thieren das kleine Hirn verletzten, Convulsionen eintreten. — Eben so tritt bey seinen Abnormitäten auch die Lähmung stänlich oft, und zum Theil häufiger, als bey denen des großen Hirns, ein.

§. 907. Mondini (fol. 428) erklärte das Gehirn für den Ursprung des Rückenmarks und der Bewegungsnerven; Varoli (p. 37) hingegen nahm sinnvoller an, wie im großen Hirne die Empfindung und der Sinn, so sey im kleinen Hirne die Beziehung zur Bewegung vorwaltend. Eben so behauptete Walker (Thomson's *annals of philosophy*; 1815. April), das große Hirn sey das Organ der Empfindung und des Verstandes, das kleine Hirn das des Willens, wie denn auch die Breite desselben der Stärke des Willens entspreche. Walther (Physiologie II. S. 348) erklärte es für das Organ der thierischen Triebe. Garus (Gehirn S. 106) meynt, das Rückenmark, als die dem Bewegungssysteme entsprechende Centralmasse verhalte sich zum Gehirne wie ein Nerve, müsse daher auch ein Ganglion heben, und dies sey das kleine Hirn (S. 288. 306), welches denn auch in Uebereinstimmung mit den Bewegungsgliedern stehe, und dessen Größe der des ganzen Körpers und besonders der Gliedmaßen entspreche. Rolendo (p. 44 — 48) hält es auch für das Organ, welches die willkührliche Ortsbewegung bestimmt; er sah nämlich, daß Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und Schildkröten nach seiner Zerstörung gelähmt waren und sich nicht von der Stelle bewegten, und Fische nicht mehr schwimmen konn-

ten, sondern im Wasser untersanken. Grohmann (Nasse Zeitschrift 1822. 3. St. S. 37) nimmt an, das verlängerte Mark sey für die Plasticität, das kleine Hirn für Terribilität und Willen, und das große Hirn für die zur Geistigkeit gesteigerte Empfindung bestimmt. — Man sieht aber, daß diese Behauptungen einseitig sind, indem sie das, was bloß relative Gültigkeit hat, als schlechthin geltend aufstellen. Nicht zu erwähnen, daß, wenn wir das Rückenmark mit einem Nerven vergleichen, wie auch das ganze Gehirn als sein Ganglion betrachten müssen, so sprechen auch mancherley Erfahrungen gegen jene uneingeschränkten Annahmen. 1) Rolando (p. 45. 47) selbst sah nach Entfernung des kleinen Hirns zuweilen noch Bewegungen, behauptete aber, sie seyen unsicher und nicht eigentlich willkürlich gewesen, oder es sey noch ein Theil des kleinen Hirns unbeschädigt geblieben. Lorry (*mém. prés III* p. 371) sah bey einer Taube nach Wegnahme des kleinen Hirns keine Symptome und erst nach Durchschneidung des verlängerten Marks Krämpfe; eine andre (p. 363), bey welcher er es bloß mit einer starken Nadel durchstochen hatte, wankte anfänglich, machte sich aber dann los und flog davon. Ein Hund, welchem Zinn (*Haller disp. VII*, p. 445) den Trocar quer durch das kleine Hirn gestoßen hatte, war anfangs betäubt, aber am folgenden Tage munter; ein anderer (p. 446), bey welchem er es von hinten nach vorne durchbohrt hatte, war etwas betäubt, hatte aber noch Empfindung und Bewegung. 2) Zwar geht Nasse (*Horn's Archiv* 1821. S. 414. 417. Leichenöffnungen S. 53. 57. zu Abercrombie S. 77) zu weit, wenn er behauptet, die Abnormitäten des kleinen Hirns verursachten seltener Lähmung oder Zuckungen, als die des großen Hirns, diese Zufälle seyen nicht begleitet, erfolgen erst spät und scheinen selbst bloß von gleichzeitiger Affection des großen Hirns abzuhängen. Aber soviel ist gewiß, daß die Abnormitäten des kleinen Hirns beynahe eben so oft die Bewegung ungestört lassen, als sie stören. Unter 107 Fällen zählte ich 14 mit Convulsionen und Lähmung, 21 mit Lähmung allein, 27 mit Convulsionen allein, und 45 ohne Convulsionen und ohne Lähmung. Rechnen wir nun noch hinzu, daß oft Abnormitäten des großen Hirns bey vollkommener Normalität des kleinen Hirns die Bewegung stören, so können wir Letzteres unmöglich für das wesentliche Organ der willkürlichen Bewegung halten, sondern ihm nur vergleichungsweise einen größern Einfluß auf dieselbe estakumen. 3) Die Entwicklung des kleinen Hirns in der Thierreihe trifft zwar in einigen, aber nicht in allen Punkten mit der Ausbildung der Iratabilität zusammen: sie stimmt nicht immer überein mit der Gliederbildung, denn sie ist bey Fröschen ungleich unvollkommener, als bey den Fischen; eben so mit der Beweglichkeit, denn sie ist bey Schlangen viel unvollkommener, als bey den Schildkröten; derselbe Fall ist es mit der Muskelkraft, denn das kleine Hirn ist bey den Nagethieren verhältnißmäßig größer, und bey den Affen an sich mehr ausgebildet, als bey den größern Raubthieren.

§. 908. Der Einfluß, welchen die Zerstörung des großen Hirns bey Integrität des kleinen Hirns, und die Zerstörung des Letztern bey Integrität des Erstem auf die Verhältnisse der Bewegung ausübt, zeigt uns die wesentliche Verschiedenheit beyder Organe in dieser Beziehung. Eine Taube, welcher Zinn (*Haller. Disp. VII* p. 425) das große Hirn genommen hatte, ohne das kleine Hirn zu verletzen, konnte stehen und das ihr in den Schnabel gesteckte Futter verschlucken. Hühner und Tauben, welchen Spurzheim einen Theil des großen Hirns genommen hatte, nahmen freywillig kein Futter, verschluck-

ten es aber, wenn es ihnen in den Schnabel gebracht wurde. Ein Huhn, welchem Robando § des großen Hirnmarks abgeschnitten hatte, suchte zwar noch Futter, aber die Richtung der Bewegung war unsicher, und es pickte oft fehl; andre standen nach Abschnidung der Hemisphären des großen Hirns unbeweglich wie Bildsäulen, hielten sich aber aufrecht im Gleichgewichte, wenn sie gestößen wurden, und machten deshalb einige Schritte, verschluckten auch das ihnen in den Mund gesteckte Brod; eine Schildkröte, welcher eine Hemisphäre genommen worden war, bewegte sich nur selten und bey starker Reizung; eine andre, welche beyde Hemisphären verloren hatte, schwamm etwas, setzte sich dann auf den Boden und blieb unbeweglich; zog man sie herauf, so schwamm sie etwas, und sank dann wieder unter; ein Hey, zu welchem dieselbe Operation gemacht worden war, entfloß, verborg sich hinter einem Steine, und blieb daselbst unbeweglich, so lange er nicht gereizt wurde. Tauben, welche Flourens eben so behandelte, standen aufrecht, bewegten sich nicht von freyen Stücken, brachten sich aber bey jeder Lage für das Gleichgewicht, gingen, wenn man sie stieß; flogen, wenn man sie in die Luft warf; richteten sich auf, wenn man sie auf den Rücken legte; bewegten sich, wenn man sie stach, aber unzweckmäßig und ohne fliehn zu können; schluckten das in den Schnabel gebrachte Wasser (p. 30. 334). Meerschweinchen bewegten sich nicht freywillig, aber gingen und sprangen, wenn man sie reizte (p. 52). Dasselbe war der Fall bey Hühnern, welche die Verwundung mehrere Monate überlebten: sie schüttelten sich, putzten sich mit dem Schnabel, gingen herum, aber ohne Zweck und ohne einem Hindernisse ausweichen zu wollen; sie tasteten nicht, bemerkten nicht das Futter, welches man ihnen dicht vorhielt, äusserten keinen Trieb sich zu nähren, wenn man sie Tage lang hungern ließ, und wären verhungert, wenn man ihnen das Futter nicht in den Rachen gesteckt hätte, verschluckten dann aber Alles ohne Unterschied (p. 87 — 90. 125). Nachwürfe hörten auf zu geborn; Käuze, die vorher sehr wild gewesen waren, suchten weder sich zu vertheidigen, noch zu entfliehn (p. 132). Nach Wegnahme des kleinen Hirns zeigten die Thiere ebenfalls noch Gemeingefühl und Bewegungskraft, aber das Vermögen, der Bewegung eine zweckmäßige Richtung zu geben, war noch mehr geschwächt, und das Bewußtseyn dagegen weniger gestört: Tauben erkannten, daß sie von einem Schläge bedroht wurden, und bewegten sich, aber konnten ihm nicht ausweichen; sie konnten trotz allen Bewegungen sich nicht aufrecht halten, nicht gehen, nicht fliegen, noch, wenn sie auf den Rücken gelegt waren, sich aufrichten (p. 36).r eben so Meerschweinchen (p. 51); Hühner bemerkten die vor ihnen liegenden Körner, bemühten sich, sie mit dem Schnabel zu fassen, pickten aber fehl. Flourens schließt aus diesen Beobachtungen: im großen Hirne wirke ausser der Sensation bloß der Wille, das kleine Hirn hingegen ordne bloß die Bewegung, und gebe derselben ihre Zweckmäßigkeit. Auf den ersten Anblick scheint diese Behauptung paradox, denn der Wille ist ja eben nichts Andres, als die einer Vorstellung entsprechende, einem Zwecke angemessene Richtung oder Ordnung der Bewegungen. Allein bey näherer Erwägung finden wir einen verständigen Sinn in jener Behauptung, indem wir bedenken, daß der Wille selbst auf Bewußtseyn beruht; die Wirkung desselben auf bestimmte Muskeln aber durch eine bewußtlose Thätigkeit erfolgt. Die unwillkürlichen Bewegungen sind auch zweckmäßig, aber nicht anders, als die pflanz-

chen Thätigkeiten, Kreislauf, Absonderung u. s. w. ihr Zweck liegt nicht im Gedanken des Individuums, sondern in dem Gedanken des an dem Individuum sich verwirklichenden allgemeinen Lebens. Die Thiere, welchen Flourens das große Hirn genommen hatte, bewegten die Gliedmaßen nicht mehr willkürlich, durch Sinnesthätigkeit und Vorstellung bestimmt, aber unwillkürlich, den Eindrücken des Gemeingefühls gemäß; sie erhielten die Glieder in der ihrer Bestimmung und ihrem Kraftstande angemessenen Stellung. Die, welchen das kleine Hirn genommen war, hatten die Bewegungskraft überhaupt mehr verloren, namentlich waren die Bewegungen, durch welche Mensch und Thier unwillkürlich und ohne weitem Zweck sich in ihrer natürlichen Stellung erhalten, und dieselbe, wenn sie verändert ist, wieder herstellen, und drohenden Gefahren ausweichen, unvollkommen. Mitbin schien nach diesen Versuchen im großen Hirne der auf Vorstellungen beruhende Wille, im kleinen Hirne aber die Kraft der bewußtlosen Bewegungen, oder die pflanzliche Seelenthätigkeit, auf Bewegung bezogen, zu wirken. Da nun die bewußtlose Bewegung schon da erscheint, wo der Wille noch nicht erwacht ist; da sie ferner oft, wo er feyert, in Wirksamkeit tritt; da sie endlich das erst vollbringt, was er bezweckt: so dürfen wir annehmen, daß das kleine Hirn als Reactionsorgan gegen das Gemeingefühl für sich die maschinenartigen Bewegungen vollzieht, bey der Wirksamkeit des Willens im großen Hirne aber diesem sich unterordnet, von ihm den Impuls bekommt, welchen es im ersten Falle in sich selbst fand, und nun auf eine bewußtlose Weise zu Stande bringt, was im großen Hirne mit Bewußtseyn als Zweck aufgestellt worden war. Dann müssen also für die willkürliche Bewegung großes und kleines Hirn zusammenwirken, wie sich aus Flourens Versuchen ergibt. Wenn nun, wie ich zur Zeit noch glaube (§. 864.), die Rückenmarksnerven nur bey gemeinschaftlicher Thätigkeit der vordern und hintern Stränge des Rückenmarks sich wirksam beweisen, und wenn wir das kleine Hirn als eine Entwicklung der hintern, das große Hirn als eine Entwicklung der vordern Stränge betrachten dürfen, so würden die vordern Stränge des Rückenmarks mit der bewußten und vorstellenden, die hintern mit der bewußtlosen und pflanzlichen Seelenthätigkeit in Beziehung stehen. Jedes Nervenganglion ist ein untergeordneter Centralpunct (§. 17.), welcher den Verkehr zwischen der Peripherie und dem höhern Centralorgane beschränkt. Die hintern Wurzeln der Rückenmarksnerven sind durch ihre Ganglien mehr den Rumpfnerven ähnlich, vermitteln vorzüglich die dunkeln Perceptionen des Gemeingefühls, und bestimmen die bewußtlosen Bewegungen. Die vordern Wurzeln hingegen ähneln mehr den besondern Hirnnerven oder den reinen Sinnesnerven, welchen ebenfalls die Ganglien fehlen, vermitteln die directe Beziehung zwischen Peripherie und Centrum, wirken also mehr auf das Bewußtseyn, und leiten den Impuls des bewußten Willens.

§. 909. Die Verletzung des kleinen Hirns äussert ihre Wirkungen besonders in Krämpfen der an der hintern Fläche des Körpers liegenden Muskeln. Zinn (*Haller disp. VII. p. 447. sq.*) und Saucerotte (*pris de chir. X. p. 347. sq.*) sahen bey Hunden, an welchen sie das kleine Hirn, namentlich den Wurm durchstoßen oder durchschnitten hatten, einen Opisthotonus erfolgen; bey einem andern Hunde (Foville p. 19) wurde nach einer ähnlichen Verletzung der Kopf rückwärts gezogen, und eine Gans (ebend.

p. 23) bog den Körper und Hals nach hinten, fiel auf den Rücken und streckte die Beine gerade nach hinten. Damit stimmen auch die pathologischen Beobachtungen überein. Der Kopf war rückwärts, übergebogen bey Erweichung (Nr. 731), Aftergebilden (Nr. 953: 959) und Blutergießung (Foville p. 24) im kleinen Hirne. Monteggia (Boemer *sylloge* I. Nr. 3) beobachtete einen Menschen, der bey einer Wunde des kleinen Hirns 11 Tage lebte, und an keiner Lähmung, sondern bloß an einer Spannung im Nacken litt. Bey einer Eiterung dasselbst (Nr. 409) war der Kranke anfänglich nach vorne, in den letzten Tagen immer nach hinten zu fallen geneigt. Krämpfe im Nacken kommen, laut der XXVI. Tabelle, am häufigsten bey Abnormitäten des verlängerten Marks, und demnächst bey denen des kleinen Hirns, ungleich seltner bey solchen des großen Hirns, vor. — Magendie (*memoires* p. 19. sqq. *Journal* III. p. 155) machte den obigen ähnliche Erfahrungen an Thieren; zog aber daraus den sonderbaren Schluss: daß das kleine Hirn zum Vorwärtsgehn, das große Hirn zum Rückwärtschreiten 'nöthig' sey; welchen er dadurch zu unterstützen suchte, daß ein Thier, bey welchem man das große Hirn ausser Stand gesetzt habe zu wirken, gerade fort liefe, als ob es gejagt wäre, bey 2 Pferden aber, die nicht rückwärts hatten gehn wollen, das große Hirn krank, das kleine gesund gefunden worden wäre. Aus jenen Beobachtungen scheint vielmehr nur soviel hervorzugehn, daß das kleine Hirn so wie die hintern Stränge des Rückenmarks (§. 867.) verhältnißmäßig stärker auf die Streckmuskeln wirkt, indem diese dem Willen ungleich weniger, als die Beugemuskeln untergeordnet sind, und mehr durch organische Reizungen bestimmt werden. Im Ganzen haben wir also Grund, die Streckung, namentlich des Nackens und des Kopfs als die Pantomime einer Affection des kleinen Hirns zu betrachten.

§. 910. Was das Verhältniß zu den obern und untern Gliedmaßen betrifft, so werden, zufolge der XXIII. Tabelle, die Letztern viel häufiger, als die Erstern, und noch viel häufiger, als bey Abnormitäten des großen Hirns, bey denen des kleinen Hirns gelähmt. Abererombie (S. 283) spricht dies; freylich zu unbedingt, in dem Satze aus: Geschwülste im kleinen Hirne machen Paraplegie. Wir glauben, diese Erfahrung, daß das kleine Hirn stärker als das große Hirn, und stärker, als auf die obern, auf die untern Gliedmaßen einwirkt, dahin deuten zu dürfen, daß die obern Gliedmaßen sensibler und dem Willen mehr unterworfen sind, die untern hingegen mehr irritable Kraft besitzen, vergleichungsweise mehr den bewußtlosen Bewegungen dienen, und ihre Nerven vom untern Ende des Rückenmarks bekommen, welches auch die Nerven zu den dem kleinen Hirne näher verwandten Harn- und Geschlechtsorganen (§. 902.) giebt. Vielleicht steht die überwiegende Entveckelung des kleinen Hirns bey Vögeln auch in einer Beziehung zur Rhomboidalgrube ihres Rückenmarks und zu dem Umstande, daß hier die hintern Gliedmaßen fortdauernd, noch im bewußtlosen Zustande, im Schlafe, die alleinigen Träger des Körpers sind; eben diese Beziehung der Bewegung zum Pflanzlichen, Bewußtlosen, ist es vielleicht, weshalb in dieser Rhomboidalgrube gerade die hintern Stränge (§. 908.) angeschwollen sind. — Abererombie (a. a. O.) sagt: Geschwülste im großen Hirne machen Hemiplegie, während die im kleinen Hirne Paraplegie hervorbringen. Unsere XXII. Tabelle rechtfertigt einigermaßen diesen Ausspruch, indem nach derselben die Abnormitäten des kleinen Hirns eine Hemiplegie zwar etwas häufiger, als eine Läh-

mung der untern, und noch viel häufiger als eine Lähmung der obern Gliedmaßen, aber bedeutend seltner, als die Abnormitäten des großen Hirns verursachen. Hiernach scheint es denn, als ob die durchgreifende Wirkbarkeit auf das ganze Bewegungssystem der einen Körperhälfte vorzüglich dem großen Hirn, als dem Ueberriegenden und Herrschenden zukäme. Da aber nach der XIX. Tabelle, seine Abnormitäten viel seltner, als die des kleinen Hirns, eine allgemeine Lähmung hervorbringen, so bezieht sich jenes Verhältniß vielleicht darauf, daß das große Hirn bey seiner stärker entwickelten Duplicität seine Abnormitäten und deren Wirkungen auch mehr auf die eine Seite beschränkt.

§. 911. Wir betrachten nun noch die Verhältnisse der übrigen Bewegungsorgane nach den Resultaten der XXIV. — XXIX. Tabelle. Die Zunge wird nächst den Gliedmaßen am häufigsten bey Abnormitäten des kleinen Hirns gelähmt, noch häufiger aber bey denen des großen Hirns, da sie bey dem Menschen vorzüglich, der freysen Willens-thätigkeit untergeordnet ist, und ihr eigentlicher Bewegungsnerve in den vordern Strängen des verlängerten Marks wurzelt. — Dagegen haben die Krankheiten des kleinen Hirns häufiger Lähmung des Kiefers und erschwertes Schlingen zur Folge, was zunächst mit dem Ursprunge der kleinen Wurzel des fünften Nerven, so wie des neunten und zehnten aus den hintern Strängen des verlängerten Marks zusammenhängt. Der Kiefer mit seinen Organen erscheint in mancher Hinsicht als ein Analogon zum Becken und zu dessen Eingeweiden. Beyde sind auch unter einander, consensuell verknüpft; die Lippen werden bey dem Menschen Organe der Geschlechtslust, und sind bey Wollüstigen stärker entwickelt; die Höhle des Rachens wird bey starkem Geschlechtstrieb trocken und in einem fast entzündlichen Zustand versetzt; die Speicheldrüsen sprützen bey Lüsternheit mehr Speichel aus, und ihre Entzündung wird häufig auf die Hoden übertragen; der Kehlkopf entwickelt sich mit dem Eintritte der Pubertät, und die Stimme wird bey den verschiedenen Hergängen des Geschlechtslebens auf eine entsprechende Weise verändert; eben so hängt der Bartruch mit der Zeugungskraft zusammen. Beyderley Organe haben aber auch die nähere Beziehung zum kleinen Hirn mit einander gemein. — Seltner bewirkt dieses in seinem krankhaften Zustande eine Lähmung der Gesichtsmuskeln und der Pupille. Das große Hirn hat hier das Uebergewicht, da der siebente Nerve vorzüglich den vordern Strängen anzugehören scheint, und die Pupille vorzüglich durch den dritten Nerven, der im Stamme des großen Hirns wurzelt, bestimmt wird.

§. 912. Das kleine Hirn steht in einer nähern Verbindung mit dem übrigen Körper (§. 897.), muß folglich von demselben die Eindrücke des Gemeingefühls aufnehmen: es muß als die erste strahlige Ausbreitung des Rückenmarks der Brennpunct der längs desselben fortgepflanzten Eindrücke werden. Wir sind um so mehr geneigt, dies anzunehmen, da es uns wahrscheinlich ward, daß das kleine Hirn der Sitz der bewußtlosen Triebes ist (§. 908.), und da dieser nichts Andres ist, als die Reaction auf das Gemeingefühl. Die Bestätigung dieser Annahme finden wir in den Beobachtungen, wo bey gereiztem Zustande des kleinen Hirns die Empfindlichkeit des Körpers auf eine widernatürliche Weise erhöht war (§. 825.). Endlich haben wir die Streckung des Nackens und Ueberbengung des Kopfs nach hinten als die Pantomime der Affection des kleinen Hirns erkannt (§. 909.): dies ist aber zugleich auch die Pantomime des zu seiner größten Höhe

getriebenen körperlichen Gefühl, des heftigsten Schmerzes, so wie der höchsten Wollust. — Einigermassen scheint, dies auch die Meynung von Petit (*op. de chir.* XL. p. 106), wenn er behauptet, das große Hirn gebe die Nervenleüster zur Bewegung, das kleine Hirn die zur Empfindung, und von Foville (p. 28) und Pinel, wenn sie Letzteres für den Heerd der Sensibilität erklären. Da indeß der eigentliche und nächste Sitz des Gemeingefühls im Hirnstamme ist (§. 723.), so bleiben nach eindringenden Verletzungen des kleinen Hirns alle Theile des Körpers empfindlich (Magen die *Journ.* III. 149. 154. 599).

§. 913. Das Gemeingefühl ist die Wurzel der Seelenthätigkeit überhaupt, und das Mittelglied, vermöge dessen der Zustand des Körpers die Stimmung der Seele begründet; das andre Moment aber, welches diese bestimmt, ist das materielle oder pflanzliche Leben des Gehirns. Wenn nun das kleine Hirn theils der Centralpunct des Körpergefühls ist (§. 912.), theils ein Uebergewicht bewußtloser (§. 908.) also pflanzlicher Hirnthätigkeit zeigt, so muß es auch die Seelenthätigkeit stimmen, bey seiner erhöhten Lebendigkeit eine größere Spannung und Aufregung in derselben setzen. Bey den Fischen ist das kleine Hirn in Verhältnis zum großen Hirne größer, als bey den Amphibien; bey den Vögeln größer, als bey den Säugethiern; bey den Nagethieren größer, als bey den Wiederkäuern: so scheint denn sein Uebergewicht im Ganzen mit einer regeren Lebendigkeit zusammenzutreffen, welche mit einer größern Regsamkeit, und Hastigkeit der Bewegungen und mit einer größern Frequenz des Athmens und des Herzschlags verbunden ist. — Wenn der Schlaf in dem Nachlassen der Spannung der verschiedenen Seelenthätigkeiten besteht, so könnte er vielleicht darauf beruhen, daß das kleine Hirn, erschöpft durch seine Wirksamkeit auf das große Hirn, so wie auf das Rückenmark und den übrigen Körper, diese Beziehungen aufgibt, seine Thätigkeit in sich concentrirt, und dadurch allmählig wieder zu dem Grade von Kraft gelangt, daß diese, überströmend auf das große Hirn, den Zustand des Wachens herbeyführt. Diese Hypothese findet einigermaßen einen Stützpunkt in den Erscheinungen der Hirnhöhlenwassersucht, Hier nämlich tritt häufiger, als bey andern Krankheiten, Schlaflosigkeit ohne Schmerzen und ohne sonstige Aufregung ein (§. 377.). Da nun bey der Hirnhöhlenwassersucht das große Hirn vorzüglich leidet, und das kleine Hirn in der Regel seine Integrität behauptet, so muß Letzteres das Uebergewicht gewinnen, und es wäre möglich, daß hierdurch das Bedürfnis des Schlags aufgehoben würde. — Reil (*Archiv* VIII. S. 26. fig. 53.) merkte das kleine Hirn wegen seiner abwechselnden Schichten markiger und grauer Substanz mit einer galvanischen Batterie; seine peripherischen Blätter sollen als Elektromotoren Lebensgeist erzeugen; das Marklager soll der Collector seyn, in welchem sich disponible Erregbarkeit sammelt, die Brücke soll die Kette schliessen und das Zelt der vierten Höhle einen Leitungsapparat abgeben. Auch Rolando (p. 61.) erklärte es für ein Analogon des elektrischen Organs einiger Fische; wenn er (p. 31.) einen Conductor an das kleine Hirn legte, so entstanden heftigere Zusammenziehungen, als wenn er ihn an das große Hirn anbracht hätte. Allein 1) dieser Umstand beruht, bloß darauf, daß das kleine Hirn in einer nähern Beziehung zum Rückenmarke steht, und deshalb seine Affection leichter Krämpfe erregt (§. 906.); 2) die abwechselnde Schichtung der beyden Substanzen ist nicht der wesentliche Charakter des kleinen Hirns, denn sie fehlt bey den meisten Fischen,

und bey den Amphibien, und erscheint erst bey höherer Entwicklung desselben; 3) sie findet sich auch am Mantel des großen Hirns, nur dass hier die Randwülste dicker sind, und nicht so parallel liegen. Gesetzt also, dass durch die differenten Substanzen eine höhere Lebensspannung erregt wird, welche wir mit der elektrischen vergleichen dürfen, ohne sie dafür selbst auszugeben, so kommt sie doch dem kleinen Hirne weder durchgängig, noch ausschliesslich zu, und wenn dieses wirklich als ein Erregendes und Spannendes sich verhält, so muss solche Kraft noch auf andern Momenten beruhen.

§. 914. Die Frequenz der Blindheit ist grösser bey Abnormitäten des kleinen Hirns (r: 11,32), als bey denen des großen Hirns (r: 13,64), gerade so, wie sie grösser ist bey Abnormitäten des verlängerten Marks (r: 5,63), als bey denen des Großhirnstamms (r: 3,23). Nämlich die Thätigkeit des verlängerten Marks, als des Centralpunctes für den fünften Nerven, enthält die Bedingung für das Leben des Ciliarsystems, also für das Gemeingefühl des Auges, für die Lichtempfindlichkeit, für das niedere, aber begründende Moment des Sehens. Das verlängerte Mark wirkt mit einer gewissen Selbstständigkeit auf diese Weise auf das Sehen, kann aber durch den Einfluss des kleinen Hirns bestimmt werden. Nach Rolando (p. 45) und Flourens (p. 36) haben die Thiere noch, welchen das kleine Hirn genommen war, und nach der obigen Tabelle bewirkten Abnormitäten des verlängerten Marks noch einmal so oft, als die des kleinen Hirns, Blindheit. Wenn hierdurch der Verkehr des kleinen Hirns mit dem fünften Nerven erwiesen ist, so folgt daraus, dass es auch zu den übrigen Sinnesthätigkeiten und zum Gemeingefühle des Kopfs (§. 852. fgg.) in einer höhern Beziehung steht, als das große Hirn.

§. 915. Noch viel grösser ist der Unterschied der Frequenz der Taubheit bey Abnormitäten des Erstern (r: 17,80) von der bey Abnormitäten des Letztern (r: 36,88). Auch kommt bey jenen nicht selten (Nr. 422. 429. 752. 753. 729. 738) Ohrenausen und Ohrenschmerz vor, und wenn bey oder nach einem Eiterflusse aus den Ohren ein Geschwür im kleinen Hirne entsteht (Nr. 418. 425. 428), so ist zwischen diesem und dem Geschwüre im Hörorgane bisweilen (Nr. 410) kein mechanischer Zusammenhang. Auch scheint in der Thierreihe die Entwicklung des kleinen Hirns und namentlich seiner Hemisphären zum Theil übereinzustimmen mit der Ausbildung des Gehörs und der auf dieses sich gründenden Stimme: so zählte B. Franke (Reil's Archiv XI S. 227) bey Schwimmvögeln 13, bey Hühnern 14, bey Raben 15, bey Singvögeln 17 Platten des kleinen Hirns. — Varoli (p. 8) schrieb ihm daher die Schallperception zu, und Schönlein (S. 124) erklärte es für das aufgebühte Hörganglion. Nach Cuvier (Nervensystem S. 415) gehört das Gehör, als der Sinn für räumliche Bewegung, dem Rückenmark zu, da aber der Schall die innerste gestügteste Bewegung ist, so bildet die Centralmasse des Hörnervens ein eigenes Ganglion als obersten Theil des Rückenmarks, und (Zootomie S. 905) das kleine Hirn wird das Ganglion der Hör-, Tast- und Bewegungsnerven. Allein das kleine Hirn ist nur dem Mittel des großen Hirns analog, kann also eben so wenig, als dieses, ein Ganglion genannt werden, wenn wir nicht das Gehirn überhaupt mit diesem Namen belegen wollen. Auch kann die erste Affection durch den Schall nicht in ihm, sondern nur im verlängerten Marke ihren Sitz haben, aber von da aus auf Jenes leichter sich fortpflanzen, als auf das große Hirn. Daher ist die Frequenz der

Taubheit bey Abnormitäten des verlängerten Marks (1110, 33) größer als bey denen des kleinen Hirns (1117, 80). Diese Fortpflanzung auf die Strahlungen im Mantel muß das Eintreten der sinnlichen Affection in das innere Seelenleben bezeichnen. Wenn nun im kleinen Hirne die pflanzliche Seelenenthätigkeit verhältnismäßig überwiegend ist (§. 908.), so muß auch diese zunächst davon ergriffen werden. So betrachtet es auch Willis (art. 2. 17. p. 83. sqq.): verbannt die Schallempfindung im kleinen Hirne, sagt er, so kann sie, durch Beruhigung der Geister des kleinen Hirns die Betrübnis des Herzens heben, stürmische Affecte stillen; die von Wallungen des Bluts in der Brust herrühren, sich auf die Stimm reflectiren und die Gesangkunst wecken; pflanzt sie sich hingegen vom kleinen Hirne durch die Vierhügel (Bindeärme), oder von der Brücke aus durch die Streifenhügel (Großhirnschenkel) auf das große Hirn fort, so beschäftigt sie bloß die Phantasie; das Talent für Musik sucht Willis daher in der Fähigkeit des kleinen Hirns, die Töne als solche aufzufassen, fest zu halten, und zu reproduciren, während das große Hirn den Sinn oder die symbolische Bedeutung der Töne in der Vorstellung aufsaßt. Mancherley Erfahrungen deuten übrigens auf einen Zusammenhang des Gehörs mit den Geschlechtsfunctionen, und Beyer mit dem kleinen Hirne hin; so bemerkt z. B. Autenrieth (Tübinger Dissertat. III. S. 99), daß die Nerrücktheit, wobey der Kranke das Eingeden Anderer zu hören sich eipbildet, meist auf Erschöpfung der Geschlechtstheile beruht, indem diese auf das Rückenmark wirken, und dessen Affection, wenn sie sich nach oben in den Nacken gestreckt, das Gehör afficirt.

§. 916. Versuchen wir nun, aus den Verhältnissen der Sinnesthätigkeiten die psychische Wesenheit der Hauptabtheilungen des Gehirns zu folgern, so erkennen wir 1) daß das kleine Hirn durch den Zusammenhang mit dem unter ihm liegenden Theile des Hirnstammes in einer weit ausgebreiterten Beziehung zu den äussern Sinnen steht, als das große Hirn, daß es also mehr der sinnlichen Welt zugewendet ist. Denn der ihm zunächst untergeordnete Theil des Hirnstammes empfängt theils als obres Ende des Rückenmarks, theils als Centralpunct der untern Hirnnerven bis zum fünften hinauf, die Eindrücke des Gemeingefühls, so wie des Gefühl- und Tastsinnes (§. 587.). Eigenthümlich ist ihm die Aufnahme der Geschmacks- und Gehörsempfindungen (§. 588.), und durch seinen fünften Nerven (§. 835. 837.) begründet er die Geruchs- und Gesichtserception, deren specifische Erkenntnis dem großen Hirne anheim fällt. 2) Ihrer innern Bedeutung nach sind seine eigenthümlichen Sinne auf die Erkenntnis der innern Verhältnisse der Dinge unter einander, auf den Wechsel und die Wechselwirkung gerichtet (§. 588.), während die Sinne des großen Hirns mehr auf Erkenntnis des Allgemeinen und Ganzen ausgehn (§. 589.). Der Antheil des kleinen Hirns an der Seelenenthätigkeit wird also mehr die wechselnden Verhältnisse, die mannichfaltigen Beziehungen der Dinge betreffen. 3) Wie der höhere Sinn des kleinen Hirns (das Gehör §. 584.), so wird auch dieses in Vergleich gegen das große Hirn und dessen höhern Sinn (das Gesicht) mehr mit dem pflanzlichen Seelenleben, mit dem Gefühle und der subjectiven Erkenntnis verwandt seyn. Wie jene beyden Sinne, so werden auch kleines und großes Hirn wie Tüglisches und Nächtliches, Erdiges und Sonniges sich verhalten. 4) Wie endlich das Gehör unter einem stärkern

Einflusse des Herzschlags steht, so wird auch bey dem kleinen Hirne dasselbe anzunehmen seyn (§. 893.).

§. 917. Betäubung kommt bey Abnormitäten des kleinen Hirns seltner (1:3,86), als bey denen des großen Hirns (1:2,73) vor: Jedes scheint also weniger Einfluß auf das Bewußtseyn zu haben: Die Thiere, welchen Rolando (p. 46) und Florens (p. 56) das kleine Hirn genommen hatten, behielten den Gebrauch ihrer Sinne; L'orry (mem. prés. III. p. 544. 578) bemerkte, daß ein Druck auf dasselbe nur bisweilen, und zwar durch Wirkung auf das verlängerte Mark Betäubung verursacht; die von der Verwundung herrührende Betäubung sah Zinn (Haller *disp. VII. p. 443. 446*) bald vorübergehn. Spurzheim (p. 125) nahm Hühner, Tauben und Kaninchen nur den obern Theil vom Mantel des großen Hirns: sie sahen und hörten noch, nahmen aber kein Futter. Rolando (p. 38. sqq.) nahm Hühnern zwey Drittel des Mantels vom großen Hirn: sie waren etwas betäubt, wie betrunken; bey tieferer Verletzung waren sie ganz betäubt, und wurden durch kein Geräusch zur Bewegung gebracht; ein Rabe wurde durch äussere Gegenstände nicht bewegt, und nicht, wie sonst, durch den Anblick eines Handes in Zorn gebracht. Florens (p. 30. sqq.) nahm Tauben beyde Hemisphären des großen Hirns: sie wurden betäubt, sahen und hörten nicht, und hatten keine Ernährung, denn gegen dasselbe Hinderniß sprangen sie immer wieder von Neuem an, ohne einen Versuch, es zu vermeiden; eben so war es bey Meerschweinchen (p. 52), bey Hühnern, welche mehrere Monste theils schlafend, theils in einem betäubten Zustande des Wachens verlebten (p. 87 go. 125). — Eben so geht das Delirium seltner von Abnormitäten des kleinen (= 1:7,12), als des großen Hirns (1:5,38) aus. — Dagegen haben Krankheiten des kleinen Hirns häufiger Verrücktheit (1:19,77) und Blödsinn (1:8,47) zur Folge, als die des großen Hirns (1:24,29 und 1:10,90). Aber wir bemerken zugleich, daß die Abnormitäten des verlängerten Marks verhältnißmäßig noch häufiger Verrücktheit (1:15,50) und Blödsinn (1:7,75) verursachen: da nun dies Organ offenbar nur als entfernte Grundlage und als mittelbare Bedingung der Verstandesthätigkeit diese Seelenkrankheiten hervorbringt (§. 725.), so wird dasselbe wahrscheinlich auch vom kleinen Hirne gelten. Wenn dies nämlich als das spannende und erregende Glied in der Hirnorganisation wirkt, so muß es auch die Regsamkeit und Lebendigkeit des großen Hirns, und dadurch der höhern Seelenkräfte bestimmen. Auf diese Weise kann es vielleicht auch auf das Erinnerungsvermögen Einfluß haben. Denn wiewohl Mondini (fol. 428), Glaaser (Haller *elem. IV. p. 397*) u. s. w. bloß den Arabern folgend, das kleine Hirn als das Organ des Gedächtnisses betrachteten, und Andre sehr zweydeutige Beweise dafür anführten, z. B. Tulp (c. 14. p. 518) die Beobachtung, daß nach einem Falle auf das Hinterhaupt enfangs das Gedächtniß überhaupt, nachmals bloß die Erinnerung der unmittelbar vor dem Falle Statt gefundenen Umstände geschwunden war, worin wir nur die Wirkung der Hirnerschütterung überhaupt erkennen, und noch Beniveni (*de abditis morborum causis* c. 89) die Enge des Hinterhauptes bey einem hartnäckigen Diche, dessen wiederholte Diebstähle von einer Vergessenheit der frühern Strafen herrühren sollten, — so ist wenigstens nach den hier gesammelten Beobachtungen (XIV. Tabelle) das kleine Hirn derjenige Theil, dessen Abnormitäten häufiger (1:12), als die irgend eines andern, Amnesie zur Folge haben.

§. 918. Da dasselbe mit dem Leben des übrigen Körpers (§. 897—902. 905), mit der pflanzlichen Seelenthätigkeit (§. 913. 917.), mit den bewußtlosen Bewegungen (§. 908.) und mit dem Gehör (§. 588.) in näherem Verkehr steht, so wird es auch eine nähere Beziehung zu den dunkeln Gefühlen haben. Bey dem Heimweh fand Barrère (p. 7. 10. 13. 16. 19. 22) die Gefäße des kleinen Hirns besonders strotzend oder mit polypösen Gerinnungen gefüllt, und Laugier (Gerson II. S. 484) dasselbe eiternd. Indessen verursachten nach der XVI. Tabelle seine Abnormitäten seltner (1:22); als die andrer Hirnthelle, Verstimmung des Gemüths. Beruht dies vielleicht darauf, daß die Störung der eigenthümlichen Function eines Organs deutlicher hervortritt, wenn sein Leben durch Congestionen an seiner Peripherie und durch Abnormitäten benachbarter Theile gestört wird, als wenn es in seiner Substanz selbst eine größere Veränderung erlitten hat? Wenigstens läßt sich dafür anführen, daß ein äußerer Druck auf das Gehirn gewöhnlich mehr Betäubung erregt, als einflößen, und daß eine Entzündung der Hirnhäute häufiger Delirium hervorbringt, als die der Hirnsubstanz. Wahrscheinlicher aber ist es, daß das Gefühl im kleinen Hirne nur vorbereitet wird und erst bey dem Eintritte von dessen Fortsetzungen in das große Hirn sich entwickelt. Unter den im Anhange verzeichneten Beobachtungen waren 11 Fälle, wo die Krankheit Trinker und Wollüstige betraf oder im Rausche und in oder nach der Begattung eintrat; darunter waren 3 Fälle (Nr. 138. 142. 147), wo die Abnormität im kleinen Hirne ihren Sitz hatte, und 8 (Nr. 166. 167. 177. 244. 485. 522. 664. 1014), wo sie im Mantel des großen Hirns sich zeigte. In 2 Fällen, wo angestrenktes Studiren vorhergegangen war, fand sich die Abnormität in 1 Falle (Nr. 935) im kleinen Hirne und verlängerten Marke, im andern (Nr. 1026) im kleinen Hirne und im Hinterlappen des großen Hirns. Nach Gram und Kummer entstanden Abnormitäten in 18 Fällen, wovon 5 (Nr. 148. 716. 883. 955. 958) das kleine Hirn, und 13 (Nr. 151. 214. 248. 252. 253. 515. 520. 683. 689. 716. 905. 1023. 1106) das große Hirn trafen. Einige Abnormitäten, welche nach Furcht (Nr. 816), Schrecken (Nr. 1015. 1036), Aerger (Nr. 1017), Freude (Nr. 853) entstanden zu seyn schienen, hatten im großen Hirne ihren Sitz.

§. 919. Wenden wir uns endlich zu den morphologischen Betrachtungen, so erscheint uns das kleine Hirn als ein Niederes und dem großen Hirne Untergeordnetes, sowohl vermöge seines geringern Volumens, als auch vermöge seiner Lage. Es wird von den hintern Strängen gebildet, liegt hinter dem großen Hirne, und breitet sich ursprünglich und am stärksten nach hinten aus (§. 107. 1. 2. 161. 3. 5.), das verlängerte Mark und dessen Rautengrube deckend. Wenn nun in dem Hintern die Beziehung zur Irritabilität, zum Gemeingefühle und zur subjectiven Richtung der Seele vorwaltend ist (§. 265.), so wird dies auch vom kleinen Hirne gelten. Denselben Charakter wird es auch insofern haben, als es, namentlich bey den höhern Säugethieren und bey dem Menschen, unter (§. 861. fg.) dem großen Hirne liegt und von dessen Hinterlappen bedeckt wird.

§. 920. Es erscheint in der Thierreihe, so wie bey dem Embryo, zuerst in der Form eines Blattes, und bey seiner fortschreitenden Entwicklung nimmt es besonders in der Breite zu, das große Hirn hingegen mehr in der Länge und Tiefe (§. 107. 7. 161. 9. 11.). Nach Wenzel's (cerebr. p. 249) wächst das große Hirn vom dritten Monate bis zur

Geburt 3" in die Länge, 3" in die Breite, und von der Geburt bis zum siebenten Jahre 2" in die Länge, 1" in die Breite, das kleine Hirn im ersten Zeitraum $1\frac{1}{2}$ " in die Länge, $1\frac{1}{2}$ " in die Breite, und im zweyten 1" in die Länge, $1\frac{1}{2}$ " in die Breite. In seiner blätterigen Textur, so wie in seiner Gesamtgestalt zeigt das kleine Hirn überwiegende Breite und Flächenbildung, während im Rückenmarke die Länge und die Wellenform, im großen Hirne aber die Tiefe und die Kugelgestalt am stärksten hervortritt. Wenn nun die Längsrichtung vorzüglich die Leitung, Bewegung und Irregularität, die Kugelgestalt das Abgeschlossene, innerliche sensible Leben, und die Flächenform das Indifferente, Plastische ausdrückt, so wird das kleine Hirn in dieser Hinsicht als das belebende, sensible Kraft ausströmende Mittelglied der Centralmasse des Nervensystems betrachtet werden können.

§. 921. Es hat ferner einen ungleich einfacheren Bau, und zeigt in der Thierreihe, wie schon Willis (*cerebr. c. 3. p. 16*) bemerkte, verhältnißmäßig weniger Verschiedenheiten, als das große Hirn. Es hat weniger verschiedenartige Bestandtheile, und diese sind noch nicht so ausgeartet und selbstständig, sondern noch mit einander mehr verschmolzen (§. 107, 12. 161, 2. 7); seine Schenkel gehen unmerklich in die Strahlung über; sein einziges Ganglienpaar liegt in diesem Uebergange, in der Strahlung versteckt; seine einzige Commissur, die Brücke, ist mit dem Hirnstamme verwachsen und verwebt; und sein einziges Längengebilde scheidet sich erst beym Austritte als Blindkirm von der übrigen Masse. Da alle Steigerung des Lebens auf Entwicklung von Gegensätzen beruht, und da das Denken im Begrenzen, Scheiden, Sondern zu bestimmten Vorstellungen gelangt, so wird das kleine Hirn, da es mehr gleichförmig ist und weniger besondre, eigenthümliche Gebilde enthält, mehr auf ein allgemeines, unbestimmtes Gefühl, als auf ein klares Vorstellen sich beziehen.

§. 922. Seine gleichartige Masse sondert sich vielfältiger (§. 107, 9), indem sie nach der Peripherie zu in mehrere Blätter auseinander weicht, und da diese nach der Breite sich bilden, so bleiben zwischen ihnen Querspalten. In den zahlreichern, aber dünnern und einander mehr gleichen (parallelen) Randwülsten müssen die empfangenen Eindrücke über eine größere Fläche sich ausbreiten und eine allgemeinere Wirkung hervorbringen, aber nicht so zu einem Ganzen vereint, sondern vielmehr zersplittert werden. Bey den Knochenfischen, den Fröschen, Schlangen und Schildkröten, so wie bey dem menschlichen Embryo in den ersten Monaten ist das kleine Hirn glatt. Die Furchen erscheinen erst bey dem Embryo noch dem vierten Monate, bey Knorpelfischen, einigen Eidechsen und bey Nagethieren. Sie treten zuerst an der obern Fläche auf, und werden allmählig immer tiefer und zahlreicher, während das große Hirn noch glatt ist. Ihre Zahl nimmt bey den Säugethieren allmählig, zu, und erreicht bey dem Menschen ihr Maximum. Malacarne (*neuroencephalol. p. 7*) zählte bey Blödsinnigen nur 320, dagegen (p. 20 sq.) bey lebhaften, scharfsinnigen, mit schnell fassendem und treuem Gedächtnisse begabten Menschen bis 720 Blätter, am meisten bey einer sehr lebhaften, scherzhaften und sehr beredten Frau. Die vielfachere Spaltung des kleinen Hirns scheint also mit der geistigen Beweglichkeit und Regsamkeit übereinzustimmen.

§. 923. Es besteht, wie zuerst Meckel (*Archiv I. S. 358*) es ausgesprochen hat, anfänglich aus zwey Seitenblättern, die aber bald einander entgegenwachsen und sich mit

einander vereinigen. Bey seiner weitern Entwicklung gewinnt es aber nicht, wie das große Hirn, eine vollkommene Scheidung in der Mittellinie, und bleibt daher im Ganzen genommen unpaarig (§. 107, 6. 112. 161, 15), wie denn auch seine Sichel nur ein unvollkommenes Analogon von der des großen Hirns ist, und bey dem Embryo viel später, als diese sich entwickelt (Tiedemanns Gehirn S. 149); der Wurm selbst erstreckt sich ohne Einschnitt über die Mittellinie, während der Stamm des großen Hirns an seiner obern und untern Fläche tief eingeschnitten ist, und seine Hemisphären nur durch Commissuren vereint werden. Wir erkennen also im Gehirne eine Triplicität; da wir nun auch in andern Theilen des Körpers unterhalb eines paarigen Organs ein unpaariges finden, so dürfen wir uns erlauben, aus dem Verhältnisse der Glieder eines solchen Tripsystems, als dem Bekannten, der Analogie zufolge einen Schluß zu ziehn auf das Verhältniß der Hirnglieder. Unter den paarigen Nasenhöhlen liegt die unpaarige Mundhöhle, an welche der Speiseröhrenkopf sich anschließt; beyde gehören verschiedenen Systemen an, lassen sich also weniger mit einander vergleichen; indeß bemerken wir, daß die Mundhöhle vorzüglich durch überwiegende Irritabilität sich unterscheidet, das Geruchsorgan aber in der Stufenleiter der Sinne höher steht (§. 576.), also verhältnißmäßig sensibler ist. Unter den Lungen liegt das Herz mit der Aorta, unter den Nieren die Harnblase mit der Harnröhre, unter und zwischen den Ovarien der Uterus mit der Vagina; unter dem gewissermaßen doppelten Grimmdarme der Mastdarm, und unter den Lebertappen die Gallenblase mit dem gemeinschaftlichen Gallengange: hier ist nun immer das paarige Organ das Schaffende, das unpaarige hingegen das Bewegende, zum Theil auch das Aufbewahrende und das Ausbildende. Demnach werden wir im großen Hirne eine höhere Sensibilität, gesteigertes inneres Leben, psychische Bildung, also Denken und Fühlen, im kleinen Hirne aber überwiegende Beziehung zur Irritabilität, Verknüpfung des Innern mit dem Aeußern, Richtungsthätigkeit der Seele, also Sinn und Willen vermuthen dürfen. Wenn nun jeder Theil der sensibeln Centralmasse nur die unter ihm liegenden Theile beherrscht, von ihnen Eindrücke aufnehmend, und auf sie zurückwirkend, so muß das kleine Hirn die niedre Sphäre und das Organ psychischer Richtung ohne Erkenntniß, also der Sinnesrührung ohne Vorstellung, und des Triebes ohne Bewußtseyn seyn; das große Hirn dagegen als der Gipfel der Centralmasse die Thätigkeiten des kleinen Hirns in sich aufnehmen und beherrschen, und die Sinnesaffection zur Wahrnehmung, und den Trieb zum Willen erheben.

§. 94. Endlich sehen wir am kleinen Hirne in vielen Beziehungen gerade das Gegentheil vom großen Hirne, wie dies zum Theil schon Serres (l. p. CII.) bemerkt hat. 1) Die Ciliarkörper liegen an der untern und innern Fläche der Kleinhirnschenkel, die Schlägel und Streifenhügel an der obern und innern Fläche der Großhirnschenkel. 2) Die Brücke liegt unten, der Balken oben. 3) Jene hat ihre Strahlungen an den äußern Theilen des kleinen Hirns, dieser an den innern Theilen des großen Hirns. 4) Die Längsbelegung ist am innern Theile des kleinen Hirns, und am äußern Theile des großen Hirns überwiegend. 5) Die Hemisphären des kleinen Hirns sind oben platt, unten gewölbt, die des großen umgekehrt. 6) Das kleine Hirn zeigt an der Oberfläche, das große in seinem Innern mehr Mannichfaltigkeit. 7) Jenes entwickelt sich ursprünglich

nach hinten, und wächst bey seiner weitem Ausbildung nach vorne; dieses nimmt in beyden Zeitpuncten die entgegengesetzte Richtung. 8) Der höhere Sinn des Kleinhirnsbezirks (Gehör) ist passiv, pflanzlich und subjectiv, der des großen Hirns (Gesicht) activ, objectiv und mimisch; der niedere Sinn des Erstem ist activ und mimisch, der des Letztern passiv und pflanzlich. 9) Nach der XXIV. und XXVII. Tabelle bewirken Abnormitäten des kleinen Hirns häufiger, als die des großen Hirns, Lähmung des Kiefers, seltener Krämpfe desselben, häufiger Krämpfe in den Gesichtsmuskeln, seltener Lähmung derselben. 10) Wenn man dies für das Werk des Zufalls erklären kann, da es so isolirt steht und ein Grund davon weniger sich absehen läßt, so gilt dasselbe wohl nicht von der Bemerkung, daß Oberfläche und Substanz beyder Hirnabtheilungen in Hinsicht der Krankheitserscheinungen sich umgekehrt verhalten. Nach den oben gegebenen Tabellen entsteht nämlich Schmerz, Delirium, Betäubung und Apoplexie häufiger von Abnormitäten der Oberfläche, als von denen des Innern des kleinen Hirns, dagegen häufiger vom Innern, als von der Oberfläche des großen Hirns. Eben so wird Delirium, Betäubung, Affection des Gefühls, Blindheit, allgemeine Lähmung, allgemeiner Krampf und Lähmung der Sprache häufiger durch Abnormitäten der Hülle des kleinen Hirns, als seiner Substanz, hingegen häufiger durch Abnormitäten des großen Hirns selbst, als durch die seiner Hülle, hervorgebracht. Nur Schmerz, Blödsinn, Lähmung des Kiefers und erschwertes Schlingen erfolgte häufiger bey Abnormitäten der Hülle, als bey denen der Substanz des großen und des kleinen Hirns — Schwindel und Verrücktheit war häufiger die Folge von einer innern, als von einer äussern Abnormität des kleinen Hirns, und häufiger von einer äussern, als von einer innern Abnormität des großen Hirns. Verrücktheit und Lähmung der untern Glieder fand öfter Statt bey Abnormität des kleinen Hirns selbst, als bey der seiner Hülle, und öfter bey Abnormität der Hülle des großen Hirns, als bey der in dessen Substanz. Blödsinn und Gedächtnisschwäche erfolgte häufiger bey innern, als bey äussern Abnormitäten des großen und des kleinen Hirns; Schwindel, Apoplexie, Gedächtnisschwäche, Krampf des Kiefers und Erbrechen wurde häufiger beobachtet bey Abnormitäten in der Substanz des großen und kleinen Hirns, als bey denen der Hirnhäute. Wenigstens scheint aus Dem allen soviel hervorzugehn, daß an dem kleinen Hirne die Oberfläche, am großen Hirne hingegen die innere Substanz wichtiger für das Leben, und namentlich für das Bewußtseyn ist.

§. 925. Aus allen diesen Betrachtungen gehen nun folgende Resultate hervor. Das kleine Hirn ist das Mittelglied zwischen dem Rückenmarke und dem großen Hirne (§. 920); höher entwickelt, als jenes und dasselbe beherrschend; unvollkommener, als dieses und von ihm beherrscht (§. 893. 919. 921). Es verhält sich zu dem großen Hirne, als Vorbereitungsorgan, gleichsam als Saamenlappen, und ist eine niedere, partielle Entwicklung, während jenes die höchste und universale Entwicklung der Centralmasse darstellt (§. 893.). In ihm sind also die niedern, Grund legenden und vermittelnden Momente des Seelenlebens enthalten. Da es aber dem großen Hirne analog ist in seinen Elementen (§. 893.) und Eigenschaften, nur in umgekehrter Proportion derselben (§. 924.), so ist sein Leben nicht schlechthin eigenthümlich, sondern nur relativ verschieden, indem die niedern Momente, welche im großen Hirne untergeordnet sind, in ihm überwiegen und vorherrschen.

Als Saamenlappen des großen Hirns; oder als Vorbereitungsorgan des Seelenlebens bewirkt es vorzüglich die Lebensspannung (§. 913. 920. 922.), welche aus dem Conflict der organischen Momente hervorgeht, und das pflanzliche, bewußtlose und unfreye Seelenleben (§. 916. 921.) als den Keim bewußter und freyer Seelenthätigkeit, giebt. Die Sinnlichkeit ist in ihm vorherrschend, die Beziehung auf die Subjectivität (§. 916. 919.) und auf die eigne Individualität, wie es denn bey seinem Uebergewichte mit dem Egoismus zusammenhängen kann. Somit ist denn sein Leben dem Besondern, den Verhältnissen (§. 916.) und den Richtungsthätigkeiten (§. 923.) zugewendet. Es steht daher in einer nähern Beziehung zum Leben des Rumpfes (§. 897. 898.), vorzüglich mit dem Herzschnge (§. 899. 916.) und den Geschlechtsfunctionen (§. 902. 903.), indem die auf das Allgemeine gerichtete Plasticität den strengsten Gegensatz zu der dem Besondern zugewendeten Seelenthätigkeit bildet, und daher in consensuellem Verhältnisse steht. Das kleine Hirn empfängt die Eindrücke des Gemeingefühls (§. 912.) und sämtlicher Sensationen (§. 914—916.), welche sich aber in ihm noch nicht zu Vorstellungen gestalten, sondern allgemeine, unbestimmte, subjective Affectionen bleiben (§. 916. 921.). Verhältnißmäßig ist in ihm die Beziehung zur Irritabilität vorherrschend (§. 906. 919. 923.), vorzüglich aber wirkt in ihm der bewußtlose Trieb, welcher, aus dem pflanzlichen Seelenleben hervortretend, auf pflanzliche Weise zweckmäßige Bewegungen hervorbringt, unter dem Einflusse des bewußten Willens aber zu dessen Zwecken die nöthigen Mittel in Bewegung setzt (§. 908.); darauf wirkt denn das kleine Hirn auch stärker auf diejenigen Bewegungsorgane, welche von dem Willen und von der höhern Seelenthätigkeit weniger bestimmt werden (§. 909—911.). Indem die pflanzliche Seelenthätigkeit in ihm überwiegend ist, wird es bey höherer Entwicklung der Seelenkraft immer mehr dem großen Hirne untergeordnet (§. 894.), gewinnt aber selbst an innerer Ausbildung, da die in ihm vorherrschende Sinnlichkeit die Fruchthülle ist, aus welcher die höhere Seelenthätigkeit sich entwickelt, und somit diese durch die Thätigkeit des kleinen Hirns mit bedingt wird.

D) Einzelne Theile des kleinen Hirns:

§. 926. Die Schenkel des kleinen Hirns stehn mit diesem in geradem Verhältnisse: wo das kleine Hirn einen geringen Umfang hat, sind sie glän, flach und weit auseinander gespreizt, so daß die zwischen ihnen liegende Rautengrube eine breite, flache Vertiefung bildet; wo das kleine Hirn mehr entwickelt ist, sind sie breiter und dicker, so daß die Rautengrube enger und tiefer wird. Auf diese Weise nehmen sie im fortschreitenden Alter des Embryo, und im Ganzen genommen in der aufsteigenden Thierreihe bis zum Menschen allmählig zu.

§. 927. Die Ciliarkörper stehn in geradem Verhältnisse zur seitlichen Entwicklung des kleinen Hirns, fehlen daher noch bey Vögeln, erscheinen erst bey Säugethieren, und erreichen ihre vollkommne Ausbildung erst bey dem Menschen. Während sie im Ganzen genommen mit den Stammganglien des großen Hirns analog sind, unterscheiden sie sich von diesen dadurch, daß sie weniger als freye Hügel und eigne Organe in eine Höhle ragen, sondern vielmehr als Kerne in der Hirnmasse liegen, und mit derselben mehr verschmelzen; daß sie unvollkommnere Mittelglieder zwischen den Schenkeln und

dem Mantel abgeben, indem die Fasern von jenen, um in diesem sich auszubreiten, mehr neben den Ciliarkörpern vorbei, als durch sie hindurch gehn; daß sie endlich weiter auseinander liegen und fester sind.

§. 928. Der Wurm und die Hemisphären bekommen ihre Grundlage von den Sehenkeln, deren Strahlung gegen einander oder nach der Mittellinie zu den Wurm, und deren divergirende, nach aussen gehende Strahlung die Hemisphären giebt. Zu dieser Grundlage tritt nun Belegungssubstanz als vervollständigend hinzu, welche theils die einzelnen Punkte des kleinen Hirns unter einander, theils dasselbe mit dem großen Hirne verknüpft, also die Wechselwirkung dieser Abtheilungen vermittelt. Diese Wechselwirkung kann nur darin bestehen, daß der erste Reflex des niedern Lebens, welcher sich im kleinen Hirne gebildet hat, indem die durch Nerven und Rückenmark geleiteten Eindrücke hier zuerst an einem Centrum sich gebrochen haben, auf das große Hirn übertragen wird, dieses also theils Lebensspannung für seine Thätigkeit überhaupt, theils sinnliche, subjective Affection zur Umwandlung in Vorstellung und Erkenntniß empfängt, dann aber, auf das kleine Hirn zurückwirkend, die bewußtlosen Impulse der Bewegung durch den Willen bestimmt. Diese verknüpfende Belegung besteht aus dem längenförmigen Bindesysteme, und dem queren Brückensysteme. Das Binde-system giebt eine unmittelbare Verknüpfung: von den Strahlungen des kleinen Hirns ausgehend und in das große Hirn einstrahlend, trägt es die ungebrochene Macht des Ersten auf Letztes über, und wird der Repräsentant des kleinen Hirns im großen Hirne. Es übt also vorzüglich die lebendige Spannung in das höhere Centrum, und erhebt das bewußtlose und unwillkürliche pflanzliche Seelenleben zu einer höhern Potenz: diese Potenz ist aber das Gefühl, welches in Erkenntniß, aber in einer subjectiven, dunkeln und unwillkürlichen besteht. Da das Binde-system in die Länge sich erstreckt und also mannichfaltige, ungleichartige Gehilde verknüpft, folglich der Phantasie verwendet ist, so wird sein näherer Charakter in der Beziehung zur Gefühlsphantasie bestehen. — Das Brückensystem stellt zunächst das kleine Hirn als ein Selbstständiges dar, indem es den Theilen desselben Einheit verleiht, und in seinem Mitteltheile (der Brücke) das Gesammtzeugniß desselben darstellt. In der Brücke wird nun großes und kleines Hirn in eine mittelbare Verbindung gebracht, und ein gegenseitiger Einfluß beyder vermittelt, indem der Hirnstamm, und namentlich sein vorder Theil, in einzelne Bündel zerfällt, welche, ohne ihre Richtung und Stetigkeit aufzugeben, doch mit den Markfasern und der grauen Substanz der Brücke, zwischen welchen sie sich hinziehen, in nähern Verkehr treten. Hier wird also die eigenthümliche höhere Natur des großen Hirns ihre Grundlage und ihre Verknüpfung mit dem niedern Leben finden: hier wird die überströmende Lebensspannung als Stütze der geistigen Kraft sich gestalten, die subjective Rührung zur objectiven Erkenntniß sich entwickeln, und der bewußte Wille das organische Tiefwerk in Bewegung setzen.

§. 929. Die erste Richtung ist noch innen gewendet: das ursprünglich Paarige verschmilzt zu einem Unpaarigen, Indifferenten, die Mittellinie Einnehmenden, und es entsteht der Wurm. Der erste Gegensatz, welcher sich entwickelt, tritt in der Länge oder nach vorne und hinten hervor, und ihm entsprechend bildet sich, als die erste Belegungssubstanz, das Binde-system, welches gegen die Mittellinie concentrirt ist und zum Theil

dieselbe einnimmt. Wie aber alle Belegungssubstanz auf einer höhern Entwicklung beruht, so sind auch hier, wo bloß der Wurm vorhanden ist, nur die Anfänge des Bindesystems gegeben. Dies ist des Verhältnißs hey den drey untern Classen der Wirbelthiere. Das kleine Hirn ist bey den meisten Fischen und bey den Amphibien nichts als ein mehr oder weniger ausgebildeter Wurm mit schwachen Faserungen des Bindesystems. Nur bey einigen, namentlich Knorpelfischen, treten seitliche Anhänge, als Rudimente von Hemisphären hervor. Bey den Säugethiereu wird er in seiner Breite beschränkt, bleibt aber noch bedeutend dick und lang, so daß er bey vielen derselben für seine Länge nicht hinlänglichen Raum findet, sondern wie zusammengefaltelt und entweder auf die eine, namentlich die rechte Seite, oder schlangenförmig, abwechselnd auf beyde Seiten gebogen erscheint. Erst bey dem Menschen zieht er sich nach allen Richtungen zusammen, und bildet durch seine Abschnürung gegen die Hemisphären an der obern Fläche Einknickungen, durch sein Schwinden an der untern Fläche des Thal, und durch seine Verkürzung den vordern und hintern Einschnitt des kleinen Hirns. Die Länge des Wurms verhält sich nach Tiedemann's (*icones*) Messungen zur Länge der Hemisphären des kleinen Hirns bey dem Menschen wie 1:1,50, bey dem Lemur wie 1:1,23, bey den Affen wie 1:0,88 bis 0,94, bey den Löwen wie 1:0,80; zur Breite des kleinen Hirns bey dem Menschen wie 1:2,72, bey dem Seehunde wie 1:1,93, bey den Affen wie 1:1,67 bis 1,86, bey Nagethieren wie 1:1,52 bis 1,66, bey Rauhthieren wie 1:1,36 bis 1,52; und zur Länge des großen Hirns bey dem Menschen wie 1:4, bey den Affen wie 1:3, bey den Rauhthieren wie 1:2, bey den Nagethieren wie 1:1,87 bis 2. — Nach Serres (l. p. XXXI) steht der Wurm in geredem Verhältnisse zur Entwicklung des Rückenmarks und der Vierhügel, d. h. er nimmt in derselben Proportion ab, als des Uebergewichts des Gehirns über das Rückenmark, und des großen Hirns über die Vierhügel zunimmt. — Bey dem Embryo ist der Wurm anfänglich noch nicht gegen die Hemisphären bestimmt abgegränzt; er wird früher gefurcht, als diese, wird erst im siebenten Monate an Länge von ihnen übertroffen, und bildet erst im neunten Monate des Thal. — Der Wurm erscheint uns also als die niedere, frühere, indifferente Bildung, welche die Grundlage des Lebensgefühls abgibt. Bartholin (*hist. cent. IV. hist. 6*) fand ihn bey einem Selbstmörder sehr klein, und Greding (l. S. 375) fand ihn unentwickelt bey einer Frau, die, wie ihr Vater und ihre Schwester, melancholisch und lungenächtig war. Eben so wird er auf die von dem Gefühle ausgehenden unwillkürlichen Bewegungen sich beziehen. Nach Galen (*de usu part. lib. VIII. c. 14. p. 170*) sollte er den Uebergang der thierischen Geister in die vierte Höhle reguliren, was Vessel (*lib. VII. c. 10. p. 550*) widerlegte. Nach Trevirenus (Biologie VI. S. 144) soll er auf die Athmungsbewegung Einfluß haben, weil er in Hinsicht auf Größe den Kleinhirnschenkeln entspreche (?), in deren Nähe das zehnte Nervenpaar entspringt; darum sey er unvollkommen bey Amphibien in Bezug auf deren beschränktes Athmen, überwiegend ausgebildet hey Säugethiereu und Vögeln, in Bezug auf den festen Rhythmus ihres Athmens, und auf ihr Vermögen, articulirte und melodische Töne hervorzubringen. Die Basis dieser Vermuthung ist eben so unsicher, als ihre Bestätigung.

§. 950. Die Flocken scheinen diejenigen Theile der Hemisphären zu seyn; welche die meiste innre Verwandtschaft mit dem Wurme haben, denn 1) sie sind die seitlichen Anhänge am Wurme bey den Vögeln (Carus Nervensyst. S. 247), und wahrscheinlich auch bey Fischen, erscheinen also in der Thierreihe früher, als die Hemisphären; 2) sie werden um so zarter, je mehr die Hemisphären über den Wurm das Uebergewicht gewinnen, und sind daher bey Menschen verhältnißmäßig am kleinsten (ebend. S. 250); 3) sie sind bey dem Embryo verhältnißmäßig größer, weshalb sie auch Meckel (Archiv I. S. 362) zu den Theilen zählt, von welchen die Bildung des kleinen Hirns ausgeht, und welchen sich die übrigen Theile anbilden, während Schönlein (S. 134) sie gar für eigenthümliche Organe des menschlichen Fötus erklärt; 4) sie sind unvollkommene Lappen, deren Markzweige zum Theil frey liegen, und welche mit dem Wurme nicht, wie andre Hemisphärentheile, durch verzweigte, sondern durch einfache Markblätter (die Segel) verbunden sind; 5) ihre Stiele laufen mit den Bindeärmen in das große Hirn, und gehören in sofern zum Binde-systeme. Sie scheinen eine äussere Beziehung zum Gehör zu haben, denn sie liegen an den Hörnerven und Zungenschlundkopfnerven an, durch Gefäßhaut eng mit ihnen verbunden, und liegen bey Vögeln und Säugethieren in einer eignen Höhlung des Felsenbeins, welche von den Bogengängen gebildet wird. Nach Carus (a. a. O. S. 207) sollen sie auch der Ausbildung des Gehörorgans entsprechen. Da sie nun nicht innerlich mit dem Hörnerven zusammenhängen, so können sie auch mit der Perception der specifischen Schalleindrücke nichts zu schaffen haben, sondern nur die allgemeine organische Affection des Hörnerven aufnehmen und durch Leitung nach dem großen Hirne die Einwirkung des Schalls auf das subjective, pflanzliche Seelenleben und auf das Gefühl vermitteln. Dies scheint dadurch bestätigt zu werden, daß sie bey Thieren mit dem Felsenbeine und den Bogengängen, also mit solchen Theilen, welche weniger den specifischen Ton, als den Schall überhaupt leiten und fortpflanzen, in einer nähern Beziehung stehn und durch dieselben afficirt werden müssen.

§. 951. Wenn nun die ersten, dem Wurme noch verwandten Hemisphärentheile verhältnißmäßig in einer nähern Beziehung zur Sensation stehn, so werden wir den Hemisphären überhaupt eine ähnliche Beziehung zuschreiben dürfen. Diese finden sich nur bey den Säugethieren, und zwar am unvollkommensten noch bey den Nagern und kleinen Raubthieren, größer bey den Wiederkäuern, Schweinen und Einhufern, dann bey den Raubthieren, noch größer bey den Seebüden, Cetaceen und Affen. Am größten werden sie bey Menschen, wo sie besonders nach hinten und unten sich ausbilden, so daß sie über das Hinterhauptloch hinausragen, weshalb auch das Hinterhaupt, welches bey den Thieren schräge nach vorne aufsteigt, nach hinten sich wölbt. Sie bilden sich durch das stärkere und nach aussen gerichtete Strahlen der Schenkel unter Hinsutrit des Brückensystems und der übrigen Belegungsmasse. Letztre ist bey den Thieren noch viel schwächer, als bey Menschen, namentlich an der untern Fläche, weshalb ihnen denn auch die zweybüchigen Lappen und die Mandeln fehlen.

§. 952. Eine Brücke findet sich nur da, wo Hemisphären sind, hat ihre Strahlung vorzüglich in denselben, namentlich in ihrem äussern Theile, und steht überall im geraden Verhältnisse zu ihnen, und in umgekehrtem Verhältnisse zu dem Wurme und den

Vierhügeln, welches Letztre schon Willis (ver. d. 2. p. 14) vor Serres (l. p. XXXI) bemerkte. Bey dem Embryo scheint sie schon zu Ende des zweyten Monats als ein zartes Markblättchen vorhanden zu seyn (Emmert in med. chir. Ztg. 1815. I. S. 193); aber erst im sechsten Monate wird sie verhältnißmäßig breit und dick. Die Brücke ist keine reine Commissur, sondern ist wesentlich mit dem Hirnstamme verknüpft, welchen sie theils durchwebt, theils in einem Halbringe, dessen andre Hälfte vom kleinen Hirne gebildet wird, einschließt. Wenn sie nun gleich dem Balken in das seitlich Entwickelte und Paarige Einheit bringt, so kann diese keine höhere, innerliche und abstracte seyn, da die niedere sinnliche Thätigkeit des Hirnstammes eingreift. Sie enthält also mehr das Gesammtzeugniß der organischen Thätigkeit des kleinen Hirns, eine Lebensspannung, welche nicht direct, wie vom Bindesysteme in das große Hirn übergeht, sondern nur auf den Stamm desselben einen Einfluß ausübt, vermöge dessen theils die innere Kraft des großen Hirns, das Bewußtseyn, theils seine Receptivität, die Sensation, theils seine reactive Kraft, die willkürliche Bewegung und der Einfluß auf die Rumpforgane verstärkt wird. — Die Brücke muß als Commissur der Hemisphären mit dem kleinen Hirne verglichen werden; insofern sie aber zugleich den Hirnstamm enthält, müssen wir sie mit dem darunter liegenden verlängerten Marke, und dem darüber liegenden Großhirnstamme vergleichen. Betrachten wir nun so die pathologischen Tabellen, so finden wir 1) daß die Brücke bey ihren Abnormitäten häufiger, als verlängertes Mark, kleines Hirn und Großhirnstamm, Betäubung und Blödsinn, Blindheit und Taubheit, Lähmungen aller Art, Störungen des Aathmens, so wie des Harnens und Erbrechen; 2) häufiger als verlängertes Mark und Großhirnstamm, aber seltner als kleines Hirn Affection der Geschlechtstheile und Convulsionen; 3) häufiger als verlängertes Mark und kleines Hirn, seltner als der Großhirnstamm, Apoplexie und Verstimmung des Gemüths; 4) häufiger als kleines Hirn und Großhirnstamm, seltner als das verlängerte Mark, Abmagerung; 5) häufiger als das kleine Hirn, seltner als verlängertes Mark und Großhirnstamm, Schmerzen; 6) häufiger als verlängertes Mark, seltner als kleines Hirn und Großhirnstamm, Schwindel, Delirium und Gedächtnisschwäche; 7) endlich seltner als verlängertes Mark, kleines Hirn und Großhirnstamm, Verrücktheit hervorbringt. Hiernach würde denn a) die Brücke sich mehr beziehen auf die objectiv Sensation (Gesicht und Gehör), als auf das Gemeingefühl. b) Da Betäubung und Blödsinn am häufigsten, Affection des Gefühls, Schwindel und Delirium seltner, Verrücktheit am seltensten von ihr ausgeht, so scheint sie mehr auf die Kraft der objectiven Anschauung und auf die Klarheit des Bewußtseyns, als auf die subjective Stimmung, auf Phantasie und Gemüth zu wirken. c) Sie wirkt stärker als andre Theile auf die willkürliche Bewegung. d) Eben so übt sie auch einen stärkern Einfluß auf die plastischen Organe aus. — Ueberhaupt ist also hier der Hirnstamm dadurch potenziert, daß die Kraft von Hemisphären mittels einer Commissur auf ihn übertragen wird: die so gewonnene Energie wirkt nun theils im großen Hirne fort, wo sie die Stütze der objectiven und freyen Seelenthätigkeit wird; theils wirkt sie nach unten, verstärkt die durch die vordern Stränge vom großen Hirne kommenden Impulse, und verbindet so die von da ausgehenden Antriebe des Willens mit der automatischen Bewegungskraft des kleinen Hirns. Letztes war schon die Ansicht von Willis. Nach ihm (cerebr. u. 17. p. 80) ist nämlich

die Brücke der Behälter der von den beyden Hemisphären des kleinen Hirns hier zusammenstreichenden Nervengeister, die von hier aus an die Nerven gehn; nur können wir ihm nicht heystimmen, wenn er ferner behauptet, daß diese Nerven meist den bewußtlosen Bewegungen dienen, und (c. 18. p. 87) daß die Brücke den Einfluß der Gemüthsbewegungen auf die Präkordien vermittele, und darum bey Raubthieren größer, als bey Wiederkäuern, bey dem Menschen aber am größten sey. — Wedemayer (S. 54) glaubt, sie trenne das Rückenmark in einem gewissen Grade von dem Gehirne und dessen Einflusse, so daß unwillkürliche Bewegungen hervortreten; und Treviranus (Biologie VI. S. 135) legt ihr die Wirkung bey, den Einfluß des Hirnstamms auf das große Hirn durch Unterbrechung des Erstern zu beschränken, so daß die Seele nicht mehr von einzelnen sinnlichen Eindrücken beherrscht wird, und diese nicht mehr entsprechende Bewegungen zur unmittelbaren Folge haben. Indessen können wir beyden Meynungen, welche wesentlich zusammengehören und einander ergänzen, nicht beypflichten, da wir weder die Brücke für ein eigentliches Ganglion erklären können, in welchem die Faserung und Leitung erlischt, noch auch andre Gründe für eine solche Hemmung sprechen.

§. 933. Der dem kleinen Hirne angehörige Theil des Schädels zeigt Eigenthümlichkeiten, welche auf eine überwiegende Contraction hindeuten: das Felsenbein hat die festeste Knochensubstanz, und enthält innerhalb desselben ein Sinnesorgan, welches knöcherner Gebilde unter seinen wesentlichen Bestandtheilen hat, und dessen Sinnesnerv den Halsnerven mit sich durch dieselbe Oeffnung zieht. Zu diesen Eigenthümlichkeiten gehört noch das bey vielen Thieren knöcherner Zelt, welches, als ein nach innen gehender Bogentheil des Würfels des kleinen Hirns, dieses vom großen Hirne scheidet. Dies knöcherner Zelt besteht in seiner unvollkommensten Form aus zwey Knochen, welche von den beyden Felsenbeinen ausgehn: so bey Affen, Schweinen und Nagern. Bey den Einhufern und bey einigen Fleischfressern kommt zu diesen zwey Fortsätzen noch ein dritter vom Hinterhauptsheine. Indem diese 3 Stücke weiter sich ausbreiten, und zu einem einigen Knochen verwachsen, erreicht das knöcherner Zelt bey andern Raubthieren seine größte Entwicklung. — Daß diese Bildung mit einer gesteigerten Irregularität zusammenhängt, läßt sich wohl behaupten; aber die besondern teleologischen Erklärungen hohen wenig für sich. Nach Willis (cer. 6. p. 32) sollte der Zeltknochen bey Thieren vorkommen, welche stark laufen, und sein Zweck sollte seyn, die Erschütterung des kleinen Hirns zu verhüten. Dies suchte Arlet weiter durchzuführen, aber Blumenbach wendete dagegen ein, daß ein häutiges Zelt auch bey sinken, und ein knöchernes auch bey trägen Thieren vorkommt, und bezog Letztes auf eine Verstärkung der Kraft heym Beissen.

III. Großhirnstamm.

§. 934. Aus dem Gegensatze des kleinen Hirns haben wir die allgemeine Bedeutung des großen Hirns erkannt. Es ist nicht ein Partielles, aus einzelnen Theilen des Hirnstammes hervorgehend, sondern die Entwicklung seiner Gesammtheit; kein Durchgangspunct, sondern der Endpunct, der Gipfel der Centralmasse und das eigentliche Centrum (§. 893.). So ist es denn auch das Herrschende, in welchem die Sensibilität und die Objectivität vorwaltet (§. 919.), so wie auch in ihm die active Seite der Plasticität verhält-

nissmäßig mehr rege zu seyn scheint (§. 904.). Sein Verkehr mit dem körperlichen pflanzlichen Leben (§. 897. ff.), so wie mit dem Aeußern überhaupt (§. 916.) ist nur mittelbar und beschränkt, und sein Leben ist mehr der Innenwelt zugewendet. So bezieht sich denn dasselbe weniger auf Richtung, als auf Bildung (§. 923.), welche nicht in allgemeiner Erregung und Thätigkeit, sondern in bestimmter, klarer Erkenntniß sich anspricht (§. 921.). Wie die ihm zunächst untergeordnete Sinne ihre Objecte in der Universalität der Aussenwelt finden (§. 589.), so geht sein Leben auf die Anschauung im Ganzen aus; in ihm wirkt Bewußtseyn (§. 917.), geistige Thätigkeit, Gefühl (§. 918.) und Wille (§. 908.). — Am meisten stimmt mit dieser Ansicht die von Willis (ver. c. 10. p. 48) überein. Nach ihm ist das große Hirn das unmittelbare Organ für die Wahrnehmung (Imagination), wobey eine Undulation inwendig im Marke Statt findet, die sich nach dem Umkreise ausbreitet; für das Gedächtniß, wobey die Undulation vom Umkreise nach innen geht; und für die Begehrung, wobey sie ihre Richtung auf die Nerven nimmt; dagegen ist es das mittelbare Organ für Empfindung und Bewegung, für Leidenschaften und Instincte, welche zunächst im verlängerten Marke und im kleinen Hirne ihren Sitz haben.

§. 935. Der Großhirnstamm mit Inbegriff seiner Ganglien verursacht nach der XXXV. Tabelle in seinem abnormen Zustande häufiger, als der Kleinhirnstamm, Delirium, Apoplexie, Verstimmung des Gemüths und Schwäche des Gedächtnisses; er steht also im Ganzen genommen mit der Seelenthätigkeit in einer nähern Beziehung. Er steht ferner weniger in Beziehung zur Bewegung: nur im innern Augenmuskel und in den Gesichtsmuskeln verursacht er häufiger Lähmung. Auch wirkt er ungleich schwächer auf die Rumpfeingeweide; nur Verstopfung kommt bey seinen Abnormitäten häufiger vor. Endlich bezieht er sich weniger auf Sinnesthätigkeit. — In Vergleich zum Mantel des großen Hirns verursacht er häufiger Verrücktheit, Blödsinn und Amnesie, seltner Delirium, Betäubung und Affectio des Gefühls; häufiger Lähmungen, Krämpfe, und Störung der Functionen der Rumpfeingeweide. Die Pathologie bestätigt es also, was sich schon aus der Betrachtung der räumlichen Verhältnisse ergibt, daß der Großhirnstamm das Mittelglied zwischen dem Bezirke des kleinen Hirns und dem Mantel des großen Hirns ausmacht.

§. 936. Die Großhirnschenkel gehn bey den niedern Wirbelthieren einander mehr parallel, und sind in der Mittellinie weniger von einander geschieden, so daß sie mehr eine gerade, walzenförmige Säule bilden. Beym Menschen sind sie in Uebereinstimmung mit der größern Entwicklung der Hemisphären stärker, mehr von einander weichend, und nach vorne und oben durch Divergenz ihrer Fasern sich ausbreitend. Bey dem Embryo steigen sie anfangs nur bis zu den Vierhügeln, welche jetzt den Gipfel des Hirnstammes ausmachen, aufwärts, biegen sich dann in einem spitzen Winkel um, und steigen mit ihrem vordern Theile herab. Dieser erhebt sich vom vierten Monate an, wie die Sehhügel und Streifenhügel mehr sich ausbilden. — Mit der Entwicklung des Seelenlebens bekommt der Großhirnschenkel das Ueburgewicht über das verlängerte Mark; seine Breite verhält sich zu der des verlängerten Marks nach Tiedemann's Messungen bey Menschen wie 10,97, bey Affen wie 11,66 bis 1,86, bey Raubthieren

wie 1:2, bey Nagethieren wie 1:3. Eben so werden die Pyramiden ihm untergeordnet, indem die Breite derselben zu der seinigen bey dem Menschen wie 1:4,50, bey den Affen und Raubthieren wie 1:2,20 bis 60, bey den Nagethieren wie 1:2 sich verhält.

§. 937. Die Bindeärme scheinen bey den drey untern Classen der Wirbelthiere ohne Verbindung mit den Sehknäulen, ausser mit der Commissur derselben, in das grosse Hirn überzugehen, und bey den Säugethieren unter den Vierhügeln hinauszustreichen, um die Sehhügel zu erreichen. Bey dem Embryo scheinen sie sehr früh sich zu bilden, sind aber noch von dem darüber hinausreichenden hintern Theile der Vierhügel bedeckt, und werden erst nach dem vierten Monate sichtbar. — Sie sind das Verbindungsglied einer Strahlung im kleinen Hirne mit einer andern im grossen Hirne, und erheben, nach unser Vermuthung (§. 928.), die dort entstandene Erregung des pflanzlichen Seelenlebens hier zum Gefühle, während die Hirnschenkel bloß mittelbar den Einfluß des kleinen Hirns aufnehmen und, mit dem verlängerten Marke und dem Rückenmarke unmittelbar verbunden, die äussern Eindrücke für die objectivc Erkenntniß, so wie die Impulse des bewussten Willens leiten. In den freylich seltenen Fällen von Abnormitäten der Bindeärme wurden bloß Störungen des innern Lebens, Schmerzen, Verrücktheit, Blödsinn, Apoplexie beobachtet, während die Abnormitäten der Großhirnschenkel ausserdem auch Störungen in den willkürlichen Muskeln und in den Rumpfeingeweiden, jedoch nicht in den Sinnesthätigkeiten verursachten. Die Differenz beyder Theile scheint sich in der verschiedenen Natur der in ihnen wurzelnden Nerven zu erweisen: die Hirnschenkel enthalten das Centralende des dritten Paares, welches der Willkühr untergeordnet ist; die Bindeärme nehmen, dem Hirnstamme gleich werdend, das vierte Paar auf, welches unwillkürliche, durch das pflanzliche Hirnleben und durch das Gefühl bestimmte Bewegungen hervorbringt (§. 847.). — Willis (*op. c.* 2. p. 16) erklärte die Hirnschenkel für die Heerstrasse der thierischen Geister zur Bewegung und Empfindung.

§. 938. In den Stammganglien tritt die Leitung mehr zurück und die Central- und Reflexion wird mehr herrschend: es kommt hier zu sinnlicher Wahrnehmung, und das Bewusstseyn beginnt sich zu entwickeln. Die pathologischen Beobachtungen bestätigen diese Ansicht. Blindheit und Taubheit entstand nicht von Abnormitäten der Hirnschenkel und Bindeärme, weil sie vorzüglich nur als Leiter dienen; häufig bey Abnormitäten der Stammganglien, als den Punkten, wo der Eindruck sich bricht, um percipirt zu werden; seltner im Mantel, wo die Perception in die Gesamtheit des Bewusstseyns aufgenommen wird. Betäubung geht am häufigsten (= 1:2) vom Mantel, seltner (= 1:3 bis 5) von den Stammganglien, noch seltner (= 1:18) von den Hirnschenkeln aus. Lähmung der willkürlichen Muskeln aber geht im Ganzen genommen häufiger von den Stammganglien, als von den Hirnschenkeln und vom Mantel aus, indem dieser nur den ersten Impuls giebt, Jene nur leiten, die Stammganglien aber den eigentlichen Reflexionspunkt darstellen. Diese bilden den Gipfel des Hirnstamms und den Fuß des Mantels. Bey Thieren, wie bey dem Embryo, ragen sie mehr discret in die Höhlen herein, während sie bey dem erwachsenen Menschen sich mehr dem Mantel anschließen und ihm mehr untergeordnet sind. — In Reil's (Archiv IX. S. 206) Vermuthung, daß sie einen kräftigen Lebensgeist absondern, welcher in den Mantel strömt und ein laises Ge-

fähig, so wie ein starkes Reactionsvermögen giebt, scheint ihre Bedeutung nur einseitig aufgefaßt zu seyn:

§. 939. Die Vierhügel sind ursprünglich der eigentliche und nächste Gipfel des Hirnstamms, und bilden sich durch eine Combination von dessen vordern und hintern Strängen mit den Bindeärmen. Während nämlich vom verlängerten Marke aus die übrigen Stränge theils nach hinten in das kleine Hirn, theils nach vorne in das große Hirn sich umbiegen, behalten die äussern Hülfsstränge die Richtung des Rückenmarks bey, steigen senkrecht herauf, schliessen die hintern Stränge ein, indem sie mit ihrem äussern Theile sich auf der hintern und obern Fläche des Großhirnstamms herumschlagen, und bilden hier als eine gangliöse Anschwellung die Vierhügel, welche unmittelbar auf den Bindeärmen aufliegen. Die Letztern, als die Fortsetzungen des kleinen Hirns im großen sind also hier nach oben mit den vordern Strängen, nach unten mit den hintern Strängen des Hirnstamms vereint. Die Vierhügel sind die Ganglien der Haube, wie die Schühgel und Streifenhügel die der Hirnsehnkel sind, und was von der Haube (§. 164.) gilt, gilt auch von den Vierhügeln.

§. 940. Die Sehkugeln der drey untern Classen der Wirbelthiere sind, wie zuerst Gall (Untersuchungen S. 219), dann Meckel, Arsaaky, Cuvier, Carus, Tiedemann, Serres und Andre erkannten, Vierhügel; denn sie bilden sich aus dem vordern den Olivenbündeln entsprechenden Theile des verlängerten Marks, und liegen entweder unmittelbar, oder mit ihrer Commissur auf den Bindeärmen; sie liegen ferner unmittelbar vor dem kleinen Hirne, und haben, wie die Vierhügel bey dem Säugthierembryo, eine Höhle, welche mit der Wasserleitung zusammenhängt. Aber sie zeigen dabey eine eigenthümliche Natur, indem sie theils den vordern Hemisphären oder dem eigentlichen großen Hirne an Grösse, Aussehen und Textur mehr oder weniger gleich kommen, eine Strahlung von Marksubstanz, eine Höhle, und in dieser zum Theil Ganglien haben; theils das ganze Centralende des Sehnerven enthalten. Die Vierhügel erscheinen also hier als ein eigenthümlicher, hemisphärenartiger Theil, als ein eignes Seehirn: während sie bey den Säugthieren bloß Ganglien darstellen, welche durch die Schühgel in den gemeinschaftlichen Mantel ausstrahlen, und an welchen der Sehnerv nur einen geringern Antheil hat. — Die Sehkugeln wurden von Willis und Haller als *Thalami* und von Cuvier als Hemisphären betrachtet, von Treviranus (Schriften III. S. 26. 31) aber nur für die hintern Theile der Schühgel gehalten und „hintere Hemisphären“ genannt; bey Scarpa heißen sie „*tubercula cerebri majora et olivaria*“, bey Arsaaky „*tubercula optica*.“ Die vordern äussern Stränge (Olivenbündel) treten in die Sehkugeln, und bilden auf dem Boden ihrer Höhle bey einigen Fischen und bey Fröschen Anschwellungen, welche von Cuvier „*corpora striata*“, von Carus (Nervensystem S. 159. 177) „vordere innere Ganglien“ genannt wurden, und von welchen die Strahlung ausgeht. Bey mehreren Fischen findet sich weiter hinten in derselben Höhle ein andres Ganglienpaar, welches mit dem kleinen Hirne zusammenhängt, und vielleicht eine Anschwellung der Bindeärme ist; Cuvier hielt es vormals für Vierhügel; Carus (a. a. O. S. 158. 169) nannte es „hintere innere Ganglien“, und erklärte es für den Centralpunkt des dritten Nervenpaares. Bey den übrigen Fischen und Amphibien, so wie bey den Vögeln, gelte die Fortsetzungen jener

Rückenmarkstränge, ohne zuvor in Ganglien anzuschwellen, in die Strahlung über, und die so gebildete markige Blase helegt sich mit grauer Substanz, welche wieder von einer küssern Markschicht überzogen wird, die sich in den Schnerven fortsetzt. Die Schkugeln liegen bey Fischen und Amphibien neben, und zum Theil so dicht aneinander, daß sie nur eine, durch einen Längeneinschnitt getheilte Kugel darstellen. Bey den Vögeln sind sie nach aussen und unten gedrängt, aber hinten und oben unter einander verbunden durch eine Commissur, welche auf den Bindeärmen und dem Ende der Klappe aufliegt und über die Wasserleitung herübergeht, also das Analogon der hintern Commissur ist, von Treviranus (Schriften III. S. 30) aber für die Vierhügel gehalten wird.

§. 911. Bey den Säugethieren sind die Vierhügel nicht mehr eine eigene, selbstständige Hirnabtheilung, sondern bloße Ganglien, welche sich dem großen Hirne anschließen und in dasselbe eingreifen, indem sie durch die Schhügel in den Mantel strahlen; zugleich findet der Sehnerv nicht mehr ausschließlich sein Centralende in ihnen, sondern rückt mehr in den Schhügel ein. Ihre Größe nimmt in der aufsteigenden Reihe der Säugethiere verhältnißmäßig ab, und in gleichem Maße werden sie immer mehr vom Mantel bedeckt. Bey Nagethieren und Fledermäusen sind sie am größten und unbedeckt; sie werden kleiner bey den Wiederkäuern, noch kleiner bey den größten Raubthieren, und endlich bey den Affen. Bey dem Menschen sind sie im Verhältniß zum Gehirn am kleinsten, am meisten bedeckt, und ihre graue Substanz ist mit einer Markschicht überzogen.

§. 912. Bey dem Embryo scheinen die Schkugeln Uroorgane zu seyn; man findet sie, sobald sich ein Gehirn unterscheiden läßt, und zwar haben sie anfänglich ein entschiedenes Uebergewicht über die übrigen Hirntheile, welches sich nur allmählig bey fortschreitender Entwicklung der Letztern verliert. — Nach Serres (l. p. 3—25. 39—46) erscheinen die Schkugeln bey dem Hühnchen um die Foste Stunde des Brütens als zwey häutige Blätter, welche von unten nach oben verwachsen und so am dritten Tage eine einzige Blase bilden, welche am vierten Tage in zwey sich abschnürt, indem die ursprünglichen Blätter an der Mittellinie in die Höhle der Blase hereinwachsen. Diese beyden Blasen enthalten eine aschgraue Flüssigkeit, welche durch ihre Wandung hindurch schümmert; am achten Tage zeigen sich in Letztrer einzelne Markstreifen, welche bald zunehmen, so daß die Schkugeln am zehnten Tage weiß sind, während das große und das kleine Hirn noch grau ist. Indem sie immer mehr sich aufwölben, bilden sie den obersten Punet des Gehirns; aber vom zehnten bis zwölften Tage fangen sie an, aneinanderzuweichen, während der wachsende vordere Theil des kleinen Hirns an ihre Stelle vorrückt; endlich treten sie, indem ihre Commissur in die Breite fortwächst, nach aussen und unten, so daß nun die vordere Fläche des kleinen Hirns vom 19ten Tage an die Hemisphären des großen Hirns berührt. — Bey dem menschlichen Embryo erscheinen im zweyten Monate ebenfalls zwey gebogene Blätter (Tiedemann Gehirn S. 115), welche dann zu einer länglichen Blase verwachsen, die horizontal liegt, den obersten Theil des Gehirns bildet und einen schwachen Längeneinschnitt hat. Nach und nach kommen sie niedriger zu stehn, indem die vordern Ganglien und die Hemisphären des großen Hirns sich mehr entwickeln; sie bekommen dabey immer mehr eine obrige

Stellung, und werden allmählig von den wachsenden Hemisphären bedeckt; zugleich schwindet nach und nach ihre Höhle, indem ihre Wandung dicker wird. Sie nehmen dabey an Breite zu, und bekommen im siebenten Monate eine Quersfurche, wodurch sie nun erst als Vierhügel erscheinen.

§. 945. Indem sie bey fortschreitender Entwicklung in der Thierreihe und im Lebensalter immer mehr ihr Uebergewicht verlieren und dem großen Hirne untergeordnet werden, können wir sie allerdings den Theilen; bey welchen ein gleiches Verhältniß Statt findet, gewissermaßen gleichstellen, und sie als Gegensätze derer, bey welchen das umgekehrte Verhältniß Statt findet, betrachten; nur giebt eine solche Zusammenstellung, die sich noch mehr vervielfachen müßte, um vollständig zu seyn, keinen weitern Aufschluß über ihre eigenthümliche Natur. So ist es denn zu verstehen, wenn 1) Serres (I. p. XXVII) sagt, daß sie in geradem Verhältnisse zum Rückenmarke stehn, oder dessen Entwicklung der ihrigen entspricht. Wir bemerken aber, daß die Vierhügel in Vergleich zum verlängerten Marke eine höhere Entwicklung sind, und daher in Verhältniß zu demselben in der aufsteigenden Thierreihe zunehmen; denn die Breite des verlängerten Marks verhält sich zur Breite der hintern Vierhügel, nach Tiedemann's Messungen bey Nagethieren, wie 120,71 bis 0,90, bey Raubthieren wie 120,75 bis 88, bey dem Seehunde wie 120,86, bey Affen wie 121 bis 1,20, bey dem Menschen wie 121,25. Im Ganzen genommen sehen wir auch ein gleiches Verhältniß zu dem Rückenmarke, so daß die Breite desselben von der der Vierhügel bey dem Menschen mehr übertroffen wird, als bey den Säugethieren. Was die Oliven, als den einzigen meßbaren Theil des verlängerten Marks, der in eine Beziehung zu den Vierhügeln gebracht werden kann, betrifft, so waren sie bey einem Hemicephalen (Nr. 354) zugleich mit den hintern Vierhügeln stark entwickelt, doch scheint ihre Breite zu der der Letztern bey dem Menschen größer zu seyn, als bey den Säugethieren, und in Hinsicht auf Länge das entgegengesetzte Verhältniß Statt zu finden. 2) Nach Willis (ser. c. 18. p. 87) sollen die Vierhügel in umgekehrtem Verhältnisse zur Brücke, nach Serres (I. p. XXXI) in umgekehrtem Verhältnisse zu den Hemisphären des kleinen Hirns, und in geradem zum Wurme, nach Meckel (Archiv I. S. 375) in umgekehrtem Verhältnisse zum kleinen Hirne überhaupt stehn. — In der aufsteigenden Thierreihe kommt das kleine Hirn, eben so wie das große, immer mehr das Uebergewicht über die Vierhügel. Die Breite der Schkugeln verhält sich zur Breite des Erstern bey Vögeln, abgesehen von ihrer Commissur, wie 11 bis 2, die der hintern Vierhügel bey Nagethieren 111,66 bis 2,75, bey Raubthieren 111,77 bis 2,41, bey Wiederkäuern 111,80, bey Affen 112,30 bis 2,79, bey dem Seehunde 113,20, bey dem Menschen 114 bis 5. Die Längenverhältnisse sind bey Nagethieren 111,30, bey Raubthieren 112 bis 2,20, bey Wiederkäuern 112 bis 2,50, bey Affen 112,40 bis 2,80, bey dem Menschen wie 114 bis 5. Die Vierhügel verhalten sich zum großen Hirne der Länge nach bey Vögeln wie 11,11 bis 2,66, bey Nagethieren wie 122,06 bis 4, bey Raubthieren wie 113,77 bis 8, bey Wiederkäuern wie 124,26 bis 5, bey Affen wie 117,25 bis 9,07, bey dem Seehunde wie 129,50, bey dem Menschen wie 111; der Breite nach bey Vögeln wie 12,50 bis 5, bey Nagethieren wie 12,50 bis 3,50, bey Wiederkäuern wie 12,90 bis 4, bey Raubthieren wie 13,40 bis 4,71, bey Affen wie 14,19 bis 4,75, bey dem Seehunde wie 15,06, bey dem Menschen wie 17.

§. 944. Bey den Raubthieren scheinen die Vierhügel überhaupt verhältnißmäßig mehr entwickelt zu seyn, als bey den Wiederkäuern, besonders aber die hintern, so daß diese die vordern an Größe übertreffen. Bey den Wiederkäuern, Nagern, Einhufern; aber auch bey den kleinern Raubthieren (Igel, Marder u. s. w.) sind die vordern Vierhügel größer, als die hintern. Verhagen (*lib. A tract. 4. c. 7. p. 233*) glaubte, deshalb, daß die vordern Vierhügel auf die Eklust, die hintern auf die Triebhaftigkeit bezogen, und leitete die Kleinheit der Vierhügel bey dem Menschen davon ab, daß bey ihm der Nahrungstrieb mehr untergeordnet ist. Autenrieth (§. 1049.) bezog die hintern auf Gewandtheit und angreifenden Muth, die vordern auf die Schnelligkeit der Bewegung nach einer Richtung hin in der Flucht. — Uebrigens sind bey dem Menschen beyde Paare einander an Größe ziemlich gleich.

§. 945. Um nun zu ihrer Bedeutung fortzuschreiten, weisen wir zunächst die mechanischen Ansichten ab, daß sie bloß als Decke, und Schutz der Wasserleitung dienen, und den Uebergang der thierischen Geister in die vierte Höhle bestimmen (Vesal *lib. VII. c. 9. p. 546*), oder die Zügel vor die Oeffnung der Wasserleitung stoßen (Piccolomini *lib. F. lect. 3. p. 254*), oder als Stützen der Gefäßgeflechte dienen (Marchetti *p. 121*).

§. 946. Man hat bemerkt, daß die Größe der Vierhügel mit der Größe der Augen übereinstimmt, indem beyde Organe bey den Fischen am größten sind, bey Amphibien und Vögeln, dann bey Nagern und Wiederkäuern, hierauf bey Raubthieren, endlich bey Affen immer kleiner werden und bey Menschen am kleinsten sind (Carus Nervensyst. S. 236. Tiedemann *Joanes p. 32*, Serres I. p. XXVII.). Gewiß ist es, daß die Sehkugeln das Organ der Gesichtssensation sind. Flourens (p. 42—45) sah, daß Vögel nach Wegnahme einer Sehkugel auf dem entgegengesetzten Auge, nach Wegnahme beyder Sehkugeln auf beyden Augen sogleich erblindeten; die Iris wurde dabey erst dann gelähmt, wenn die Sehkugel bis auf den Boden weggenommen wurde, so wie auch (p. 152) die Reizung einer Sehkugel Zuckungen in der Iris der entgegengesetzten Seite verursachte. Magendie (*Journ. III. p. 380*) beobachtete ebenfalls nach Zerstörung der Sehkugeln Blindheit, und nachdem er die Hornhaut des einen Auges undurchsichtig gemacht hatte, Atrophie der Sehkugel der entgegengesetzten Seite. Doch scheinen die Sehkugeln den Sehaft selbst nicht zu vollenden, denn wenn, ohne daß sie verletzt wurden, Flourens die Hemisphären wegnahm, erfolgte Blindheit. Bey Säugethieren und bey Menschen ist es noch entschiedner, daß die Vierhügel weder das eigentliche und alleinige Sensationsorgan des Gesichts sind, noch auch ihre Thätigkeit einzig auf das Sehen bezogen ist. Denn was das Erste anlangt, so wurzelt der Sehnerv mehr im Sehhügel, und Abnormitäten desselben verursachen häufiger (= 13,11), als die der Vierhügel (= 13,66) Blindheit, wie denn auch Rudolphi (Berliner Akademie. 1815 S. 28) bey einem Kinde, wo Sehnerv und Auge der rechten Seite fehlte, nur die Sehhügel abnorm, die Vierhügel aber normal fand. Was aber das Zweyte betrifft, so hat der Maulwurf vollständige und große Vierhügel, so wie der Proteus Sehkugeln, ohne Sehnerven.

§. 947. Auf der andern Seite scheinen sie derjenige Punct zu seyn, welcher näher als ein andrer Theil des großen Hirns mit dem Gehör zusammenhängt, denn bey den

Abnormitäten derselben kam Taubheit viel häufiger ($=1:5,50$), als bey denen der vordern Ganglien, namentlich der Streifenhügel ($=1:25,66$) und der Hemisphären ($=1:36,88$) vor. Ist dies gegründet, so stellen die Vierhügel den Centralpunct des Gehörs im großen Hirne dar, und dies wird dadurch möglich, daß die hintern Stränge, welche die Centralenden des Hörnerven aufnehmen, theils durch die Rautengrube zu den Wänden der Wasserleitung gelangen und am Boden der Vierhügel hängen, theils in das kleine Hirn ausstrahlen, von wo die Bindeärme an die Vierhügel gebn. Die Vögel, welchen Florens (p. 92) die Sehkugeln genommen botte, hörten zwar noch; doch ist dies daraus erklärlich, daß bey ihnen nur die Commissur derselben mit den Bindeärfen und mit den in der Wandung der Wasserleitung fortgehenden hintern Strängen in Verbindung tritt, diese Basis der Sehkugeln aber von Florens nicht verletzt wurden.

§. 948. Gall hatte die Vermuthung, daß die hintern Vierhügel das Centralende des Riachnerven enthalten sollten, bloß flüchtig hingeworfen. Treviranus (Biologie VI. S. 147. fg.) behauptete aber, daß die Vierhügel durch die Zärbeltiele mit diesem Nerven, überhaupt aber mit allen Nerven der Sinnesorgane, namentlich durch Fasern, die von ihnen zum vordern Rande der Brücke gingen, mit dem dritten, und durch die Schleife mit dem fünften, sechsten und zwölften Paare zusammenhängen. Ein solcher Zusammenhang läßt sich indeß, soviel ich sehe, nur mit dem fünften Paare nachweisen; dieser ist aber auch um so bedeutender. Nämlich die vordere Wurzel des fünften Paares gebt in den äußern Hülsenstrang, welcher als Schleife die Vierhügel ganz eigentlich bildet; die hintere Wurzel aber geht in die hintern Stränge, welche die Unterlage der Vierhügel bilden und mit dem äußern Hülsenstrange, welcher als ein gebogenes Blatt sie einschließt, die Haube darstellen. Die Vierhügel sind also der gangliöse Punct, welcher das fünfte Nervenpaar, und besonders durch die Schleife die vordere sensible Wurzel desselben beherrscht. Zwar geht diese Wurzel von der Brücke aus abwärts gegen das Rückenmark im äußern Hülsenstrange; allein, daß die Impulse in der Länge eines Stranges nach unten und dann wieder nach oben gehen können, ist uns bey Betrachtung der Verhältnisse der Kreuzung (§. 802.) wahrscheinlich geworden. Die verhältnißmäßig stärkere Entwicklung des fünften Nerven bei den niedern Thieren trifft auch einigermaßen mit der Größe der Vierhügel zusammen.

§. 949. Die Vierhügel würden demnach die höhern Centralpuncte für den fünften Nerven, welcher das Gemeingefühl als die subjective Seite aller Sinnenthätigkeit vermittelt, und für den achten Nerven seyn; dessen Sinn in Vergleich zum Gesichtsinne ebenfalls durch vorwaltende Subjectivität sich bezeichnet. Für das Sehen geben sie nur die in den Hemisphären auszubildende Grundlage, also auch mehr die-receptive, subjective Seite. Dabey empfangen sie durch die Bindeärme unmittelbar die im kleinen Hirne erzeugte Lebensspannung, welche zunächst auf die Subjectivität sich bezieht. Da nun das große Hirn vorzüglich auf Erkenntniß sich bezieht (§. 954.), die subjective Erkenntniß aber das Gefühl abgibt, so werden die Vierhügel, diese untersten Ganglien des Großhirnstammes, namentlich der Haube, die Organe des Gefühls seyn. Wie das Gefühl den Anfang aller Erkenntniß ausmacht und auf einer niedern Stufe geistiger Entwicklung das Vorherrschende ist, so entwickeln sich die Vierhügel bey dem Embryo zuerst, und blei-

ben bey den niedern Thieren überwiegend; und wie bey fortschreitender Ausbildung das Fühlen in ein klares Denken verwandelt und dem geistigen Wirken untergeordnet wird, so treten bey den höhern Thieren, und am meisten bey dem Menschen, die Vierhügel zurück, beherrscht von den vordern Ganglien und deren Strahlungen in den Hemisphären. — Uebrigens werden die Vierhügel, als bloße Ganglien erst in ihrer Anstellung die deutlichen und bestimmten Gefühlsvorstellungen vermitteln; sie selbst hingegen mehr die dunklern Rührungen des sinnlichen Gefühls sammeln. Da nun jede Einwirkung auch eine Rückwirkung mit sich führt, so werden sie auch in einer nähern Beziehung, als andre Theile des großen Hirns, zu den dunkeln Trieben, zum Instincte und zu den unwillkürlichen Bewegungen stehn. — Diese Ansicht stimmt großentheils mit der von Willis aufgestellten überein. Nach ihm (ser. c. 14. p. 70. c. 18. p. 87. sq.) bewirken sie unmittelbar den Instinct: indem sie nämlich die thierischen Geister aus dem kleinen Hirne in das große Hirn führen, theilen sie diesem die von den Eingewinden empfangenen Eindrücke mit, bereiten den Antrieb vor, welcher sich in ihm entwickeln soll, und wecken Begehungen. Dagegen sind sie bloß Durchgänge für die Gemüthsbewegungen, indem sie diese von dem großen Hirne auf das kleine Hirn, und dadurch auf die Rumpfeingeweide und Gesichtsmuskeln fortpflanzen. Darum, führt Willis fort, sind sie größer bey den ungelehrten Thieren, den Wiederkäuern und Schweinen, bey welchen der Instinct Alles ersichten muß; kleiner bey Hunden, Füchsen u. s. w.; welche nach der Geburt nicht sogleich ihre Sinne gebrauchen und ihr Futter suchen können, aber mehr für Gemüthsbewegungen empfänglich sind.

§. 950. Wir dürfen vermuthen, daß das Organ, in welchem die Beziehung auf subjective Erkenntniß vorwaltet, auch selbst ein sehr reges Gemeingefühl hat; und in der That scheinen die Vierhügel nächst dem Gewölbe der empfindlichste Punkt des großen Hirns zu seyn, indem ihre Abnormitäten am häufigsten (1:1,83) Schmerzen erregen. Die Richtigkeit dieses pathologischen Resultates wird dadurch bestätigt, daß es mit dem Schwindel, als einer eignen Form des Gemeingefühls dieselbe Bewandniß hat: er geht am häufigsten vom Gewölbe, nächst dem von den Vierhügeln (= 1:11), viel seltner von den übrigen dem Ganglien und von den Hemisphären aus.

§. 951. Unsere pathologischen Beobachtungen lehren uns ferner, daß die Vierhügel in ihrem krankhaften Zustande ungleich häufiger, als alle andre Organe (= 1:2,75) das Gefühl ergreifen und das Gemüth verstören, und das Gewölbe zunächst darauf folgt. Nächst dem Gewölbe bewirken aber die Vierhügel häufiger, als andre Hirntheile (= 1:2,75), Delirium, da die Phantasie mit dem Gefühle nahe verbunden ist. Sie verursachen ferner mit dem Bindehirne häufiger, als andre Organe, Verrücktheit (= 1:5,50), und häufiger, als die übrigen Stammganglien, Blödsinn (1:41). — Schwäche des Gedächtnisses ging am häufigsten von den Vierhügeln (= 1:2,75), hiernächst von den vor ihnen liegenden Sehhügeln (= 1:13,25) und dem hinter ihnen liegenden kleinen Hirne (= 1:13,58) aus. So schätzen denn die Vierhügel als Mittelglieder jener Organe, als Indifferenzpunkte von Bewusstseyn und von pflanzlicher Lebensspannung der Seele auf das Gedächtnis zu wirken. — Als die untersten Ganglien des Großhirnstammes und als Organe, in welchen die Beziehung zum Gefühle vorherrscht, haben sie geringern Einfluß auf das Bewußt-

seyn, und ihre Abnormitäten erregen seltner, als die der übrigen Ganglien so wie des Mantels, Betäubung (= 1:5,50). Dies stimmt mit Flourens (p. 44. 92. 155) Beobachtungen überein: Hühner, welchen beyde Schkugeln genommen worden waren, zeigten keine Störung des psychischen Lebens, äusserten Gedächtnis und Verstand, wie vorher; giengen, da sie blind waren, mit besonder Vorsicht, wichen einem Widerstande, auf den sie stiessen, aus, hörten auf den Ruf, suchten, fanden und wählten ihre Nahrung, und erwiederten die Liebkosungen des Hahns. Wir dürfen vermuthen, daß die letzte Erscheinung würde weggefallen seyn, wenn die Commissur mit den Bindeärmen zerstört, und so die Verbindung mit dem kleinen Hirne aufgehoben worden wäre. — Uebrigens tritt auch bey Abnormitäten der Vierhügel seltner, als bey denen der übrigen Ganglien, Apoplexie ein.

§. 952. Flourens (p. 1. 21) behauptet, daß die Vierhügel, als der Gipfel des Hirnstamms, der oberste Punct sind, welcher die Muskelbewegung unmittelbar erregt. Allein er stützt sich dabey bloß darauf, daß bey Reizung derselben (p. 18. 20) Zittern und Krampf erfolgte, was bey Reizung der vordern Ganglien nicht der Fall war: dies deutet aber bloß auf die höhere Empfindlichkeit der Vierhügel, da wir wissen, daß die Verletzung empfindlicher, die Bewegung nicht unmittelbar bestimmender Organe Krämpfe erregt. Nach Wegnahme beyder Schkugeln (a. a. O. p. 43 sq.) entstanden heftige Convulsionen, aber die Thiere konnten nachher eben so gut, wie zuvor, stehn, gehn und fliegen. Thiere, welchen Magendie (Journ. III. p. 379) die Vierhügel genommen hatte, erlitten dadurch gar keine Störung der willkürlichen Bewegung. Damit stimmen nun auch unsre pathologischen Beobachtungen überein. Allgemeine Krämpfe gingen höchst dem Hirnanhange am häufigsten von den Vierhügeln (= 1:2,30) aus, aber Hemiplegie und allgemeine Lähmung gehörte nicht zu den Symptomen ihrer Abnormitäten, wiewohl diese nicht selten die Lähmung einzelner Gliedmaassen bewirkten. Dagegen verursachten sie häufiger, als die Abnormitäten eines andern Hirnthells, Lähmung des Kiefers (= 1:11) und des Speiseröhrenkopfs (= 1:5,50), welches aus ihrem Zusammenhange mit den hintern Strängen, und dadurch mit der hintern Würzel des fünften, so wie mit dem neunten und zehnten Nervenpaars erklärlich ist.

§. 953. Wenn sie auf diese Weise der Punct sind, welcher die zum Theil unwillkürlichen Nahrungsbewegungen bestimmt, so werden sie auch mit der Verdauung überhaupt in einem nähern Zusammenhange stehn. In der That lehren uns die pathologischen Beobachtungen, daß Erbrechen (= 1:5,50), Verstopfung (= 1:11) und unwillkürliche Ausleerung (= 1:11) häufiger von den Vierhügeln und demnächst von den Seitenhöhlen, als von andern Hirngebilden, ausgeht. Wir dürfen also wohl vermuthen, daß die Vierhügel, so fern sie in ihrer (von Flourens in obigen Versuchen nicht verletzten) Unterlage mit den hintern Strängen in Verbindung stehn; auch das nächste, in den Hemisphären weiter entwickelte psychische Moment der Verdauung enthalten und das Gemeingefühl der Verdauung, so wie den Nahrungstrieb vermitteln (§. 944).

§. 954. Die Sehhügel sind als eine Wiederholung der Vierhügel, aber mit gesteigerter Entwicklung, namentlich mit verstärktem Antheile der vordern Stränge zu betrachten. Sie bestehen nämlich theils aus den fortgehenden Faserungen der Vierhügel, theils aus der obern Schicht der Hirnschenkel. Zu den hintern und seitlichen Strängen, den

Bindegewebe und den äussern Halsensträngen, welche zusammen die Haube und die Vierhügel ausmachen, kommen also noch die Olivenkernstränge, oder die Fortsetzungen der vordern grauen Seitenstränge des Rückenmarks, um die Sehhügel zu bilden. Die Olivenkernstränge sind also ihr charakteristischster und wesentlichster Theil.

§. 955. Deutlich entwickelte Sehhügel giebt es bey den Fischen noch nicht, wenn sich auch hin und wieder Andeutungen derselben finden (*Carnus Nervensystem* S. 176). Sie zeigen sich zuerst bey Amphibien, und dann etwas mehr entwickelt bey Vögeln, als kleine, graue, mit ihren innern platten Flächen dicht aneinander liegende, zum Theil unter einander verwachsene Hügel, welche *Treviranus* (*Schriften* III. S. 32) „Schenkel der hintern Hemisphären“ nennt. Bey den Nagethieren sind sie noch klein und platt; in den folgenden Ordnungen nehmen sie allmählig zu, und zwar bekommen sie 1) nach und nach ein Uebergewicht über das verlängerte Mark, indem die Breite eines Sehhügels zu der des verlängerten Marks bey Raubthieren wie 1:2 bis 2,50, bey Affen wie 1:1,81 bis 2,08, bey Nagethieren wie 1:1,35 bis 1,75, bey Menschen wie 1:1,09 sich verhält; die Breite des verlängerten Marks verhält sich zur Länge des Sehhügels bey Nagethieren wie 1:0,40 bis 0,85, bey Raubthieren wie 1:0,83 bis 1,00, bey Menschen wie 1:1,02, bey Affen wie 1:1,14 bis 1,40, bey Menschen wie 1:2,05. Die Länge der Oliven verhält sich zu der der Sehhügel bey den meisten Säugethieren wie 1:2,50 bis 3,50, bey Menschen wie 1:3,55, bey Affen wie 1:2,25 bis 2,35, bey Menschen wie 1:4,50. 2) Bey den höhern Thieren bekommen sie immer mehr das Uebergewicht vorzüglich in der Länge, über die Vierhügel, so wie auch über die Hirnschenkel; die Länge der Vierhügel verhält sich zur Länge der Sehhügel bey Nagethieren wie 1:0,73 bis 1,33, bey Wiederkäuern wie 1:1,30, bey Raubthieren wie 1:1,44 bis 1,90, bey Affen wie 1:2,25 bis 2,35, bey Menschen wie 1:2,80 bis 2,90, bey Menschen wie 1:2,95.

§. 956. Beym Embryo erscheinen die Sehhügel im zweyten Monate, unbedeckt, niedriger als die Vierhügel, kleiner als dieselben, und von einander ganz getrennt. Im dritten Monate rücken sie höher herauf, und werden von den Hemisphären bedeckt. Im vierten Monate werden sie durch ein Markblatt, welches an ihrer obern Fläche liegt und späterhin verschwindet, so wie dann auch durch die weiche Commissur, unter einander verbunden.

§. 957. Wenn die Sehnerven bey den Fischen einzig in die Sehhügel, bey den Vögeln zum Theil auch in die Sehhügel sich einsenken, so treten sie bey den Säugethieren immer mehr in die Letztern, und diese werden so allmählig die eigentlichen Centralpunkte des Gesichtsinnes. Daher ist denn die Frequenz der Blindheit bey Menschen am größten (= 1:3,11) bey Abnormitäten der Sehhügel, etwas geringer bey denen der Vierhügel (= 1:3,66), noch geringer aber bey denen aller übrigen Hirnthelle. Man findet nicht bloß bey Menschen (z. B. *Wenzel. op. p. 115. 117*), sondern auch bey Thieren nach Amaurose oder Zerstörung eines Auges bald auf derselben Seite (*Malacarne encephalot. p. 159*), bald auf der entgegengesetzten (*Rudolphi Abhandlgg. S. 32*, *Sömmering de cerebri administ. p. 76*) den Sehnerven und den Sehhügel atrophisch, woran die Vierhügel zuweilen, aber nicht immer Theil nehmen. *Rudolphi* (*Berliner Akad. 1815*) fand bey normalen Vierhügeln den rechten Sehhügel abnorm und unentwickelt bey einem Kinde, welchem das rechte Auge fehlte, und bey einem andern Kinde (*Malacarne in Harles*

meinem Journ. d. anal. Lit. II. 1. St. S. 189) fehlten beyde Sehhügel und beyde Augen. — Nach der obigen Angabe kommen bey Abnormitäten der Sehhügel auf einen Fall von Blindheit oder Gesichtsschwäche zwey Fälle ohne Störung des Sehens; In dem größern Theile dieser Fälle war nur der eine Sehhügel abnorm: theils konnte hier die Affection des entsprechenden Auges übersehen werden, da häufig das eine Auge schwächer ist, ohne daß man es bemerkt; theils konnte, da jeder Schnerve aus beyden Sehhügeln Fasern erhält, der gesunde Sehhügel die Function des kranken mit übernehmen. Waren aber beyde Sehhügel abnorm (z. B. Nr. 858), so erstreckte sich diese Abnormität wahrscheinlich nicht über denjenigen Punct, welcher die Centralenden des Sehnerven enthält, und den allerkleinsten Theil des Sehhügels ausmacht, und es geht daraus bloß soviel hervor, daß diese Ganglien nicht allein zum Sehen dienen, sondern noch eine andre Function haben, wie dies schon Lancisi (*de sede animae* p. 161) wegen ihrer Größe vermuthete.

§. 958. Nach den pathologischen Beobachtungen kommen bey Abnormitäten der Sehhügel seltner, als bey denen der Vierhügel, und häufiger, als bey denen der Streifenhügel, Schmersen, Schwindel Verrücktheit, Blödsinn und Amnesie vor; ferner seltner, als bey denen jener Ganglien, Delirium und Verstümmung des Gemüths; häufiger hingegen Betäubung, und häufiger, als bey der Abnormität irgend eines andern Hirnthells, Apoplexie. Wir müssen es versuchen, aus diesen Thatsachen Schlüsse in Betreff der psychischen Functionen zu ziehen. Die Apoplexie ist eine Hemmung des Hirnlebens, welche nicht bloß das Bewußtseyn, sondern auch das Leben der Sinnesorgane, der Rumpfeingeweide und der willkührlichen Muskeln ganz oder theilweise schwächt, oder unterbricht, oder aufhebt. Wenn nun die Apoplexie ungemein häufig (= 1:1,82) und häufiger, als von irgend einem andern Hirnthelle, von den Sehhügeln ausgeht, so müssen diese der Wendepunct seyn, in welchem Bewußtseyn und pflanzliches Hirnleben zusammenstreffen, und in welchem namentlich die Macht des Gehirns über die Gesamtheit des leiblichen Lebens am größten ist. Sie erlangen diese Macht dadurch, daß sie außer ihrer eigenen bedeutenden Masse Fortsetzungen des Hirnstamms enthalten, welche theils in den Vierhügeln noch fuhren, theil nicht bis zu den Streifenhügeln reichen; dadurch also, daß sie allein die Totalität des Hirnstamms in sich begreifen und den eigentlichen Gipfel oder die höchste Entwicklung desselben darstellen.

§. 959. Die Betäubung kommt bey ihren Abnormitäten ziemlich häufig (= 1:3,31), und häufiger, als bey denen der übrigen Ganglien, aber seltner, als bey denen der Belohnungsorgane und der Hemisphären des großen Hirns vor. Sie haben also unter den Ganglien den meisten Einfluß auf die erste Aeußerung der Spontaneität der Seele, auf das Vermögen, die sinnlichen Eindrücke in Einheit zusammenzufassen, und so sich selber selbst bewußt zu werden. Da aber dieser ihr Einfluß geringer ist, als der der Hemisphären, so erscheinen sie als Mittelglieder zwischen diesen, und den übrigen Ganglien des Hirnstamms. Ihre räumlichen Verhältnisse entsprechen diesem Charakter, indem der größte Theil des Stielkranzes von ihnen ausgeht, weshalb sie denn auch Cuvier (*Nervensystem* S. 277) als den Brennpunct der höchsten Centralmasse bezeichnet. Sie erscheinen als der Mittelpunct des Gehirns; durchbohrt und umkreist vom Gewölbe, nach vorne und hinten mit dem Hirnanhange; nach hinten und oben mit der Zirbel zusammenhän-

gend, werden sie von der meisten Hirnmasse umlagert; in ihrer Höhe breitet sich das Gehirn am weitesten seitlich aus, und treibt den hintern Theil des Schuppenheins auf; und in ihrer Länge wölbt es sich zum Scheitel auf. — Die Sehhügel sind also die Wurzel des Bewusstseyns, welches im Stahkranze sich entwickelt und in den Belegungsorganen sich vollendet. Die Sehhügel enthalten das Centralende der Sehnerven, indem wenigstens die obre Wurzel unmittelbar sich in sie einsenkt, und die Faserung der Vierhügel, welche die untre Wurzel aufgenommen hat, in sie tritt. Sie sind also der eigentliche Centralpunkt des Sehens. Wie nun das Sehen die höchste, umfassendste, ihr Object am bestimmtesten und schärfsten erkennende Sinnesfähigkeit ist, so müssen auch die Sehhügel in Verhältniß zum übrigen Hirnstamme mit der klaren, objectiven Erkenntniß in der nächsten Beziehung stehen.

§. 960. Mit dem ersten Erwachen des Bewusstseyns, mit der beginnenden Richtung auf das innre Leben, tritt das Gemeingefühl zurück; es entsteht denn bey Abnormitäten der Sehhügel, Schmerz ($\approx 1:3,3$) und Schwindel ($\approx 1:33,00$) viel seltner, als bey denen der Vierhügel, aber auch etwas seltner, als bey denen des Mantels, da das entwickelte Bewusstseyn auch, wiewohl untergeordnet, die Regungen des Gemeingefühls umfaßt. Ein Gleiches gilt von der Reizbarkeit des Gemüths, welche von Abnormitäten der Sehhügel ($\approx 1:26,50$) sehr viel seltner, als von solchen der Vierhügel und selbst des Mantels, verstimmt wird, da die Faserungen, welche in der Vierhügeln ihren Culminationspunkt gefunden hatten, durch die Sehhügel bloß hindurch streichen, um dann in den Mantel sich auszubreiten. Es gilt aber endlich auch von dem Delirium, und zwar so, daß dieses seltner, als von den meisten andern Hirntheilen, von den Sehhügeln ($\approx 1:13,75$) ausgeht, indem das einfache Bewusstseyn, auf welches Phantasie und Urtheilskraft noch nicht einwirken, von der Verwirrung der Vorstellungen am freyesten sich erhält.

§. 961. Die Verrücktheit geht von den Sehhügeln ($\approx 1:10,60$) seltner, als von den Vierhügeln, und häufiger, als vom Mantel aus, denn die beherrschende Befangenheit in einem Wahne über die Verhältnisse und die Störung der Urtheilskraft hat am seltensten in einem Gebrechen dieser selbst ihren Grund, häufiger in Abnormitäten des plastischen Lebens, deren Wirkungen auf den Hirnstamm und dessen Gipfel, die Sehhügel, sich fortpflanzen, am häufigsten aber in der erkrankenden Subjectivität und in abnormer Erregung des Gefühls. — Wenn auch die Amnesie am häufigsten von den Vierhügeln, weniger häufig von den Sehhügeln ($\approx 1:13,25$), und noch weniger vom Mantel abhängt, so beruht dies vielleicht darauf, daß die im kleinen Hirne erzeugte Lebensspannung, so den für die Subjectivität wirkenden Vierhügeln einen Einfluß auf die Erinnerungskraft ausübt, welcher in den folgenden Ganglien und im Mantel immer mehr abnimmt. — Der Blödsinn endlich wird durch Abnormitäten der Sehhügel seltner, als durch solche der Vierhügel nach des Mantels veranlaßt.

§. 962. Die bisher an Thieren angestellten Experimente konnten kein reines Resultat geben, da theils die Sehhügel nicht in ihrem ganzen Umfange zerstört, theils dabey andre Theile mit verletzt wurden. Zinn (Haller *disp. VII. p. 424. 425.*) stieß einem Hunde einen Troikar mitten durch den Balken und durch die Sehhügel, wo sie aneinander liegen: der Hund blieb munter, zeigte Aufmerksamkeit auf das Bellen eines andern

Hundes, und war auch am folgenden Tage wohl. Ein anderer, welchem der Troikar durch den Balken und den Sehhügel gestoßen war, lief herum, als ob ihm nichts zugestoßen wäre, und war am folgenden Morgen nur müd, ohne Bewegung und Empfindung verloren zu haben. Ein dritter Hund, der eben so behandelt worden war, war anfangs betäubt, kam nach einigen Stunden zu sich, heulte die ganze Nacht, und war am folgenden Morgen auf der einen Seite gelähmt, doch munter. — Roland (p. 33. 36. sq.) verletzten bey verschiedenen Thieren die Vierhügel und Sehhügel; es entstanden Krämpfe, die willkürlichen Bewegungen wurden unsicher, unregelmäßig wie bey einem Betrunknen, die Füße bald höher gehoben, als nöthig war, bald geschleppt; die Thiere drehten sich im Kreise und waren auf der einen Seite etwas gelähmt. — Flourens (p. 19) stach in die Sehhügel, und nahm sie schichtweis weg, ohne das Krämpfe erfolgten. — Magendie (*Journ. III. p. 376, 379*) nahm die obre Hälfte der Sehhügel weg, und die willkürliche Bewegung wurde dadurch gar nicht gestört. — Nach unsern pathologischen Beobachtungen wirken die Sehhügel stärker auf die willkürliche Bewegung ein, als die Vierhügel. In Verhältniß zu den übrigen Hirnthellen überhaupt verursachen die Abnormitäten der Sehhügel am häufigsten Lähmung der Gesichtsmuskeln ($= 1:6,63$), der Augenlider ($= 1:13$), der geraden Augenmuskeln ($= 1:17$), und der Pupille ($= 1:17$), so daß also die auf das Sehen bezogene Irrthätigkeit vorzüglich durch sie bestimmt wird.

§. 963. Ihr Einfluß auf die Rumpfloorgane scheint geringer zu seyn, als der der Vierhügel, wenigstens entstand bey ihnen Abnormitäten viel seltner Erbrechen ($= 1:17,66$), Verstopfung ($= 1:17,66$) und unwillkürliche Ausleerung ($= 1:55$). Häufiger, als bey Abnormitäten der andern Hirnthelle, war die Harnaussleerung dabey gestört ($= 1:15$).

§. 964. Die Streifenhügel sind die letzte Entwicklung des Hirnstammes, und werden gebildet von den Fortsetzungen derjenigen Schichten des Sehhügels, welche weder in den Hirnnhang, noch in den Mantel übergegangen sind, ehe der Hinzutritt der vordersten oder untersten, aus den Pyramiden- und innern Hüsensträngen gebildeten Schichten der Hirnschenkel.

§. 965. Sie fehlen bey den Fischen, denn die vordern innern Ganglien der Sehkugeln können schwerlich als ihnen analog betrachtet werden (*Carus Nervensystem S. 155*). Dagegen zeigen sie sich bey Amphibien und Vögeln am Ende des Hirnstammes, wo derselbe in den Mantel ausstrahlt, am Russern Theile des Bodens der Hirnhöhle. Bey den Säugethieren scheinen sie im Ganzen genommen mit fortschreitender Entwicklung des Gehirns in Verhältniß zum verlängerten Marke und zu den Pyramiden an Größe zuzunehmen; in Verhältniß zum Mantel hingegen zurückzutreten.

§. 966. Bey dem menschlichen Embryo bilden sie sich im zweyten Monate, eben den Sehhügeln, von diesen, so wie vom Mantel scharf geschieden, verhältnismäßig ziemlich lang, und mehr nach unten liegend. Allmählig entwickeln sie sich mehr nach vorn und oben, rücken den Sehhügeln näher, und mehr in den Anfang des Mantels herein.

§. 967. Die Abnormitäten, welche am häufigsten in ihnen vorkommen, sind besonders Erweichung, dann Blutergießung und endlich Eiterung. Sie scheinen in dieser Hinsicht mit dem kleinen Hirne und mit dem Oberlappen des großen Hirns am meisten übereinzustimmen. Morgagni (I, 18. III, 18) bemerkte schon die Häufigkeit der Blut-

ergießungen in ihnen, und leitet dieselbe theils aus ihrem Reichthume an Gefäßen, theils aus ihrer weichen Consistenz ab. Das Verhältniß der Gefäße ist, wie auch Briche-
10220 (*Journal, compl.* I. p. 292), wohl das bedeutendste Moment: es dringen nämlich in
Verhältniß zu andern Hirngebilden die meisten und stärksten Arterienriser von unten
her unmittelbar in die Sehhügel und vornehmlich in die Streifenhügel. Wir dürfen da-
her wohl auch ein regeres Leben in ihnen vermuthen.

§. 968. Ein Blick auf die pathologischen Beobachtungen lehrt uns, daß die Streifen-
hügel in der nächsten Beziehung zur willkürlichen Bewegung stehn. Ihre Abnormitäten
verursachen häufiger, als die eines andern Hirnthteils, Hemiplegie (= 11,97); häufiger, als
die der Sehhügel und Vierhügel, allgemeine Lähmung (= 119,25), Lähmung des Halses
(= 119) und der Zunge (= 115,13). Also bestimmen sie vorzüglich diejenigen Bewegun-
gen, in welchen die Irritabilität am reinsten und freyten hervortritt: nur die örtliche
Lähmung eines Arms oder eines Beins ging häufiger von den Vierhügeln aus. Sie wür-
ken weniger, als die Vierhügel, auf die den unwillkürlichen sich nähernden Bewegun-
gen des Kiefers (= 177) und des Speiseröhrenkopfs (= 138,50), und weniger, als die
Sehhügel auf die Muskeln des Gesichts (= 18,55), des Augenlids (= 138) und des Aug-
apfels. — Alle an Thieren angestellte Experimente bewiesen den Einfluß der Streifen-
hügel auf die Gliedmaßen. Pettit (*prix de phil.* XI. p. 178) fand, daß, wenn er bey
Hunden die Hälfte des großen Hirns abschnitt, keine vollständige Lähmung erfolgte, wenn
er nicht auch die Streifenhügel zerstörte. Saucerotte (ebend. X. p. 330) durchstach
den rechten Streifenhügel und sah darauf Lähmung der linken Gliedmaßen und der
rechten Hälfte des Gesichts. Ein Hund, welchem Zinn (Haller *diap.* VII. p. 429) den
linken Streifenhügel durchbohrte, wurde rechts gelähmt. Arneemann (S. 174) sah bey
allen seinen Versuchen nur dann vollkommne Lähmung, wenn er die vordern Hirnhö-
hlen und die Streifenhügel verletzt hatte. Caldani (ital. Bibl. L 2 St. S. 371) nahm bey
18 Hunden einen Theil der Streifenhügel weg: ohne Ausnahme wurde dadurch Empfin-
dung und Bewegung in den Gliedern der entgegengesetzten Seite vernichtet. — Saucer-
rotte (a. a. O. p. 178. 299) stellte daher den allgemeinen Satz auf: daß eine Abnormität
an oder in den Streifenhügeln früher oder später Lähmung bewirke. Nur wäre es zu
weit gegangen, behaupten zu wollen, daß bey jeder Lähmung die Streifenhügel abnorm
seyen (Prochaska *adnotat.* III. p. 203). — Da nun die Streifenhügel ihre Eigenthüm-
lichkeit vorzüglich durch die Pyramidenstränge erhalten, und bey ihrer Abnormitäten am
häufigsten die entgegengesetzte Seite gelähmt wird, diese Stränge aber zu der gegenüber-
liegenden Seite herübergehn, so müssen dieselben die vorzüglichsten Leiter für die Im-
pulse des Willens seyn. Wenn Magendie (*Journal* III. p. 379) bey Kaninchen bloß
die graue Substanz der Streifenhügel wegnahm, ohne die Markfasern zu verletzen, so
wurde die Bewegung nicht im mindesten gestört.

§. 969. Auf diese Erfahrungen gestützt, erklären wir die Streifenhügel für die Or-
gane des körperlichen Willens, in demselben Sinne, in welchem wir von Organen psy-
chischer (§. 471.) und lebendiger (§. 469.) Kräfte überhaupt sprechen. Wir drücken also
damit nur aus, daß diese Gebilde mit der freyen willkürlichen Bewegung in einer nä-
hern Beziehung stehn, oder mehr zu derselben heytrogen, als die übrigen Hirnthteile. Den

verschiedenen Antheil der Hirngebilde an der Bewegung auf besondere Muskeln oder besondere Richtungen zu beziehen, ist aber wohl ein verfehltes Streben. Dahin gehören die Vermuthungen von Magendie, Saucerotte, Foville und Serres. Erstere (*Journal III*, p. 376, 399) sah, daß Thiere nach Verletzung der Streifenhügel oder nach Trennung derselben von den Sehhügeln durch einen senkrechten Schnitt, wenn sie abgelassen wurden, fortliefen, nach Verletzung oder Zerstörung des kleinen Hirns aber den Körper nach hinten bogen (§. 909.), oder nach hinten fielen und nicht mehr laufen konnten. Er erklärte diese sehr begreiflichen Erscheinungen durch die Annahme, daß in den Streifenhügeln die Kraft liege, rückwärts zu gehn, und im kleinen Hirne die Kraft vorwärts zu schreiten. — Saucerotte (*prol. de chir.* X, p. 334. sq. 358) glaubte, aus seinen an Hunden angestellten Versuchen schließen zu dürfen, daß die Streifenhügel in den vordern und hintern Gliedmaßen, die Vorderlappen in den hintern, und die Hinterlappen in den vordern Gliedmaßen die Bewegung bewirkten. Foville und Pinel Grandchamp (p. 7—15) zogen aus ihren pathologischen Beobachtungen eine ähnliche Folgerung, nämlich, daß die Bewegung der obern Gliedmaßen von den Sehhügeln und Hinterlappen des großen Hirns, die der untern Gliedmaßen von den Streifenhügeln und Vorderlappen bestimmt werde. Damit übereinstimmend glaubt Serres (Magendie *Journal III*, p. 126), daß die Strahlung der Sehhügel in den hintern Theil der Oberlappen und in die Hinterlappen auf die Bewegung der Arme, und die Strahlung der Streifenhügel in die Vorderlappen auf die der Beine sich beziehe. — Es scheint aber, als habe man hier aus einzelnen Beobachtungen voreilig und falsch geschlossen. Die im Anhangs gegebene Sammlung von Beobachtungen giebt ein ganz andres Resultat. Zuvörderst nämlich kommen Abnormitäten in den genannten Hirntheilen ohne Affection der Gliedmaßen vor; folglich kann hier nicht ein so bestimmtes materielles Verhältniß gedacht werden. Dann haben wir Fälle, wo die obern Gliedmaßen bey ausschließlicher Abnormität in den Streifenhügeln und Vorderlappen (Nr. 48, 188, 215, 296, 593, a, 754, 978, 1056) allein oder (Nr. 277, 463, 509, 919) vorzüglich gelähmt waren, und umgekehrt finden wir Fälle, (Nr. 83, 356), wo die untern Gliedmaßen gelähmt, und bloß im Hinterlappen Abnormitäten zu entdecken waren. Auch Leuret (*Prociop* Nr. 104, S. 212) führt Fälle an, wo bey Erweichung der Streifenhügel die obern, bey Erweichung des kleinen Hirns und der Hinterlappen die untern Gliedmaßen gelähmt waren. Auch nicht einmal in der größern Frequenz zeigte sich ein solches Verhältniß, wie jene Beobachter annehmen, vielmehr kam eine Lähmung der obern Gliedmaßen häufiger vor bey Abnormitäten der Vierhügel, Streifenhügel, Sehhügel und des großen Hirns; Lähmung der untern Glieder aber bey Abnormitäten der Brücke, des verlängerten Marks und des kleinen Hirns. Auch schien es, als ob die Gliederbewegung überhaupt in einer nähern Beziehung zu den Streifenhügeln, dem kleinen Hirne und den Hinterlappen des großen Hirns stünde; denn eine Lähmung sowohl der obern, als der untern Gliedmaßen kam häufiger vor bey Abnormitäten der Streifenhügel, als der Sehhügel, häufiger bey denen des Kleinen, als des großen Hirns, häufiger bey denen der Hinterlappen, als der Vorderlappen. Auch die Krämpfe der Gliedmaßen (XXI Tabelle) wurden häufiger bey Abnormitäten der Hinterlappen, als der Vorderlappen beobachtet. Hier haben wir nun, auch, wie es scheint,

den Schlüssel zu den von Saucerotte und seinen Nachfolgern gemachten, aber unrichtig gedeuteten Beobachtungen; da nämlich die Abnormität der Hinterlappen häufiger Krämpfe oder Lähmungen in den Gliedmaßen überhaupt hervorbringt, die oberen Gliedmaßen aber von irgend einer Abnormität des Gehirns befreit und häufiger afficirt werden, so konnte es das Ansehen gewinnen, als ob Hinterlappen und obere Glieder in einer spezifischen Beziehung stünden, ungeachtet dies nicht wirklich der Fall ist.

§. 970. Verhältnissmäßig am häufigsten geht Apoplexie (= 11,92) von den Streifenhügeln aus, und diese stehen hier bloß den Schühügeln nach, würden also nächst diesen am stärksten auf den Verein des psychischen und pflanzlichen Lebens, — Ziemlich häufig, namentlich häufiger, als Schühügel und Mantel; jedoch seltner, als die Vierhügel, bewirken die Streifenhügel im abnormen Zustande eine Verstimmlung des Gemüths (= 19,62).

§. 971. Seltner, als der Mantel, und dabei s) seltner, als die Schühügel, jedoch ab und für sich ziemlich häufig verursachen die Betäubung (= 13,34). Nach ihrer Verletzung verfallen die Thiere oft in einen soporösen oder apoplektischen Zustand, ab welchem aber auch die gleichzeitige Verletzung des Balkens und des Hirnstammes Antheil haben kann. Ein Hund, welchem Zinn (Haller *dispositio* p. 424) einen Troikar durch den linken Streifenhügel bis auf die Basis gestossen hatte, war anfangs munter, verfiel denn aber, indem er zugleich gelähmt wurde, in einen Sopor, aus welchem er auf kurze Zeit geweckt werden konnte, der aber nach Ausziehen des Troikars zunahm, und starb einige Stunden darauf. Mehrere Thiere, bey welchen Rolland o. (p. 32. sqq.) den Balken und die Streifenhügel verletzte, verloren die Sinnesfähigkeit und die freye willkürliche Bewegung: sie standen unbeweglich, konnten weder durch leichte Reizung, noch durch starken Lärm, noch durch Vorhalten von Futter, sondern nur durch einen heftigen Stoß zur Bewegung gebracht werden; nach einiger Zeit legten sie sich, versanken in einen eigentlich soporösen oder apoplektischen Zustand und starben: — b) Seltner als Vierhügel und Mantel, aber häufiger als die Schühügel, verursachen die Streifenhügel im kranken Zustande Delirium (= 19,62). — c) Seltner hingegen, als von den meisten oder allen Hirntheilen, geht von ihnen aus Schmerz (= 14,27), Schwindel (= 177), Blutstau (= 19,23), Amnesie (= 158,50) und Verrücktheit (= 138,50).

§. 972. Nach diesen Erfahrungen besteht das Eigenthümliche der Streifenhügel in der nähern Beziehung zum körperlichen Willen, welche ihnen vermittelt der, in ihnen erfolgenden Entfaltung der Pyramiden und innern Hülsenstränge; als ihrer eigenthümlichen Elemente, zukommt. Demnach haben sie Antheil am Gefühl und am Bewusstseyn, aber bloß, in sofern sie die Fasern der hintern Ganglien aufnehmen, so daß sie, in Hinsicht auf Gefühl, den Vierhügeln, und in Hinsicht auf Bewusstseyn, den Schühügeln nachstehen. Während der körperliche Wille, als psychische Reactionskraft auf der niedern Stufe in ihnen überwiegend ist, ist ihr Gemüthsgefühl am stumpfsten, und während sie mit einigem Bewusstseyn und Gefühl im nächsten Verkehr stehen, haben sie am wenigsten Einfluß auf Gedächtnis und Verstand.

§. 973. Willis (*de anima* p. 38, sqq. *cerebr.* c. 1. p. 10. c. 11. p. 54. c. 13. p. 62) erklärt die Streifenhügel für das *agrorum modiciorum*, weil sie 1) den obersten und vordersten Theil des Hirnstammes bilden und alle Nerven von Bewegungs- und Empfindungsor-

ganz unter sich haben, also auch befehlseben; 2) weil von ihnen Fasern zu dem ganzen Umkreise des großen Hirns und zum Balken gehn; 3) weil alle Eindrücke vom kleinen Hirne nur durch sie in das große Hirn gelangen können. Durch die Vierhügel und sonst durch das kleine Hirn stoßen sie in Verkehr mit den Eingeweiden; durch die Hirnschnekel haben sie Gemeinschaft mit den Sinnesorganen und den willkürlichen Muskeln. Wenn sie von unten her angegriffen werden, ordnen sie die Eindrücke auf, ordnen sie und bringen sie in den Balken, wo sie der Phantasie sich darstellen oder wahrgenommen werden; bekommen sie den Tapsel von oben her, so leiten sie denselben zur Bewegung nach allen Theilen. So sind sie Mittelglieder zwischen dem Hirnstamme und den Hemisphären, als dem: Sitz der Vorstellungen und des Willens; gelangen die Eindrücke nur hin zu ihnen, ohne in die Hemisphären überzugehen, so erreichen sie das Bewußtseyn nicht; und es erfolgen unwillkürliche Bewegungen. Diese Theorie ist auf physiologische Ansichten, also auf ein nach unserer Ueberzeugung sicheres Princip gegründet. Allein diese Ansichten selbst sind nicht ganz richtig. Willis vernachlässigte zu sehr die Seh Hügel, indem er ihre Thätigkeit einzig und allein auf das Geschäft des Sehens bezog und es übersah, daß sehr viele Fasern unmittelbar von ihnen aus in die Hemisphären treten, ohne durch die Streifen Hügel zu gehn; indem er es also auch verkennt, theils aus der Natur des Sehens, theils aus pathologischen Beobachtungen Folgerungen für den unmittelbaren Antheil der Seh Hügel am psychischen Leben zu ziehn im Vierhügel (c. 20. p. 122, c. 21. p. 125 c. 22. p. 129) folgte, im Gegentheile Willis nach ihm sollen die *corpora striata superiora und media* als das *consorium actus* mit dem *centrum ovale*, als dem Sitze der Imagination zusammenhängen; Erstre aber eine Fortsetzung der hintern Stränge des Rückenmarks seyn und verhältnismäßig mehr der willkürlichen Bewegung dienen, die *corpora striata media* hingegen ein Continuum mit den vordern Strängen bilden und mehr auf unwillkürliche Bewegung sich beziehen.

§. 974. Die Streifen Hügel stehen in Beziehung auf das Gefühl über den Seh Hügel und unter den Vierhügeln (§. 919). Ein gleiches Verhältniß haben sie auch in Beziehung auf das Gehör, welches durch ihre Abnormitäten seltnere, als durch die der Vierhügel, aber wenigstens um Vieles häufiger, als durch die Seh Hügel, gestört wird (— 1:25,66). Da nun das Gehör zum Gerichte sich verhält wie subjective Seelenthätigkeit zu objectiver (§. 584), so wird ein gleiches Verhältniß zwischen den Streifen Hügel und den Seh Hügel, Statt finden. Wie ferne Gefühl und Wille mit einander verknüpft sind und nur als Affecten und Reaction einander gegenüber stehn, so werden die Vierhügel die subjective Receptivität, die Streifen Hügel aber die subjective Spontaneität darstellen.

§. 975. Die Streifen Hügel können zwar nicht als die eigentlichen Centralorgane der Rechnerien betrachtet werden; aber doch stehn sie, so viel wir sehen, mit denselben in einer nähesten Verbindung, als andre Ganglien. Daraus sprechen auch manche pathologische Beobachtungen, z. B. Sommering (de bas. p. 5) fand bey einer Misgestaltung des einen Streifen Hügel auch den Rechnerstreifen derselben Seiten dünn. So scheint denn der Geruch, als der subjective Sinn des großen Hirns, das receptive Moment der Subjectivität, im Gegensatz zur activen Willkür im Streifen Hügel darzustellen.

§. 976. Was den Zusammenhang mit den Rumpfeingeweiden anlangt, so bewirkten Abnormitäten der Streifenhügel zwar selten (= 1:77), aber unter den Ganglien des Großhirnstamms allein, Störung des Athmens, was wir wohl darauf beziehen können, daß das Athmen theils am unmittelbarsten von der Bewegung abhängig, theils mit dem Geruche näher verknüpft ist. — Dasselbe Verhältnisse fand in Hinsicht auf die Geschlechtsfunctionen Statt. Dagegen fand Erbrechen (= 1:33,50), Verstopfung (= 1:25,66) und Störung der Harnausscheidung (= 1:77), so wie Abmagerung (= 1:77) bey Abnormitäten der Streifenhügel seltener, als bey denen der Sehhügel Statt.

§. 977. Die Linsenganglien kommen nur bey Säugethieren vor, und sind bey ihnen weniger entwickelt, als im Menschen. Sie liegen am weitesten nach aussen, mehr auseinandergerückt, und die Duplicität ist also in ihnen stärker entwickelt; sie ragen nicht mehr in die Höhlen, sondern sind dem eigentlichen Hirnstamme mehr entrückt, und bilden unter Hinzutritt von Belegungsasse schon keinen keimspindelförmigen Theil, den Stammlappen. Offenbar haben sie also eine höhere psychische Bedeutung, als die übrigen Ganglien. Da sie längs der Streifenhügel und der Sehhügel sich erstrecken, und durch die innere und äußere Capsel mit dem ganzen Stabkranz in Verbindung stehen, so scheinen sie die Gesamtbedeutung jener Ganglien in sich zu fassen und eine Potenzirung derselben zu seyn. Ihre nähern Verhältnisse sind zur Zeit noch unbekannt, da man auf ihre Abnormitäten noch nicht geachtet hat.

§. 978. Ueber den Hirnanhang giebt es sehr viele Hypothesen. Im Alterthume, wo man keinen richtigen Begriff von einer Drüse hatte, nannte man ihn eine solche, wozu bloß die oberflächliche Aehnlichkeit des Aussehens veranlaßte. Damit ver setzte man sich nun in die plastische Sphäre, und glaubte, diesen Theil des Gehirns am ersten begreifen zu können. Diese Ansicht wurzelte so ein, daß die Theorie eine seltsame Zähigkeit bewies; man suchte immer neue Schlupfwinkel, wenn der Weg versperrt war; da einmal Secretion und Excretion hier schlechterdings Statt finden sollte. 1) Man stellte zuvörderst den Satz auf, der Trichter führt Lymphe. Willis (ceres. 2. 2. p. 15) wollte ihn bey Pferde, Vieussens (c. 8. p. 93) bey Hund, und Murray (p. 255) bey Menschen bis zum Hirnanhange hohl und mit Serum gefüllt gefunden haben. Allein es ist durch Stenson (Mangelus II. p. 97) Blaas (collegium Amstelodam. p. 35), Girardi (Santorini tab. p. 35), Monro (p. 20) Sommerring (de bas. p. 34) und Andre bewiesen, daß der unter Theil des Trichters solid ist, selbst wenn sein oberer Theil als Boden der dritten Höhle bey der Höhlenwasserraucht angedeutet ist. Ungesachtet man weder Eisstreifen in ihm fand, wenn man ihn hatte gelähmt lassen, noch auch Luft, Sabininetur, und Quecksilber in ihn treiben konnte, so behaupteten doch Vieussens und Wenzel's, er sey zellig oder schwammig, so daß Feuchtigkeiten hindurch gehn könnten. 2) Der Hirnanhang, sagte man ferner, enthält eine Feuchtigkeith. Gennari (p. 15) zeigte, daß er keine Höhle enthält, und Girardin (d. O. p. 56) fand ihn nach dem Gefäßnetze solid und ohne Eis. Wenzel's erklärte ihn für zellig, und die Interstitia zwischen seinen Lappen für eine Höhlung; auch bemerkten Santorini (obs. p. 70) und Chaussier (p. 40), daß man eine weißliche Feuchtigkeith ausdrücken könne. Allein hier beweiset nur nichts für jene Hypothese, da jeder weiße thierische Theil Feuchtigkeith enthält, jeder

Theil des Nervensystems bey dem Drucke flüssiges Mark ausfließen läßt, und in allen Interstitien eine secretirte Feuchtigkeit sich ansammeln kann. 3) Man nahm ferner an, der Hirnanhang bekomme seine Feuchtigkeit zunächst aus der dritten Höhle. So sollte nach Vesal (*lib. VIII. c. II. p. 55*;) der Schleim ausserdem auch aus dem Unterhorne und vom Balken in den Trichter abfließen; nach Willis (*cer. c. 12. p. 57*) sollte die *serosa colluvies* aus allen Hirnhöhlen, nach Wharton (p. 154) die aus der vierten Höhle, und nach Viussens (*c. 16. p. 104. c. 17. p. 108*) der dünnere Theil der von der Zirkel secretirten Flüssigkeit, und das von den Drüsen der Gefäßgeflechte secretirte Serum hier ihren Abzug finden. Da aber der Trichter nicht hohl ist, so fällt diese Hypothese weg. Der scheinbarste Grund, der sich dafür anführen ließ, war wohl der, daß Trichter und Hirnanhang bey chronischer Hirnhöhlenwassersucht zuweilen sehr fest, oder, wie man sich ausdrückte, eitrige sind; indeß läßt sich noch öfter keine Abnormität an ihnen entdecken, und sodann pflegt bey dieser Krankheit die Hirnsubstanz überhaupt eine ungewöhnliche Festigkeit zu erlangen. 4) Zugleich nahm man an, daß der Hirnanhang selbst secretire. Nach Willis (*cer. c. 4. p. 22. c. 12. p. 58*) bekommt er Zweige aus dem *rete mirabile*, steht mit ihm in Hinsicht auf Grösse in geradem Verhältnisse, und entsteht dem zum Gehirne tretenden Blute sehr überflüssiges Wasser. Daher, führt Viussens (p. 46. c. 9. p. 51) fort, giebt er ein vorbereitendes Bildungsorgan für das Gehirn ab, indem er das Blut desselben von Serum befreyt, welches mit dem aus den Hirnhöhlen gekommenen sich vermischt. Auf diese Weise reinigt er nach Diemerbroeck (*lib. III. c. 8. p. 364*) das Blut für die Bildung thierischer Geister, gleich den Drüsen der Gefäßgeflechte. Nach Littre (*ac. de Paris 1707. p. 164*) secretirt ein vorder Lappen eine dünne, weiß, geistige Flüssigkeit, welche sich mit der aus den Hirnhöhlen in den hintern Lappen gelangten Feuchtigkeit vermischt, um dieselbe flüssiger und zur Abführung geschickter zu machen, worauf auch das Blut hinwirkt, in welchem der Hirnanhang, wie in einem Wasserbade, liegt. Nach Wharton (p. 158) sollte die in ihm secretirte Feuchtigkeit in die entfernten Nervengeflechte und dadurch zu den peripherischen Organen kommen. 5) Die Flüssigkeit sollte nun aus dem Hirnanhange ausgeführt werden a) durch das Keilbein zum Gaumen nach Galen (*de usu part. lib. IX. c. 3. p. 172*), Mondini (*fol. 427*, Riolan (*anat. c. 47. p. 160*), u. s. w. nach Vesal (*lib. VII. c. 11. p. 55*) und Willis (*cer. c. 12. p. 57*) widerlegte; b) durch die obre Augenhöhle nach Vesal, und durch das Sehnervenloch nach Bauhin in die Augenhöhle; c) zur Nase als Schleim und zum Gaumen als Speichel nach Dubois (p. 893); d) durch die Löcher an der Schädelbasis nach Bartholin (*lib. III. c. 3. p. 529*), und zwar nach Wharton (p. 158) zu Augen, Mandeln und Speicheldrüsen, welche nach Molinetti (p. 81) die Feuchtigkeit einzusaugen, um sie wieder als Speichel abzusetzen; e) durch Venen, und zwar nach Willis (*cer. c. 4. p. 22. c. 12. p. 57*;) durch solche im Keilbeine, nach Viussens (c. 9. p. 53. b. 16. p. 104.) und Murray durch die Zellenblutleiter, nach Mayer (v. Gehirne S. 11.) durch den Ringblutleiter; Littre ließ die im Hirnanhange begeistigte Lymphe in beyde Blutleiter fließen, um das Blut, welches bey Ernährung des Gehirns seinen geistigen Theil verloren hat, dünner und beweglicher zu machen; f) ausserdem nahm er und Willis auch noch Saugadern zu Hülfe, wie denn auch Brunner (Haller *ibid. I. p. 597*)

ausdrücklich unsichtbare Sanguinalien hierzu einnehmen. Wenn Schneider die Nichtigkeit dieser Fiktionen darthat und umständlich bewies, daß der Hirnanhang weder eine Feuchtheit aus den Hirnhöhlen empfangt, noch eine solche ausführe, und wenn Haller zeigte, daß eine besondere Cloake der Art gar nicht nöthig sey, da überall die ausgesündete Feuchtheit auch wieder eingesogen werde, so kam man doch immer wieder von Neuem auf die alten Träumereyen zurück. — 6) Da Diemerbroeck (*ib.* III. c. 8. p. 364) einsah, daß durch den Hirnanhang nichts aus dem Gehirne abfließen kann, Secretion und Excretion aber doch einmal hier Statt finden mußten, so nahm er an, das im Hirnanhange gebildete Serum gehe durch den Trichter in die Hirnhöhlen und von da durch die Rückknochen als Schleitun in die Nase. Wenzels (*ser.* p. 225 — 239) haben Injectionen aus dem hintern Lappen des Hirnanhangs in den Trichter getrieben, nehmen also an, daß die präsumtiven Zellen des Letztern vom Hirnanhange gegen das Gehirn zu gerichtet sind, und daß die Feuchtheit aus jenem in dieses gelangt. Dies nimmt auch Meckel (*Archiv* II. S. 38. Anatomie III. S. 483) an, und vermuthet, daß der Hirnanhang als ein Analogon der Fruchthüllen, besonders des Dottersacks und der Allantois die Ernährungsflüssigkeit für das Gehirn aufnehme, welche der Trichter, als dem Dottergange und der Harnachaur analog, dahin führe. — 7) Endlich bezeichnete man die plastischen Functionen dieses Gebildes bloß im Allgemeinen. Hatte Monro (p. 19) den Hirnanhang für eine Lymphdrüse gehalten, so erklärte ihn Döllinger (S. 19) für die Drüse des großen Hirns überhaupt, und bewies die Nothwendigkeit seines großen und kleinen Lappen daraus, daß jede Drüse eine Nebendrüse habe. Nach Autenrieth (S. 1049) soll er auf die Secretion in den Hirnhöhlen Einfluß haben (wiewohl ihn Wenzels oft krank fänden, ohne Wasseranhäufung oder andre Abnormitäten in den Hirnhöhlen zu bemerken), und nach Treviranus (*Biologie* VI. S. 163) soll er das zu einer gewissen Thätigkeit im Gehirne erforderliche Blut vorbereiten.

§. 979. Wenden wir uns zum Thatsächlichen, so bemerken wir zuvörderst, daß der Hirnanhang bey allen Wirbelthieren sich findet, also einen wesentlichen Theil des Gehirns ausmacht (Willis *ser.* c. 4. p. 22), aber im Ganzen genommen bey höherer Entwicklung in Verhältniß zu dem übrigen Gehirne abnimmt, indem sein Gewicht zu dem des Letztern nach Schneiders (*de oetaphis lib.* III. c. 16. p. 179 *egg.*) Angaben bey Vögeln sich verhält wie 1:52 bis 99, bey Wiederkäuern wie 1:75 bis 121, bey Nagern wie 1:104 bis 360, bey Pferden wie 1:359, bey Schweinen wie 1:480, bey Raubthieren wie 1:723 bis 960, bey Menschen wie 1:2304. Er steht also eher in umgekehrten, also in geradem Verhältnisse zur psychischen Kraft, kann folglich auch weder unmittelbar, noch durch eine plastische Thätigkeit (§. 978) das Hirnleben in seiner Gesamtheit und die Seelenthätigkeit überhaupt fördern. Nach Treviranus (*Schriften* III. S. 74) ist er bey den Wasserthieren jeder der drey obern Classen größer, als bey den Landthieren derselben Classe. Bey den Fischen ist er beträchtlich groß, hat weiße und graue Substanz, und hängt durch einen kurzen, hohlen, cyllindrischen Trichter an dem vor ihm liegenden, ebenfalls hohlen grauen Höcker, und hat bey manchen Fischen seitliche Anhänge, welche der Lage nach den Markkügelchen angeführ entsprechen, ohne ihnen analog zu seyn. (*Carus Nervensystem* S. 141). Bey den Amphibien scheidet er sich schon in einen vordern wei-

fen und grauen Theil; bey einigen ist er schmal und lang; er ist, so wie der graue Höcker, bedeutend groß. Bey Vögeln ist er kleiner, und rund, härter als Marksubstanz, und in seinem hintern Theile mehr roth, als die graue Substanz des übrigen Gehirns. Bey den Säugethieren ist der Trichter länger; der Hirnanhang soll bey den Niedern derselben, wie Carus (a. a. O. S. 269) behauptet, in seiner Substanz dem Gehirne mehr ähnlich, bey dem Menschen aber gleichsam ausgeartet seyn: indess findet man ihn bey Affen, Raubthieren, Wiederkäuern und Einhufern eben so fest, rothbraun, ohne deutliche Markfasern und mit der festen Hirnhaut verwachsen, wie bey dem Menschen.

§. 980. Auch bey dem Embryo ist Trichter und Hirnanhang anfänglich hohl und verhältnißmäßig größer, indem die dritte Höhle einen Beutel mit einem Boden bildet, in dessen Mitte der Trichter herab geht. Nach Wenzel's Bemerkungen ist die obre Fläche des Hirnanhangs anfänglich in drey Hügelchen getheilt, welche dann verschmelzen; sie verliert um die Zeit der Geschlechtsreife an Convexität, wird gegen das 40ste Jahr flach und im höhern Alter concav. Der hintre Lappen ist bey dem Embryo weiß und sehr klein, im Alter grau und größer, aber immer weicher, als der vordre. — Bey bedeutenden Bildungsfehlern des Gehirns z. B. bey großen Brüchen und unvollkommner Entwicklung desselben (Nr. 290) ist der Hirnanhang öfters ganz normal, so wie er auch bey Hemicephalen seltner (Nr. 608. 638) fehlt, häufiger (Nr. 612. 617. 618. 635. 640. 644) der einzige ausgebildete und zum Theil sehr große Hirntheil ist. In einem Falle (Nr. 651), wo das Gehirn eine ungetheilte Masse bildete und der Sattel mit dem Gaumen gespalten war, hing der Hirnanhang in die Mundhöhle herab, und bildete eine große Blase, deren Wände weich und eine Linie dick waren und deren Höhle mit den Hirnhöhlen zusammenhing.

§. 981. Wahrscheinlich beruhte es auf einem Irrthume, wenn man eine Verbindung des Hirnanhangs mit dem ersten Nervenpaare bey Fischen (Hallers *auscult.* p. 18., Treviranus Schriften III. S. 48); mit dem zweyten bey Fischen (Treviranus ebendaf.) und bey Vögeln (ebend. S. 34) oder überhaupt (Gall Untersuchungen S. 38.); mit dem dritten bey Vögeln (Meckels Archiv II. S. 39.); und mit dem sechsten bey Schlangen (Carus Nervensyst. S. 184) zu sehen glaubte. Dafs dagegen der graue Höcker Fäden von den hintern Strängen zum Sehnerven giebt, ist unzweifelhaft. — Nach Chaussier (p. 176) fehlten bey Missgeburten ohne Nase und Augen die Riechnerven und der Hirnanhang; dieser fehlte in einem Falle (Nr. 650), wo nur ein Auge vorhanden, die Nase rüsselförmig und das Gehirn eine verworrene Masse war. Wenn bey seinen Abnormitäten Blindheit Statt fand, so konnte dies von der Affection des benachbarten Sehnerven abhängen. — Nach Gall (Untersuchungen S. 412.) soll der Trichter zum Sehorgane gehören.

§. 982. Bey Seelenkrankheiten ist der Hirnanhang öfters abnorm. Greding (I. S. 350) fand ihn unter 199 Krankheitsfällen in 50 Fällen größer und in 12 kleiner, in 84 Fällen härter und in 54 weicher, als gewöhnlich, und bemerkte, dafs bey solchen Krankheiten Abnormitäten des Sattels am häufigsten vorkommen. Nähere Thatsachen über seine psychische Beziehung sind nicht bekannt. Nach Wenzel's (*cerebr.* p. 207) soll er bey Ergießung von Wasser oder Blut in den Hirnhöhlen nach Kummer und Wahn-

sinn oft sehr weich seyn: Nach Rayer (*Bulletin méd.* 1824 I. p. 123) soll seine Anschwellung Schwere im Kopfe, Mattigkeit, Apathie, Gedächtnisschwäche und Betäubung verursachen, vielleicht bloß durch Druck auf die benachbarten Theile. In einem Falle (Nr. 903), wo er ganz zerstört war, fand nur eine leichte Betäubung Statt.

§. 983. Wenden wir uns zu unserer Sammlung pathologischer Beobachtungen, so sehen wir, daß hey seinen Abnormitäten seltner, als hey denen aller übrigen Hirntheile, Schmerz (= 17,85), Schwindel (o), Delirium (o), Amnesie (o), Betäubung (= 113,75), Apoplexie (mit Ausnahme der Zirkel, = 113,75), Taubheit (= 1:55), Blindheit (mit Ausnahme der Zirkel, = 1:27), Lähmung aller Gliedmaßen (o), der ohern (o), der untern (mit Ausnahme des Mantels, = 1:55), Hemiplegie (mit Ausnahme der Zirkel, = 1:27,50), Lähmung des Kiefers (o), der Zunge (o), des Speiseröhrenkopfs (o), des Halses (o), Erbrechen (mit Ausnahme der Streifenhügel (= 1:27,50), Verstopfung (= 1:55), unwillkürliche Ausleerung (mit Ausnahme der Zirkel, = 1:55), Störung des Athmens (o), vorkommt. Hieraus ergiebt sich denn 1), daß im Ganzen genommen sein Einfluß auf das Hirnchen am beschränktesten ist, daß namentlich sein Gemeingefühl, seine Beziehung zur Sinneswahrnehmung, zum Bewußtseyn, zur Phantasie, und zur Kraft der willkührlichen und unwillkührlichen Bewegung, so wie sein Einfluß auf das plastische Leben überhaupt, und auf Athmen und Verdauung insbesondere geringer ist, als der von fast allen Hirntheilen; 2) daß, wenn ein andrer Hirntheil in dieser Hinsicht noch tiefer steht, als er, dies gewöhnlich die Zirkel ist.

§. 984. Seltner als die Vierhügel und Sehhügel, häufiger als die Streifenhügel und der Mantel, verursachte der Hirnanhang in seinem abnormen Zustande Verrücktheit (= 1:11); seltner, als die Vierhügel und Streifenhügel, häufiger, als Sehhügel und Mantel, Affection des Gefühls (= 1:11); seltner als die Streifenhügel, häufiger als der Mantel, gastrische Zufälle (= 1:55); häufiger, als Ganglien und Mantel, Blödsinn (= 17,85), Abmagerung (= 1:18) und Affection der Genitalien (= 1:55). Häufiger endlich, als irgend ein andrer Hirntheil, verursachte er allgemeine Krämpfe (= 12,11): Wenzel's (Hirnanhang S. 115 fg.) fanden ihn bey allen Epileptischen, deren Leichname sie untersuchten, in einem abnormen Zustande, vorzüglich mit Ergießung halbgeronnener Lymphe in der Gruhe zwischen seinen Lappen; wenn sie aber seinen entzündlichen Zustand für die allgemeine Ursache der Epilepsie erklärten, so ergab es sich aus andern Beobachtungen (Kelch S. 103. Lauth in *Journ. compl. IV.* p. 301), so wie schon aus pathologischen Begriffen, daß sie hierin zu weit gingen. — Convulsionen, Verrücktheit, Affection des Gefühls und gastrische Unreinigkeiten sind mehr qualitative, als quantitative Störungen, mehr Alienationen und abnorme Richtungen des Lebens, als zu starke oder zu schwache Aesserungen der Functionen. Wenn nun der Hirnanhang in seinem abnormen Zustande vorzüglich Verstimmungen erzeugt, so wird er überhaupt ein Organ seyn, welches nicht sowohl unmittelbar in das Leben auf eine bestimmte Weise eingreift und zu gewissen Functionen mitwirkt, als vielmehr eine allgemeine Stimmung giebt. Am deutlichsten spricht sich dies darin aus, daß er unter allen Hirntheilen am seltensten Lähmung erregt, also am wenigsten die Kraft der Bewegung bestimmt, dagegen am häufigsten Krämpfe, also Alienationen und widernatürliche Richtungen der Bewegung erregt.

§. 935. Die seitlichen Theile des Hirnstamms als Fortsetzungen der seitlichen Stränge des Rückenmarks strahlen in den Mantel aus; die innern Theile dasselben oder die runden Stränge, welche die Fortsetzungen des grauen Kernstrangs sind, können sich nicht seitlich entfalten, sondern bleiben in der Mittellinie, und bilden den Hirnanhang. Dieser ist das oberste scheibenförmige Ende des Rückenmarks und bildet so den entschiedensten Gegensatz zum Endfaden des Rückenmarks. Beyde Enden sind gleichsam Degenerationen der sensibeln Substanz: der Endfaden ist nicht rein flechsig, aber auch kein vollkommener Nerve, und der Hirnanhang ist keine Drüse, aber auch kein ausgebildeter Hirnhöhl. Dieser ist eine Umbeugung nach vorn und unten, welche einen Ausgang aus dem Schädel sucht, und eine Grube im Sattel sich gräbt; jener tritt nach hinten aus dem Wirbelcanales hervor. Beyde gehören dem Unpaarigen und Indifferenten im Rückenmark, dem grauen Kernstrang an; an dem untern Ende nämlich hören die grauen Seitenstränge und mit ihnen die seitlichen peripherischen Entwicklungen derselben, die Nervenpaare, auf, und es bleibt bloß ein grauer Strang in der Mittellinie zurück, welcher durch den Zapfen in den Endfaden übergeht; oben entfalten sich die seitlichen Stränge durch ihre Ganglien in die Hemisphären, und die übrig bleibende Fortsetzung des grauen Kernstrangs geht in den unpaarigen Hirnanhang über. Dieser ist die unvollkommene Nachbildung eines Hirnlappens, wie der Endfaden die unvollkommene Nachbildung eines Rückenmarksnerven ist. Der Endfaden ist dabey eine unvollkommene Wiederholung des Rückenmarks, insofern er zuletzt nach beyden Seiten Fäden ausschickt: eben so wiederholen sich in den vordern und hintern Lappen des Hirnanhangs in ganz gleichem Verhältnisse die vordern und hintern Stränge des Rückenmarks (I. Bd. S. 109). Der Hirnanhang liegt im Centrum der Schädelgrundfläche, auf dem Knochenstücke, welcher den eigentlichen Kern und die Grundlage des ganzen knöchernen Kopfs ausmacht. Er liegt ferner innerhalb arterieller und venöser Gefäßkreise, zunächst im ringförmigen Blutleiter, und dann im *Circulus Willisii*. Die Nähe der vordern Hirnarterien und des Blutes im ringförmigen Blutleiter muß eine gewisse Spannung in ihm erregen, durch welche er auf das übrige Gehirn stimmend einwirkt. Dies kann aber bey der Unvollkommenheit seiner Entwicklung bloß eine geringe und vage Stimmung seyn, welche mit der, die das kleine Hirn giebt, keinen Vergleich aushält. In den niedern Thieren und bey dem Embryo, wo die psychische Thätigkeit unbestimmter und dunkler, die seitliche Entfaltung im Rückenmark und im Gehirn geringer, und dieses über jenes weniger überwiegend ist, ist auch der Hirnanhang größer, und zum Theil selbst hohl, wie der Kernstrang, dessen Fortsetzung er ist, den Canal des Rückenmarks und den Boden der Hirnhöhlen bildet, jede Höhlenbildung aber auf eine verhältnißmäßig überwiegende Entwicklung hindeutet. Der graue Kernstrang des Rückenmarks, dessen Ende der Hirnanhang ist, scheint selbst zwar gegen äußere Verletzungen unempfindlich zu seyn, aber durch Verbindung der seitlichen Theile die durch die Nerven zugelassenen Eindrücke zur Perception des Gemeingefühls zu bringen, und weniger auf Bewegung zu wirken. Wenn Foderà (Magen die Journ. III. p. 200) das Rückenmark in der Mittellinie durchschnitt, so wurde die Empfindung in beyden Seiten aufgehoben, die Bewegung nur zum Theil. Magendie (*deconspertes* p. 17) sah nach Reizung des Kerns des Rückenmarks keine Bewegung erfolgen, und

wenn Lorry (*mem. pres. III. p. 375*) das verlängerte Mark in der Mittellinie verletzte, so erfolgte Opisthotonus, aber keine Lähmung. — Carus (Nervensystem S. 143. 167. 254. 269. fg.) hält den Hirnanhang für das untere, unter der Speiseröhre gelegene Ganglion des Halsnervennings wirbelloser Thiere, welches hey den Wirbelthieren gegen das Gehirn zurückgezogen seyn soll. Da nun von jenem Ganglion die untere Ganglienkette ausgeht, diese aber dem sympathischen Nerven analog seyn soll, so soll der Hirnanhang das Kopfende des sympathischen Nerven, der oberste Centralknoten des Gangliensystems, der Repräsentant desselben in der Schädelhöhle, die Einbildung desselben in das Gehirn seyn und die Beziehung der Vegetation auf die höchste Sensibilität ausdrücken. Allein das untere Ganglion des Halsrings ist das Centralende mehrerer Nervenpaare, der Hirnanhang nicht; jenes setzt sich unmittelbar in den Gangliensamm fort, der Hirnanhang aber steht in keiner Verbindung mit dem Rumpfnerven, denn daß dieser einige zarte Fäden an die vordere Hirnarterie giebt, welche die Reiser derselben an den Hirnanhang begleiten, berechtigt eben so wenig, diesen, der offenbar das Ende der Faserung des Hirnstamms ist, für einen Theil des Rumpfnervensystems zu halten, als Ackermann ein Recht hatte, aus der Verbindung des fünften Hirnnervens mit dem Rumpfnerven zu schließen, daß Letzterer die Wurzel des kleinen Hirns sey.

§. 986. Ueber die Bedeutung der Zirbel führen wir zuerst einige Hypothesen an, die man darüber aufstellte, ohne gehörige thätssächliche Gründe dafür zu haben. Zuerst schrieb man ihr einen mechanischen Nutzen zu. Sie sollte, wie schon frühere Physiologen angenommen hatten (Galenus *de sin. part. lib. VIII. c. 14. p. 170*) die Wasserleitung verschließen, und so den Uebersang thierischer Geister (Piccolomini *lib. F. loq. 3. p. 254*) oder schleimiger Auswurfstoffe (Highmore *lib. III. par. 1. c. 6. p. 214—219*) aus den vordern Hirnhöhlen in die vierte Höhle hemmen; oder sie sollte, wie alle Drüsen, zur Befestigung der sich zerästelnden Gefäße dienen (Galenus a. a. O. Vesali *lib. VII. c. 3. p. 548*), die Gefäßgeflechte stützen (Marchettis p. 121) und ausgedehnt erhalten (Willis *op. c. 14. p. 67*). — Dann wurde sie als ein plastisches Organ betrachtet. Sie sollte einsaugen, und zwar die durch die dritte Höhle auszufließende Feuchtigkeit anziehen (Varoli p. 9), oder die von den Gefäßgeflechten secretirte seröse Feuchtigkeit aufnehmen und aufbewahren, bis sie in Venen und Sengadern übergeht (Willis a. a. O.), oder die excrementielle Feuchtigkeit aus dem Hirnstamme zieht, damit dieser zu den psychischen Functionen geschickter werde (Wharton p. 141). Sie sollte die größte Drüse der Gefäßgeflechte (Bauhin) oder die Drüse des kleinen Hirns, der Hirnsand aber ihre Nebendrüse seyn (Döllinger S. 18); auf die Secretion in den Hirnhöhlen Einfluß haben (Autenrieth §. 1049), oder selbst secretären, und zwar entweder eine Feuchtigkeit von unbekanntem Nutzen (de la Boe p. 35. p. 21), oder eine wässrige Feuchtigkeit, welche durch ihre Haut schweitzt und durch die dritte Höhle zum Hirnanhange geht (Vieuassens c. 17. p. 108), oder Nervensaft, welcher durch die Striae tritt und Dem, was vom Balken zu den peripherischen Organen geht, unterwegs neue Triebkraft verleiht (Lancisi *de sede animae p. 155. 161*). — Descartes (p. 100—114) erklärte sie für den Sitz der Seele, weil sie 1) unpaisig ist, also der Einhalt der Seele entspricht; 2) in der Mitte der Höhlen liegt, an deren Wänden alle Nerven entspringen;

3) beweglich ist; und 4) einen großen Reichthum an Gefäßen hat, welche ihr thierische Geister geben. Diese Geister, welche sie von den Gefäßgeflechten empfangen hat, drängen aus ihren Poren hervor, bewegen sie nach allen Richtungen, womit verschiedene Gedanken verbunden sind, geben von da in entsprechenden Richtungen in die Wände der Hirnhöhlen, beugen die Fäden, zwischen welchen sie hingehn, und bringen Bewegungen hervor; indem die Seele der Zirbel eine bestimmte Richtung giebt, wird das Wahrnehmen, Erinnern, so wie die Muskelbewegung bewirkt. Wenn diese Ansicht von Vielen angenommen wurde, so fehlte es auch nicht an Gegnern. Unter Andern bemerkte Stenon (Mongetus II. p. 89), daß die Zirbel gar nicht eine solche Lage hat, daß sie mit sämtlichen Wandungen der Hirnhöhlen in Beziehung treten könnte; daß sie nicht beweglich, sondern angeheftet und zwischen die übrigen Hirnthelle fest eingeschoben ist; und daß sie mehr von Venen, als von Arterien umgeben ist. Indes bildete in unsern Zeiten Görres eine ähnliche Theorie, welche wir schon (I. Bd. S. 232) angeführt haben, und welche Eschenmayer (Psychologie S. 208 — 216) auf folgende Weise gestaltet hat. Wo großes Hirn, kleines Hirn und verlängertes Mark zusammentreffen, muß das Centralorgan zu finden seyn: dies ist also die Zirbel, die unpaaig, selbstständig, von aller Differenz frey, und von allen Seiten umflossen ist von dem ätherischen Principe, das durch die Hirnhöhlen zieht. Sie ist der Regulator der expansibeln Secretionen, und der herrschende Beziehungspunct der Gefäßgeflechte; oben so regulirt sie, wie das Herz den Kreislauf, die Bewegungen des ätherischen Princips, welche die Wechselwirkung von Seele und Körper vermitteln. Da sie nun ausser diesem ätherischen Principe, als der höchsten organischen Production und Expansion, den Hirnsand, als ein unorganisches, höchst contrahirtes Product giebt, so ist sie die höchste Indifferenz, welche den Lebensact des Gehirns regiert; die Centralsonne des Mikrokosmos; das höchste organische Gewächs; der Keim des ganzen Organismus, der sich bey der Zeugung gestaltet und aus welchem sich erst das Gehirn, dann das Herz, dann die Leber entfaltet. — Hiermit hatte sich denn die speculative Physiologie so überboten, daß ein noch höherer Schwung nicht möglich war.

§ 987. An die Empirie uns haltend, befragen wir vor allen Dingen die Zootomie und die Entwicklungsgeichte. Die Zirbel findet sich in allen Classen der Wirbelthiere, wie schon Willis (ver. c. 24. p. 67) und Lancisi (*de sede animae* p. 155) ausgesprochen. Sie erscheint aber nach Carus bloß bey einigen Fischen, und zwar in Form eines aus Gefäßhaut gebildeten Beutels, und fehlt bey andern; ist noch bey Fröschen ein Bündel keulenförmiger Massen und bekommt erst bey den übrigen Amphibien die Form, welche sie bey den Säugethieren hat. Bey diesen erreicht sie eine bedeutende Größe, während sie bey den Vögeln klein ist. Bey den niedrigen Säugethieren ist sie, wie schon Willis (o. c. O.) bemerkte, größer, als bey den höhern: sie ist also groß bey den Nagern, den kleinern Raubthieren, den Einhufern und den Wiederkäuern, wo sie eine Höhle und sehr starke Stiele hat; kleiner ist sie bey den größern Raubthieren und bey Affen. Uebrigens ist sie verschiedentlich gestaltet: rundlich oder oval, oder walzenförmig oder herzförmig. Bey dem Menschen ist sie verhältnißmäßig kleiner, wie schon Bauhin

(*lib. III. c. 14. p. 598*) bemerkte, zeigt aber viel Varietäten in Größe, Gestalt, Farbe und Festigkeit (*Wenzel observ. p. 157*).

§. 988. Sie bildet sich im menschlichen Embryo etwas spät, und zwar nach Serres (*l. p. 158*) so, daß zuerst die vordern Theile der Zirbel entstehen, nach hinten wachsen, und am hintern Ende graue Knöpfchen tragen, welche im Anfange des vierten Monats sich verbinden und so die Zirbel bilden, welche zu Ende des vierten Monats durch hintere Stiele mit der hintern Commissur sich verbindet. Sie ist anfänglich bläulichgrau, weich und rund, wird in den ersten Lebensjahren granröthlich, fest, und mehr breit und lang; späterhin wächst sie mehr in die Länge und wird mehr bräunlichgrau.

§. 989. Nachdem Descartes seine Lehre vorgetragen hatte, suchte man den Grund der Seelenkrankheiten öfters in Abnormitäten und besonders in Versteinerungen der Zirbel. Morgagni (*V. 12. LXI. 3*) bemerkte dagegen, daß bey Seelenkrankheiten die Zirbel oft gesund gefunden wird, und daß bey Anhäufung von Sand in derselben entweder gar keine oder ganz verschiedene Krankheitserscheinungen beobachtet werden, so wie auch Meckel (*acad. de Berlin 1754. p. 92 — 112*) bey Menschen, deren Verstand ungestört gewesen war, häufig Sand, und bey einigen Verrückten keinen fand. Sömmering (*de acervulo cerebri* in *Ludwig script. neur. III. p. 322*) erklärte endlich den Hirnsand für ein normales Product. Er scheint als eine flüssige Materie theils an, theils in der Zirbel secretirt zu werden und allmählig zu erstarren. Die normale Entwicklung eines erdigen Concrements innerhalb eines weichen Gebildes ist ohne Beyspiel, und kann nur mit der Verknöcherung weicher Theile im Alter verglichen werden. Da nun der Hirnsand bey keinem Thiere, und bey Menschen nur von den spätem Kinderjahren oder von der Zeit der Entwicklung der Pubertät an sich findet, so hat man seine Erzeugung aus dem Sinken des Lebens der Zirbel erklärt (*Carus Nervensystem S. 271. Schönlein S. 107*). Allein 1) die normale Verknöcherung im hohen Alter trifft nur fibröse und knorpelige Theile, und besteht nur in einer Umwandlung ihrer Substanz mit Beybehaltung der frühern Form, nicht in der Ablagerung eigner Concremente. 2) Es ist nicht denkbar, daß zu der Zeit, wo gerade das Seelenleben zu seiner höchsten Regsamkeit sich zu entwickeln beginnt, ein Hirnorgan zu kränkeln und zu verküppeln anfangen sollte, da das Krankhafte die Hirnfunctionen stören müßte. 3) Andre Organe, welche bey höherer Entwicklung des Organismus mehr zurücktreten, verschwinden entweder gänzlich, oder nehmen an Volumen ab, aber verfallen nicht in eine krankhafte Ausartung: wie sollte nun das Uebergewicht der Zirbel bloß dadurch beschränkt werden können, daß sie versandet? — Es ist also wahrscheinlicher, daß die Sandbildung nicht eine Hemmung bewirkt, noch auf einem Erlöschen des Lebens beruht, sondern das Erzeugniß gesteigerter Hirnthätigkeit und dem psychischen Leben förderlich ist. Aber die Art, wie dies geschieht, ist durchaus dunkel, und wir können nur Hypothesen darüber aufstellen. Der Hirnsand kann entweder unmittelbar und als Erzeugniß, oder mittelbar durch seine Entstehung das Hirnleben fördern. In erstrem Falle müßte er als mechanischer Reiz wirken, und zwar auf die Substanz der Zirbel selbst, oder auf ihre Stiele, oder auf die Vierhügel, wofür keine analoge Thatsehe spricht. In letzterm Falle müßte die Hirnsubstanz dadurch um so vollkommner und lebendiger werden, daß die erdige Masse mehr

ausgeschieden würde. Da alle Steigerung des Lebens auf Entwicklung des Indifferenten in Differentes beruht, hier aber die stärkste Differenz sich zeigt zwischen der höchsten organischen Substanz, der sensiblen Centralmasse, und einem unorganischen, erdigen Conglomerate, so ist diese Ansicht nicht unwahrscheinlich. Das Gehirn bey den Thieren und in der ersten Kindheit wäre also vergleichungsweise noch eine indifferente, unreife Masse. Wir können nicht bemerken, daß der Hirnsand mit dem Fortschreiten des Alters übereinstimmend in größeren Massen sich anhäufte. Da er gleichwohl nicht unmittelbar aufgelöst werden kann, so müßte er entweder fortdauernd wieder verflüssigt und eingesogen werden, während zugleich wieder neuer sich absetzt und erstarrt, oder er müßte nur einmal im Leben sich erzeugen und dann fortbestehn. Letzteres ließe sich wohl denken: da er nämlich um die Zeit der Pubertät zuerst sichtbar wird, mit der Pubertät aber nicht hofs im Leiblichen, sondern auch im Psychischen eine bedeutende Metamorphose eintritt, so könnte seine einmalige Erzeugung eine solche Veränderung und Klärung des Hirnlebens herbeiführen, welche in ihren Wirkungen bleibend wäre und die Reife der psychischen Thätigkeit begleitete, wie schon Autenrieth (§. 104g.) vermuthet. Da aber Alles im Leben wechselt, und jedes normale Gebilde fortdauernd sich zersetzt und wieder erzeugt, so ist es auch denkbar, daß der Hirnsand gleich der ihm verwandten Knochensubstanz sich wieder auflöst, um von den rückführenden Gefäßen aufgenommen zu werden, und fortdauernd von Neuem sich erzeugt. Beyde Processen können auf krankhafte Weise in ein verschiedenes Verhältniß zu einander treten, so daß die Auflösung und Verflüssigung, oder die Bildung und Erstarrung überwiegend wird. Erstres schien Statt zu finden in den Fällen, wo Morgagni bey bejahrten Personen gelbliche Materie an der Zirbel fand, welche die Form des Hirnsandes hatte, aber ganz weich war (VIII, 9), oder nur zum Theil weich war mit beygemengtem Sande (XIV, 35), oder durchaus eine zähe Feuchtigkeith darstellte (III, 14. VII, 15).

§. 990. Nach Georget (Verrücktheit S. 264) kommen Abnormitäten der Zirbel bey Seelenkrankheiten selten vor. Bey ursprünglichem Mangel der Zirbel (Nr. 649. 680) fand der höchste Grad von Blödsinn Statt; allein es war dabey auch das übrige Gehirn abnorm und unvollkommen entwickelt. Bey der Hirnhöhlenwassersucht hat man sie bisweilen vergrößert, verhärtet, zuweilen klein und unscheinbar gefunden, zuweilen ganz vermisst und zwar in Fällen, wo die Seelenthätigkeit wenig gestört war (Nr. 372, a. 381. 386). Wiewohl Beobachtungen der letztern Art sehr verdächtig sind, da man bey unbehutsamer Behandlung die Zirbel leicht zerstören und übersehen kann, so bekommen sie doch durch Malacarne's (*Encephalotomia II*, p. 81) Autorität einiges Gewicht. Ein Mensch (Nr. 66), bey welchem sie in einen leeren Sock verwandelt war, starb am 28ten Tage nach einer Verwundung, nachdem er die letzten zwey Tage in Betäubung gelegen hatte. Ein Andre (Nr. 57), bey welchem eine Flutenkugel auf der Zirbel saß, lebte dabey mehrere Jahre ohne merkliche Störung und starb plötzlich während des Spiels an einer Blutergießung. — Nehmen wir unsre Sammlung pathologischer Beobachtungen zum Maasse, so bewirkt die Zirbel in ihrem abnormen Zustande 1) seltner, als Ganglien und Mantel des großen Hirns, Amnesie (o), Apoplexie (= 1:60), Taubheit (o), Blindheit (= 1:30); allgemeine Lähmung der Gliedmaßen (o), Hemiplegie (= 1:60), Läh-

mung der untern (c), und der obern Gliedmaßen (= 1:130); der Zunge und des Speiseröhrenkopfs (= 1:30); des Halses, der Gesichtsmuskeln und der Augenmuskeln (c), und Krampf des Kiefers und des Nackens (c); Durchfall, Verstopfung und gastrische Abnormitäten (c); unwillkürlicher Ausleerungen (= 1:60); und Störung des Athmens (c). Sie bewirkt selten, als der Mantel, häufiger, als der Hirnanhang, und dabey a) häufiger, als die Vierhügel, Betäubung (= 1:5,45), b) als die Sehhügel, Delirium (= 1:12), c) als die Streifenhügel, Schmerz (= 1:3,75) und Schwindel (= 1:60); d) als Vierhügel und Streifenhügel, Störung des Harnes (= 1:60); e) als Sehhügel und Streifenhügel, Erbrechen (= 1:12); f) häufiger, als der Mantel, und a) als die Ganglien, mit Ausnahme der Vierhügel und des Hirnanhangs, Convulsionen (= 1:2,40); b) häufiger, als die Ganglien, doch seltner, als der Hirnanhang, Affection der Geschlechtsheile (= 1:60); c) häufiger, als Hirnanhang und Ganglien, mit Ausnahme der Vierhügel, Verrücktheit (= 1:16), Verstimmung des Gefühls (= 1:5) und Lähmung des Kiefers (= 1:60); d) häufiger, als Hirnanhang und alle Ganglien, Blödsinn (= 1:3,50) und Abmagerung (= 1:12). In Hinsicht der psychischen Wirkungen stimmen diese Resultate mit denen von Greding's (l. S. 318) Beobachtungen überein. Dieser fand nämlich die Zirkel größer, als gewöhnlich, am häufigsten bey Melancholischen (= 1:1,20); am seltensten bey Epileptischen (= 1:6,20); kleiner, als gewöhnlich, am häufigsten bey Blödsinnigen (= 1:5), am seltensten bey Epileptischen (= 1:15,50); ungewöhnlich fest am häufigsten bey Blödsinnigen (= 1:5), am seltensten bey Epileptischen (= 1:20,66); ungewöhnlich weich am häufigsten bey Blödsinnigen (= 1:3), am seltensten bey Rasenden (= 1:7,14); mit Wasser umgeben am häufigsten bey Melancholischen (= 1:1,66), am seltensten bey Blödsinnigen (= 1:3,33). Verhältnismäßig nicht selten ist auch die Zirkel der Sitz einer durch anhaltenden Gram verursachten Hirnkrankheit (Nr. 654. 674. 792). Somit scheint denn die Abnormität der Zirkel vergleichungsweise am meisten Blödsinn, Verstimmung des Gefühls und Verrücktheit, am wenigsten Blindheit, Taubheit, Amnesie und Apoplexie, am meisten Convulsionen und Lähmung des Kiefers, am wenigsten Lähmung der Gliedmaßen, und anderer willkürlicher Muskeln zu bewirken; am stärksten auf die Ernährung und auf die Geschlechtsheile, am schwächsten auf Verdauung und Athmen zu wirken.

§ 99. Da wir nun mit diesen Angaben nur wenig für die Erkenntniß gewonnen haben, so wenden wir uns zu den Verhältnissen des Baues und bestimmen die Classe von Gebilden, zu welchen die Zirkel gehört, und das individuelle Gebilde, mit welchem sie zunächst im Zusammenhange steht. Aber auch hier sind so viel Dunkelheiten und Widersprüche, daß wir mehr nach Gründen der Wahrscheinlichkeit entscheiden können. — Carus (Nervensystem S. 203), und Tiedemann (Gehirn S. 133) nennen sie eine Commissur, Gall (*systeme* I, p. 316) erklärt sie für ein Ganglion. Sie ist gewissermaßen Beydes, und daher eigentlich weder das Eine, noch das Andre, denn keine Commissur stellt in der Mittellinie ein solch selbstständiges gangliöses Gebilde dar, und kein Ganglion ist so unpaarig, so gegen den Hirnstamm abgesetzt und mit einer solchen commissurenartigen Grundlage versehen. — Was den Zusammenhang der Zirkel vermittelt ihrer vordern Stiele betrifft, so hat man a) am häufigsten dieselben aus Theilen des Gehirns abgeleitet (s. II. Bd. S. 334). So will sie Carus (Nervensyst. S. 238) in die ab-

steigende Wurzel des Gewölbes, Tredermann (Folia p. 19) heym Seehund in die Markkugeln, Serres (L. p. 159) in die Säulen des Gewölbes verfolgt haben. Allein bey der aufmerksamsten Untersuchung habe ich nie eine organische Verbindung der Zirbeltheile mit diesen Theilen bemerkt, sondern sie nur bis in die Substanz verfolgen können, welche das Lager der Wurzeln des Gewölbes, der Säulen und Markkugeln anmaacht; überdies kommt die Zirbel auch bey Thieren vor, welche kein Gewölbe haben, nämlich bey Fischen und Amphibien, und bey den Vögeln, welche wenigstens keine Markkugeln haben. b) Nach Willis (Cerebr. 2. p. 13) sollten die Zirbeltheile die Schläfenerven an ihrem Ursprünge verknüpfen, und nach Carus (Nervensystem S. 150, 196, 203) die ganglienförmige Commissur der Schlägel bilden, so daß die Zirbel mit dem Gesichtssinn in Verbindung stehe, übrigens eine um die Centralaxe des Gehirns krystallisirte Nervennasse darstelle. Allein die Enden der Zirbeltheile reichen offenbar bis zum Boden der dritten Höhle, welcher nicht mehr zur Substanz der Schlägel gehört. c) Endlich will Treviranus (Schriften III. S. 47, 49) heym Stör und bey Proteus sie bis zum Ursprünge des Riechnervens verfolgt haben. d) In §. 99a. Gewiß ist nur so viel, daß die Zirbeltheile mit der Masse zusammenhängen, die in dem Trichter sich fortsetzt, und da man sie nicht weiter mit Bestimmtheit verfolgen kann, sie ober nach Serres aus dieser Gegend herauswachsen, so dürfen wir hier ihre Wurzel suchen: In dieser Masse geht nun theils der gleiche Keimstrang zum Hirnanhange, theils eine Fortsetzung der hinteren Stängel. Was nun Ristern anlangt, so kann wir auch aus andern Gründen, daß die Zirbel mit dem Hirnanhange ein Ganzes ausmacht, wie dies zum Theil schon von Stenson, Wenzel's, Böllinger, Cuvier und Schönlein anerkannt worden ist (siehe I. Bd. S. 33a). Denn 1) beyde haben eine gemeinschaftliche, keinem andern Hirnthelle zukommende Form: von der innern Fläche der Seitenfläche des Hirnsamens ausgehend, lösen sie sich von demselben ab, und ragen als eigne, freye Gebilde in der Mittellinie hervor. 2) Ihre Substanz und Consistenz hat viel Aehnlichkeit. 3) Beyde stimmen in ihren Lage hinreichend, indem sie die Endpunkte der dritten Höhle bezeichnen, an die Schlägel sich anheften, und mit den Gefäßstämmen, so wie mit der festen Hirnhaut, in einer nähern Berührung stehn, als andre Hirnthelle. 4) Beyde sind meistens gleichzeitig in einem krankhaften Zustande; daß dies nicht ohne Ausnahme ist, (Tubinger Blätter III. S. 5a), beweiset nichts, dagegen, da oft auch eine Abnormität auf den einen oder andern Theil eines und desselben Organs sich beschränkt. 5) Daß Bichat auch am Hirnanhange schon gefunden hat, ist zwar nur eine isolirte Thatsache, die aber in Verbindung mit andern auf die innere Aehnlichkeit beyder Organe hindeutet. 6) Beyde sind bey niedern Thieren größer, bey höhern Thieren kleiner, bey Menschen verhältnißmäßig am kleinsten (§. 987.). Nach Treviranus stimmen Beyde auch darin mit einander überein: daß sie bey Wasserthieren größer sind, als bey Landthieren. 7) In den Wirkungen ihrer Abnormitäten stimmen sie größtentheils mit einander überein (§. 99a.). Beyde verursachen, verglichen mit andern Hirnthellen, hementlich den Ganglien und dem Mantel des großen Hirns, am seltensten Amnesie und Apoplexie, Taubheit und Blindheit, Lähmung der Gliedmaßen des Halses, der Zunge und des Speiseröhrenkopfs, der Gesichtsmuskeln, Verstopfung, Durchfall und unwill-

kühliche Aussteuerungen; am häufigsten aber Verrücktheit, Verstimmung des Gefühls und Blödsinn, Abmagerung, Affection der Genitalien und Convulsionen. Mithin dürfen wir vermuthen, daß die Zirbel gleich dem Hirnanhange (§ 984.) nicht sowohl eine eigenenthümliche Function hat, als vielmehr eine allgemeine Stimmung des Hirnlebens bewirkt.

§. 993. Da wir hier nicht ohne Hypothesen auskommen, und die Hypothese, als ein intermittierender Gedanke, immer besser ist, als Gedankenlosigkeit, so stelle ich die Vermuthung auf, welche schon Lanijsi (*de sede animae* p. 155) äusserte, daß die Zirbel ein Analogon, oder eine Wiederholung, oder ein Repräsentant des kleinen Hirns in der Sphäre des großen Hirns ist. Denn 1) in Boden der dritten Höhle verläuft ausser den Kernsträngen der Theil der hintern Stränge, welcher nicht in das kleine Hirn ausgestreckt ist, Wiewohl es sich nun wegen der Weichheit der Masse noch nicht anatomisch hat erweisen lassen, so ist es doch möglich, daß diese hintern Stränge entweder unmittelbar in die Zirbelstiele übergehen, oder doch mit ihnen in Verbindung stehen. Letzteres ist kaum zu bezweifeln; und so würden denn die Zirbelstiele das Analogon zu den Schenkeln des kleinen Hirns seyn. 2) Die Stiele und die Schenkel weichen von vorne und unten, nach hinten und oben. 3) Beyde treffen, indem sie nach innen sich ausbreiten, auf ihr Paariges, und verwachsen so unter einander. 4) Diese Verwachsung findet bey dem menschlichen Embryo gleichzeitig Statt, so daß im Anfange des vierten Monats sowohl die Zirbel, als das kleine Hirn erscheint. 5) Beyde Organe entwickeln sich also im Lebensalter, und zum Theil auch in der Thierreihe später, als das große Hirn. 6) Beyde nehmen auf den höhern Stufen der Entwicklung in Verhältniß zur übrigen Hirnmasse ab, und sind bey'm Menschen verhältnißmäßig am kleinsten. 7) Beyde sind unpaarige Organe. 8) Beyde hängen vorne mit dem Stamme zusammen, erstrecken sich meist wagrecht nach hinten, und enden mit einem hintern, freyen Rande. 9) An Beyden ist eine überwiegende Venosität wie die Zirbel von den großen Hirnvenen, so ist das kleine Hirn von den größten Blutleitern umgeben; Beyde erscheinen in dieser Hinsicht als Aussenswerke des Gehirns, wenn der allgemeine Satz gültig ist: daß an den sensibeln Organen des Venöse mehr nach aussen gedrängt wird (§. 229.) 10) Wie phosphoraurer Kalk an der Zirbel als Hirnsand sich absetzt, so scheidet er sich am kleinen Hirne als Knochenmasse ab, welche in seiner Umgebung viel stärker ist, als in andern Gegenden der Hirnschale. Das kleine Hirn hat eine größere Gensigtheit zu erdigen Concretionen, als das große Hirn: in unser Sammlung pathologischer Beobachtungen waren unter 163 Fällen von Abnormalitäten des kleinen Hirns 2 (= 1:81) mit erdigen Concrementen; dagegen unter 863 Fällen von Abnormalitäten des großen Hirns nur 6 (= 1:144) mit dergleichen Concrementen. Das knöcherne Zelt kann als ein Ausscheidungsproduct, und vielleicht selbst als Stellvertreter des Hirnsandes angesehen werden. 11) Beyde Organe stimmen nach unsers auf Thatfachen sich gründenden Vermuthungen darin überein, daß sie mehr mittelbar als Hindernde überhaupt stimmen, als unmittelbar einzelne Thätigkeiten bestimmen. 12) Wie Abnormalitäten der Zirbel am häufigsten Blödsinn und Verrücktheit, Convulsionen Abmagerung und Affection der Geschlechtstheile verursacht, so haben auch die Abnormalitäten des kleinen Hirns dieselben Wirkungen häufiger, als die des großen Hirns. 13) Endlich scheinen beyde Organe, vermöge ihrer gleichen Bedeutung, einander gewisser-

maalen zu ergänzen, so daß, was an Größe dem Einen abgeht, durch stärkere Ausbildung des Andern ersetzt wird: wie bey den Amphibien das kleine Hirn unvollkommen entwickelt und die Zirbel groß, bey den Vögeln hingegen Jenes groß und diese klein ist, so ist bey dem menschlichen Weibe das kleine Hirn kleiner, und die Zirbel größer, als bey dem Manne.

IV. Belegungsorgane.

§. 994. Das Gewölbe fehlt bey den Fischen, denn die Markstreifen, welche innerhalb der Sehkugeln des Herings sich finden (Cerus Gehirn S. 155) können nicht mit ihm verglichen werden. Eben so fehlt es auch bey den Vögeln; nur bey Adlern und Papageyen will Serres (l. p. XXXV) die ersten Spuren davon gefunden haben. Bey den Säugthieren findet es sich durchgängig, unterscheidet sich aber von dem menschlichen 1) durch geringere Duplicität, indem seine Seitenhälften fast ganz verwachsen sind, 2) durch geringere Länge, besonders durch Kürze der Säulen, 3) durch größere Breite, 4) durch Beymischung graulichcr Substanz. Am breitesten und kürzesten ist es bey Nagethieren; es wird etwas schmaler und länger bey Wiederkäuern, und noch mehr bey Raubthieren und Affen. — Bey dem Embryo steht man im dritten Monate den vordern Theil des Gewölbes, der allmählig nach hinten fortwächst. Nach Serres (l. p. 154) entwickeln sich zu gleicher Zeit die Ammonshörner, und aus diesen wachsen die Schenkel von hinten nach vorne dem Körper entgegen, bis sie sich mit diesem vereinigen.

§. 995. Daß das Gewölbe nicht dazu dient, gleich einem gewölbten Mauerwerke die Decke der Seitenhöhlen zu tragen und gespannt zu erhalten, wie Galen (*anat. administr. lib. IX. c. 4, p. 105. de usu part. lib. VIII. c. 11. p. 169*) und Vesal (*lib. VII. c. 7. p. 547*) vermutheten, noch auch zu hindern, daß der Eingang zur dritten Höhle nicht durch Auswurfstoffe verstopft werde, scheint von selbst einzuleuchten; dagegen übt die Höhlenwassersucht einen mechanischen Einfluß auf das Gewölbe aus, indem dies durch das Wasser endlich ausgedehnt und aufgehoben wird, so daß nun beyde Seitenhöhlen durch eine bedeutende Oeffnung unter einander communiciren. Eben so wenig Grund hat Lancisi's (*de sede animae p. 152*) Meynung, daß es eine Kreuzung vermittele, und daß Fasern von einer Hemisphäre durch den Balken zum Gewölbe der andern Seite gehen. Nach Willis (*cer. o. 10. p. 51*) sollen in ihm die Geister von einem Ende des Gehirns zum andern circuliren, wie durch einen Pelican, und durch diese kreisende Bewegung wahrscheinlich feinere Acte der Phantasie bewerkstelligt werden. Nach Reil (*Archiv XI S. 112*) ist es vielleicht nur *Conductor*, nicht *Motor* der Electricität, da ihm die grane Substanz abgeht; doch findet sich diese in den Markkugeln, und in den Ammonshörnern. Nach Treviranus (*Biologie VI. S. 165, 161*) vermittelt es die Einheit des Bewußtseyns bey der Mannichfaltigkeit der Empfindungen, und die Möglichkeit, daß Eindrücke auf einen Sinnesnerven Vorstellungen von Gegenständen andrer Beschaffenheit erregen.

§. 996. Betrachten wir das Gewölbe in seiner ganzen Ausdehnung (§. 184 — 187. 199), so erscheint es uns als der köstliche Ausdruck der Phantasie (§. 745). Wie diese das Ungleichartige in Verbindung bringt, so setzt das Gewölbe Vordres und Hintres, Obres und Untres, Innres und Außres in Beziehung. Es steht in der nächsten Bezie-

hung zu den Gefäßgeflechten, und muß von der Turgescenz derselben, und von der verstärkten Activität des Kreislaufs im Gehirn am meisten erregt werden, hierdurch aber auch eine stärkere Spannung in allen den Gehirnen hervorbringen, mit welchen es in Berührung tritt. Es umkreist und durchbohrt den Sehhügel, als denjenigen Punkt des Hirnstamms, in welchem die bewußte sinnliche Erkenntnis am stärksten hervortritt. Indem es aber so mit dem Hirnstamme, als dem Organ sinnlicher Rührung, zusammenhängt, verhindert es sich auch mit dem Mantel und tritt dadurch in Beziehung zu dem innern Wirken der Seele. Mit den Querheileitungsorganen tritt es im Ganzen nur in Configuration, indem es sich vorne an die vordere Commissur, oben an den Balken anlehnt, so daß die Verstandesthätigkeit nicht unmittelbaren Einfluß auf dasselbe gewinnen kann, wohl aber in Wechselwirkung mit ihm tritt: richtet das Gewölbe seine Spannung gegen den Hirnstamm und dessen Strahlung, so wird die Phantasie mit sinnlichen Bildern und Begehungen sich beschäftigen; richtet sie sich gegen die Commissuren, so wird sie auf die Möglichkeit des ursachlichen Zusammenhangs und der geistigen Verknüpfung sich beziehen. Es steht mit dem Vorderleppen, und dadurch mit der geistigen Erkenntnis in Beziehung; vorzüglich aber mit dem Unterleppen, und mit der Gemüthstheätigkeit.

§. 997. Aus den Resultaten der pathologischen Beobachtung geht hervor 1), daß das Gewölbe überhaupt mit dem innern Seelenleben in einem viel innigern Verkehr steht, als mit der Richtung der Hirnthätigkeit auf das leibliche Leben, wie wir dies schon nach seinem Baue vermuthen müßten, da es zum Hirnstamme und seinen Strahlungen als selbstständiges Organ bloß hinzutritt, und nicht eine Fortsetzung davon ist. Wenn es in einem gereizten, abnormen Zustande sich befindet, so verursacht es häufiger, als irgend ein andrer Theil, Delirium (= 1:2,37); als den Ausbruch einer ausschweifenden, die sinnliche Wahrnehmung und die Verstandesthätigkeit überflügelnden Phantasie. Seine Abnormitäten bewirken auch häufiger, als andre Theile, Betäubung (= 1:1,90), insofern es mit der centralen Seelenthätigkeit, dem Bewußtseyn zusammenhängt. Vermöge der Verwandtschaft der Phantasie mit dem Gemüthe, verursachen die Abnormitäten des Gewölbes so häufig (= 1:4) Verstimmung des Gemüths, daß es hierin nur den Vierhügeln nachsteht. Dagegen übertrifft es diese an Regsamkeit des Gemeingefühls, indem Schmerz (= 1:1,58) und Schwindel (= 1:1,90) am häufigsten von ihm ausgeht: seine Entzündung charakterisirt sich nach Abercrombie durch den heftigern und tiefer sitzenden Schmerz und durch den acuten Verlauf. Es verursacht seltner, als verlängertes Mark, Brücke, Sehhügel und Streifenhügel, Apoplexie (= 1:4,75; seltner, als verlängertes Mark, Vierhügel, Sehhügel, Zübel und Hirnanhang, Verrücktheit (= 1:19); seltner, als Vierhügel, Sehhügel, und kleines Hirn, Amnesie (= 1:19). Blödsinn kam hey seinem Abnormitäten gar nicht vor, was wohl darauf beruht, daß diese meist einen acuten Verlauf nehmen; in dem einen Falle (Nr. 395), wo hey Wassersucht der Hirnhöhlen der vordere Theil des Gewölbes zerstört war, wurde der Kranke stumpfsinnig und schlüfrig. Auch hat es keinen unmittelbaren Einfluß auf die Sinnesstheätigkeiten, und es kam hey seinen Abnormitäten weder Blindheit, noch Taubheit vor. — 2) Es wirkt im Ganzen weniger auf die Irregularität. Am häufigsten kam hey seinen Abnormitäten allgemeine Lähmung (= 1:19), Lähmung des Kiefers (= 1:19), der Zunge (= 1:9), des Speiseröhrenkopfs (= 1:19), eines Arms

(= 119,50) oder eines Beins (= 119) vor; vergleichungsweise sehr selten Convulsion (= 16,35) und Hemiplegie (= 19,50; und gar nicht Krämpfe des Nackens, Lähmung der Hals-, Gesichts- und Augenmuskeln. 3) Am schwächsten wirkt es auf die Rumpfeingeweide, denn bey seinen Abnormalitäten trat verhältnißmäßig nur sehr selten (= 119) Erbrechen, eine andre Störung der plastischen Functionen aber gar nicht ein.

§. 998. Markkugeln können nur da angenommen werden, wo ein Gewölbe vorhanden ist. Bey einer menschlichen Mißgeburst, wo die rechte Hälfte des Gewölbes mangelte, fehlte auch das rechte Markkugeln (Berliner Akademie 1815 S. 27). Was man bey Fischen dafür angesehen hat (Treviranus Schriften III. S. 47), sind nur Anhänge des Trichters. Bey den Säugethieren haben sie eine geringere Duplicität, als bey dem Menschen, sind also mehr indifferent und weniger entwickelt: bey Nagern bilden sie eine völlig ungetheilte Masse; bey den Wiederkäuern und Raubthieren zeigt sich nur eine Spur von Trennung; bey den Affen liegen sie dicht aneinander, und erst bey dem Menschen sind sie völlig geschieden. Mit dieser fortschreitenden Entwicklung parallel laufend, nehmen sie an Masse, in Vergleich zum verlängerten Marke, zu, in Vergleich zum Gehirne aber ab. Bey dem Embryo erscheinen sie zu Ende des dritten Monats als eine ungetheilte Masse, welche erst zu Anfang des siebenten Monats getheilt wird (Tiedemann Gehirn S. 162). — Sie sollten nach Marchetti's (p. 124) das zu starke Anströmen des Schleims in den Trichter verhüten; nach Willis (cer. a. 2. p. 16) den Trichter befestigen und schützen; nach Gruithuisen (Beiträge zur Physiognosie S. 333) die Leitung in Hinsicht der Gesichtspception vermindern, so daß, wo sie fehlen, auf das Sehen eines Gegenstandes eine geschwinde Resolution erfolgt. Nur bey den niedern Säugethieren hängen sie mit dem Chiasma und dem Sehstreifen zusammen, und zwar so, daß auch dies eine bloße Anlagerung zu seyn scheint, wie denn bey den Wiederkäuern die Markkugeln mit ihrer untern Fläche auch in einer Vertiefung der obern Fläche des Hirnanhangs ruhn. Da sie mit dem Hirnstamme, den Schlägeln und zum Theil mit den Sehstreifen in näherer Beziehung stehen, so dürfen wir vermuthen, daß sie sich auf die Phantasie sinnlicher Wahrnehmung beziehen; und da sie graue Masse enthalten, auch gleich dem Hirnanhange und der Zirkel frey hervorragende Knospen bilden, so werden sie wahrscheinlich auch eine regere Spannung setzen. Bey den Säugethieren, wo sie größer, aber indifferent, unpaarig, dem Hirnanhange und der Zirkel ähnlicher sind, mag ihr allgemeines Spannungsverhältniß größer seyn; bey dem Menschen hingegen mögen sie bey ihrer höher entwickelten Duplicität mehr mit klaren und bestimmten Gestaltungen der Phantasie zusammenhängen.

§. 999. Die Ammonshörner sind ebenfalls nur ein Eigenthum der Säugethiere, auch bey den niedern derselben breiter, als bey den höhern, und bey dem Menschen am schmalsten: Gleichwohl sind sie bey dem Menschen 1) mehr in der Länge entwickelt. Bey den Thieren bildet der Hirnanhang den untersten Theil des großen Hirns, und die Ammonshörner reichen nicht so weit herab, sondern hören, z. B. bey Wiederkäuern, 6 bis 8 Linien über der untern Fläche des Hirnanhangs auf; bey dem Menschen hingegen reichen sie 4 bis 6 Linien weiter herab, als der Hirnanhang. 2) Bey ihm ist die Textur derselben zusammengesetzter, und die Kerben sind mehr ausgebildet, als bey

den Thieren: — Beym Embryo erscheinen die Ammonshörner gegen Ende des dritten Monats, und zwar bestehen sie denn noch bloß aus den von den Schenkeln des Gewölbes gebildeten Mulden, und bleiben bis noch der Geburt hohl. — Eine innre Beziehung zwischen den Ammonshörnern und den Sehhügeln anzunehmen (Meckel's Archiv I. S. 397), scheinen wir nicht berechtigt zu seyn. Dagegen steht jene bey Thieren offenbar mit den Riechfortsätzen und den Centralenden der Riechnerven in Verbindung, indem der Haken, welchen Malecarne die *protuberantia natiformis*, Treviranus (Schriften III. S. 6) die birnenförmige Hervorragung, Tiedemann (*zoones* p. 33) den *lobus inferior*, Serres (L. p. 276) den *lobus hippocampi* nennt, bey den niedern Säugethieren ununterbrochen, bey den höhern mehr mittelbar in den Riechkolben übergeht, indem auch seine Breite mit der Entwicklung des Riechkolbens in geradem Verhältnisse zu stehen scheint. Auch waren in einigen Fällen (Treviranus Biologie VI. S. 150) bey menschlichen Misgeburten, wo die Riechnerven fehlten, die Ammonshörner nicht ausgebildet. Treviranus vermuthet daher, daß diese bey der Erinnerung wirksam seyn mögen, die durch Eindrücke auf den Geruch so sehr geweckt wird. Wenn unsere Vermuthungen gegründet sind, daß die Längenbelegungssubstanz, also auch die in das Ammonshorn tretende Zwinde, vornehmlich aber das Gewölbe, Organe der Phantasie sind, und daß der Unterlappen vorzüglich auf handelnde Kraft der Seele sich bezieht, so dürfen wir auch vermuthen, daß das Ammonshorn die Beziehung der Phantasie auf Gefühl und Begehrung ausdrückt, im Gegensatz zum vordern Theile des Gewölbes, welcher mehr mit der Anschauungsphantasie zusammenhängt, so wie das Hintre und Vordre überhaupt in ähnlichem Verhältnisse zu einander stehen. Wie der vordre Theil des Gewölbes mit dem Sehhügel und zum Theil mit dem Schestreifen, das Ammonshorn aber mit dem Riechkolben und dem Riechstreifen in näherer Beziehung steht, so wirkt die Thätigkeit der Phantasie, welche durch Gesichtseindrücke geweckt wird, mehr auf geistige, objectiv Erkenntnis, die durch den Geruch erregte, aber mehr auf subjective Erkenntnis und Begehrung. Beym Menschen ist der Haken wenigstens um Vieles freyer von der Herrschaft des Riechkolbens, so wie bey ihm der Geruch ungleich weniger Einfluß auf die Begehrung äussert, und die Aehnlichkeit der Gerüche mit ehemals percipirten zwar die Phantasie lebhaft beschäftigt, aber weniger den sinnlichen Trieb, als eine Aufregung der höhern Gemüthsthatigkeit hervorruft. — An pathologischen Beobachtungen, in Betreff des Ammonshorns, sind wir noch zu arm, als daß wir daraus Resultate gewinnen könnten. In einem Felle (Nr. 803), wo dasselbe, in Folge einer chronischen Entzündung, geschwunden war, hatte sich eine Exaltation der Phantasie, besonders in Beziehung auf das Gemeingefühl des Gehirns, geäußert. In 3 Fällen (Wenzel *cerebr.* p. 142. sq. 209—214) wurde es bey Melancholischen, Verrückten und Blödsinnigen abnorm gefunden.

§. 1000. Die Scheidewand zeigt sich zuerst bey einigen Schildkröten (Tiedemann Gehirn S. 165), allgemein aber und stark entwickelt bey den Vögeln, wo sie die „strahlige Merkhaut“ genannt wird. A. Meckel (Meckel's Archiv II. S. 65—68) will sie aus der Rautengrube ableiten. Sicherer scheint es, daß ihre Stiele vom hintern Rande der obern Fläche der Sehhügel entspringen, und als äussere Streifen auf dieser Fläche nach vorne laufen. Von da lenken sie sich nach aussen, unten und vorne, um die Seh-

hügel herum, laufen dann an der Basis des Gehirns nach vorne und innen, steigen dann vor dem Chiasma und vor der vordern Commissur herauf, und breiten sich nun strahlig in die Scheidewände aus. Diese sind nicht unter einander verbunden, legen sich an die innern Flächen der Hemisphären an, und liegen, indem sie sich nach vorne, oben und hinten ausbreiten, mit ihren untern Rändern über der vordern Commissur und den Schhägeln. Man hat sie für ein Rudiment von Balken, Gewölbe und Scheidewand (Meckel Archiv I. S. 411), und namentlich ihre Stiele für Säulen des Gewölbes gehalten (Hallier *den. 18.* p. 33. Caru's Gehirn S. 193. 200. Treviranus verm. Schriften III. S. 25). Aber ihre Stiele haben dasselbe Gestaltungsverhältniß und denselben Verlaufs, wie bey dem Säugethiere und bey'm Menschen (§. 183), und haben in ihrer Lage vor der vordern Commissur, so wie in ihren übrigen Verhältnissen durchaus keine Aehnlichkeit mit dem Gewölbe. Bey Säugethiere gestaltet sich die Scheidewand dadurch um 1) daß sie durch den Balken beschränkt wird, also nicht so hoch aufsteigt; 2) daß ihre seitlichen Hälften unten unter einander, oben durch den Balken vereint werden und daß dadurch eine geschlossene Höhle innerhalb derselben entsteht. Bey den Nageethieren ist sie noch sehr unvollkommen; sie entwickelt sich bis zu den Affen herauf immer mehr, und ist bey'm Menschen am größten.

§. 1001. Bey'm Embryo besteht sie bis in den dritten Monat aus zwey getrennten Seitenblättern, wie bey Vögeln, und die zwischen denselben befindliche Spalte hängt mit der dritten Höhle zusammen. Allmählig erfolgt die Verwachsung, und im fünften Monate ist die Höhle der Scheidewand geschlossen, bleibt jedoch bis nach den ersten Jahren verhältnißmäßig breiter, als sie bey Erwachsenen wird.

§. 1002. Galen (*de anat. administr. lib. IX. c. 4. p. 105*) glaubt, daß die Scheidewand, da sie zu schwach ist, um die Decke der Höhlen tragen zu können; bloß zur Scheidung derselben bestimmt sey. Andre legen ihr mit mehr Wahrscheinlichkeit das Geschäft der Leitung bey, und zwar sollte sie nach Viassens (c. 11. p. 39) die Geister aus dem Balken zum Gewölbe leiten, nach Wenzel's (*op. p. 79*) aber mittels der Feuchtigkeits ihrer Höhle die Sinnesindrücke aus den Seitenhöhlen zum Balken und durch diesen zur obern Fläche der Hemisphären leiten. Digby erklärte sie für das *Sensorium*, weil sie mitten im Gehirne, und zwar in den Seitenhöhlen, welche Behälter für die kussern Eindrücke sind, liegt, und so von zwey Seiten die sinnlichen Eindrücke empfängt.

§. 1003. In den von uns gesammelten Beobachtungen kam bey Abnormitäten der Scheidewand nie Blindheit und Taubheit vor; nie eine Störung der Functionen der Rumpfeingeweide; nie eine Lähmung aller oder einzelner Gliedmaßen und andrer Bewegungsorgane; seltner, als bey Abnormitäten irgend eines andern Hirnorgans, Convulsionen ($\approx 1:19$); sehr selten und nur häufiger, als bey denen des kleinen Hirns, des Gewölbes, des Hirnanhangs und der Ziebel, Hemiplegie ($\approx 1:19$). Die Scheidewand steht also in keinem Verkehr mit der Richtung des Hirnlebens nach aussen, sondern bloß mit der psychischen Thätigkeit. Dies ergibt sich schon daraus, daß sie nicht mit dem Hirnstamme selbst, sondern nur mit der Oberfläche der Schhägeln, dem Gewölbe und dem Balken in organischer Verbindung steht, so wie daraus, daß sie bey dem Menschen größer ist, als bey den Säugethiere.

§. 1004: Was nun ihre psychische Wesenheit betrifft, so scheint ihr nur eine untergeordnete Stellung zuzukommen, in sofern sie bey Ergießung von Blut (Nr. 186. 241. 456) oder Wasser (Nr. 364. 369. 381. 388. 393. 783) in den Seitenhöhlen zerstört gefunden wird, ohne daß dabey immer eine bedeutende Störung der Seelenthätigkeit bemerkt worden wäre. Zwar sind nicht alle diese Beobachtungen ganz zuverlässig, da oft erst bey der Zergliederung die Scheidewand zerfällt, wenn man nur eine Seitenhöhle geöffnet und entleert hat und die in der andern ergossne Flüssigkeit nun mit ganzer Gewalt auf dieselbe wirkt. Indess findet sich eine solche Zerreißen auch bey einer vorsichtign Zergliederung, und namentlich wird bey der chronischen Hirnwassersucht; wie auch Craige (*Edinburgh Journal XVIII*, p. 497) bemerkt, der Balken nach oben gedrängt, dadurch aber die Scheidewand gespannt, verdünnt, an einzelnen Stellen durchlöcher und endlich größtentheils consumirt. — Eine Person (Nr. 678), bey welcher sie fehlte, war stumpfsinnig, doch zu gemeinen Geschäften brauchbar.

§. 1005. Nach ihrem Zusammenhange mit mannichfaltigen, ungleichartigen Gebilden zu urtheilen, scheint es, als dürften wir sie den Organen der Phantasie beyzählen. Sie entspringt von den Sehhügeln; als den Hauptganglien sinnlicher Anschauung, und kann von den hier entstandenen Affectionen den Stoff für ihre Thätigkeit empfangen. Bey den Vögeln, wo sie die Stelle des Gewölbes vertreten kann, bildet sie die innerste Schicht der Hemisphären; hier scheint die Phantasie der sinnlichen Anschauung am unbeschränktesten hervorzutreten und in das gesammte Seelenleben einzugreifen, während dieselbe bey den Fischen noch nicht entwickelt ist. Bey den Säugethiere, und am meisten beym Menschen, ist die Phantasie noch mehr ausgebildet, und hat ein ausgebreitetes und eigenthümlicheres Organ im Gewölbe gewonnen. Die Scheidewand ist diesem beygegeben, und bildet zum Theil die Vermittlung zwischen ihm und dem Balken. Letzterer hat ihr Wachsthum nach oben gehemmt, und lagert sich über ihren obern Rand: die Phantasie steht hier im Zusammenhange mit der Einheit der Gedanken, wirkt erregend auf den Verstand, und wird hinwiederum von ihm beherrscht. Am obern Theile der Hemisphären, wohin bey Vögeln die Scheidewand sich erstreckt, liegt statt derselben die Zwinge, welche als Längenbelegungsmasse ebenfalls für die Phantasie wirkt.

§. 1006. In unsrer Sammlung pathologischer Beobachtungen entstand bey Abnormitäten der Scheidewand häufig, jedoch seltner als bey denen des Gewölbes, Betäubung (= 1:25), seltner, als bey denen der Vierhügel, Verstimmlung des Gemüths (= 1:2) und Verrücktheit (= 1:9), seltner, als bey denen des Gewölbes und der Vierhügel, Schmerz und Delirium (= 1:3), seltner, als bey denen der Sehhügel und Streifenhügel, Apoplexie (= 1:3). Blödsinn und Gedächtnißschwäche wurde dabey gar nicht beobachtet.

§. 1007. Die vordere Commissur findet sich schon bey mehreren Fischen und bey den Amphibien. Bey den Vögeln liegt sie dicht vor den Sehhügeln, bildet in der Mittellinie einen senkrechten, nach oben offenen, und einen wagerechten, nach vorne offenen Bogen, und strahlt dann wagerecht in die Hemisphären. Bey den Säugethiere hat ihr Bogen seine Concavität ebenfalls nach vorne (während er beym Menschen die entgegengesetzte Richtung hat), und die Faserung geht theils nach vorne zum Riechkolben, theils nach aussen zu den seitlichen Theilen der Hemisphären. Beym Menschen breitet sie sich

nicht so nach vorne aus, sondern geht nach aussen in den Unterlappen; und nach hinten in den Hinterlappen. — Wie in der Thierreihe, so erscheint die vordere Commissur auch bey dem Embryo ziemlich früh, und eher als der Balken, so daß sie im dritten Monate allein die Hemisphären unter einander verbindet.

§. 1008. Man hat sie auf die Streifenhügel bezogen. So glaubt Willis (cer. p. 63) daß sie dieselben verbinde, und ihre Thätigkeiten verschmelze, damit die Affectionen nicht gedoppelt seyen; und nach Meckel (Archiv I. S. 385) soll sie hey dem Embryo die nach innen sich biegende Spitze der Streifenhügel seyn. Allerdings steht sie mit den Linsenkerne in Verkehr, aber nur im Verhältnisse der Contiguität, da sie nur vorübergeht, ohne sich darin zu endigen. — Dasselbe gilt von der Beziehung zu den Riechstreifen: wiewohl sie in der Nähe von dessen Wurzeln liegt, und in der Thierreihe mit ihm in gleichem Verhältnisse entwickelt scheint (Meckel's Anatomie III. S. 520), auch bey manchen niedern Säugethiern ganz an den Zitzenfortsatz geht (Treviranus Schriften III. S. 24. 70. 87), und sie auf diese Weise ein Verbindungsglied der Riechnerven zu seyn geordnet (Rolando p. 9), so ist doch ihre Beziehung zum Geruchsinn gewiß nur untergeordnet, da ihre Enden in die Lappen des großen Hirns ausstrahlen. — Da die vordere Commissur die Hemisphären verknüpft, so dürfen wir vermuthen, daß sie die Einheit der Vorstellungen vermittelt; und da sie ungleich schwächer ist, als der Balken, auch früher als dieser auftritt, in allen Classen der Wirbelthiere sich findet, und bey den niedern derselben zum Theil selbst grösser ist, so wird sie auch nur niedere Vorstellungen verknüpfen; da sie endlich durch den Hirnstamm selbst sich hinzieht, und, namentlich bey Thieren, in einer Verbindung mit den Riechnerven zu stehen scheint, so wird sie wohl in die Vorstellungen sinnlicher Anschauung und körperlichen Willens Einheit zu setzen bestimmt seyn.

§. 1009. Daß der Balken nicht die mechanische Bestimmung hat, die ohne Hirnmasse zu tragen, wie Galen und Vieussens (c. 17. p. 61) glaubten, oder die Verschiebung der dritten Höhle durch Aufhebung des Gewölbes (Vesal *lib. VII. c. 5. p. 543*) oder in Gemeinschaft mit demselben (Columbus *lib. VIII. p. 192*) zu hinderen, oder an seiner obern Fläche, wie in einer Rinne Schleim (Valverde *lib. V. c. 3. p. 241*), namentlich zur Nase (Vidius *lib. VII. c. 3. p. 311*) abzuführen, bedarf keines Beweises.

§. 1010. Der Balken muß eine höhere Function, als die übrigen Hirnthelle, haben. Dies geht zuvörderst aus seinem Verhältnisse in der Thierreihe hervor. Er fehlt bey Fischen gänzlich. Bey den Vögeln werden beyde Hemisphären über den Sehügeln, hinter der vordern Commissur durch ein Markblättchen verbunden, welches A. Meckel zuerst bemerkt hat (Meckel's Archiv II. S. 73. fg.); aber es ist so schmal und dünn, daß es ungefähr nur $\frac{1}{4}$ der vordern Commissur beträgt; es liegt ferner unter dem untern Rande der Scheidewand, und scheint mit seiner Strahlung in diese überzugehen, hat also nur eine entfernte Aehnlichkeit mit dem Balken. Dieser erscheint erst bey den Säugethiern, und zwar bey den niedern derselben ganz kurz, und bloß in seinem vordern Theil. Er nimmt im Ganzen genommen in geradem Verhältnisse zu den Hemisphären an Länge zu, jedoch so, daß er bey dem Menschen nicht bloß absolut am längsten ist, sondern auch relativ gegen die Hemisphären länger ist, als bey den meisten Säugethiern. — Eben

so erreicht er auch bey dem Embryo seine Ausbildung spät. Er besteht ursprünglich aus zwey Seitentheilen, welche allmählig mit einander verwachsen (Wenzel *oerebr.* p. 302), und zwar erscheint sein erster Anfang als ein senkrecht vor der vierten Höhle stehendes, in der Mittellinie noch eingeschnürtes oder erst im Verwachsen begriffenes Markblatt, zu Ende des dritten Monats. Er wächst im vierten Monate nach oben, dann aber nach hinten, so daß er erst im siebenten Monate hinter den Hirnganglien hinausragt und die Wulst bildet. Seine höhere Bedeutung ergibt sich endlich auch daraus, daß er mit den Rumpfeingeweiden in keinem Verkehr steht: in unsrer Sammlung pathologischer Beobachtungen kam bey seinen Abnormitäten nie eine Störung des Athmens, der Verdauung, der Ernährung und der Geschlechtsfunctionen, küsserst selten aber Harnbeschwerde (= 1:38) vor.

§. 1011. Wenn er nun, nach diesen Thatsachen zu urtheilen, ganz auf das psychische Leben sich bezieht, so werden wir ihn, vermöge seiner Gestaltungsverhältnisse, für ein Organ psychischer Einheit erklären müssen. So vermuthete schon Zinn (*Halleriæ sup. VII* p. 442), daß er die Empfindungen und Willensthätigkeiten in beyden Hemisphären verknüpfe. Diese Einheit kann sich nun zuvörderst auf die sinnlichen Vorstellungen beziehen. Zwar bedingt er nicht unmittelbar diese Vorstellungen, und wir können daraus, daß er bey Mißgeburten zugleich mit den Riechnerven und Schnerven fehlte, keinesweges folgern, daß seine Function unmittelbar mit diesen Sensationen zusammenhänge (*Treviranus Biologie VI* S. 155), denn die Stammsstrahlung, welche die sinnlichen Eindrücke empfängt, besteht für sich, und bildet unabhängig von ihm ein eignes Ganzes; bey seinen Abnormitäten kam in den von uns gesammelten Fällen nie Blindheit und Taubheit vor, und die Sensation geht bey den Thierclassen, wo er fehlt, nicht minder vor sich, als da, wo er vorhanden ist. Wohl aber könnte der Balken es vermitteln, daß beyde Hemisphären bey der Sensation zusammenwirken, so daß die Thätigkeit der gleichen Punkte beyder in eine und dieselbe Vorstellung übergeht. Dies wird sehr wahrscheinlich durch den Umstand, daß die Thiere, welchen der Balken fehlt, mit beyden Augen zu gleicher Zeit verschiedne Gegenstände sehn können (*Treviranus Biol. VI* S. 162). Dies liegt nicht an der Getrenntheit der Sinnesorgane, denn bey den Vögeln sind sowohl die Schnerven durch das Chiasma, als auch die Sehkugeln durch ihre Commissur vereinigt. Der Balken muß also der Ausdruck derjenigen Einheit der Seele seyn, vermöge deren die Differenz der paarigen Organe, oder die Verschiedenheit der Thätigkeiten in räumlich getrennten, ihrer Natur nach aber übereinstimmenden Organen aufgehoben wird.

§. 1012. Wenn auf diese Weise der Balken die räumliche Duplicität vernichtet und die Einheit herstellt, vermöge deren die Seele nicht nach der räumlichen Form der Erscheinungen und der Reizung ihrer Organe, sondern nach der innern Bedeutung der thätigen Punkte erkennt; und das Doppelte, oder Symmetrische, als ein Einiges auffaßt, so wird er bey weiterer Entwicklung auch im höhern Sinne wirken können. Seine höhere Function wird also darin bestehen, die räumliche Form von den sinnlichen Vorstellungen abzustreifen und in der Erkenntniß von der Erscheinung zur Wesenheit verandringen. Er wird also das Organ des Verstandes, und dadurch der höhern Seelenkräfte überhaupt

seyn, insofern die völlig entwickelte Verstandesthätigkeit auch ihr Urwesen, die Vernunft, im Kreise der physischen Individualität zur Verwirklichung bringt. Bey den Thieren wird der Balken die niedere, bey'm Menschen die höhere Bedeutung haben.

§. 1015. Vermöge seiner organischen Verhältnisse ist er ganz dazu geeignet. Seine Strahlung liegt an der innern Fläche des Stabkranzes jeder Seite. Da er nicht die Fortsetzung von diesem ist, so empfängt er die auf den Hirnstamm gemachten sinnlichen Eindrücke weder unmittelbar und in ihrer ganzen Stärke, noch in ihrer Einzelheit. Vermöge seiner Anlagerung aber wird er durch den Stabkranz erregt; die in diesem schon vergeistigten und zu Vorstellungen gewordenen Sinnesführungen, gelangen durch Reflexion und als ein Gesamtes zu ihm. Auf einem niedrigeren Standpunkte der Seelenkraft geht der Stabkranz vielleicht unmittelbar in den Balken über, während bey höherer Entwicklung beyde Organe selbstständiges und nur durch Anlagerung miteinander in Wechselwirkung sind. Der Balken erstreckt sich durch die ganze Länge des großen Hirns, und ist der allgemeinste Collectör von dessen Thätigkeiten; das umfassendste Organ, in welchem das Allgemeine der Vorstellungen, der Begriff, zur Anschauung kommen muß. Schon seiner Masse nach überwiegend, zeigt er sich auch in seiner Lage als das Herrschende, indem er unter den Kernorganen zu oberst liegt (§. 861. fg.). Das große Hirn bildet im Stammlappen einen Ring, welcher die Höhlen desselben in sich schließt: die Seitentheile dieses Rings sind die Stammganglien mit dem Anfange ihrer Strahlungen; der untre Theil ist der Boden der dritten Höhle mit dem Trichter- und Hirnanhange, der obre Theil aber ist der Balken, als der Schlußstein des ganzen Hirngebäudes: Hirnanhang und Balken bilden also einen Gegensatz, wie Untres und Obres; ist Jener das Ende des Rückenmarks, so ist dieser ein eigenthümliches, hinzutretendes Hirngebilde; ist Jener ein Indifferentes, so trägt dieser, die in seinen Strahlungen gegebene Mannichfaltigkeit zur Einheit, giebt Jener bloß eine unbestimmte Spannung, als Mittel des Hirnlebens, so tritt in diesem eigenthümliche Wirksamkeit hervor, welche die von den übrigen Gebilden überlieferte Thätigkeiten vollendet und zu ihrem Ziele führt. — Nach aussen gränzt der Balken an die Strahlungen des Hirnstamms, als die Organe der sinnlichen Vorstellungen; nach innen legt er sich an die Organe der Phantasie, nämlich mit seinen Strahlungen und oben auf die Zwingen, mit seinem Körper und unten an das Gewölbe und die Scheidewand an, so etsetzt der Verstand in Verkehr mit der Wahrnehmung und der Phantasie.

§. 1016. Bey einem ursprünglichen Mangel des Balkens, so wie des Gewölbes, der Scheidewand und der Zirbel (Nr. 649) fehlte Bewusstseyn, Sinnesthätigkeit und Willkühr, aber es war auch der Hirnstamm unvollkommen entwickelt, mit Verschmelzung seiner Ganglien. In einem Falle, wo die Seitentheile des Balkens in der Mittellinie sich nicht vereint hatten (Nr. 678), zeigte sich bloß Verstandesschwäche: das Subject war stumpfsinnig, doch zu gemeinen Geschäften, als Botenläufen, brauchbar. Bey einer Zerstörung des Balkens durch chronische Höhlenwassersucht (Nr. 393) fand Blödsinn Statt. Ueberhaupt wurde Blödsinn bey Abnormitäten des Balkens (= 1345) häufiger beobachtet, als bey denen andrer Hirntheile, mit Ausnahme des Großhirnstamms. Dieser nämlich enthält, insofern er die sinnlichen Eindrücke aufnimmt, die Bedingung der Verstandesthät-

tigkeit, und wie der Verstand bey Mangel sinnlicher Anregung verkümmert; so geht der Blödsinn noch häufiger vom Stamme des großen Hirns, als von dem eigentlichen Organe des Verstandes, aus.

§. 1015. Saucrotte (*prix de chir.* X. p. 340—343) durchschnitt einem Hunde den Balken von vorne nach hinten; zugleich entstand Betäubung mit heftigem Schütteln des ganzen Körpers, Schloechzen und Darmanalörung; durch Eingießen von Arquebade wurde das Thier geweckt, es sah, hörte, veränderte bisweilen seine Stelle, und stand einen Augenblick aufrecht, wenn man es gestellt hatte, aber roch nicht, und kassierte keine Empfindung, wenn Augen, Nase, Muskeln gestochen oder gebrannt wurden. Ein anderer Hund, bey welchem eine mit Oel bestrichne Bleyplatte auf den Balken gedrückt wurde, wurde betäubt, an allen Gliedern gelähmt und sah nicht; nach Entfernung der Platte verminderten sich die Zufälle etwas; bey wiederholter Anbringung derselben vermehrten sie sich, und nach einer halben Stunde erfolgte der Tod. Zinn (*Haller diss.* VII. p. 421. 424. 437.) durchbohrte bey 5 Hunden den Balken mit einem Troikars: zwey wurden betäubt, doch der eine derselben war am folgenden Tage munter, aber auf der einen Seite gelähmt; die drey andern wurden weder betäubt, noch gelähmt, jedoch zum Theil matt. Lorry (*mém. prés.* III. p. 358) will nach Zerstörung des Balkens bey Thieren keine Betäubung beobachtet haben. Der Erfolg dieser Versuche läßt sich verschiedentlich deuten: partielle Verletzung des Balkens braucht nicht immer seine gesammte Function zu vernichten; Sinnenthätigkeit und sinnliches Bewußtseyn kann nach Aufhebung der Verstandesthätigkeit fortdauern; bey Thieren kann der Balken noch nicht die volle Bedeutung gewonnen haben, die er bey Menschen hat. — Wie la Peyronie (*ac. de Paris* 1741. p. 214 — 217) in 5 Fällen von Blutergießung am Balken Betäubung beobachtete, so trat auch in den von uns gesammelten Beobachtungen Betäubung bey Abnormitäten dieses Organs (= 1:2,53) häufiger, als bey denen der andern Hirnthelle, mit Ausnahme des Gewölbes und der Scheidewand, ein.

§. 1016. Wie das Delirium zunächst auf einem abnormen Uebergewichte der Phantasie, und namentlich auf abnormer Aufregung derselben durch das subjective Gefühl, dann aber auch mittelbar durch Verminderung der bindenden, einenden und fixirenden Kraft des Verstandes beruht, so geht dasselbe sehr häufig vom Balken aus (= 1:3,45), und nur das Gewölbe, die Vierhügel und die Scheidewand übertreffen ihn in dieser Hinsicht. — Verrücktheit kam bey Abnormitäten des kleinen Hirns, der Brücke, der Streifenhügel und des Mantels des großen Hirns häufiger, als bey denen des Balkens (= 1:19), vor. Auch zeigten auf solche Weise die Vierhügel, die Schügel und das kleine Hirn mehr Einfluß auf das Gedächtniß, als der Balken (= 1:19); die von Treviranus (*Biologie* VI. S. 156) aufgestellte Vermuthung, daß in ihm die Eindrücke aufbewahrt werden, findet also hier keine Stütze.

§. 1017. Als das Organ höherer, geistiger objectiver Anschauung kann der Balken selbst weder ein reges Gemeingefühl haben, noch mit dem subjectiven Gefühle in näherer Beziehung stehn, noch auch auf das pflanzliche Hirnleben einen unmittelbaren Einfluß ausüben. Bey seinen Abnormitäten entstand verhältnismäßig selten (= 1:3,80) und nur häufiger, als bey denen der Streifenhügel und des Hirnanhangs, Schmerz; Schwindel

gar nicht; Apoplexie selten (= 1:6,35) und nur häufiger, als bey denen des Hirnanhangs, der Zirbel und der Vierhügel; Verstimmung des Gemüths ebenfalls selten (= 1:16) und nur häufiger, als bey denen des kleinen Hirns und der Sehhügel.

§. 1018. Die subjectiven Erfahrungen des Gemeingefühls scheinen auf den Antheil des Balkens an der höhern Geistesthätigkeit eingermanen binzudeuten: wenigstens fühlt man in Zeiträumen des erschwerten Denkens vorzüglich einen Druck in der Stirne und dem Scheitel (Reil's Beyträge I. S. 44). — Nach Gall's Beobachtungen endlich äussern sich in der Mittellinie, wo die Strahlungen des Balkens sind, die Seelenthätigkeiten, welche mehr auf innere Einheit beruhen, und von ihr seitlich diejenigen, die mehr dem Einzelnen und Aeussern zugewendet sind: mitten der Sachsinns, seitlich der Sinns für Farbe, Ort, Form, Zahl und Mechanismus; mitten Scharfsinn und Tiefsinn, seitlich Witz; mitten Stolz, seitlich Eitelkeit, u. a. w.

§. 1019. Schon längst hat man sich unsern Ansichten mehr oder weniger genähert. Nach Willis (*op. c.* 10. p. 51.) treten die thierischen Geister von allen Punkten der Hemisphären in dem Balken zusammen, breiten sich in ihm aus und reinigen sich dabey durch anhaltende Circulation; in ihm (c. 11. p. 54) gelangt die in den Streifenhügeln gebildete sinnliche Wahrnehmung zur Einbildung; wenn (*de anima* p. 36) die Streifenhügel als Objectivgläser die sinnlichen Eindrücke aufgenommen haben, so leiten sie dieselben zum Balken, als zu der weissen Wand, auf welcher sich die Bilder der Gegenstände gestalten; und von diesem geht bey umgekehrter Richtung der Wille aus. — Lancisi (*de sede animae* p. 145, 157 — 161) erklärte den Balken für das eigentliche Seelenorgan, in welchem die Sensation ihr Ende erreicht, die Einbildung, die Vorstellung, die Beurtheilung ihren Sitz hat, und von welchem die Impulse zur Bewegung ausgehn. La Peyronie (*ac. de Paris* 1741 p. 210) hatte dieselbe Meynung, indem er behauptete, edes andre Hirngebilde für sich sey weder zum Leben, noch zum Denken absolut nöthig, nur der Balken könne nicht verletzt werden ohne Störung oder Aufhebung der Seelenthätigkeit. Etwas vorsichtiger erklärte Chopart (*prix de chir.* XI. p. 81) den Balken für denjenigen Hirnthheil, dessen Verletzung am häufigsten Verlust des innern Sinnes nach sich ziehe.

§. 1020. So wenig wir den Balken für den unmittelbaren Sammelplatz der sinnlichen Eindrücke halten können, eben so wenig können wir ihn als das Organ, welches die körperlichen Bewegungen bestimmt, ansehen. Er steht nicht in Continuität mit den Faserungen des Hirnstamms, wohl aber in Contiguität mit dessen Strahlungen. Hierdurch kann er einen Einfluss auf die Bewegung ausüben, aber bloß einen mittelbaren und mehr einen allgemeinen, indem er auf die Gesamtheit des Stabkranzes einwirkt. So lehren uns denn auch die gesammelten pathologischen Beobachtungen, daß nur allgemeine Krämpfe (= 1:3,16), und allgemeine Lähmung (= 1:19) häufig, Hemiplegie verhältnismäßig schon seltner (= 1:6,35), von ihm ausgeht; Lähmung der Gesichts- und Augenmuskeln, des Halses und des Arms, des Kiefers, der Zunge und des Speiseröhrenkopfs kam bey seinen Abnormitäten gar nicht vor.

V. Der Mantel.

§. 1021. Aus der Vergleichung mit dem kleinen Hirn hat sich bereits ergeben, daß der Mantel des großen Hirns mehr auf das psychische, als auf das leibliche Leben (§. 897), mehr auf innere Seelenthätigkeit, als auf Sinnlichkeit (§. 916), mehr auf Erkenntniß, als auf Stimmung und Richtung (§. 919 — 923), mehr auf den Willen, als auf den beverflichteten Trieb (§. 908) sich bezieht. Dem gemäß finden wir in der aufsteigenden Thierreihe ein stetiges Fortschreiten seiner Ausbildung, und zwar besteht diese 1) in zunehmender Größe gegen die Ganglien, den Hirnstamm und das kleine Hirn; 2) in der zunehmenden Concentrirung. Bey den niedern Fischen ist das Gehirn eine Doppelreihe von Kugeln zersplittert, welche theils ganglienartig, theils hemisphärentartig sind; bey den höhern zeigt sich das Gehirn als ein Einfaches, aus dem kleinen Hirn, den Sehkugeln und den Hemisphären bestehend. Bey den Vögeln ist diese Fünfszahl noch hervorstechend, jedoch so, daß die Hemisphären das Uebergewicht gewinnen. Bey den Säugethieren nimmt das Uebergewicht noch mehr zu, so daß die Sehkugeln als eigene Hauptabtheilungen verschwinden und die Dreyzahl sich feststellt, indem hier erst das große Hirn zur einfachen Duplicität gelangt. 3) Das Ganze, welches die Hemisphären darstellen, scheidet sich bey seiner höhern Entwicklung wieder in männlichfähige und dabey gleichartige Theile an der Oberfläche. Die Furchen fehlen, wie bey den drey niedern Classen, so auch noch bey den Nagethieren und Fledermäusen, erscheinen bey den Wiederkäuern und Raubthieren, werden bey den Amphibiensäugethieren und Cetaceen sehr zahlreich, blähen aber noch seicht. Beym Menschen sind nicht nur die Furchen zwischen den Randwülsten am tiefsten, sondern auch die größern Furchen so entwickelt, daß bey ihm allein der Mantel in eigenthümliche, schärfer begränzte Lappen zerfällt. 4) Die Hemisphären wachsen in der aufsteigenden Thierreihe von vorne nach hinten, so daß sie bey Nagern und Fledermäusen nur einen Theil der Vierhügel, bey den Raubthieren, Wiederkäuern, und Einhufern den vordersten Theil des kleinen Hirns, und bey den Affen dasselbe ganz bedecken, bey den Cetaceen aber, und noch mehr beym Menschen über dasselbe hinausragen. In Hinsicht auf das Verhältniß der Dimensionen zu einander erscheint beym Menschen die meiste Harmonie, und ein geringeres Vorherrschen einzelner Richtungen. Bey den Vögeln, den Nagethieren und den Seehunden ist das große Hirn mehr breit, als lang; beym Menschen ist es mehr lang, als breit, aber noch mehr wird die Breite von der Länge übertroffen bey einigen Raubthieren und Affen. Bey den Nagethieren ist die Höhe so gering, daß sie nicht allein von der Breite, sondern auch von der Länge ziemlich um das Doppelte übertroffen wird; bey dem Menschen steht die Höhe gegen die Breite und Länge weniger zurück, aber noch weniger bey den meisten Affen.

§. 1022. Die Hemisphären bilden im Anfange des zweyten Monats des Embryonalens eine häutige Blase, welche die Vierhügel, jedoch verhältnißmäßig wenig, in Größe übertrifft. Nach der Bildung der Stammganglien wachsen sie von vorne nach hinten, so daß sie zu Ende des dritten Monats die Sehkugeln, im fünften Monate die Vierhügel, im sechsten Monate das kleine Hirn bedecken und im siebenten Monate darüber hinausragen.

§. 1023. Der Mantel besteht aus verschiednenartigen Elementen: in ihm sind die Fortsetzungen der Kernorgane, der Stammganglien, der vordern Commissur, des Gewölbes und des Balkens vereint, so daß hier die Gesamtwirkung hervortritt und über die einzelnen Richtungen herrschend wird. Daher finden wir denn auch, daß die Abnormitäten des Mentals überhaupt weniger entschiedne Störungen einzelner Functionen hervorbringen, als die Abnormitäten der Kernorgane. Zu jenen Strahlungen tritt Belegungs-
masse, in welcher die Längenhügel überwiegend sind, die nach unserer Vermuthung (§. 742) Organe der Phantasie sind. Unter ihnen sind die Zwißgen die bedeutendsten, da sie den weitesten Umkreis haben, am wenigsten mit andrer Belegungs-
masse verschmolzen sind, an dem Balken und dessen Strahlungen anliegen, und mit dem Gewölbe zur Darstellung der Ammonshörner sich vereinigen.

§. 1024. In den Hemisphären des großen Hirns tritt das Gesamterzeugniß der verschiedenen psychischen Momente hervor: die mannichfaltigen Empfindungen, welche durch den Hirnstamm vermittelt worden, treten zur Einheit des Bewußtseyns zusammen. Die pathologische Anatomie lehrt, daß bey Lähmung der Glieder in Folge einer Encephalitis nur dann vorzüglich das Bewußtseyn sich erhält, wenn die Entzündung nicht in den Hemisphären des großen Hirns, sondern im kleinen Hirne, in der Brücke oder im Großhirnstamme ihren Sitz hat (Lallemand I. p. 248). Die Thiere, welchen Flourens die Hemisphären des großen Hirns genommen hat, zeigten Gemeingefühl, aber keine Sinneserkenntniß; ihre Bewegungen entsprechen dem Gemeingefühle, und waren zweckmäßig, aber nicht durch die Vorstellung eines Zwecks bestimmt; sie ethmeten so vollkommen, wie zuvor, aber sie hatten keinen Nahrungstrieb, verhungerten, wenn man sie nicht fütterte (Flourens p. 155), verschluckten selbst das Nicht, was ihnen in den Schnabel gebreht wurde, verschlangen aber Alles ohne Unterschied, was man ihnen in den Rachen schob (ebend. p. 90); durch gehörige Fütterung konnten sie sich bis zehn Monate lang am Leben erhalten werden, und wurden dabey wohl genährt und fett (ebend. p. 87. 125); kurz, das pßnälische Hirnleben dauerte ungestört fort, und nur die freye psychische Wirksamkeit war aufgehoben. — Wenn Vieussens (c. 22. p. 128) annahm, daß im Marklager des großen Hirns (*centrum ovale*) die Imagination, d. i. die Anschauung der sinnlichen Eindrücke vor sich gehe und somit auch (c. 25. p. 136) Gedächtniß, Urtheilskraft und Vernunft hier wirke, so irrte er wohl vorzüglich nur insofern, als er der Marksubstanz an sich einen so hohen Werth beylegte.

§. 1025. Die Stammleppen scheinen das Ursprüngliche an den Hemisphären zu seyn. Wenn wir nämlich die soliden Hemisphären der Knochensische mit einem Theile des Säugethiergehirns vergleichen wollen, so finden wir dazu kein andres Analogon, als die auf dem Hirnstamme sitzenden, soliden Schüßel und Streifenhügel mit ihren äussern, von Rinde überzogenen Oberflächen. Wie jene soliden Massen der Fische Ganglien sind, die auf dem Hirnstamme sitzen, und dabey doch auch Aehnlichkeit mit Hemisphären haben, so sind auch die Stammleppen nichts als die Ganglien mit leppnartiger, durch Rinde und Randwülste bezeichneter Oberfläche. So erscheinen sie auch beym menschlichen Embryo eine Zwißung überwiegend, und bis in den sechsten Monat unbedeckt, indem der Klappendeckel des Oberlappens, der hintre Theil des Vorderlappens und der Unterlappen noch zu wenig entwickelt ist,

wiewohl sie ihre Randwülste erst am Ende des Embryonalenlebens erhalten. Somit scheinen sie denn auch nur Organe einer unvollkommenen, über die sinnliche Nahrung kaum hinausreichenden Seelenthätigkeit zu seyn.

§. 1026. Ihnen zunächst folgen die Oberlappen, welche von den Stammlappen ausgeh., sich über sie heraufwölben und dadurch nach innen eine Höhle bilden. Die hohlen Hemisphären bey Knorpelfischen scheinen die ersten, mit den Stammlappen noch verschmolzenen Oberlappen zu seyn. Bey seiner höchsten Entwicklung besteht der Oberlappen aus dem mittlern Theile des Stabkranzes oder den scheitelrecht aufsteigenden Fasern des Hirnstamms, aus dem mittlern Theile des Balkens und seiner Strahlung, aus dem mittlern Theile der Zwinge, und aus Belegungsmaße, welche zu den übrigen Lappen übergeht. Somit scheint er denn der Collectivlappen zu seyn, dessen Thätigkeit mehr auf die Gesamtheit, als auf einzelne Richtungen sich bezieht.

§. 1027. Das Blut strömt am mächtigsten auf den Oberlappen zu wirken, wie er denn auch an der Bewegung des Gehirns den meisten Antheil nimmt. Apoplexien, welche bey Trinkern, im Rausche und bey wüthiger Anfrügnng erfolgen, gehen von ihm häufiger aus, als von andern Lappen des großen Hirns. Auch die deprimirenden Gemüthsbewegungen wirken stärker auf ihn ein: unter 11 Fällen, wo die Hirnkrankheit durch Gram, veranlaßt oder befördert worden zu seyn schien, waren 7 (Nr. 448, 252, 253, 515, 520, 683, 905), wo sie im Oberlappen ihren Sitz hatte; in zwey Fällen (Nr. 683, 1025) war dieser im Hinterlappen; in einem Falle im Unterlappen (Nr. 689) und im Vorderlappen (1106). Man fand ferner nach Aerger Abnormitäten im Oberlappen (Nr. 1017), nach Schreck im Oberlappen (Nr. 1015) und Vorderlappen (Nr. 1036), und nach Furcht im Hinterlappen (Nr. 816).

§. 1028. Diese Gesamtwirkung (§. 1026) scheint sich auch darin auszusprechen, daß nach unsern Tabellen die Abnormitäten des Oberlappens häufiger, als die eines andern Theils des großen Hirns, mit Ausnahme der Zirbel und des Hirnanhangs, Abmagerung (= 1:29) hervorzubringen, und auf die einzelnen plastischen Functionen weniger einwirken. — Petit schloß aus einigen Beobachtungen, daß die Kraft zur Bewegung der Glieder im Oberlappen wirke, und glaubte, dies durch Vivisectionen bestätigt zu sehn. Auch Chopart hatte dieselbe Meynung. Es scheint gewiß zu seyn, daß Lähmungen vom Oberlappen häufiger ausgehen, als vom Vorderlappen. Namentlich verursachen seine Abnormitäten häufig Hemiplegie (= 1:3,35) und Lähmung der Gesichtsmuskeln (= 1:15), so wie der Zunge (= 1:10). Etwas seltner des Speiseröhrenkopfs (= 1:57), der Augenlieder (= 1:55), der obern (= 1:17) und der untern Glieder (= 1:88), und allgemeine Lähmung (= 1:44). In allen diesen Beziehungen auf Bewegung stand der Oberlappen den Schlägeln und Streifenhügeln noch, so daß auch sein ganzer Einfluß auf die Bewegung durch seinen organischen Zusammenhang mit diesen Ganglien bedingt zu seyn scheint.

§. 1029. Dasselbe gilt auch von der Apoplexie (= 1:6,02), nur so, daß hier die Differenz dieser Ganglien von dem Oberlappen noch größer ist. — Dagegen ist die Betäubung (= 1:12,19) häufiger ein Symptom von Abnormitäten des Oberlappens, als der Ganglien, und nur seltner, als der Belegungsorgane. Seine nähere Beziehung zum Bewußtseyn,

scheint er also zunächst dem Antheile, welchen der Balken an ihm hat, zu verdanken. Wie Saucerotte (*priz. de chir.* X. p. 337) durch Compression des Gehirns unter dem Scheitelbeine bey Hunden Betäubung bewirkte; so beobachtete auch Marshall (p. 291), daß die Eindrückung des Scheitelbeins mehr Betäubung hervorbringt, als die des Stirnbeins. (s. 1030.) Nach den Arabern und ihren Nachfolgern sollte die mittlere Hirnhöhle, also der Oberlappen der Sitz der Denkkraft, des Verstandes, des Urtheils und des Entschlusses seyn. Trevisanus (Biologie VL S. 139) bezieht ihn und den Hinterlappen auf den Gesichtssinn. Nach Gailhofenbart sich an der Mittellinie des Oberlappens, oder am Scheitel hinten die Festigkeit des Charakters (tab. 8. p. 11. 12. Nr. XIII), mitten die religiöse Stimmung (ebend. Nr. XXVII), vorne am Uebergange in den Vorderlappen die Gümmthigkeit (tab. 9. 11. 12. Nr. XIV). Die hier bezeichneten Stellen entsprechen den Strahlungen des Balkens. In seiner höchsten Aufwölbung und in der Mitte seiner Länge, so wie des großen Hirns überhaupt, würde also ein Indifferenzpunkt höherer Ordnung auftreten, in welchem die Anschauung der höchsten Einheit, des Gesamtgrundes aller Einzelheiten, nicht als Gegenstand einer einzelnen Richtung der Seelenthätigkeit, nicht als philosophische Erkenntniß, sondern als ein die ganze Seele durchdringendes Gefühl wirkte. Wenn nun von diesem Punkte aus nach vorne die Objectivität, nach hinten die Subjectivität das Ubergewicht erhalte (§. 816), so würde nach vorne die höchste Einheit des Subjecta mit den Objecten als Sympathie, als Erkenntniß der Gleichheit unsres Ichs mit andern besetzten Wesen, als Sinn für Gerechtigkeit wirken; nach hinten aber würde die Einheit unser selbst als eines Thätigen, mit uns selbst als einem Seyenden, die Uebereinstimmung zwischen unsern Handlungen und unsern Ueberzeugungen, die Charakterstärke und Festigkeit des Willens sich äußern.

§. 1031. Die Unterlappen bilden nebst den Oberlappen die mittlere Partie des großen Hirns, welche zwischen den vordern und hintern Lappen liegt. Ihre Eigenthümlichkeit besteht in Hinsicht auf die Lage darin, daß die Unterlappen bloß vom hintern Theile des Hirnstamms ausgehn, während die Oberlappen aus dem mittlern Theile sich erheben; daß sie unter diesen liegen; überhaupt tiefer als die übrigen Lappen herabsteigen, und so den Hirnstamm berühren; daß sie endlich am weitesten seitlich auseinander weichen, oben durch Oberlappen und Hinterlappen, unten durch den Hirnstamm von einander getrennt, während die übrigen Lappen in der Mittellinie aneinander gränzen. Wenn nun das Hintre im Gegensatze zum Vordern (§. 815) das Untre im Gegensatze zum Obren (§. 861) das Seitliche, Aeußere im Gegensatze zum Innern, den Gegensatz des Irrthabens zum Sensibeln, der Mannichfaltigkeit zur Einheit ausdrückt, so werden die Unterlappen auf die bewegende, nach aussen wirkende, in Mannichfaltigkeit sich ergebende Thätigkeit der Seele, auf Thatkraft und Charakter sich beziehen.

§. 1032. Eben darauf deutet auch ihre Eigenthümlichkeit in Hinsicht der Structur hin. Sie zeichnen sich vor allen andern Lappen durch eine größere Mannichfaltigkeit der Gebilde aus, indem sie allein gangliöse Theile, die vielgestalteten Ammonsörnere, die Haken ganglien und die Mandelkerne enthalten. Diese gangliösen Theile, die nicht mit dem Hirnstamme in Verbindung stehen, also auch nicht mit der Aussenwelt verkehren, und keine unmittelbare Beziehung zur Objectivität haben, müssen Brennpunkte des subjectiven

Seelenlebens seyn. Bey der Vielfachheit ihrer Gestaltung kann die Thätigkeit nicht auf Einheit der Vorstellungen, sondern auf mannichfaltige Anregung und vielseitige Richtung ausgehen.

§. 1033. Was endlich die Bestandtheile anlangt, so bekommen die Unterlappen 1) ihre Grundlage vom untern und hintern Theile des Stabkranzes, welcher von den Vierhügeln ausstrahlt; wie nun in diesen die Subjectivität vorherrscht (§. 949.), so wird dies auch hier der Fall seyn. 2) Die Ammonshörner bilden sich aus der Vereinigung der hintern Enden des Gewölbes und der Zwingen, welche wir als Organe der Phantasie anerkannt haben (§. 742. fgg. 996. 1023.). Diese Organe umkreisen die Stammganglien und den Balken in die Länge, und sind durch Letztern von einander geschieden; im Ammonshorne hört diese Trennung auf, und aus ihrer Vereinigung erwächst eben dieses gangliöse Gebilde: hier wird also auch die Phantasie als stürker Impuls für die übrige Seelenthätigkeit wirken. Wenn der vordre Theil des Gewölbes mit den Sehhügeln und also mit der sinnlichen Anschauung in näherer Beziehung steht, so wird sein hinter Theil im Ammonshorne mehr dem Gefühle und dem durch dasselbe bestimmten Willen verwandt seyn. 3) Die Balkenstrahlung bildet in den Unterlappen nur eine ganz dünne Schicht, die Tapete, welche die Windungen nicht erreicht. Die Einheit der geistigen Anschauung ist also hier am geringsten. 4) Dagegen erstreckt sich hier die vordre Commissur, welche nach unser Muthmaasung das Organ der Einheit sinnlicher Anschauung und körperlichen Willens ist (§. 1003.). 5) Der Unterlappen ist endlich mit den übrigen Lappen am vielfältigsten durch Belegungsmasse verbunden: mit dem Hinterlappen durch den Zwickel und das innre Grundbündel; mit dem Stammlappen und Vorderlappen durch das Hakenbündel; mit dem hintern und vordern Lappen durch das untre Längsbündel; mit dem hintern, obern, vordern und Stammlappen durch das Bogenbündel. Er kann also von den verschiedensten Seiten her angeregt werden, und eben so vielseitig auch zurückwirken.

§. 1034. Nach den vor uns liegenden pathologischen Beobachtungen erregen die Abnormitäten des Unterlappens häufig Schmerzen (=1:2,43), Betäubung (=1:2,05), Delirium (=1:4,33) und Verstimmung des Gemüths (=1:12). Da der Unterlappen in allen diesen Hinsichten von dem Gewölbe, und eben so, nur in Hinsicht auf Betäubung nicht, von den Vierhügeln übertroffen wird, so hängen diese seine Beziehungen wohl von dem Antheile ab, welchen jene Kernorgane an ihm haben. Uebrigens kommen in den gesammelten Beobachtungen häufig Hemiplegie (=1:3), Krampf und Lähmung der Gesichtsmuskeln (=1:19), Lähmung der Pupille (=1:7), des Augenlieds (=1:9) und des Halses (=1:44) bey reinen Abnormitäten vor. Störung der plastischen Functionen war seltner.

§. 1035. Daß bey einer vorzüglichen Breite des Kopfs in der Gegend der Schläfenebene und des untern Theils der Scheitelbeine oft Thatkraft und praktische Thätigkeit die Individualität auszeichnet, lehrt die Beobachtung unbezweifelt. Gall verlegt an die dieser Gegend entsprechende Seitenflächen der Unterlappen Eigenschaften, welche sämmtlich auf das Handeln sich beziehen, und seine Angaben lassen wohl eine Deutung zu, welche mit den aufgestellten Vermuthungen übereinstimmt. Nach ihm äussert sich am hintern und obern Theile des Unterlappens, seitlich und abwärts von der Stelle des

Oberlappens, wo nach ihm die Festigkeit sich offenbart, die Vorsicht (Tab. 8. Nr. X.); weiter nach vorne am obern Rande unter dem Klappdeckel, die Schlaueit (ebend. Nr. IX.); und noch weiter nach vorne unter der Stelle, wo der Vorderlappen an den Klappdeckel gränzt, die von ihm als Diebstahl bezeichnete Verschmitztheit (ebend. Nr. VIII.). Am untern Theile dieser Seitenfläche zeigt sich nach seinen Angaben hinten, der Muth (ebend. Nr. 5) und weiter nach vorne, die Mordlust (ebend. Nr. VI.). Sonach würde denn im obern Theile der Seitenfläche die Kraft mehr mit der Verstandesthätigkeit, im untern hingegen mehr mit dem Gefühle zusammenhängen, wie denn die Randwülste dort mit denen des Oberlappens, hier mit denen des Hinterlappens, in Verbindung stehen.

§. 1036. Wenn nach allen diesen Betrachtungen (§. 1031 — 1035.) im Unterlappen die Kraft für das äussere Leben wirkt, wenn die Einstrahlung der Vierhügel das subjective Gefühl, als das Begründende dieser Aeusserung, giebt; wenn in den Ammonshörnern die Phantasie diese Kraft anregt und die Vorstellung ihrer verschiedenen möglichen Richtungen erzeugt; wenn der Balken, in dessen vordern Theile die Erscheinungen zur Einheit des Begriffs zurückgeführt werden, von seinem hintern, egestiven Theile aus die Tapete in den Unterlappen sendet, um jene Kraft durch Begriffe und Grundsätze zu leiten; wenn endlich durch die zu den übrigen Lappen sich fortsetzende Belegungsmasse jene Kraft mit den andern Seelenkräften in vielfache Verbindung gebracht wird: so werden auch in den Verhältnissen des Unterlappens die Hauptzüge der psychischen Individualität sich aussprechen. Die großen Verschiedenheiten, welche er zeigt, indem er bey einigen Individuen tief herabragt, bey andern nicht (Sömmerring's Hirnlehre S. 24), werden mit der Verschiedenheit des Charakters parallel laufen. Es wird also, wenn unsere Voraussetzungen gegründet sind, bey einer geringern Thatkraft der Unterlappen in seinem untern Theile weniger entwickelt oder kürzer seyn, wie dies bey dem Weibe wirklich der Fall ist (Ackermann Verschiedenheit des Mannes vom Weibe S. 141). Er wird, wo das Handeln mehr durch Ahnung erregt und instinctartig ist, mehr mit dem Riechstreifen zusammenhängen, wie dies in noch höherem Grade bey Thieren der Fall ist. Bey Menschen von theoretischem Talente, welche geschickt und geneigt sind, die Mannichfaltigkeit der Erscheinungen auf die Einheit des Begriffs zurückzuführen und so die Erkenntnis um ihrer selbst willen zu erlangen, wird er gegen den Vorderlappen schwach seyn. Bey Solchen, denen der Begriff und die allgemeine Kenntniss bloß Durchgangspunct zur nützlichen Anwendung ist, und deren Stärke in der Subsumtion besteht, wird die Tapete stärker entwickelt seyn. Wo die Phantasie mehr zum Handeln bestimmt, wird das Ammonshorn, und wo das Gefühl mehr die Richtung giebt, der Zwickel und das innere Grundbündel das Uebergewicht haben u. s. w. Erst wenn auf solche Weise vielfältige, vergleichende Beobachtungen angestellt worden sind, wird man die Gälligkeit unsrer größtentheils auf morphologische Betrachtungen sich stützenden Muthmaßungen gründlich beurtheilen können.

§. 1037. Die Hinterlappen stellen den polarischen Gegensatz zu den Vorderlappen dar, welcher dem Gegensatze subjectiver und objectiver Erkenntnis zu entsprechen scheint. Sie liegen über den Gehörorganen, wie die Vorderlappen über den Augen, und es wird hier unter den Hirnthellen dasselbe Verhältniß eintreten, wie an jenen beyden

Sinnesarten, nämlich ein relatives Uebergewicht der Subjectivität und der Objectivität. Die Vorderlappen liegen über der Nasenhöhle und hängen durch den Riechstreifen mit einem Organe subjectiver Stimmung zusammen; jedoch ist diese Beziehung nur eine untergeordnete; die Hinterlappen hingegen liegen über dem kleinen Hirne, als den mächtigsten Organen subjectiver Stimmung, und nehmen, wie es scheint, auch die Bindehäute desselben in ihre Organisation auf, indem die Faserung von den Vierhügeln aus durch die Sehhügel in den hintern Theil des Stabkranzes strahlt, welcher die Grundlage der Hinterlappen ausmacht; in diesen wird also, was zuvor bloß subjective Affection war, zur Gefühlsvorstellung erhoben werden. Wenn in den dicht aneinander liegenden, breit sich abrundenden und doch sich aufwölbenden Vorderlappen eine Concentrirung sich ausspricht, so zeigt sich eine entgegengesetzte Richtung in den Hinterlappen, welche nach hinten von allen Seiten sich auspitzen und von einander abstehn, auch zahlreichere und schmalere Randwülste haben. Der Balken giebt von seinem Knie aus eine starke Masse von Strahlungen in den Vorderlappen, die zu beyden Seiten der Mittellinie dicht aneinander liegen; von seiner Wulst aus aber schickt er die wagerechten, weit auseinanderlaufenden Zangen, die nicht zu den Randwülsten gelangen, sondern in das Innere der Hinterlappen aufgenommen werden. Hier scheint demnach die Einheit des Gedankens verhältnißmäßig weniger zu herrschen. Periphere Längenbelegungsmaße, der Zwickel und das innere Grundbündel, bildet durch Einbiegung die Klaue, unter Hinzutritt der Zange.

§. 1038. Nach den oben (§. 825) angeführten Beobachtungen einer erhöhten Empfindlichkeit des ganzen Körpers bey Abnormitäten des kleinen Hirns und des Hinterlappens zeigt es sich, daß auch Letztrer in einer nähern Beziehung zum Gemeingefühle steht. Auch ist er selbst sehr empfindlich; Lorry (*mon. prod.* III. p. 351) bemerkte schon, bey Vivisectionen von Hunden, daß der hintere Theil des großen Hirns empfindlicher war, als der vordere, und in den vorliegenden pathologischen Beobachtungen, kamen Schmerzen bey Abnormitäten des Hinterlappens häufig (= 1:2,51), und nur bey denen des Vorderlappens noch häufiger vor. Auch ist die Frequenz der Blindheit (= 1:8) und der Taubheit (= 1:25) dabey größer, als bey Abnormitäten der übrigen Lappen, jedoch seltener, als bey denen der Vierhügel. Dasselbe gilt endlich von der Verstimmung des Gemüths (= 1:8). Hiernach zu urtheilen, tritt im Hinterlappen die receptive Subjectivität am stärksten hervor.

§. 1039. Von ihm ging ferner in unsrer Sammlung pathologischer Beobachtungen häufiger, als von andern Lappen, Apoplexie (= 1:5,05), allgemeine Lähmung (= 1:44), und Convulsionen (= 1:4,04), Lähmung der obern (= 1:11) und der untern Gliedmaßen (= 1:50), der Zunge (= 1:9) und des Speiseröhrenkopfs (= 1:25), Störung des Athmens (= 1:11), gastrische Abnormität (= 1:20) und unwillkürliche Darmausleerung (= 1:33) aus. Wir dürfen dies wohl als die Wirkung einer nähern Verwandtschaft mit dem Hirnstamme betrachten.

§. 1040. So kam auch Blödsinn (= 1:5) und Verrücktheit (= 1:16) bey den Abnormitäten des Hinterlappens viel häufiger vor, als bey denen der andern Lappen, ungeachtet wir eine unmittelbare Beziehung zur Verstandesthätigkeit als überwiegend nicht an-

nehmen können. Es ist aber die Subjectivität überall die Wurzel der objectiven Erkenntniß, und die Krankheiten der Seele gehen, im Ganzen genommen, häufiger von der Wurzel aus, wie denn auch verhältnißmäßig sehr oft Abnormitäten des verlängerten Marks, des kleinen Hirns und der Vierhügel dabey gefunden werden. Bey der geistigen Thätigkeit scheinen die Organe der subjectiven Stimmung durch Consensus in eine gewisse Spannung zu gerathen, wodurch sie zum Ganzen mitwirken: so fand man in Fällen, wo die Krankheit durch zu starke Anstrengung bey'm Studiren herbegeführt worden zu seyn schien, Abnormitäten im verlängerten Marke (Nr. 1060), im verlängerten Marke und kleinen Hirne (Nr. 935), und im kleinen Hirne und Hinterlappen (Nr. 1026). Besonders scheint die Balkenzange, welche die Bildung der Klaue bestimmt, das Vereinende, Regelnde und Ord nende in der Subjectivität zu seyn. Bey Seelenkrankheiten sind die Klauen nicht selten klein oder ganz verschwunden. Bey einem jungen Manne, der sich durch sonderbare Lagen auszeichnete und überhaupt nicht wußte, Ziel und Maas zu finden, hatte der Hinterlappen zahlreiche, schmale, krumme, dicht aneinander liegende Randwülste, ganz leichte Furchen, und ein sehr kleines Hinterhorn ohne Spur von Klaue (Wenzel *op.* p. 146. sq.). Bey zwey Blödsinnigen vermißte Hastings (Nasse Zeitschrift I. S. 602. fgg.) Hinterhorn und Klaue gänzlich.

§. 1041. Bey den Thieren ist überhaupt der Mantel mehr eine indifferente Masse, ohne so bestimmte Abtheilung in Lappen, wie bey'm Menschen. Besonders ist auch der Hinterlappen weniger entwickelt, indem der hintre Theil des großen Hirns bey Nagern, Zahnlosen und Beutethieren selbst nicht bis über die Vierhügel ragt. Nur bey Affen und Säugethieren bedeckt er das kleine Hirn ganz, oder doch größtentheils, und hat er ein Hinterhorn, welches aber mehr eine kleine Bucht, als ein eigentliches Horn ist, und keine Klaue hat. So entwickelt sich auch bey dem Embryo der Hinterlappen mit seinen Randwülsten ziemlich spät; das Hinterhorn erscheint dann als eine beutelförmige Höhle, in welcher die Klaue erst zu Ende des vierten Monats als eine unbedeutende Erhabenheit sichtbar wird.

§. 1042. Nach Gall Russert sich im Hinterlappen oben und innen, wo er mit dem Oberlappen zusammenhängt, der Stolz (Tab. 9. 11. Nr. XII); von da zu beyden Seiten, die Eitelkeit (Tab. 9. Nr. XI); darunter, die Anhänglichkeit (Tab. 8. Nr. III); unmittelbar über dem kleinen Hirne an den Spitzen des Hinterlappens, die Liebe für die Nachkommenschaft (Tab. 8. Nr. II); und von da weiter nach aussen, am Uebergange in den Unterlappen, der Muth (Tab. 8. Nr. V). Uebrigens findet man Aekermann's und Gall's (*system III.* p. 160) Beobachtung, daß bey dem weiblichen Geschlechte der Hinterlappen größer, und das kleine Hirn kleiner zu seyn pflegt, als bey'm männlichen, häufig bestätigt.

§. 1043. Wenn es schon aus dem Gegensatze zu den Hinterlappen (§. 1037.) sich ergibt, daß die Vorderlappen am nächsten auf geistige Thätigkeit und objective Erkenntniß sich beziehen, so wird dies zunächst auch bestätigt durch das Gemeingefühl. Wir haben bey angestrengtem Denken ein Gefühl von Spannung im untern Theile der Stirngegend, welches zum Theil wohl in den Augen und deren Muskeln (§. 585.) seinen Sitz hat, woran aber auch die Vorderlappen gewis Theil nehmen, indem jene Empfin-

dung zuweilen auch in die obere Stirngegend sich ausbreitet. So bemerkte Lancisi (p. 163), daß besonders bey angestrengtem Denken im Dunkeln eine Empfindung entsteht, als ob unter der Stirn und dem Scheitel Etwas sich regte, und daß man daseibst ein Gefühl von Schwere, Hitze und Stumpfheit spürt, wenn das Denken erschwert ist; darum nahm er denn auch (p. 139) die Stirngegend als die Werkstätte der Gedanken an. Verheyen (*lib. I. tract. 4. c. 7. p. 231*) trug dieselbe Meynung vor.

§. 1044. Der Vorderlappen ist bey den Thieren noch nicht so scharf gegen Oberlappen und Stammlappen abgegränzt, wie bey dem Menschen, und breitet sich weder so weit seitlich aus, noch wölbt er sich so hoch auf: die Stirne ist daher schmal und bildet gegen die Schädelbasis einen sehr spitzen Winkel. Häufig nähert sich die Stirne der Blödsinnigen dieser thierischen Form, wiewohl sie in seltneren Fällen auch auf die entgegengesetzte Weise schweicht, unförmlich hervortragt und einen stumpfen Winkel mit der Schädelbasis bildet. Offenbar spricht sich in der besondern Gestaltung der Stirne das geistige Vermögen der Individuen am entschiedensten aus.

§. 1045. Wenn überhaupt an der vordern Seite des Körpers die Ingestion und Sensibilität verhältnismäßig stärker hervortritt (§. 76.), so wird auch in den Vorderlappen die ingestive Seite des psychischen Lebens culminiren, und ganz vorzüglich der Gedanke walten. Aber als Hirntheile können sie nicht selbstständig wirken. Sie stellen das vordere Ende des Gehirns dar, stehen also in einem polaren Gegensatz zu dem hintern Ende desselben, den Hinterlappen und dem kleinen Hirne. Boyde Pole können nicht getrennt wirken, sondern müssen zu einer Gesamthätigkeit sich vereinen, oder so, daß bald der eine, bald der andre das bestimmende Glied, und in der Erkenntniß bald die Objectivität, bald die Subjectivität das Ueberwiegende ist. Dies polarische Verhältniß äußert sich in Krankheitsfällen deutlich. Nach den vor uns liegenden Beobachtungen kommen Vorderlappen und Hinterlappen in mehreren Verhältnissen mit einander überein: bey ihren Abnormitäten entstand viel häufiger, als bey denen der Oberlappen und Unterlappen, Amnesie, Verrücktheit, Blödsinn, Convulsionen, Erbrechen, gastrische Abnormität, unwillkürliche Anseerung und Störung des Athmens. Der polare Consensus des kleinen Hirns zeigt sich darin, daß bey dessen Abnormitäten die Schmerzen sehr häufig (Nr. 409. 421. 428. 924. 927. 929. 930. 939. 951. 957.) in der Stirne ihren Sitz haben, ungeachtet die Vorderlappen ganz normal gefunden werden. Auch ist es vielleicht eben so zu erklären, daß die Abnormitäten des kleinen Hirns, so wie die der Vorderlappen (= 1:28) verhältnismäßig am häufigsten Amnesie verursachen. Da diese Lappen in keiner vorzüglich nahen Verbindung mit dem Gesammtleben stehn und ihre Verwundungen verhältnismäßig weniger lebensgefährlich sind, so deutet der Umstand, daß ihre Abnormitäten häufiger, als die andrer Lappen, auf den Magen (= 1:6) und die Harnwege (= 1:28) wirken, ebenfals auf ein Verhältniß consensueller Polarität hin. Wenn bey Entzündung des Magens und der engen Därme eine consensuelle, örtliche Entzündung der plastischen Hirnhäute eintritt, so hat diese nach Spoutetten (Gerson V. S. 428) besonders am Vorderlappen ihren Sitz.

§. 1046. Die sensible Strömung geht im Rückenmarke nach oben gegen das Gehirn zu (§. 610. fgg.). Die sensible Stimulation in jedem Puncte des Hirnstammes ist das Pro-

duct des Inbegriffs der in allen darunterliegenden Theilen entstandnen Thätigkeiten; je weiter also ein Punct nach oben liegt, um desto größer muß die Summe von Thätigkeiten seyn; die hier umfaßt werden. So müssen denn die Strahlungen des Stabkranzes in den Vorderlappen, als die höchsten und letzten, auch das Ergebnis des Ganzen darstellen und den herrschenden Punct abgeben. Auf diesem Gipfel der Stammsstrahlung wird also die Vorstellung am klarsten sich entwickeln. Der Vorderlappen ist keinesweges als eine Entfaltung des Streifenhügels zu betrachten; dieser ist vielmehr nur ein partielles Ganglion, und während in ihm die Beziehung zur willkürlichen Bewegung vorwaltet, so tritt dieselbe in dem Vorderlappen zurück, dessen Verletzung verhältnismäßig nur selten Lähmung zur Folge hat, wie dies schon Chopart (*prix de chirurgie* XL p. 178) bemerkte, und wie auch die vorliegende Sammlung pathologischer Beobachtungen darthut.

§. 1047. Der Balken ist an den Vorderlappen am mächtigsten, erstreckt sich mit seinem Körper weit in dieselben herein, und hat, da er sich in seinem Knie frey ausbreitet, und starke Strahlungen eben sowohl nach vorne und nach unten, als nach oben schickt, einen ungleich größern Antheil an diesen, als an irgend einem andern Lappen. Hier, wo die einende Kraft des Balkens am meisten concentrirt ist, muß also auch die geistige Thätigkeit am lebendigsten wirken und die freye, objective Erkenntniß ihren eigentlichen Sitz gewinnen.

§. 1048. Unter dem Vorderlappen liegt der Riechkolben mit seinem Riechstreifen; dessen Wurzeln theils in Faserungen des Hirnstammes übergeln, theils mit dem Vorderlappen selbst zusammenhängen. Bey den Thieren sind diese Centraltheile des Geruchs theils mehr entwickelt, theils inniger mit dem Gehirne verbunden, als bey dem Menschen. Bey den Fischen ist der Riechnerve ein wirklicher Nervenstamm, welcher sich entweder unmittelbar in die Hemisphären, oder zunächst in Ganglien einsenkt; diese sind entweder an die Hemisphären angesetzt; oder von ihnen getrennt und nur durch Riechstreifen mit ihnen verbunden. Auch bey den Amphibien und Vögeln giebt es noch Riechnervenstämme, und die Riechkolben machen theils das vordre Ende der Hemisphären aus, theils liegen sie mit ihnen zusammenhängend an ihrer untern Fläche. Bey den Säugethieren treten die Riechnerven vereinzelt und ohne einen Stamm zu bilden, in den Riechkolben ein. Dieser ist als sogenannter Zitzenfortsatz (*processus mammillaris*) mit dem Riechstreifen verschmolzen, macht einen bedeutenden Theil des Vorderlappens aus, ist in seiner ganzen Länge mit ihm verwachsen, ragt zum Theil nach vorne über ihn hinaus, hat eine Höhle, welche in das Vorderhorn sich fortsetzt, und geht nach hinten in den Unterlappen über. Wenn bey dem Seehunde und den Affen Riechkolben und Riechstreifen mehr der menschlichen Form sich nähern, so bleiben sie doch noch um Vieles breiter. So sind sie auch bey dem menschlichen Embryo anfänglich hohl, und überhaupt viel stärker entwickelt, als bey dem erwachsenen Menschen. Beym Kinde ist die untre Stirngegend stark gewölbt, und diese flacht sich allmählig etwas ab, während zu gleicher Zeit die Stirnhöhnen sich entwickeln: dies Zurücktreten des Stirnbins, und namentlich seiner innern Tafel, muß darauf beruhen, daß der untre Theil des Vorderlappens selbst zurückweicht.

§. 1049. Die Entwicklung dieser Centralorgane des Geruchs steht nicht durchaus in geradem Verhältnisse zur Schärfe und Feinheit dieses Sinnes. Sie können sich daher nicht allein auf Sensation beziehen, sondern müssen auch die psychische Bedeutung derselben ausdrücken. Der Geruch (§. 583, 584) ist der pflanzliche, subjective und passive Sinn des großen Hirns; seine Centralorgane werden also wogendliche, freythätige, klare, als vielmehr eine gegebene, dunkle Erkenntnis; vermittelten. Er entspricht in Vergleich zu den übrigen Sinnen der Richtung auf die Zukunft. Da nun die subjective Erkenntnis die Künftigen die Ahnung ausmacht, so wird diese in seinen Centralorganen ihren vorzüglichsten Sitz haben! Da endlich die Ahnungen das Bestimmende des Instincts sind, so werden die Riechkolben und die Riechstreifen vornehmlich auf den Instinct erregend und weckend einwirken.

§. 1050. Bey den niedern Thieren sind die Schlanglien den Riechganglien mehr gleich, und Letztere stehen mit den Hemisphären in einer noch näheren Beziehung: das Ahnen ist also hier überwiegend über das freye Erkennen. Allmählig werden die Schlanglien mehr in die Hemisphären als integrierender Bestandteil aufgenommen, und die Riechganglien dagegen von den Hemisphären getrennt und ihnen untergeordnet: so tritt denn das Ahnen auch immer mehr zurück, und weicht der klaren, objectiven Erkenntnis. Wie in den Lufthieren überhaupt der Instinct, und namentlich der Kunsttrieb, geringer ist, so wird er auch durch die Centralorgane des Lufsinns mehr angefocht. Der Zitzenfortsatz hängt mit dem Unterlappen, als dem Organe des äussern Wirkens, zusammen, und so wird denn das Handeln der Thiere unmittelbar durch die Ahnung bestimmt, während bey dem Menschen der Unterlappen von dieser Verbindung freyer ist, und sein Wirken mehr von der Erkenntnis ausgeht.


§. 1051. Nach Gall äussert sich in den Strahlungen des Balkens am Vorderlappen unten der Sachsin oder die Erziehungsfähigkeit, oben der vergleichende Scharfsinn; und der Tiefinn. Am der seitlichen Theilen offenbart sich unten der Sinn für Localität, dann für Farbe, Ton und Zahl, endlich am weitesten nach aussen der mechanische Sinn; oben der Witz, und der poetische Sinn.


S c h l u s s w o r t e

„*Cerebrum pars hominis est, cuius obscura adhuc structura, obscuriores morbi, obscurissimae functiones perpetim philosophorum aliquo medicorum torquent ingenia.*“ (Fautonié de la Motte, p. 103).) Bey der Ueberzeugung, in Hinsicht auf den Bau und das Leben des Gehirns im Ganzen und seiner Elementarsysteme insbesondere unsre Aufgabe gelöst zu haben, erkennen wir am Schlusse unserer mühevollen Forschungen die fortdauernde Gültigkeit dieses Satzes, in Beziehung auf unser Wissen von einzelnen Hirngebildeten an. Indes haben wir das Bewußtseyn, daß wir nämlich, mit Umsicht und mit Benützung aller uns zu Gebote stehenden Hilfsmittel, gestrebt haben, tiefer einzudringen. Wir glauben ferner, durch unsere Darstellung die vorhandenen Lücken, deren Ausfüllung unsern Nachfolgern überlassen bleibt, sichtbar gemacht zu haben. Wir erkennen endlich, daß wir auch in der speciellen Physiologie des Gehirns einige Lichtpunkte gewonnen haben, indem manchen der hier aufgestellten Ansichten ein Grad der Wahrscheinlichkeit zukommt, welcher sich der Gewißheit nähert. Diese Ansichten in ihrem organischen Zusammenhange darzustellen, und so ihre Nothwendigkeit aufzufassen, setzt tiefer eingehende Untersuchungen über die Wesenheit der einzelnen Seelenthätigkeiten voraus, welche in diesem Werke, das ohnedies einen zu großen Umfang bekommen hat, nicht Platz finden können, und muß daher unsrer Bearbeitung der Naturlehre der Seele aufgespart bleiben.

Erklärung der zehnten Tafel.

Auf die Gefahr, daß man eine solche Abbildung anstößig findet; gebe ich hier eine anschauliche Darstellung einiger Verhältnisse in der Richtung der Hirnthätigkeit. Man findet nämlich hier ein Bild, 1) wie das Gehirn mit größerer Kraft auf dieselbe Seite der ihm zunächst liegenden (a, d) und auf die andre Seite der von ihm entfernten Gebilde (c, f); mit geringerer Kraft hingegen auf dieselbe Seite der Letztern (b, g) und auf die andre Seite der Ersten (d, e) wirkt (Siehe §. 811); 2) wie bey der Aufnahme der Eindrücke in der entgegengesetzten Hemisphäre, und bey dem von derselben ausgehenden Impulse des Willens die räumlichen Verhältnisse der Aussenwelt, ungeachtet der Kreuzung, richtig aufgefaßt werden (Siehe §. 824); 3) wie (a, b) die Hirnthätigkeit auch in rückgängiger Richtung sich fortpflanzt (Siehe §. 339. 802. 847).





A n h a n g.

Sammlung von Beobachtungen abnormer Zustände des Gehirns;
welche im Texte nach ihren Nummern angeführt sind.

Erste Classe. Mechanische Abnormitäten.

I. Hirnerschütterung.

1. LITTLE in *ac. de Paris* 1705 p. 54. Ein junger Mensch, welcher gerädert werden sollte, fiel, die Hände auf den Rücken gelegt, mit dem Kopfe gegen die Mauer. Das Gehirn war fest und eingesunken.

2. Theodens neue Bemerkg. u. Erfahrng (Berlin 1795) S. 64. Ein Rasender tötete sich eben so. Die feste Hirnhaut war mit dem obern Sichelblatte vom Schädel getrennt, ohne Extravasat; die Hirngefäße strotzend.

3. Baumer in Posewitz Journ. f. Medizin I. (Herborn 1799) Nr. 2. Ein Knabe von 12 Jahren, von einem durchgehenden Pferde 250 Schritte weit auf steinigem Wege geschleift; bloß gänzliche Zerreißung der Kopfbedeckung; geheilt.

II. Aeußere Verletzung.

a) In der Gegend der Hinterlappen.

4. Seyer in *phys. med. Journ.* 1802 II. S. 19. Fall auf die untre, hintere Ecke des linken Scheitelbeins; genesen.

5. Kees p. 3. Wunde hinter dem Ohre; genesen.

6. Schmucker's Schriften II. S. 172. Wunde am obern Theile des Hinterhauptbeins; genesen.

7. Bilguer S. 16. Hieb auf Hinterhaupt; genesen.

b) In der Gegend der Vorderlappen.

8. Bartholin *cent. F. obs. 2*. Wunde an der rechten Schläfengegend; genesen.

9. Quesnay in *ac. de chir. L. p. 329*. Fall auf die linke Seite der Stirne; bloß das Perikranium gequetscht; genesen.

10. Bilguer S. 134. Bruch des Stirnbeins; genesen.

11. Klein S. 149. Schlag auf die rechte Schläfengegend; genesen.

12. Louvrier S. 54. Streifschnitz des selbst; genesen.

13. Wagner in Loder's Journ. IV. S. 76. Fractur und Depression an der linken Seite der Stirne; genesen.

14. Duncan's *annals* 1796 (*med. chir. Ztg.* IV. Ergänzung. S. 185). Schädelbruch ebendasselbst mit Zerreißung der festen Hirnhaut; genesen.

III. Penetrierende Wunden.

a) Im kleinen Hirn. (Nr. 87).

b) Im Mantel des großen Hirns. (Nr. 491).

c) Im Oberlappen.

15. Schmucker's Schriften II. S. 156. Ein Wundarzt stieß aus Versehen den Tropan 1½ Zoll tief ein; genesen.

17. Klein in Henke's Zeitschrift 1822 2. St. S. 371. Hieb durch das rechte Scheitelbein 2 Zoll tief in das Gehirn; in der Wunde ein Knochen splitter und Eiter; die Umgebung getöthlich und erweicht; in der linken Seitenhöhle ½ Unze röthliches Wasser, und mehrere Hydatiden am Gefäßgeflechte; Tod am 16ten Tage.

d) Im Unterlappen. (Nr. 546).

18. Loder's Journ. III. S. 199. Ein

Messer, durch die vordre, untre Ecke des Scheitelbeins 18 Linien tief eingestochen; genesen.

19. Duponchel im *bulletin de la soc. d'émulation* 1822, Mai. Hieb unter dem rechten Auge durch den Sehnerv und Unterlappen; an der rechten Hemisphäre etwas Bluterguss und Adhäsion der Häute, ohne Eiterung; Tod am 16ten Tage.

c) Im Hinterlappen. (Nr. 569.)
20. Knaus in *Hufeland's Journ.* V. S. 425. Eine Misgabel 2 Zoll tief eingestochen; genesen.

21. Larrey's Denkwürdigkeiten II. S. 39. Lanzentisch; genesen.

f) Im Vorderlappen. (Nr. 181) 453. 587. 593. 598. 824.)

22. Wepfer *hist. apoplect.* p. 336. Degentisch durch die Augenhöhle bis in die rechte Hirnhöhle; in dieser geronnenes Blut; die Basis des Gehirns entzündet; Tod nach 24 Stunden.

23. Morgagni *LI.* 57. Stich durch die Augenhöhle bis 1 Zoll von der Hirnhöhle; in dieser Blut ergossen; Tod am 4ten Tage.

24. Diemerbroeck *lib. III.* c. 10. p. 378. Degentisch durch die Augenhöhle in die Hirnhöhle; Tod am 17ten Tage.

25. Fantoni *opusc.* p. 188. Ein spitzeß Eisen am innern Augewinkel eingedrungen; Tod am 10ten Tage.

26. Obr. Jac. Treu gründliche Nachricht dessen, was bey einer raren Hauptwunde observirt worden. Nürnberg 1724.

4. Eine Flutenkugel drang am rechten Augenbraunbogen ein und 2 Zoll unter dem Scheitel heraus; Hirnsubstanz von der Größe eines Hühnereys ging dabey verloren; der Schusskanal war 5 Zoll lang; Tod am 19ten Tage.

27. Schwarz in *Beob. d. Joseph. Akad. I.* Eine Flutenkugel drang am äussern Ende des linken Augenbraunbogens ein, und über dem rechten Oberaugenhöhlenloche heraus; 2½ Loth Hirnsubstanz ging durch Verwundung und Eiterung verloren. Nach 15 Wochen Tod am Nervenfieber; die Vorderlappen wie abgekürzt, gewölbt, ohne Eiterung, und ihre regenerirte Stelle mit einem zarten Häutchen bedeckt.

28. Limbourg in *Journ. de méd.* XLVIII. p. 224. Ein abgeschossener Ladestock drang am äussern Augewinkel ein, und an der hintern obern Ecke des Scheitelbeins heraus; genesen.

29. Duncan in *med. chir. Zig.* IV. Ergänz. Bd. S. 185. Ein Haken, über dem rechten Augenbraunbogen eingestossen; genesen.

30. Morand II. p. 190. Ein Ladestock 2 Finger breit in's Gehirn gedrungen; genesen.

31. Larrey in *Gall IV.* p. 27. Stich durch das Siebbein, 8 Linien tief in den innern hintern Theil des linken Vorderlappens; genesen.

IV. Risse. a) Im Oberlappen.

32. Henckel's Beobachtg. S. 86. Schädel unverletzt; Riss im untern Theile des Oberlappens; mit Extravasat gefüllt; eiterartigen Stoff zwischen den Hirnhäuten, oberflächliche Vereiterung der festen Hirnhaut und Beinaß der innern Schädelfläche; Tod am 10ten Tage.

33. Ollenrodt in *Artemann's Magaz.* I. Bd. 2. St. S. 119. Durch den Schlag eines Windmühlensügels ein Riss bis in die rechte Seitenhöhle; in den Seitenhöhlen bläuliches Wasser; mehrere Blutleiter zerrissen, und viel Blut an der Basis des Schädels; Tod am 4ten Tage.

b) Im Vorderlappen. (Nr. 285.)

34. Klein S. 156. Fraktur und Depression des Schädels. Der Riss im Vorderlappen ein Zoll tief und lang; die Umgebung weich, wie eiternd; viel Extravasat in der ganzen Schädelhöhle; Tod am 4. Tage.

35. Henckel's Beob. S. 70. Durch den Schlag eines Windmühlensügels Risse in beyden Vorderlappen; die Oberlappen gequetscht; mit Extravasat.

c) In der Scheidewand. (Nr. 186. 241. 369. 456.)

d) In der festen Hirnhaut. (Nr. 14. 481. 510. 820. 1056.)

V. Substanzverlust.

a) Im Oberlappen. (Nr. 65. 74. 77. 506.)

36. Tulpinus p. 1. Täglich eine halbe Naßschale groß, und am dritten Tage 2 Löffel voll Hirnsubstanz verloren; Tod am 6ten Tage.

37. Yonge p. 3. Mit Depression und Splütern; genesen.

38. La Peyronie in *ac. de Paris* 1741. p. 199. Mit Splittern und geronnenem Blute; genesen.

39. Quénay in *ac. de chir.* II. p. 126. Mehr als ein Hühnerey groß, Hirnsubstanz verloren; genesen.

40. Thebesius bey Taubeler p. 73. Einen Löffel voll verloren; genesen.

41. Taubeler p. 75. $\frac{1}{2}$ Zoll dick Hirnsubstanz abgehauen, und nachher noch durch Eiterung 2 Löffel verloren; genesen.

42. Simmon's 1787. S. 104. Fall: die Fractur im Scheitelbeine erst nach 3 Wochen bemerkt; Wasser und Hirnsubstanz abgegangen; genesen.

43. Brown in *Repert.* II. S. 105. Depression; Splitter im Gehirn; 1 Löffel voll Hirnsubstanz verloren; genesen.

44. Baldinger VI S. 351. Genesen; 1 Grube von der Größe eines Hühneroyes im linken Oberlappen geblieben.

45. Home in Meckels Archiv III S. 117. Genesen.

b) Im Vorderlappen. (Nr. 25. 27. 94. 104. 107. 599. 1057.)

46. Tulpus *Nb. IV. c. 1. p. 292.* Ein Hühnerey groß verloren; bey Hirnschwamm der größte Theil der einen Hemisphäre veretert; Tod am 13ten Tage.

47. Marchettis obs. p. 3. Genesen.

48. Morand I. p. 169. Mit Splittern; genesen.

49. Kölpin p. 75. Bis zum 6ten Tage lang bey jedem Verbande Hirnsubstanz abgegangen; genesen.

50. Behrens in *Sammlung. chir. Bemerkung.* II. S. 123. Bis zum 20ten Tage Splitter und Hirnsubstanz abgegangen; genesen.

51. Schütte in *ac. de Berlin* 1752. p. 269. Ein Knabe von 12 Jahren verlor durch den Schlag eines Windmühlendügels 3 Unzen Hirn und Blut; genesen.

52. Home in Meckels Archiv III S. 117. Ein Knabe von 5 Jahren verlor $\frac{1}{4}$ Unze Hirn; genesen.

53. Joh. Christ. Camerarius *Act. rarissima sanationis cerebri quassati.* Tübing. 1719. 4. Ein Knabe von 12 Jahren verlor erst ein 1 Zoll langes, 5 Linien breites, 4

Linien dickes Stück Hirn, späterhin beyrn Verbande mehr; genesen.

54. Lenoir im *Repert.* II. S. 110. fgg. zuerst ein Hühnerey groß Hirnsubstanz mit Blut, dann beyrn Erbrechen noch halb so viel, und späterhin etwas bey der Eiterung verloren; genesen.

55. Quénay in *ac. de chir.* II. p. 127. Eine Flintenkugel drang durch das Gewölbe der Augenhöhle herein, durch den obern Theil des Stirnbeins heraus. Zuerst ging ein kleines Hühnerey groß Hirnsubstanz ab, späterhin noch durch Eiterung; genesen.

VI. Fremde Körper.

a) Im kleinen Hirne.
56. Bilguer S. 143. Auf der festen Hirnhaut ein Blutklumpen und ein Knochensstück; im kleinen Hirne ein $\frac{1}{2}$ Zoll langer Knochensplitter; genesen.

b) An der Zirkel.
57. Anel in *ac. de chir.* II. p. 131. Schuß durchs Stirnbein; die Kugel auf der Zirkel sitzend und Blut dastelbst ergossen; Tod nach einigen Jahren.

c) In den Seitenhöhlen.
58. Reich in *Hufeland's Journ.* 1815. Kugel; Tod nach 9 Monaten.

59. Pyls. Aufs. IV. S. 72. Schuß durch die vordere obere Ecke des rechten Scheitelbeins; die Kugel im linken Hinterhorn dastelbst und zwischen den Hirnhäuten viel Eiter; die rechte Hemisphäre zerstört; Tod am 6ten Tage.

60. Mohrenheim's Beob. I. S. 95. 1 Zoll langer, $\frac{1}{2}$ Zoll breiter Knochensplitter ging bis in die Seitenhöhle; der Balken bleifarbig; Tod am 2ten Tage.

d) Im Mantel des großen Hirns. (Nr. 1045.)

e) Im Oberlappen e) Intern. Nr. 17. 36. 37. 38. 43. 511.)

61. Morgagni LI. 35. Zwey Knochenstücke über 1 Zoll tief im rechten Oberlappen; Tod am 6ten Tage.

62. Herpin bey Lallemand I. p. 382. Flintenkugel 3 Linien tief im rechten Oberlappen, mit Eiterung desselben; Tod am 7ten Tage.

63. Petit in *prix de chir.* XI. p. 98. Splitter vom linken Oberlappen weggenommen; andre an der festen Hirnhaut geblieben

sitzen; die Rinde daselbst entzündet; Tod am 12ten Tage.

64. *Quesnay in ac. de chir. II. p. 152.* Splitter; Tod am 12ten Tage.

65. *Mursinna's Beob. S. 48.* Am 6ten Tage große Knochensplitter und etwas Hirnsubstanz herausgenommen; die Kugel blieb tief im Gehirne sitzen; Tod am 15ten Tage.

66. *Klein S. 124.* Ein 1½ Zoll langer Splitter saß 1 Monat lang 3 Linien tief im rechten Oberlappen; dabey ein großes Geschwür mit aufgelöster Umgebung; die Zirkel ohne Hirnsubstanz, wie ein leerer Sack; Tod am 28ten Tage.

67. *Ebend. S. 114.* Der umgebogene Rand des gespaltenen linken Scheitelbeins steck im Gehirne; die Umgebung schwarz und aufgelöst; Eiterung im großen und am kleinen Hirn; Tod am 29ten Tage.

68. *Boinet med. sept. lib. I. sect. 2. c. 19.* Splitter auf dem Boden einer Wunde des rechten Oberlappens, blieben sitzen; Tod nach 4 Monaten.

69. *Le Dran p. 161.* Am 7ten Tage mußte Hirnsubstanz, 3 Haselnüsse groß, abgeschnitten werden; am 37ten Tage gingen mit starker Eiterung mehrere Schrotkörner ab; genesen.

70. *Brissacau in Sammlung chir. Bemerkungen. I. S. 171.* Das gegen 2 Drachmen schwere Eisen eines Bolzens drang bey der Trepanation so tief in das Gehirn, daß es nicht ausgezogen werden konnte, kam aber nach 4 Monaten von selbst an die Oberfläche; genesen.

71. *Bilguer S. 123.* Flintenkugel halb im Schädel, halb im Gehirne sitzend; genesen.

72. *Ebend. S. 125.* Am 5. und 7ten Tage Splitter mit Eiter heraus; die Hirnwunde heilte sich aus; genesen.

73. *Goose II. p. 1.* Splitter nach dem 10ten Tage weggenommen; genesen.

74. *Taubeler p. 76.* Splitter mit Blutergießung; 3 Löffel voll Hirnsubstanz verloren; genesen.

75. *I. W. Bauer a chirurgische Wahrnehmungen Leipzig, 1773. 8.* Am 7ten Tage Splitter weggenommen; genesen.

76. *Nolleson in Journ. de méd. XXX.*

p. 455. Am 7ten Tage Splitter mit Eiter herausgenommen; genesen.

77. *Manne in Sammlung chir. Bemerkungen. I. S. 269.* 15 Splitter und 1 Wallnuss große Hirnsubstanz am 5ten Tage herausgenommen; genesen.

78. *Anderson in Sammlung auserl. Abh. XIII. S. 716.* Knochensplitter im rechten Oberlappen; genesen.

79. *Aussen. (Nr. 116, 119, 469, 478, 507, 556).*

79. *Patit in pris de chir. XL. p. 98.* Die feste Hirnhaut von vielen Splittern durchstochen und verdickt; die Rinde an 2 Stellen entzündet; Tod am 12ten Tage.

80. *Fabricius cent. II. p. 156.* Eine Kugel saß seit einem halben Jahre auf der dadurch verdickten festen Hirnhaut unter der Pfadnath; Tod nach 6 Monaten.

81. *Med. chir. Ztg. 1801. I. S. 270.* Eine Kugel saß auf der dadurch sackförmig ausgedehnten festen Hirnhaut über der Schuppennath; Tod nach 2 Jahren durch Selbstmord.

82. *Louvier S. 3. 3 Splitter auf der festen Hirnhaut, 1 in ihr; genesen.*

f) Im Unterlappen. g) Innen.

83. *Majault in Journ. de méd. XII. p. 82.* Die Spitze eines in das Schuppenbein gedungenen Pfeils blieb sitzen, und wurde erst nach 9 Jahren ausgezogen, worauf viel schwarzer, stinkender Eiter folgte; der Unterlappen war fast ganz vereitert, und das Schuppenbein davon ausgedehnt und verdünnt; Tod nach 4 Tagen.

84. *Voltaire ebend. XX. p. 553.* Nach einem Schusse auf das Schlüsselbein wurden in den ersten 40 Tagen 11 Knochenstücke herausgenommen; die Kugel wurde nach dem 2 Jahre später erfolgten Tode halb in der Hirnsubstanz sitzend gefunden.

f) Aussen.

85. *Morand I. p. 59.* Die vor 9½ Jahren durch das Schlüsselbein eingedrungene Kugel fand sich in der Schädelhöhle; die daran liegende Hemisphäre in grünlichen, stinkenden Eiter aufgelöst.

86. *Le Dran p. 127.* Ein Jahr nach einem Schusse durch das Stirnbein fand sich die Kugel an der Seite des Sattels.

g) Im Hinterlappen. a) Innen.

87. *Petit in ac. de Paris 1741. p. 209.*

Eine Flintenkugel drang durch das kleine Hirn in d. linken Hinterlappen; Tod nach 43 Stunden.

88. Klein S. 124. Splitter am 24sten Tage herausgenommen; das Geschwür reichte vom rechten Scheitelbeine bis in das rechte Hinterhorn; Tod am 28sten Tage.

β) Aussen (Nr. 831).

89. Bilguer S. 122. Eine Kugel auf der Oberfläche des Gehirns, nahe an der Landanath sitzend; genesen.

90. Schmucker's a Schriften I. S. 242. Eine Kugel im hintern Hauptshöcker sitzend; genesen.

b) Im Vorderlappen. α) Innen. (Nr. 48. 50. 1052).

92. Will Becket's collection of. chirurg. tracta. London 1740. 8. Die Kugel auf dem Gehirne sitzend; Knochensplitter darin; Tod nach 4 Tagen.

93. *Ac. de Paris* 1703. p. 262. Zerschmetterung des Sattels, Splitter im Gehirne; dieses zum Theil in Brey aufgelöst, zum Theil suppurirt; die Gefäßhaut löse anhängend; Tod am 7ten Tage.

94. Gooch II. p. 9. Eine Flintenschraube, in der Gegend der Stirnhöhle eingedrungen und am zweyten Tage ausgezogen; Abgang von Hirnsubstanz bey'm Verhau; Tod nach 14 Tagen.

95. Schumacher S. 406. 1 Zoll langer, 3 Linien breiter Splitter im rechten Vorderlappen und auf diesem Extravasat; Tod am 16ten Tage.

96. Gooch II. p. 7. Splitter 2 Zoll tief im Gehirne; Tod am 18ten Tage.

97. Vater in Sammlg. chir. Bemerkg. II. S. 305. Ein Sehrot und Knochensplitter im Gehirne; Eiter in der Seitenhöhle; Tod in der 7ten Woche.

98. Fantoni *opusc.* p. 196. Ein 5 Zoll langer, scharfer Splitter im Gehirne mit Eiter; die Wunde der festen Hirnhaut darüber war schon verwachsen; Tod nach mehreren Monaten.

99. Schmucker's a Schriften I. S. 277. Die Kugel durch das Stirnbein eingedrungen, 2½ Zoll über der linken Seitenhöhle; Tod nach 4 Monaten.

100. Kirby in med. chir. Ztg. 1819 IV. S. 247. Ein Stück einer Kugel, Knochensplitter und Eiter im Gehirne; Tod nach 7 Monaten.

101. Balme in Journ. de med. XLI. p. 504. Ein Stück Knochen wurde nach 10 Jahren mit sehr veränderter Farbe und mit Eiter herausgenommen.

102. Quesnay in *ac. de chir.* II. p. 131. Eine Kugel saß über 1 Zoll tief im Gehirne; Tod nach 1 Jahre.

103. Anel ebend. Eine Kugel saß mehrere Jahre im Gehirne.

104. Camperdon in Sammlg. f. Wundärzte II. S. 112. Eine 4 Loth schwere Schwanzschraube drang bey'm Springen einer Flinte durch den innern Augenwinkel ein, wobey einige Stücke Hirn verloren gingen, und wurde erst nach einem Vierteljahre aus dem Gehirne gezogen; Tod nach 6 Monaten.

105. Hoegg in Sandifort thes III. p. 90. Eine durch die linke Stirnhöhle eingedrungene Flintenkugel blieb sitzen, da man sie nicht ausziehen konnte; genesen.

106. Bilguer S. 104. Splitter tief herangezogen; ein Geschwür im Gehirne von der Größe einer Wallnuß; genesen.

107. Ingram p. 73. Die Depression gehoben, einen Splitter aus dem Gehirne gezogen; ½ Glas voll Rinde und Eiter ausgeleert; genesen.

108. Maune in Sammlg. chir. Bemerkg. I. S. 236. Nach 1 Monate einen 2 Zoll langen Splitter aus dem Gehirne gezogen und dabey viel Eiter ausgeleert; genesen.

109. Barlow in Sammlg. unser. Abth. XXII. S. 298. Mehrere Splitter, woron einer bis in die Seitenhöhle gieng, wurden ausgezogen; genesen.

β) Aussen (Siehe 596).

1) Im Sichelblutleiter.
110. Wärner in Samml. chir. Bemerkg. I. S. 1. Knochensplitter; genesen.

VII. Depression des Schädels.
a) Am kleinen Hirne.

111. Klein in Gräves Journ. III. S. 226. Nach einem Bruche des Hinterhauptbeins mit Depression blieb eine 4 Linien tiefe Einsenkung zurück; Tod nach 1 Jahre durch einen Schuß in den Leib.

b) Am Oberlappen. (Siehe 37. 43. 316. 479. 504. 511. 727. 829. 1046. 1050).

112. Morgagni LI. 32. Entzündung der festen Hirnhaut und seröse Ergießung; Tod am 11ten Tage.

113. Fabricius p. 137. Depression des linken Scheitelbeins; genesen.

114. Phil. Mex. Diltney Diss. de vulneribus capitis interioribus. (Herborn. 1721. 4) p. 15. Mit Splittern und Eiter auf der festen Hirnhaut; genesen.

115. M. E. Boretius de epilepsia ex depresso cranio. Regiom. 1724. 4. Genesen.

116. Quesnay in ac. de chir. I. p. 312. Genesen.

117. Heller p. 315. Genesen.

118. Manne in Sammlg. chir. Bemerkg. I. S. 279. Depression des rechten Scheitelbeins; etwas Blut auf der festen Hirnhaut ergossen; genesen.

119. I. W. Bauer 2 chir. Wahrnehmung. (Leipzig 1773. 8.) S. 1. Mit Splittern auf der festen Hirnhaut; genesen.

120. Jäger II. S. 76. Depression des rechten Scheitelbeins; genesen.

121. Acrel S. 18. Eben so.

122. Bellamy in phys. med. Journ. 1802. I. S. 201. Genesen.

123. Latta S. 165. Genesen.

c) Am Hinterlappen. (Nr. 1031).

124. Fabricius p. 373. Genesen.

125. Quesnay in ac. de chir. I. p. 377. Genesen.

d) Am Vorderlappen. (Siehe 34. 566. 590. 599. 708. 1056. 1057).

126. van der Wiel p. 27. Genesen.

127. Hill p. 76. Mit Extravasat; genesen.

128. Dannon in Journ. de méd. XXV. p. 28. Genesen.

129. Klein in Gräves Journ. III. S. 219. Depression auf der linken Seite des Stirnbeins, 3 Linien tief; Tod in der 8ten Woche.

VIII. Blutunterlaufung.

a) An den Stammganglien nach Kopfverletzungen (Siehe 435).

b) Am Schhügel (Siehe 220).

c) Am Streifenhügel. (Siehe 806).

d) Am Balken nach Kopfverletzungen (Siehe 60).

e) Am Mantel des großen Hirns a) von innern Ursachen (Siehe 215. 224).

ß) Nach Kopfverletzungen (Siehe 93).

f) Am Oberlappen nach Kopfverletzungen. (Siehe 35. 493. 503).

g) Am Hinterlappen nach Kopfverletzungen (Siehe 552).

h) Am Vorderlappen nach Kopfverletzungen. (Siehe 276. 565).

IX. Blutergießung.

a) Am verlängerten Marke.

a) Von innern Ursachen. (Siehe 133. 1059).

ß) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 135).

b) In der Rautengrube. (Siehe 143. 146. 150. 215).

c) Am kleinen Hirne. a) An der Oberfläche. aa) Von innern Ursachen (Siehe 144).

130. Morgagni III. 24. 2 Löffel geronnenes Blut unter dem kleinen Hirne; dieses sehr weich.

131. Børg in Kopenhagener Societät S. 321.

132. Hasenöhrl Hist. morbi epid. p. 55. 1½ Unzen schwarzes geronnenes Blut unter dem Zelte; die Gefäße strotzend; Wässer in den Seitenhöhlen.

133. Pyls Aufs. II. S. 12. 6 Unzen Blut um das kleine Hirn und verlängerte Mark; die Gefäße strotzend.

134. Brunet in Magendie Journ. II. p. 266. Ein 7 Linien breites, 1½ Linien dickes Extravasat am Wurme; an der innern Seite des großen Hirns eine Öffnung in die rechte Seitenhöhle.

bb) Nach Kopfverletzungen.

135. Bilguer S. 153. Schädelspalte; schwarzes geronnenes Blut auf der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns und am verlängerten Marke; die dicke Höhle groß und voll Wasser; Tod am 1ten Tage.

136. Siebold's Tagebuch S. 16. Mit Splittern und Extravasat am Vorderlappen; Tod am 2ten Tage.

137. Schwenke in Haller Disp. 469. Die Hinterhauptshöhle voll blutiges Wasser, 2 Jahre nach einem Stöße auf das Hinterhaupt.

ß) Innerhalb des kleinen Hirns. (Siehe 276. 876. 1037).

138. Morgagni II. 22. Geronnenes Blut im kleinen Hirne, namentlich in der linken Hemisphäre 1 Unze; die Umgebung aufgelöst; Blutklumpen in der rechten Seitenhöhle; flüssiges und gallertartiges Serum zwischen den Hirnhäuten.

139. Ebend. LX. 6. Eine Höhle mit ge-

ronnem Blute in der rechten Hemisphäre; olutiges Wasser in den Seitenhöhlen.

140. Anderson in *Sammig. auseres. Abth. XIII. S. 712.* 1½ Unzen Blut im kleinen Hirne; Verhärtungen im Oberlappen.

141. Abercrombie S. 100. Ein kleines Blutgerinsel in der rechten Hemisphäre.

142. Serres in *Magendie Journ. II. p. 175.* 5 Höhlen mit Blut in dem Oberwurme und den Bindeärmern; das kleine Hirn von Blut strotzend; die Vierhügel entzündet.

143. Ebendas. p. 176. Blutergussung im Oclarkörper; das kleine Hirn roth; die Bindeärmern schienen angefressen zu seyn; Blut in der Rautengrube; die Brücke am Ursprunge des fünften Nerven, die Oliven und der Anfang des Rückenmarks entzündet.

144. Mance ebendas. p. 179. 3 Höhlen mit Blutklumpen im kleinen Hirne; dieses roth und etwas Blut an seiner Oberfläche ergossen; Bindeärmern und Vierhügel entzündet.

145. Dabois ebend. p. 182. Mehrere Extravasate, besonders am Oberwurme; in der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns ein Blutklumpen von der Größe einer Flintenkugel; ein 3 Zoll langes, 1 Zoll breites Extravasat im linken Streifenbügel mit erweichter Umgebung; Narben von ältern Extravasaten.

146. Falret ebend. p. 250. Eine Höhle mit Blutklumpen im Oberwurme; Blut in der Rautengrube; die Bindeärmern roth; das große Hirn blutreich.

147. Serres ebend. p. 252. Höhlen mit Blut in beyden Hemisphären; die Umgebung roth.

148. Ebendas. p. 258. Eine Höhle mit ½ Unze Blut in der linken Hemisphäre; das Mark räumig entzündet.

149. Romberg in *Horn's Archiv 1823. I. S. 416.* Zerreißung der linken obern Arterie des kleinen Hirns; die linke Hemisphäre von diesem ausgehöhlt, und mit schwarzem geronnenem Blute gefüllt; die feste Hirnhaut strotzend; unter der Spinnwebenhaut Gallert; in den Höhlen gelbliches Wasser.

150. Ebendas. S. 453. Das kleine Hirn aus einem mit schwarzem, geronnenem Blute gefüllten Sacke bestehend; Blut in der Rautengrube und im Hinterhorne; röthliches Wasser in den Seitenhöhlen und unter der festen Hirnhaut; Gallert unter der verdickten und mit Granulationen besetzten Spinnwebenhaut; das große Hirn fest; im linken Oberlappen eine Höhlung mit röthlichem Wasser und einer 2 Linien dicken, dunkelbrannen, mit Gefäßen versehenen Haut.

d) An der Brücke. (Siehe 215. 960).
a) In den Seitenhöhlen. a) Von innern Ursachen. (Siehe 158. 150. 196. 197. 198. 200. 241. 242. 243. 246. 255. 270. 284. 411. 445. 456. 485. 968).

aa) In beyden Seitenhöhlen.
151. Wepfer *hist. apopl. p. 1.* In den Höhlen und unter der festen Hirnhaut 2 Pfund Blut.

152. La Peyronie in *ac. de Paris 1741. p. 216.* Blutklumpen.
153. Ebendas. Blutklumpen und Serum.

154. Morgagni *ep. II. art. 13.* Flüssiges Blut; die Wände der Höhlen angefressen, besonders der rechte Sehhügel und Streifenbügel.
155. Ebend. *art. 19.* Die Gefäßgeflechte entzündet; Blut am rechten Vorderlappen ergossen.

156. Ebend. *art. 20.* Blutklumpen und Serum.

157. Morgagni *ep. LX. art. 4.* Blut in allen Höhlen; der rechte Sehhügel heynah, das Gewölbe und der rechte Streifenbügel ganz aufgelöst in eine schmutzig röthliche, schleimige Feuchtigkeit.
158. Ebend. *ep. LX. art. 6.*

159. Meckel in *acad. de Berlin 1761. p. 68.* 8 Unzen geronnenes Blut aus einem von einem Geschwure angegriffenen Gefäße.

160. Lentin II. S. 240.
161. Caldani in *Ital. Bibl. I. Bd. 2. St. S. 166.*

162. Abercrombie S. 112. Blutklumpen.

163. Ebend. S. 113. Eben so.
x) Blutiges Wasser. (Siehe 139. 150. 193. 216. 220. 665. 942. 1061. 1096.)

164. Meckel in *ac. de Berlin 1764 p. 86.* Blutiges Wasser in den Höhlen und über der Gefäßhaut; die Gefäße und Gefäßgeflechte strotzend; ein spitziger Knochen an der Sichel.

163. Arneemann's Magazin I. S. 74. Blutiges Wasser in den Höhlen; Knochen wie Roseneukern an der Spinwebenhaut; die Gefäße strotzend.

166. Metzger's Schriften III. S. 209. Blutiges Wasser in den Höhlen und an der Basis; die Gefäße strotzend.

167. Ebendas. S. 214. Blutiges Wasser in den Höhlen; die Gefäße strotzend.

168. Chambon p. 394. Eben so.

bb) In der linken Seitenhöhle.

169. Adams in *phil. transact.* F. p. 210. 5 Unzen geronnenes Blut in der linken Seitenhöhle.

170. Morgagni *ep. II. art. 15.* Die linke Höhle mit Blutergießung und angefreßnem Gefäßgeflecht.

171. Ebend. *ep. LXII. art. 7.* In der linken Höhle.

172. Caldani in *ital. Bibl.* I. Bd. 2. St. S. 172. Eben so; der linke Streifenhügel zum Theil zerstört.

cc) In der rechten Seitenhöhle.

173. Morgagni *epist. I. art. 13.* Blut in der rechten Höhle, und der Streifenhügel angefreßen.

174. Morgagni *ep. II., art. 9.* Die rechte Höhle voll Blut; ihre Wand angefreßen; das Gefäßgeflecht zerrissen.

176. Ebend. *art. 11.* In den Höhlen etwas wässeriges Blut; im rechten Unterhorne ein Blutklumpen; die Gefäße strotzend; in den Gefäßgeflechtn Hydatiden.

177. Ebend. *art. 16.* Blut an der Oberfläche und in der rechten, auch etwas in der linken Seitenhöhle.

179. Hopfengärtner in *Hufeland's Joura.* I. S. 522. Ein Blutklumpen von der Größe einer Faust in der rechten Höhle.

180. Haslam S. 55. Die rechte Höhle mit schwarzem geronnenem Blute gefüllt.

ß) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 22. 23. 435. 564. 803).

181. Morgagni *LI. 59.* Stich in die Augenhöhle; Tod nach 1 Stunde.

182. Ebend. *LII. 34.* Fall; Tod nach 4 Stunden.

183. Lentin II. S. 240. Fall; die linke Höhle voll Wasser; die rechte mit schwarzem, klumpigem Blute gefüllt; die Umge-

bung mürbe und der Auflösung nahe; Tod nach einigen Stunden.

184. Pyls *Aufs.* III. S. 115. Schlag mit einem Stöckchen; geronnenes Blut und Wasser in den Höhlen und an der Basis; Tod am 2ten Tage.

185. Bell in *Sammlg.* anserl. *Abbl.* XVII. S. 540. Zerreißung der *arteria fossae Sylvii*; geronnenes Blut in allen Furchen und in der rechten Höhle; Tod am 2. Tage.

186. Caldani in *ital. Bibl.* I. St. S. 174. Zerschmettrung des Scheitelbeins; Blut an der Oberfläche und in der linken Höhle; die Scheidewand zerrissen; der linke Streifenhügel aufgelöst; Tod am 2ten Tage.

187. Ebend. S. 175. Fall; Blut an der Oberfläche und in der rechten Höhle, der rechte Streifenhügel und ein Theil des rechten Schlägels aufgelöst; Tod am 2. Tage.

188. Morgagni *II. 11.* Fall; 2 Unzen Blut in der rechten Höhle; der Streifenhügel und ein Theil des Gefäßgeflechtes wie angefreßen; Tod am 6ten Tage.

189. Ebend. *LII. 54.* Wunde des Siebelblutleiters; Blut und Eiterung in den Seitenhöhlen; Tod am 7ten Tage.

190. Prochaska *adnot.* III. p. 192. Fall auf die linke Seite; Blut auf der linken Hemisphäre; in der linken Höhle 3 Unzen schwarzes Blut; in der rechten 1 Unze Wasser; Tod am 8ten Tage.

191. Morgagni *LI. 23.* Fall auf die Stirne; das Gehirn unter der Wunde schwürzlich; Blut in den Höhlen; Tod am 20. Tage.

192. Autenrieth in *Tübinger Blättern* III. S. 46. Fall; Spalten durch das Keilbein und Felsenbein; Blut an der Oberfläche, am Hirnanhange, in den Seitenhöhlen; Wasser in den Furchen und in den Höhlen; mehrere Stellen der Schädelbasis aufgelöst und flach angefreßen; Tod am 25ten Tage.

x) Blutiges Wasser. (Siehe 17. 33. 1055).

f) In den Bindehäuten. (Siehe 142).

g) In den Vierhügeln. (Siehe 388).

h) Auf der Zirbel. (Siehe 57).

i) Im Schlägel. (Siehe 204. 246. 490. 740).

193. Wepfer *hist. apoplect.* p. 435. Im Schlägel eine große Höhlung mit einem Blutklumpen von der Größe eines Hühnerneys; im rechten Hinterlappen eine Höhlung von

der Größe einer Muscatnuß; mit Wasser und brauner, harter Umgebung; 2 ähnliche Höhlen im rechten Streifenhügel und Stamm-lappen; wässriges Blut in den Seitenhöhlen; ihre Wände granulös; die rechte Hemisphäre atrophisch.

194. Morgagni *op. III. art. 16.* Lücke am rechten Schhügel und Streifenhügel mit ergossnem Blute.

196. Home in Meckel's Archiv III. S. 113. 1 Unze Blut im rechten Schhügel; Blut in den Seitenhöhlen.

197. Tacheron III. p. 411. Im linken Schhügel Blutklumpen wie eine Haselnuß groß, und ein Riß, wodurch Blut in die linke Höhle ging; die Umgebung roth; Wasser an der Oberfläche.

198. Ebend. p. 438. Im rechten Schhügel ein Blutklumpen wie eine Haselnuß groß, mit der Seitenhöhle zusammenhängend; die Umgebung weich und rothbraun.

199. Ebend. p. 447. Im rechten Schhügel Blut; in der linken eine Höhlung von der Größe einer Erbse, mit glatten, durchsichtigen Wänden und Wasser; zwey ähnliche Höhlungen mit glatten Wänden, wie von einer serösen Haut, im rechten Unterlappen und in der Brücke.

200. Romberg in Horn's Archiv 1823 I. S. 422. Die Spinnwebhaut trübe, milchig; das Gehirn derb, federhart; der linke Schhügel fast ganz ausgehöhlt von Blut, welches durch einen Riß auch in die Seitenhöhlen sich ergossen hatte; die Scheidewand sehr fest; Verknöcherung in den Arterien.

201. Ebend. S. 427. Die feste Hirnhaut strotzend; Gallert unter der verdickten Spinnwebhaut; geronnenes, schwarzes Blut im rechten Schhügel, der fast ganz, und im Streifenhügel, der zur Hälfte zerstört war; es war wie ein Hühnersey groß und erstreckte sich bis zu einer 2 Zoll breiten und 2½ Zoll langen Erweichung im Hinterlappen; die Auskleidung der linken Seitenhöhle verdickt, und im Hinterhorns trübes Wasser; an der Oberfläche der linken Hemisphäre des kleinen Hirns eine breyig erweichte und eiternde Stelle.

k) In der dritten Höhle (Siehe 224).

l) Im Streifenhügel (Siehe 143. 201. 241. 246.)

202. Morgagni *op. III. art. 4.* Eine Höhlung mit blutigem Wasser im Streifenhügel hing mit einer ähnlichen Höhlung in der Hemisphäre zusammen.

203. Morgagni *op. IX. art. 20.* Nach einer Kopfverletzung der vordere Theil des Streifenhügels wie halb verdorben; eine von aussen her offene Höhlung mit geronnenem Blute und braunem Serum; der rechte Streifenhügel *strigosus*.

204. Ebend. *op. LXII. art. 7* Höhlung mit ergossnem Blute im linken Streifenhügel und Schhügel.

205. Ebend. art. 9. Eben so im linken Streifenhügel.

206. La Peyronie in *acad. de Paris* 1741. p. 214. Ein Blutklumpen von der Größe eines Taubeney's im linken Streifenhügel.

207. Ebendas. p. 215. Blutklumpen im rechten.

208. Wenzel *cerebr.* p. 98. Höhlung mit Blut und aufgeschwelter Hirnsubstanz im linken Streifenhügel, der linke Schhügel nach hinten und unten gedrängt.

209. Ebendas. der linke Schhügel und Streifenhügel breyig aufgelöst; in Letztrem Blut in die Substanz ergossen.

211. Ebend. p. 101. Höhlung im linken Streifenhügel, bis in den Hinterlappen reichend.

212. Lallemand I. p. 38. Ein Theil des linken Streifenhügels mit Blut infiltrirt; das linke Centrum ovale breiartig erweicht; die Spinnwebhaut verdickt; alle Arterienzweige des Gehirns verknöchert.

213. Lallemand I. p. 11. Der linke Streifenhügel infiltrirt und breyartig; im linken Oberlappen eine Erweichung.

214. Romberg in Horn's Archiv 1823 I. S. 406. Der Schädel dünn; die feste Hirnhaut strotzend, und an der Vereinigung der Knaurnath mit der Pfeilnath 1 Zoll groß entzündet und mit der Spinnwebhaut verwachsen; Letztere trübe, verdickt und mit der Gefäßhaut verwachsen; das Gehirn sehr fest und federhart; in den Streifenhügeln, so wie im Hirnmantel, kleine, venöse Extravasate von der Größe eines Stecknadelloops bis einer Erbse; die Umgebung erweicht,

schmutzig weiß, und an der Luft gelblich grün sich färbend.

215. Duncan in *auseries. Abhh. für Aerzte* XXVIII. S. 523. Unter der Spinnwebhaut etwas Wasser; am untern und vordern Theile des linken Vorderlappens eine $\frac{1}{2}$ Zoll große Blutunterlaufung; die Rinde der linken Hemisphäre meist mit Blut unterlaufen; der obere Theil des linken Streifenhügels und ein Theil des Oberlappens aufgelöst und wie aus geronnenem Blute und Marke gemischt, aussehend; in der vierten Höhle ein erbsengroßes Gerinselflüssiges Blutes, und Blut an der Brücke.

m) Am Mantel des grossen Hirns. a) An der Oberfläche. aa) Von inneren Ursachen. (Siehe 151, 175, 177, 226, 243, 668, 663, 800).

216. Lencisi *de subit. Mort.* p. 149. Die rechte Hemisphäre, auf welcher ein Blutklumpen lag, klein, deprimirt, abgezehrt; in der rechten Seitenhöhle blutiges Wasser.

217. Gmelin in *Tübinger Dissert.* II. S. 110. Gallert und viel Blut unter der festen Hirnhaut; auf der Gefäßhaut große und zum Theil verknöcherte Pacchionische Körper.

218. Wenzel *cer.* p. 102. Blutergiebung, welche auf der linken Hemisphäre eine tiefe Grube gebildet hatte; Streifenhügel und Schhügel dieser Seite schmaler, fleischer und bleicher, und das Hinterhorn enger.

219. Abercrombie S. 117. Blutergiebung am obern Theile der linken Hemisphäre; darunter eine erweichte Stelle.

220. Romberg in *Horns Archiv* 1823. I. S. 410. Unter der festen Hirnhaut der linken Hemisphäre Blut ergossen, die Rinde überwiegend und chokoladenbraun; im linken Hinterhorne blutiges Wasser; die Schhügel violett; die Rantengrube groß.

x. Blutiges Wasser. (Siehe 150, 164, 166, 254, 325).

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 19, 33, 34, 35, 184 — 187, 190, 192, 478, 564, 826).

221. Hopfengärtner in *Hufelands Journ.* I. S. 222. Von einem Schläge auf die Schläfe eine Fractur bis in den Keilbeinkörper; 6 Unzen geronnenes Blut auf der festen Hirnhaut; unter ihr viel Blut über der ganzen Hemisphäre; Tod nach einigen Stunden.

222. Pfeufer in *Henke's Ztschr.* 1822. 3. Heft. S. 99. Das Stirnbein und mehrere Gesichtsknochen gebrochen; der kleine Flügel des Keilbeins zerschmettert, der Flügelfortsatz abgebrochen; Extravasat auf der festen Hirnhaut; Tod am 4ten Tage.

223. Romberg in *Horn's Archiv* 1823. I. S. 415. Nach einem Felle; dunkelbraunes Blut auf der linken Hemisphäre; darunter die Spinnwebhaut dunkelbraun und die Gefäßhaut strotzend; Gallert unter der Spinnwebhaut; die Hirnsubstanz weich; die rechte Seitenhöhle erweitert, mit trübem, gelbem Wasser.

ß) In der Substanz. (Siehe 214, 664, 689).

224. Wepfer *hist. apoplect.* p. 5. Eine große Höhlung mit 8 Unzen geronnenem Blute, welches sich aus einem zerrissenen Zweige der Carotis ergossen hatte; die Carotiden verknöchert; im Gefäßgeflechte der linken Seitenhöhle mehrere weisse, rauhe Steine; Extravasat in der dritten Höhle; die rechte Hemisphäre mit Blut unterlaufen und weich.

225. Morgagni *epist. LXII. art. 11.* Eine Höhlung mit Blut in der rechten Hemisphäre.

226. Abercrombie S. 111. Blut an und in der rechten Hemisphäre.

227. Ebd. S. 114. In beyden Hemisphären Höhlungen mit Blutklumpen, die mit den Seitenhöhlen zusammenhängen; in diesen dunkelbraune Flüssigkeit.

228. Techeron III. p. 436. In der linken Hemisphäre eine Höhlung mit 3 Unzen geronnenem Blute, die mit der Seitenhöhle zusammenhängt.

n) Am Stammlappen und Oberlappen. a) An der Oberfläche nach Kopfverletzungen. (Siehe 38, 118).

229. Morgagni *ep. LI. art. 38.* Mit Fractur.

230. Latta S. 162. Mit Fractur und Depression; Tod nach 24 Stunden.

231. Louvrier S. 5. Mit Fractur und Splintern; Tod am 7ten Tage.

232. Kälpin p. 79. Mit Fractur; Tod am 7ten Tage.

233. Andrew in *Reportor.* II. S. 9. Tod am 7ten Tage.

234. La Motte in *prix de chirurgie* X. p. 390; genesen.

235. Schmucker's Schriften III. S. 240. Links; genesen.

236. Devero in *phys. med. Journ.* 1802. II. S. 445. Mit Fractur; genesen.

237. Arneemann's Magazin I. Bd. S. 311; genesen.

238. Tuccioni in *Sämmig. chir. Bemerk.* II. S. 182. Mit Fissur und Depression; genesen.

239. Louvrier S. 17. Mit Fractur und Depression; genesen.

240. van der Wiel p. 19. Eben so.

β) In der Substanz. αα) Von innern Ursachen. (Siehe 272).

241. Morgagni *ep. III. art. 4.* Blut auf und im rechten Oberlappen; Loch im Streifenhügel zur Seitenhöhle; die Scheidewand zerrissen.

242. Ebendas. *art. 6.* Eine Höhlung mit geronnenem Blute mit Gängen in die linke Seitenhöhle; eine kleine Höhlung mit braunem Schleime neben dem rechten Sehhügel.

243. Ebend. *art. 2.* Eine 2 Finger breite, 6 Finger breit lange Höhlung neben der rechten Seitenhöhle, mit unebenen, wie angefreßenen Wänden, mit geronnenem Blute gefüllt, welches durch eine Oeffnung in die rechte und von da durch einen Riß der Scheidewand in die linke Seitenhöhle gedrungen war; auch unter der festen Hirnhaut Extravasat.

244. Morgagni *epist. LX. art. 2.* Eine Höhlung an der Seite von Streifenhügel und Sehhügel, 2½ Finger breit, noch einmal so lang, mit Blut gefüllt und mit ungleichen, zerrissenen Wänden.

245. Ebendas. *ep. LXXIII. art. 13.* Eine Höhlung mit schwarzem Blute, von der Größe einer Wallnuß an der Seite des rechten Sehhügels und Streifenhügels.

246. Wenzel *cerebr. p. 99.* Im linken Oberlappen eine Höhlung mit geronnenem Blute, die sich von der Rinde bis zum Sehhügel und Streifenhügel erstreckte und mit dem hintern und untern Horne zusammenhing.

247. Don de la Vauterie *obs. 8.* Im rechten Oberlappen 2 Löffel geronnenes Blut; ringsum Entzündung und Eiterung.

248. Lallemand I. p. 25. Im linken Oberlappen einer Haschnuß groß Blut, theils ergossen, theils infiltrirt; die Umgebung erweicht grau, wie zerfließend, Gallert zwischen Gefäßhaut und Spinnwebhaut.

249. Lallemand I. p. 371. Der rechte Oberlappen mit Blut infiltrirt; die Umgebung sehr weich; auch Blutergießung in Gefäßhaut und Rinde; der rechte Vorderlappen erweicht und in wässriger Eiterung.

250. Tacheron III. p. 403. Höhlungen mit flüssigem und geronnenem Blute im rechten Oberlappen.

251. Ebendas. p. 414. Eben so.

252. Ebendas. p. 440. Im linken Oberlappen eine Höhlung mit 4 Unzen Blut; die Umgebung weich und aufgelöst; Serum an der Oberfläche.

253. Romberg in *Horn's Archiv.* 1823. I. S. 421. Die feste Hirnhaut strotzend; das Gehirn derb, fast lederartig, federhart; im linken Oberlappen eine wie ein Taubeney große Höhlung mit ungleichen, zerrissenen Wandungen, Blut und Stückerlen Hirnsubstanz; Blut in der linken Seitenhöhle.

254. Ebend. S. 436. Blutiges Wasser unter der festen Hirnhaut; die Spinnwebhaut trübe und verdickt; die Gefäße strotzend; Hydatiden an den Gefäßgeflechten; im linken Oberlappen eine wie eine Wallnuß große Höhlung mit glatter, dunkelgelber, Gefäße habender Haut und röthlich gelber Jance; die Umgebung erweicht.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 32. 74.)

255. Morgagni *ep. IX. art. 20.* Von der Fractur des Scheitelbeins zog sich ein Gang in eine mit Blut gefüllte Höhlung von der Größe eines Hühnereys, mit unebenen und misfarbigen Wänden; die Umgebung misfarbig und die Seitenhöhle der andern Seite voll Wasser.

256. Le Dran I. p. 113. In der Hirnsubstanz hin und wieder kleine Bluthumpen; Tod am 8ten Tage.

257. Schmucker's Wahrnehm. I. 10te Wahrn. Unter der Schädeldwunde die Hirnsubstanz gelblich aufgelöst; und darin eine Höhlung mit ½ Unze geronnenem Blute; übrigens zwischen den Hirnhäuten viel flüssiges und gallertartiges Serum; Tod am 20sten Tage.

258. Ebend. 12te Wahrnehm. Schuß auf die rechte Seite des Stirnbeins; im linken Oberlappen eine 3 Zoll tiefe, 4 Zoll breite Höhle mit brauner stinkender Jauche; Tod am 25ten Tage.

o) Auf dem Balken.

259. Lancelai *de subit. mort.* p. 160. Geronnenes Blut zwischen den Hemisphären bis auf den Balken herab.

260. Stoll III. p. 221. Eben so mit Extravasat an der Basis.

261. Tacheron III. p. 405. Blut an der Oberfläche und auf dem Balken; ein Theil von diesem zerstört; im untern Theile der rechten Hemisphäre die Rinde grünlich, das Mark grau.

p) Am Unterlappen a) An der Oberfläche nach Kopfverletzungen.

262. Metzger's verin. Schr. I. S. 78. Extravasat unter dem linken Schläflein; Tod nach einigen Stunden.

263. Stoll III. p. 225. Aeusere Wunde am hintern untern Winkel des rechten Scheitelbeins; die Gefäßhaut gequetscht; in den Furchen und auf der linken Seite der Basis Extravasat; Tod am 2ten Tage.

264. Le Dran p. 118. Aeusere Wunde an der linken Seite des Scheitels; mehrere Blutklumpen an der Basis des Unterlappens; Tod am 7ten Tage.

β) In der Substanz, von innern Ursachen.

265. Lallemand I. p. 106. Erweichung mit Blutergießung im rechten Unterlappen, mit Eiterung im rechten Hinterlappen; etwas Wasser in der rechten Höhle.

γ) Am Hinterlappen. α) An der Oberfläche. aa) von innern Ursachen. (Siehe 974).

266. Haslam S. 40.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 478).

267. Kölpin p. 83. Blut über dem linken Hinterlappen, noch mehr am rechten Vorderlappen; Tod am 2ten Tage.

268. Tulpinus p. 16. Tod am 12ten Tage.

δ) In der Substanz aa) von innern Ursachen. (Siehe 211).

269. Tacheron III. p. 401. Im rechten Hinterlappen 2 Unzen Blut mit erweichter Umgebung.

270. Ebend. p. 412. Im rechten Hinterlappen eine Höhlung mit Blut, von wo aus

ein Gang in die rechte Seitenhöhle sich erstreckte, in welcher auch ein Blutklumpen war; die Höhlung mit glatter Haut ausgekleidet; die Umgebung weich und gelb.

271. Ebend. p. 417. Im rechten Hinterlappen eine Höhlung, $\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser, mit geronnenem Blute; Serum an der Oberfläche und in den Höhlen.

272. Ebend. p. 443. Im rechten Ober- und Hinterlappen 3 Unzen Blut; die Umgebung stinkend und aufgelöst; das kleine Hirn grün und weich.

273. Brunn in Horn's Archiv 1823. I. S. 127. Ein Blutklumpen von der Größe einer Haselnuss im linken Hinterlappen; Spuren von mehreren frühern Extravasaten in derselben Hemisphäre, wovon die ältesten wie Rostflecke mit dunklem Kerne aussahen.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 435).

γ) Am Vorderlappen. α) An der Oberfläche.

α) Durch innre Ursachen. (Siehe 153. 800. 035).

274. La Peyronie *in ac. de Paris* 1741: p. 215. Blutklumpen von der Größe eines Hübnerereys.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 95. 127. 136. 267).

275. Hopfengärtner in Hufeland's Journal S. 525. Ein Blutklumpen von der Größe einer Faust unter dem rechten Vorderlappen; Tod nach 4 Stunden.

276. Stoll III. p. 212. Fissur am Hinterhaupt, Extravasat am kleinen Hirn; der Vorderlappen am meisten sugillirt und mit geronnenem Blute bedeckt; Tod am 2ten Tage.

277. Schumacher S. 326. Extravasat auf dem rechten Vorderlappen mit Erweichung desselben; die Höhlen voll Wasser; die Gefäßgeflechte voll Hydatiden; Tod am 2ten Tage.

278. Quesnay *in ac. de chir. I.* p. 322. Die feste Hirnhaut callös; die Gefäßhaut entzündet; Tod am 17ten Tage.

279. Bilguer S. 169. Fissur des Stirnbeins; genesen.

280. Schmucker's Schriften I. S. 276. Nach einem Falle mit dem innern obern Rande der linken Augenhöhle auf ein Eisen genesen.

281. Mursinus Trepanat. S. 84. Genesen.

b) In der Substanz. a) durch innere Ursachen. (Siehe 813).

282. Lallemand I. p. 19. Der linke Vorderlappen breyartig, und darin Blutergießung; die Gefäßhaut mit ihm verwechselt; Wasser unter der Spinnwebenhaut; Granulationen an dieser in der Seitenhöhle.

283. Abercrombie S. 109. Im rechten Vorderlappen eine Höhlung wie ein kleines Hühnerey mit Blutklumpen.

284. Ebendas. S. 116. Eben so, mit Oeffnung in die Seitenhöhle, und in dieser ebenfalls Blut; die Umgebung weich und breyartig.

ß) Nach Kopfverletzungen.

285. Henkel's Beob. S. 62. Nach einem Schläge auf das Hinterhaupt Extravasat über der linken Hemisphäre und in einem 2 Zoll langen Risse des Vorderlappens; das verlängerte Mark strotzend; die Höhlen voll Wasser; die Gefäßgeflechte voll Hydatiden; Tod am ersten Tage.

286. Hopfengärtner in Hufelands Journ. I S. 527. Extravasat im Vorderlappen; die Umgebung breyartig; Tod am 4ten Tage.

X. Hirnbruch.

A) Angebörner. a) An der großen Fontanelle.

287. Penada p. 65. Das Schädeldgewölbe fehlend; das ganze Gehirn in einem Beutel auf dem Scheitel, welcher größer war, als der übrige Kopf.

288. Schneider chirurg. Geschichte x. (Chemnitz 1785. 8.) S. 10. Eine Geschwulst, wie ein halber Kinderkopf groß, mit einem 21 Linien im Durchmesser habenden Stiele auf dem Schädel sitzend, enthielt oben 11 Unzen Blut, und darunter über 1½ Unze von beyden Hemisphären des großen Hirns.

289. Detharding in Stark's Archiv IV. S. 764. Geschwulst, wie ein Hühnerey groß auf dem Scheitel.

290. Autenrieth in Tübinger Blätter II S. 273. Das Schädeldgewölbe fast bis auf die Basis gedrückt; die Großhirnschenkel durch die große Fontanelle tretend und in eine formlose Masse übergehend.

b) am Hinterhauptbeine.

291. Dessault's Wahrnehmungen VI S. 26. Zwey große Geschwülste mit Wasser, Zellgewebe, Blutgefäßen und durch eine Oeffnung in der Mitte des Hinterhauptbeins tretender Hirnsubstanz.

292. Klein *descript.* 4. monstr. p. 1. Schädeldgewölbe auf die Basis gedrückt; großes und kleines Hirn in einem Beutel am Hinterhaupte.

293. Siebold *collectio obs. med. chir. I.* (Bamberg. 1769. 4.) p. 5. Eine 10 Fingerbreit lange, am Rücken herabhängende Geschwulst enthielt in der bis zum Bersten verdünnten und ausgedehnten festen Hirnhaut die Hinterlappen mit 4 Unzen gelblich röthlichem Wasser, und an der Spitze noch eine eigne Höhle mit ähnlichem Wasser.

c) Am Stirnbeine.

294. Osiender in Göttinger Anzeigen 1812. Nr. 139. Der rechte Vorderlappen in einer bleaurothen Geschwulst.

295. Henckel VII S. 50.

296. *Acad. de chir. XF.* p. 442. Geschwulst 2½ Zoll im Durchmesser, am unteren und linken Theile der Stirne.

d) An der Seitenfontanelle.

297. Ferrand in *acad. de chir. XIII.* 102. Die Oeffnung 1½ Zoll im Durchmesser.

e) Hirnanhang. (Siehe 651).

B. Später entstandener Hirnbruch.

e) Am Stirnbeine.

298. Fantoni obs. p. 172. Nach Fractur und Depression des Stirnbeins.

299. Monro in *med. transact. by the phys. in London II.* p. 353. Bey einem Manne entstand aus unbekannter Ursache ein Loch im Stirnbeine mit carlösen Rändern, wodurch das Gehirn in eine zwey Zoll breite, ½ Zoll hohe Geschwulst hervortrat.

300. Richter in *med. chir. Ztg.* 1801. II. S. 46. Bey einem Manne von 60 Jahren drang Gehirn durch das Stiebbein in die Nasenhöhle und durch des Stirnbein nach aussen; an den Oeffnungen der Knochen war kein Beinfractur zu bemerken.

b) Am Schädeldbeine.

301. Jamieson bey Ingram p. 85. Hirnbruch, durch Keichlusten. 7 Monate nach einer großen Fractur des Schädeldbeins veranlaßt.

Zweyte Classe. Abnorme Bildung von Flüssigkeiten.

I. Luftentwicklung.

302. Baader in Sandifort *thes.* III. p. 60. Alle größern Blutleiter mit fleischigen, zühen, weißen Polypen gefüllt, und mit Luftblasen zwischen gelbem Serum; aus den geöffneten großen Hirnvenen brach Luft mit Gewalt zischend hervor; die Höhlen enthielten viel Wasser.

II. Wassergießung. A) Acute.

a) Am verlängerten Marke. (Siehe 307).

x) Gallert (Siehe 446).

b) Am kleinen Hirne. (Siehe 780).

303. Dunglison in *London med. repository*, 1822 Oct. Das kleine Hirn von Blut strotzend, seine Spinnwebhaut verdickt, und Wasser auf ihr ergossen.

x) Gallert (Siehe 446).

c) An der Oberfläche des großen Hirns.

e) Ueberhaupt.

aa) Von innern Ursachen. (Siehe 780. 798. 879. 1074).

304. Gahagam in *auserl. Abh.* für Aerzte XLII. S. 561. Das Gehirn entzündet; 6 bis 8 Unzen Wasser unter der festen Hirnhaut.

305. Will Stark S. 96. 2 Unzen Wasser.

306. Ebendas. 1½ Unze Wasser unter der festen Hirnhaut, ausserdem auch Wasser unter der Gefäßhaut und in den Höhlen.

307. Ebendas. Wasser unter der festen Hirnhaut, unter der Gefäßhaut und am verlängerten Marke.

308. Guthrie in *phys. med. Journ.* 1801. Decbr. Wasser zwischen den Hirnhäuten; der Vorderlappen zerstört.

x) Gelbes Wasser (Siehe 706).

xx) Wasser unter der Spinnwebhaut. (Siehe 476).

xxx) Wasser unter der Gefäßhaut. (Siehe 306. 307).

f) Gallertartige Ergießung unter der festen Hirnhaut. (Siehe 217. 446. 928. 824).

ff) Gallertartige Ergießung unter der Spinnwebhaut. (Siehe 223. 1074).

309. Pinel in *Nasse's Zeitschr.* 1821. 4. St. S. 143. Das große Hirn fast ganz bedeckt mit einer gallertartigen Haut, die in alle Furchen drang; die Höhlen voll

Wasser; die Hirnsubstanz sehr weich, besonders oben; im vordern Theile der Sichel ein Knöchelchen; der Schädel dünn.

310. Abercrombie S. 31. Die Gefäßhaut entzündet; Gallert zwischen ihr und der Spinnwebhaut.

311. Ebendas. S. 33. Eben so.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 112).

312. Simmon's 1787. S. 207. Nach einem Falle auf das Hinterhaupt viel Wasser unter der festen Hirnhaut; Tod am 14. Tage.

313. Pfeuffer in *Henke's Zeitschrift* 1822. 3. St. S. 93. Auf der rechten Seite die innere Fläche des Schädels bückrig und das Gehirn mit einer großen Vertiefung; die feste Hirnhaut weick und 5 Unzen Wasser unter ihr.

x) Gallert unter der festen Hirnhaut. (Siehe 257. 408. 824).

314. Tacheron *III.* p. 11. Nach einem Schläge gallertartige Ergießung; Tod nach 1 Jahre.

xx) Gallert unter der Gefäßhaut. (S. 831).

β) Nach Kopfverletzungen am Oberlappen.

315. Stoll *III.* p. 209. Unter der festen Hirnhaut viel Wasser; Tod am 10. Tage.

316. Schmucker's Wahrnehmungg. I. 3te Wahrn. Depression des Scheitelbeins; gallertartige Ergießung unter der festen Hirnhaut und unter der Spinnwebhaut; Tod am 12ten Tage.

317. Ebend. 8te Wahrn. Häufiges Gerinzel unter der festen Hirnhaut; Tod am 14ten Tage.

318. Ebend. 4te Wahrn. Fractur des Scheitelbeins; die feste Hirnhaut etwas schwärzlich; die Spinnwebhaut bildete kleine mit Eiter gefüllte Pusteln und eine Blase von der Größe eines Taubeneys mit eiyförmiger Flüssigkeit; Tod am 25ten Tage.

γ. Nach Kopfverletzungen am Hinterlappen.

319. Schmucker's Wahrnehmungg. 9. Wahrn. Die feste Hirnhaut am Hinterlappen verdorben und unter ihr 4 Linie dicker, weißgelber Schleim; die Rinde derselbst aufgelöst; viel Wasser in den Höhlen.

ten; und Hydatiden in den Gefäßgeflech-
ten; Tod am 6ten Tage.

δ) Von innern Ursachen, am Vorder-
lappen.

320. Morgagni I, 2. Am Hahnen-
kamme etwas jauchiges und 1 Unze klares
Wasser; die Zirbel groß.

ε) Nach Kopfverletzungen am Vorder-
lappen.

321. Schmueker's Wahrnehm. 2:
Wahrn. Fissur; unter der festen Hirnhaut,
so wie unter der Spinnwebhaut, bis auf
den Balken, weißliche, gallertartige Sub-
stanz; die Hirnsubstanz unter der Wunde
½ Zoll tief erweicht; Tod am 11ten Tage.

322. Ebendas. 8 Wahrn. An der Basis
des linken Vorderlappens unter der festen
Hirnhaut 1 Drachme hautähnliche Lymphe;
Tod am 14ten Tage.

323. Ebend. 11 Wahrn. 4 Unzen Was-
ser unter der festen Hirnhaut; Tod am 18.
Tage.

324. Loder in Bucholz Beytr. IV. S.
50. Fissur im Stirnbein; 1 Zoll lange, 3
Linien breite, weißliche, etwas harte Sub-
stanz an der Basis des Vorderlappens; Was-
ser in den Höhlen; der Knochen etwas car-
iös mit Oeffnung in die Stirnhöhle; Tod
am 8sten Tage.

δ) Hirnhöhlenwassersucht. (S. 132. 306.
309. 400 — 403. 405. 407. 427 — 429. 466.
473. 474. 513. 514. 544. 552. 580. 655. 702.
706. 721. 730. 734. 737. 778. 781. 810. 860.
881. 884. 923. 931. 959. 996. 998. 1006. 1026.
1069. 1080. 1064. 1080).

325. Bucholz in Baldinger's neuem
Magaz. I. S. 481. 4 Unzen Wasser in den
Höhlen; 1½ Unze röthliches Wasser zwis-
schen den Häuten.

326. Ebend. II. S. 130. 4 Unzen Was-
ser in den Höhlen; das Gehirn und seine
Häute von Blut strotzend; die Hinterlappen
und das kleine Hirn weich und aufgelöst.

327. Davis in neuem Journ. 1. anal.
Lit. II. Bd. 1. St. S. 145. Misfarbiges Was-
ser in den Höhlen; Knoten in den Gefäß-
geflechtern; die Zirbel angeschwollen, fest
und mit den Gefäßgeflechtern verwachsen;
die Gefäßhaut strotzend; die Hirnsubstanz
blutreich, zähe, fest und faserig.

328. Abererombie S. 17.

329. Ebendas. S. 18.

x) Trübes und gefärbtes Wasser. * (Siehe
223. 227. 783. 790. 974).

xx) Wassergießung nach Kopfverletzun-
gen. (Siehe 255. 277. 285. 319. 324. 477.
478. 507. 538. 672. 818. 831. 850. 901. 934.
943. 953. 1007. 1051. 1056).

B. Apoplektische Wassergieß-
ung.

a) Am kleinen Hirne.

330. Schwaarschmidt's Nachrichten
III. S. 57. Im kleinen Hirne viel Blutstrei-
fen; unter ihm 1 Unze Wasser; am gro-
ßen Hirne Wasser unter der festen Hirn-
haut (½ Unze); unter der Spinnwebhaut
(1 Unze) und in den Höhlen; Hydatiden
in den Gefäßgeflechtern.

331. Stoll III. p. 305. Das kleine Hirn
von Wasser umgeben; die Blutgefäße stro-
tzend.

b) An der Oberfläche des großen Hirns.
(Siehe 197. 271. 681. 687. 688. 1015. 1026.
1061. 1065. 1066. 1072. 1108).

332. Wepfer hist. apoplect. p. 14. Sehr
große Menge Wasser unter der festen Hirn-
haut und unter der Gefäßhaut; die Hirn-
substanz schlaff und weich; in den Gefäß-
geflechtern viel härtliche, varicöse Knoten.

333. Ebend. p. 338. Auf den Furchen
Gallert, und unter derselben Wasser; in
den Höhlen Wasser; die Hirnsubstanz weich.

334. Ebend. p. 427. Wasser unter der
festen Hirnhaut, unter der Gefäßhaut und
in den Höhlen; die Gefäßgeflechte bleich
und mit Hydatiden.

x) Wasser unter der Spinnwebhaut.
(Siehe 215. 282. 335 — 337. 811).

x) Wasser unter der Gefäßhaut. (Siehe
1063. 1066).

xxx) Gallert unter der festen Hirnhaut.
(Siehe 138. 149. 827. 1063. 1117).

†) Gallert unter der Spinnwebhaut. (Siehe
150. 201. 653. 686. 795. 1058).

††) Gallert unter der Gefäßhaut. (Siehe
1058).

b) Hirnhöhlenwassersucht. (Siehe 265. 271.
530. 533. 534. 718 — 721. 806. 807. 841.
995. 1021. 1026. 1066).

335. Abererombie S. 102. Wasser
in den Höhlen und unter der Spinnweb-
haut.

336. Ebend. S. 102. Eben so.

337. Ebend. S. 119. Eben so.

x) Trübes und gefärbtes Wasser. (Siehe 149. 201. 458. 653. 686).

C) Chronische Wasserergieung.

a) Hirnhautwassersucht. a) Einfache.

338. Lancisi in *Fantoul opus.* p. 41. Anschwellung des Schädels mit Klaffen der Suturen nach einem Falle auf's Hinterhaupt.

339. Kalkschmidt de *Hydrocephalo interno.* Jenae 1752. (in Haller *disp. path.* VII. p. 484.) 9 Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut; das ganze Hirn atrophisch.

340. Flajani in *Ital. Bibl.* II. 2 St. S. 42.

341. Wrisberg in *Göttinger Anzeigen* 1804 S. 2025. Nr. 2.

342. Hartell in *med. chir. Ztg.* 1805. I. S. 92. 4 Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut.

343. Vosse in *Samml. auserl. Abhh.* XXVIII. S. 363. Bey einem Kinde von einigen Monaten der Kopf angeschwollen und durchsichtig.

ß) Mit Höhlenwassersucht.

344. Henkel's Anmerkng. I. S. f.

345. Wrisberg in *Göttinger Anzeigen* 1804. S. 2025. Nr. 1. 3 Unzen Wasser über, 8½ Pfund unter der festen Hirnhaut; Wasser in allen Hirnhöhlen.

346. Ebend. Nr. 3. 4 Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut.

γ) Mit unvollkommener Entwicklung des Gehirns.

347. *Mém. pris* I. p. 136. 2 Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut; vom großen Hirne nur Rudimente vorhanden.

348. Santorini bey Morgagni XII. 6. Das kleine Hirn von der Größe einer Mandel; anstatt des großen Hirns bloß eine Wasserblase.

349. Bromel in *acta lit. Sueciae* 1725. p. 98. Innerhalb der festen Hirnhaut bloß röthliches Wasser ohne Gehirn; Sichel und Zelt vorhanden.

350. *Com. Soc. Göttingensis* IV. p. 113. Das kleine Hirn aufgelöst, zerfließend; vom großen Hirne gar nichts vorhanden.

351. Mier in *Sammlg. auserl. Abhh.* XI. S. 214. 3 Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut; das Gehirn wie ein Hühnerey groß und fest wie Niere.

352. Breschet in *Magendie Journ.* II. p. 270. Gegen 15 Unzen Wasser unter der festen Hirnhaut; anstatt des großen Hirns bloß eine 8 his 10 Linien dicke, weiche, graue Substanz.

353. Bécclard ebend. p. 273. Die Großhirnschenkel in 2 Knollen endigend.

354. Breschet ebend. III. p. 233. 20 Unzen Wasser unter der festen Hirnhaut; die Großhirnschenkel endeten in kleine unförmliche Massen, die nach aussen in hohle Klappen übergingen.

355. Meckel's anat. phys. Beob. und Unters. S. 134. 1½ Mase Wasser zwischen Haut und Schädel; das große Hirn auf der Schädelbasis liegend, als eine hohle, unausgebildete Masse.

ß) Hirnhautwasserbruch am Hinterhaupt (Siehe 291. 293).

356. Wepfer's Beob. Nr. 23. Die Geschwulst bestand aus einem Gewebe von zähen Fasern mit verschiedenen Höhlungen, worin gelbliches Wasser war.

357. van Meekren in *prix de chir.* XIII. p. 108.

358. Penada p. 19. Die Geschwulst, 4½ Zoll hoch, 14 Zoll im Umfange, auf einem ½ Zoll langen, 1 Zoll im Umfange haltenden Stiele sitzend, enthielt 2 Pfund Wasser; ausserdem gegen 6 Unzen Wasser an der Oberfläche des Gehirns.

359. Garn's medicinische Aufsätze (Wittenberg 1791) S. 160. Die Geschwulst 3½ Zoll lang.

c) Hirnhautwasserbruch mit unvollkommen entwickeltem Gehirne.

360. Büttner's Wahrnehmung. S. 121.

361. Zwinger in *acta helvet. phys. med.* I. p. 1. Ohne Schädeldecke; in der Geschwulst Wasser und Hydatiden unter der festen Hirnhaut; am großen Hirne bloß Mark und Rinde zu unterscheiden; kein Wasser in ihm; das kleine Hirn und verlängerte Mark normal.

b) Hirnhöhlenwassersucht.

362. Lizzar's in Gräves und Walther's Journ. IV. S. 145. 4 monatliches Kind; in den Höhlen 3 Pfund Wasser; der Hirnmantel höchstens 4 Linien dick.

363. Baron in *auserl. Abhh. f. Aerzte* XXVII. S. 228. Ein 7 monatliches Kind;

der Umfang des Kopfs 28 Zoll; 3 bis 4 Pinten Wasser im Gehirne; der Hirnmantel war oben so dick wie ein Schilling, und am Scheitel ganz geschwunden, und da die feste Hirnhaut dasselbst zerrissen, so war das Wasser durch die hintere Fontanelle gedrungen und hatte eine Geschwulst der Kopfbedeckungen gebildet.

364. Prickleton in Gräves Journ. IV. S. 140. 8 monatliches Kind. Der Kopf $2\frac{1}{2}$ Zoll im Umkreise; in den Höhlen 3 Pinten Wasser; die vordere Öffnung der Wasserleitung vom Umfange eines Hühner-eyes; die Hörner der Seitenhöhlen und die Scheidewand verschwunden; die Membran der Höhlen fest und dick; der Hirnmantel höchstens 6 Linien dick.

365. Fabricius Hildanus p. 367. Ein 9 monatliches Kind.

366. Mohrenheim's Beobachtungen I. S. 172. 9 monatliches Kind; die Höhlen erweitert und voll Wasser; die vierte Höhle nach unten gespalten; Wirbelspalte an den untern Bauchwirbeln.

367. Greve in auserl. Abhh. f. Aerzte VIII. S. 584. 11 monatliches Kind; das große Hirn wie 2 Wassersäcke anzusehen; das kleine Hirn atrophisch; die Hirnsubstanz weich; der untere Theil des Rückenmarks atrophisch, Wirbelspalte am Kreuzbeine.

368. Pitschel de *hydrocephalo interno*. Lips. 1744 (in Haller *disp. patholog.* I. p. 190) Einjähriges Kind; der Kopf 28 Zoll im Umfange; Perikranium und feste Hirnhaut fest am Schädel; unter der Gefäßhaut 1 Pfund, in den Höhlen 12 Pfund Wasser; nur einige Furchen noch an der Basis, und nur der Streifenhügel noch auf der einen Seite zu erkennen.

369. Klein Beschreibung seltner Wasserköpfe S. 17. Ein 15 monatliches Mädchen; 7 Pfund Wasser im Gehirne; die rechte Hemisphäre mehr ausgedehnt als die linke, oben nur 1 Linie dick, aus $\frac{1}{2}$ Rinde und $\frac{1}{2}$ Mark bestehend; der linke Streifenhügel und Sehhügel klein und platt; der rechte Hinterlappen bog sich links nach vorne unter den rechten Hinterlappen; der rechte Streifenhügel ragte stark hervor; der rechte Sehhügel bildete nur eine Fläche; der Trichter zu einer durchsichtigen Blase

ausgedehnt; die Scheidewand dünn und zerrissen, die Gefäßgeflechte mit einigen kleinen Hydratiden; die Vierhügel normal, aber mehr nach unten liegend, da das große Hirn weiter nach hinten über das kleine Hirn sich ausdehnte.

370. Klein Beschreibung einiger seltner Wasserköpfe. (Stuttgart 1819. 4) S. 1. Ein 16 monatliches Mädchen; der Umfang des Kopfs 32 Zoll; die feste Hirnhaut mit dem Perikranium unzertrennlich verbunden; der Hirnmantel kaum eine Linie dick, ohne Randwülste, und aus Mark und Rinde bestehend, die sich gleich eignen Häuten, leicht von einander trennen ließen; eine gemeinschaftliche Höhle mit 14 Pfund Wasser; die Streifenhügel eine dünne, grane Erhabenheit darstellend, ohne alle Erhabenheit; die Sehhügel ebenfalls platt, und kaum zu erkennen; die Vierhügel völlig verschwunden; das Monrosche Loch so erweitert, daß man mit 5 Fingern durchgehn konnte; Balken und Gewölbe dünn und hautartig; das Gefäßgeflecht eine dünne, blaße Haut, das kleine Hirn noch einmal so groß, als im Normalzustande und seine Höhle erweitert; der Hirnanhang breit; das III, IV und VI, Nervenpaar lang ausgedehnt; der Riechstreifen platt; sein Kolben in eine breite Haut verwandelt.

371. Willan in Edinburger Commentarien VII. S. 69. 20 monatliches Kind; der Kopf im Umfange $2\frac{1}{2}$ Fufs; das Gehirn wie eine Blase, mit 3 bis 4 Quart Wasser; die Haut der Höhlen dick und fest mit erweitertem Gefäße; das Monrosche Loch so erweitert, daß man den Daumen durchstecken konnte; Sehhügel und Streifenhügel platt und dünn.

372. Vesal *lib. I. c. 6.* 2-jähriges Kind; der Hirnmantel am Scheitel so dünn wie eine Blase; 9 Pfund Wasser im Gehirne.

a) Klein's Beschreibung seltner Wasserköpfe S. 28. Ein Mädchen von 21 Monaten; der Umfang des Kopfs 19 Zoll; die feste Hirnhaut mit dem Schädel genau verwachsen; der Mantel dünn, hautartig; die Ganglien des Hirnstammes sammt der Zirkel nicht zu erkennen; der Trichter so dick, wie eine Schwannenfeder; das kleine Hirn von

dem in der vierten Höhle angesammelten Wasser ausgedehnt.

373. Fried in Mohrenheim's Beitr. II. S. 202. 2 jähriges Kind; Umfang des Kopfs 26 Zoll; 5 Maas Wasser im Gehirn.

374. Fabricius Hildanus p. 25. 2½ jähriges Kind; der Umfang des Kopfs 1½ Elle; das Gehirn wie ein Sack, mit 18 Pfund Wasser; die dritte Höhle mit den Seitenhöhlen eins.

375. Gooch II. p. 37. Kopf 29 Zoll im Umfange; der Hirnmantel so dick, wie 5 Bogen Papier.

376. Breschet in Magendie Journ. III. p. 241. 3½ jähriger Knabe; an der linken Hemisphäre die Stammganglien unvollkommen entwickelt, und der Mantel eine aus Rindenhaut und Höhlenhaut gebildete, mit Wasser gefüllte Blase.

377. Berdot in Act. Helvet. phys. med. V. p. 191. 4 jähriger Knabe; Umfang des Kopfs 23 Zoll.

378. Fabricius Hildanus p. 22. 5 jähriges Kind; Kopf 2½ Fuß im Umfange; der Schädel fest.

379. Home in Meckel's Archiv III. S. 108. 6 jähriges Kind; der Umfang des Kopfs 27 Zoll; im Gehirn 6½ Nüßel Wasser; der Hirnmantel ein dünnes Markblatt; der Balken reichte fast bis an den Schädel; die Siegel fast ganz verschwunden; die Randwülste fehlten gänzlich; das Gewölbe in 2 Hälften getheilt; Schhügel und Streifenhügel klein und fest.

380. Auserl. Abhh. f. Aerzte XXX. S. 722. 6 jähriges Kind; der Umfang des Kopfs 2½ Fuß; zwischen beiden Scheitelbeinen ein Raum von 7 Zoll.

381. Klein's Beschreibg. seltner Wasserköpfe S. 21. Ein Knabe von 9½ Jahren; Umfang des Kopfs 24 Zoll; die Nähe geschlossen; nur der vordere Theil der Hemisphären in eine 1 Linie dicke Haut ausgedehnt, und oben mit flockiger, wie macerirt aussehender Marksubstanz; der hintere Theil normal; 7 Pfund braunes Wasser in den Höhlen; der Balken dünn und häutig; von der Scheidewand bloß noch flockige Ueberreste; Schhügel und Streifenhügel platt; Vierhügel und Zirbel ganz verschwunden; das kleine Hirn normal.

382. Monro in med. transact. of phys. in London. II. p. 358. 10 jähriges Kind; Umfang des Kopf 2 Fuß 4 Zoll.

383. Gall III. p. 304. 13 jähriges Mädchen; der Umfang des Kopfs 25 Zoll.

384. Malacarne. Ohne Randwülste; der Hirnmantel 2 Linien, bis einen kleinen Finger dick; die dritte Hirnhöhle 1½ Zoll tief und lang; die Wasserleitung 3 Linien weit; die Zirbel fehlte; der Trichter so dick wie eine Federspule, aussen roth, mit kleinen Hydatiden; der Hirnanhang 1 Zoll lang, knorpelig und mit 2 starken Anhängen; die Stammganglien ganz platt; das kleine Hirn normal; die Suturen verwachsen.

385. Fabricius Hildanus p. 370. 18 Jahr alt; der Kopf 2 Fuß 10 Zoll im Umfange; der Schädel fest und hart.

388. Klein's Beschreibg. seltner Wasserköpfe S. 26. Ein Mensch von 19 Jahren; 7 Pfund Wasser im Gehirn; der Mantel noch 6 bis 9 Linien dick, und die Randwülste nirgends verschwunden; der Balken dünn; die Scheidewand größtentheils verzehrt; Streifenhügel und Schhügel ganz platt; der Trichter sehr ausgedehnt; die Zirbel sehr groß; die Vierhügel ein gleichförmiger, platter, weißer Körper, und darin ein Extravasat, wie 2 Erbsen groß; das kleine Hirn fester, als gewöhnlich.

389. Home in Meckel's Archiv III. S. 170. 19 Jahr alt; der Umfang des Kopfs 34½ Zoll.

390. Spurzheim bey Gall III. p. 305. Eben so. (derselbe?)

391. Michaelis in med. communications I. p. 404. 30 Jahr alt; Umfang des Kopfs 32 Zoll.

392. Büttner's anatom. Wahrn. S. 132. und Beschreibung des innern Wasserkopfs u. s. w. Königsberg 1771. 4. 31 jährige Frauensperson; Umfang des Kopfs 30 Zoll; die große Fontanelle offen, übrigens die Suturen verwachsen; 20 Pfund Wasser in den Höhlen; die Stammganglien so klein, daß sie kaum zu erkennen waren; die Hirnsubstanz von gewöhnlicher Consistenz; das kleine Hirn normal; die Hirnarterien erweitert, mit dünnen und schwachen Wänden.

393. Mayer in med. Jahrb. d. österr. Staats V. 2 St. S. 89. Ein 32 jähriger Mensch;

der Umfang des Kopfs 2½ Fufs; Wasser an der Oberfläche und in den Höhlen; die Gefäße strotzend; das Gehirn fest; Balken, Scheidewand und hinter Theil des Gewölbes zerstört; die Sehhügel weit von einander abstehend; die Streifenhügel sehr groß und in die Quere liegend; die vierte Höhle von Wasser sehr ausgedehnt; der Schädel dünn, und alle Näthe verwachsen.

394. Schneider in Annalen der Wetterauschen Gesellschaft. I. S. 262. 42jähriger Mann; die Schädelknochen dick und schwammig.

395. Auriville de *hydrocephalo*. 45 annorum. Upsal. 1763 (in Sandifort thes. II. p. 350). 45 Jahr alt; 18 Pfund Wasser in den Hirnhöhlen; der Hirnmantel 1 Linie dick, doch Rinde und Mark daran zu unterscheiden; die Sehhügel auseinandergerückt; die Streifenhügel platt; die übrigen Gehirne undeutlich; kleines Hirn u. verlängertes Mark normal; die Schädelknochen von gewöhnlicher Dicke; die Suturen verwachsen.

396. Gall III. p. 304. 55jährige Frau; 4 Pfund Wasser in den Höhlen.

x) Hirnhöhlenhautwassersucht.

397. Behrend's in Schaarschmidt's Nachr. I. S. 55. Viel Wasser innerhalb einer festen Membran, welche die Wände der Höhlen auskleidet; die Umgebung verhärtet; die Gefäßgeflechte bleich; das Gehirn fest, von wässrigem Blute strotzend; auf dem kleinen Hirne weisse, zähe, klumpige Materie, wie Stärkemehl ausschend.

xx) Hirnhöhlenblasenwassersucht.

398. Berdot in *Act. Helvet. phys. med.* T. p. 183. Achtjähriger Knabe; Umfang des Kopfs 2 Fufs; das Gehirn sehr weich; Rinde und Mark kaum zu unterscheiden; der Mantel 3 Linien dick; 4 Pfund 11 Unzen Wasser in einer eignen Blase, welche vorne auf der Decke der Augenhöhlen und dem Sattel, hinten auf dem Zelte aufsaß, oben und aussen vom Gehirne eingeschlossen war und sehr feste Wände hatte; die Sehnerven ganz aufgelöst; die rechte Hemisphäre des kleinen Hirns 6½ Unzen schwer, und darin eine harte Geschwulst mit grauer, thonartiger Substanz und einer 1 Linie dicken, fast hornartigen Haut; die linke Hemisphäre 2 Unzen schwer, und eben so

verhärtet, in einer kleinen Stelle aber auch erweicht.

D. Symptomatische Wasserergieung.

a) An der Oberfläche. (Siehe 655, 734, 744, 843, 867, 923, 993, 1070, 1102, 1105).

x) Wasser unter der Spinnwebhaut (Siehe 399, 405).

xx) Wasser unter der Gefäßhaut. (Siehe 1107).

xxx) Trübes und gefärbtes Wasser unter der festen Hirnhaut. (Siehe 891, 924).

1) Gallert unter der festen Hirnhaut. (Siehe 689, 948).

tt) Gallert unter der Spinnwebhaut. (Siehe 528, 687, 1070).

ttt) Gallert unter der Gefäßhaut. (S. 839).

b) In den Höhlen. (Siehe 302, 399, 425, 426, 556, 557, 676, 698, 744, 759, 760, 839, 840, 867, 916, 922, 925, 938, 944, 947, 949, 954, 963, 964, 980, 981, 1004, 1007, 1022, 1036, 1039, 1058, 1075, 1091, 1102, 1107).

x) Mit trübem Wasser. (Siehe 668, 707, 739, 817, 940, 1070).

xx) Nach Kopferletzungen. (Siehe 608, 899, 950, 988, 1016, 1023, 1040, 1115).

E. Wassersucht der Zirbel. (S. 685).

399. Wepfer's Beobachtg. Nr. 60. Die Zirbel klein und durchsichtig; Knochen an der festen Hirnhaut; Wasser in den Furchen und Höhlen.

400. Ridley p. 84. Die Zirbel groß, durchsichtig und von Wasser strotzend; Wasser in den Höhlen.

401. Morgagni ep. XXXVII. art. 30.

Die Zirbel weich, von Wasser ausgedehnt, wie eine Weinbeere groß; der Hirnanhang zusammengeschrunpft; die Gefäßgeflechte bleich; Wasser in den Höhlen; die Arterien des Gehirns erweitert und blutleer.

402. Ebd. ep. LXII. art. 15. Die Zirbel von Wasser ausgedehnt; Wasser in den Höhlen.

403. Italien. Bibl. III. 1 St. S. 137. Die Zirbel 2mal so groß, als sonst, steinern, schwammig, und in den Zellen derselben, sowie in den Seitenhöhlen, gelbliches Wasser.

404. Wenzel ar. p. 315. Die Zirbel hohl, mit Wasser gefüllt und ohne Sand. F. Wassersucht des Hirnanhangs.

405. Wenzel Hirnanhang S. 56. Was-

vor unter der Spinnewebenhaut des Gehirns und des Hirnanhangs, so wie in den Höhlen; die Zärbel groß und blaß.

III. Eiterung. a) Am verlängerten Marke.

a) Von innern Ursachen. (Siehe 422).

406. Chambon p. 153. $\frac{1}{2}$ des verlängerten Marks verkerkt; auch die untere Fläche des kleinen Hirns in Eiterung.

407. Stoll III. p. 229. Auf beyden Seiten am Ursprunge des siebenten Nervenpaares ein Geschwür; unter der Spinnewebenhaut des kleinen Hirns Eiter; das Zell entzündet; viel Wasser in den Höhlen.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 415).

408. Abercrombie S. 39. Nach einem Falle; ein Balggeschwür im verlängerten Marke; mehrere Unzen Wasser in den Höhlen; gallertartige Ergießung am Sehnerven; Tod nach ungefähr 1 Jahre.

b) Am kleinen Hirne. a) An der Oberfläche.

aa) Von innern Ursachen. (Siehe 201. 406. 407).

409. Do la Mare in auserl. Abh. f. Aerzte I. 3. St. S. 127. Unter den runzligen, zusammengefallenen Häuten braungelbe, stinkende, eitrige Flüssigkeit.

410. Morgagni *epist. XIV. art. 3.* Das Felsenbein cariös; das kleine Hirn in dieser Gegend citrig und 1 Linie tief misfarbig, braun.

411. Quesney in *ac. de chir. I. p. 575.* Das kleine Hirn 3 Linien tief eiternd; schwammige Auswüchse am großen Hirne; Wasser und Blut in den Höhlen; Hydatiden in den Gefäßgeflechten.

bb) Nach Kopfverletzungen.

412. Sauter in Beldinger's Magazin IV. 2. St. S. 117. Nach einem Schläge; Eiter am Oberwurme und linken Vierhügel.

413. Desso p. 118. Tod am 17. Tage.

414. Klein S. 114.

415. Stoll III. p. 236. Grauer, stinkender Eiter am kleinen Hirne, in der vierten Höhle, in den Halswirbeln und in den Seitenhöhlen; das rechte Felsenbein cariös.

β) In der Substanz. aa) Von innern Ursachen. (Siehe 913. 951. 953. 955. 962).

416. Forestus *lib. X. obs. 11.* Geschwüre in der rechten Hemisphäre des kleinen und des großen Hirns.

417. Pet. Pawit *observat. anat.* (Hav-

nac 1656. 8.) p. 17. Ein Geschwür mit bläsiggelber Flüssigkeit in dem sehr weichen kleinen Hirne; die feste Hirnhaut hin und wieder durchlöchert.

418. Bianchi in *raccolta d'opusc. scient. e filolog. XLVI* p. 169. Geschwür von der Größe eines Hühnerneys mit grauem, stinkendem Eiter in der rechten Hemisphäre.

419. Pringle S. 353. Geschwür im obern Theile des kleinen Hirns; 3 Unzen Eiter in den Seitenhöhlen.

420. Ebend. S. 357. Geschwür von der Größe eines kleinen Taubenneys mit dünner Jauche.

421. Douglas in *Edinburger med. Vers. V. S. 787.* Geschwür mit 7 Unzen Eiter in der Mitte des kleinen Hirns.

422. Stoll I. p. 385. Geschwür im kleinen Hirne; Eiter am verlängerten Marke.

423. Ebend. III. p. 235. Geschwür von der Größe einer Wellmaß in der linken Hemisphäre, mit dem cariösen Felsenbeine zusammenhängend.

424. Möhrenheim I. S. 98. Die linke Hemisphäre in grüne, stinkende Jauche aufgelöst; das Felsenbein cariös.

425. Parkinson in *med. chir. Ztg. 1818. IV. S. 54.* Geschwür in der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns, mit dem cariösen Felsenbeine zusammenhängend, und in der rechten Hemisphäre des großen Hirns; Wasser in den Höhlen.

426. Lallemand I. p. 130. Geschwüre in der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns und im rechten Unterlappen des großen Hirns; byrde mit dem cariösen Felsenbeine zusammenhängend; 2 Unzen Wasser in den Höhlen.

427. Abercrombie S. 28. Balggeschwür mit grünlichem, stinkendem Eiter in der linken Hemisphäre; Wasser in den Höhlen.

428. Ebend. S. 30. Großes Geschwür mit stinkendem Eiter in der linken Hemisphäre; das Felsenbein innen cariös; Wasser in den Höhlen.

429. Gall III. p. 120. Geschwüre in beyden Hemisphären, besonders in der linken; die Brücke atrophisch und gelblich; 1 Pfund Wasser in den Höhlen.

430. Duncan in *Edinburgh med. journ.* 1821. Geschwür mit 2 Unzen Eiter in der

rechten Hemisphäre; Eiter in der Trommelhöhle.

431. Serres in Magendie *Journ. II.* p. 262. Mehrere kleine Eiterhöhlen mit gelben, harten Rindern; der Oberwurm verhärtet; die Hemisphären erweicht, gelblich weiß, ausgeartet.

432. Ebend. III. p. 130. Geschwür in der rechten Hemisphäre; die Umgebung erweicht.

bb) Nach Kopfverletzung.

433. Lallemand II. p. 33. Nach einem Falle auf die Stirn; das kleine Hirn sehr roth; in seiner rechten Hemisphäre ein Balgeschwür von der Größe eines kleinen Hühnereys; die Farchen darüber verwischt; das Zell mit der Spinwebhaut durch ein Pseudomembran verwachsen; die Seitenhöhlen sehr erweitert; Tod nach 2 Monaten.

c) Am Großhirnstamme und Stammlappen. aa) Von innern Ursachen.

434. Edinburger Commentarien II. S. 286. Beyde Schlägel an der Oberfläche dunkelroth; in ihrem untern und hintern Theile grünlicher, stinkender Eiters; Scheidewand, Gewölbe und Wände der dritten Höhle weich und grünlich, stinkend; im rechten Unterlappen ein Geschwür mit 2 Unzen grünlich, stinkendem Eiter; der linke Streifenbügel auf der Oberfläche entzündet.

bb) Nach Kopfverletzungen.

435. Dan de la Vanterie obs. 11. Steinwurf auf die rechte Schläfengegend; unter dem vordern Theile der linken Seitenhöhle bis zum Trichter herab 1½ Zoll lang und breit erweicht, und zum Theil vereitert; in der linken Höhle 1½ Unze blutiges Wasser, und die Stammganglien vorne mit rothen Puncten, hinten wie gequetscht aussehend; in der rechten Höhle 1 Unze geronnenes Blut; unter und hinter derselben ein großer Blutklumpen in der Hirnsubstanz.

436. Gesner I. S. 473. Ein eiserner Zacken durch das linke Schläfebein, und, wie es schien, in das Gehirn gedrungen und wieder ausgezogen; Splitter in der festen Hirnhaut; die Hirnsubstanz von der linken Höhle bis zur Basis des Schädels in gelblichen Eiter verwandelt; der Streifenbügel

wie ein gangränöser Sack, der 1 Unze dunkelröthliche Jauche enthielt; ein Gefäß darin von einem eingedrungenen Splitter durchschnitten; Tod am 11ten Tage.

d) An den Vierhügeln nach Kopfverletzungen. (Siehe 412).

437. Baldinger IV. 2. St. S. 117. Eiter auf den linken Vierhügeln und auf dem Chiasma; der Tod am 13ten Tage.

438. Tyson in *phil. transact.* 1697. Nr. 228. p. 335. Zwey Monate nach einem Schläge auf den Kopf; die linke Hemisphäre des großen Hirns atternd; der linke vordere Vierhügel von der Größe einer Muscatnuss, Eiter und einen zerreiblichen kalkigen Stein, wie ein Kirschkern groß, enthaltend.

e) In der Zärbel. (Siehe 940).

f) Eiterung in den Seitenhöhlen. a) Von innern Ursachen. (Siehe 159. 419. 454. 457. 542. 586 a. 597. 926).

439. Diemerbroeck lib. III. c. 10. p. 399. ½ Pfund Eiter.

440. Wepfer *hist. apoplest.* p. 394. In allen Höhlen des großen Hirns zäher Eiter; ihre Wandungen angebissen und grau; Boden und Decke der rechten Seitenhöhle durch Eiter zusammengeklebt; die Gefäßhaut strotzend.

441. Frank in *eph. N. G. Dec. II. an. 6.* Dicker Eiter in allen Höhlen des großen Hirns; vor dem Sattel ein Loch im Schädel mit dickem Eiter.

442. Meckel in *ac. de Berlin* 1764. p. 85. Geschwür von der Oberfläche des Gehirns bis in die rechte Seitenhöhle reichend.

443. Morgagni *ep. Part. 4.* In der linken Seitenhöhle.

444. Kopenhagener Societät. S. 322. Eiter in der rechten Seitenhöhle mit angefressenen Winden, und an der Basis des Gehirns; dies ganz zusammengefallen und vom Schädel abstehend.

445. Coindet p. 43. In der rechten Höhle ½ Pfund chokoladenfarbiger Brey, aus Blutklumpen und zerstörter Hirnsubstanz bestehend.

446. Abercrombie S. 34. Eine Unze Eiter in den Seitenhöhlen; gallertartige Masse an der Basis des großen und kleinen Hirns und am verlängerten Marke; eine gelbe Membran zwischen Gefäßhaut und Spinn-

weihenaut an der obern Fläche des großen Hirns, an der untern Fläche der Vorderlappen und am kleinen Hirne.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 59. 97. 189. 415. 460. 462. 596).

447. Mohrenheim II. S. 73. Alle Höhlen voll grünem, stinkendem Eiter; Tod am 8ten Tage.

448. Schumacher S. 338. Nach einem Falle ohne Verletzung des Schädels graue eiterartige Materie auf der linken Hemisphäre und in der linken Höhle; die Wände der Letztern angegriffen; die rechte Höhle fast gänzlich verwachsen; Tod am 12ten Tage.

449. Schaarschmidt III. S. 202. Nach einem Falle viel Eiter in der linken Höhle; Tod nach 4 Wochen.

450. Klein S. 129. Ein Geschwür von der äussern Wunde bis in das linke Hinterhorn; die Zirkel ein zusammengefallener leerer Sack, auf welchem Sand lag; Tod am 28sten Tage.

g) An den Sehhügeln. α) Von innern Ursachen. (Siehe 434. 455. 456. 970).

451. Morgagni *op. XIII. art. 19.* Geschwür im rechten Sehhügel.

452. Ebend. *op. LXII. art. 7.* Geschwür am linken Sehhügel und Streifenhügel.

β) Nach Kopfverletzungen.

453. La Peyronie in *ac. de Paris* 1741 p. 206. Degeneration durch die Augenhöhle in das Gehirn; Eiterung des rechten Sehhügels und Streifenhügels; Tod nach 2 Monaten.

h) An den Streifenhügeln. α) Von innern Ursachen. (Siehe 452. 974).

454. Morgagni *op. V. art. 2.* Im rechten Streifenhügel ein altes Geschwür, welches $\frac{3}{4}$ der Basis des Gehirns einnahm; Eiter in den Höhlen.

455. Wenzel *oerebr. p. 98.* Der rechte Streifenhügel und Sehhügel veretert.

456. Ebend. p. 197. Eben so; die rechte Höhle voll Blut; die Scheidewand zerrissen.

457. Esquirol bey Gall II. p. 287. Beyde Streifenhügel weich, faulig, mit Löchern und Vorrugungen, wie der Boden eines alten Geschwürs; eitriges Wasser in den Höhlen.

458. Lallemand p. 119; Im rechten

Streifenhügel kleine Eiterhöhlen; dergleichen auch im Marke der an ihrer Oberfläche erweichten linken Hemisphäre; trübes milchiges Wasser in den Höhlen und die Membran derselben verdickt und körnig.

459. Tacheron III. p. 471. Beyde Streifenhügel aufgelöst, und im rechten eine Eiterhöhle.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 453).

460. Morgagni *op. XI. art. 4. Fall*; Eiterung des linken Streifenhügels; Wasser und Eiter in der linken Höhle; Tod am 21sten Tage.

462. Caldani in *ital. Bibl. I. 2. St. S. 172.* Nach einem Stosse auf das rechte Scheitelbein; der rechte Streifenhügel fast halb veretert; Eiter in der rechten Seitenhöhle, unter der schwarzen, festen Hirnhaut und in der rechten Trommelhöhle; Tod am 38sten Tage.

463. Petit in *priz de chir. XI. p. 164.* Wunde am rechten untern Augenlide; das Gehirn über der Augenhöhle mit der festen Hirnhaut verwachsen; Eiter auf dem rechten Streifenhügel; Tod nach 3 Monaten.

464. Caldani in *ital. Bibl. I. 2. St. S. 162.* Vor 40 Jahren Fall auf den Kopf, wovon eine bey der Berührung schmerzhafteste Vertiefung im rechten Scheitelbeine geblieben; ein Geschwür 16 Linien im Durchmesser in der rechten Hemisphäre, und der rechte Streifenhügel größtentheils zerstört.

i) Am Trichter.

465. La Peyronie in *ac. de Paris* 1741. p. 204.

k) Am Hirnanhange.

466. Littre in *ac. de Paris* 1707. p. 177. Der Hirnanhang 2 Mal so groß, als sonst, hart, roth, inwendig Eiter von der Größe einer Erbse; der Trichter unten entzündet; die Höhlen voll Wasser.

467. Mursinna's Beobachtg. S. 94. Beinfraß am Keilbeine und an der Basis des Hinterhauptbeins; Sattel und Hirnanhang ganz verzehrt, und an deren Stelle stinkender Eiter; das übrige Gehirn normal; die Höhlen ungewöhnlich leer.

l) Am Balken. Nach Kopfverletzungen. (Siehe 576).

469. La Peyronie *ac. de Paris* 1741. p. 212. Fractur des linken Scheitelbeins;

Splitter auf der festen Hirnhaut; Geschwür im Oberlappen von der Größe eines Hühnereys und bis zum Balken reichend.

470. Ebd. p. 213. Fractur des rechten Scheitelbeins; Geschwür im Oberlappen, welches einen großen Theil des Balkens angegriffen hatte; Tod n. 3 Monaten.

471. Glossy. p. 4. Eiter auf dem Balken;

472. Mursinna Trepanat. S. 98. Eiter von der linken Hemisphäre auf den Balken gesenkt; Tod am 41sten Tage.

m) Am Mantel des großen Hirns. o) An der Oberfläche. as) Von innern Ursachen. (Siehe 840. 964).

473. Abererombie S. 35. Mit vielem Wasser in den Höhlen.

474. Tscheron III. p. 13. Eiterartige Materie in den Furchen; die Randwülste platt; Wasser in den Höhlen.

475. Ebd. p. 14. Die Spinnwebenhaut sehr roth, mit eiterartiger Materie; am Chiasma verdickter Eiter, besonders rechts.

476. Ebd. p. 15. Eiterartige Materie und Wasser unter der Spinnwebenhaut.

bb) Nach Kopfverletzungen. (S. 318. 448).

477. Romberg in Horn's Archiv 1825. I. S. 55. Fall; eine mehrere Linien dicke, wie geschmolzener Talg ausschende Schicht Eiter unter der festen Hirnhaut; die Spinnwebenhaut mit der Gefäßhaut verwachsen; Wasser in den Höhlen; Tod n. 3 Wochen.

478. Pfeuffer in Henke's Zeitschrift 1822. 3. St. S. 90. Fractur des Scheitelbeins; Blut und Splitter auf der festen Hirnhaut; Blut auf dem Zelte; die linke Hemisphäre mit blutigem Eiter überzogen; die Rinde grünlich schwarz; viel Wasser in den Höhlen; die Gefäßgeflechte strotzend; Tod nach 5 Wochen.

479. Bruns in Sandifort thes. III. p. 70. Fall; das Scheitelbein deprimirt; der Schädel caries; ein Theil des Gehirns verkümmert; Tod nach mehreren Jahren.

480. Pfeuffer in Henke's Zeitschrift 1822. 3. St. S. 87. Fall auf das Stirnbein; 2 eiförmige Bälge mit Eiter an der Oberfläche der rechten Hemisphäre; das Gehirn von Blut strotzend; Tod nach 11 Jahren.

481. Wepfer's Beobachtgg. Nr. 17. Mit Zerreißung der festen Hirnhaut; genesen.

482. Simon's 1787. S. 199. Fractur im rechten Stirn-, Schläfe- und Scheitelbeine; genesen.

β) In der Substanz. aa) Von innern Ursachen. (Siehe 416. 425).

483. Spon bey Bonet lib. I. sect. 1. obs. 75. In der linken Hemisphäre ein Balggeschwür; das Felsenbein caries.

484. Wepfer's Beobachtgg. Nr. 96. Geschwür mit stinkendem Eiter in der linken Hemisphäre, nahe an der Seitenhöhle.

485. Lallemand I. p. 394. Geschwür von der Größe eines Hühnereys mit stinkendem Eiter in der rechten Hemisphäre; Wasser und geronnenes Blut in der rechten Seitenhöhle.

486. Ebd. p. 402. Geschwür in der rechten Hemisphäre; Entzündung der Hirnhäute.

487. Bleynie ebd. p. 77. Eben so.

488. Bailly ebd. p. 73. In der rechten Hemisphäre.

489. Abererombie S. 24. Die rechte Hemisphäre fast bis zur Hälfte ihrer Tiefe in stinkender Eiterung.

490. Ebd. S. 27. Eben so; im rechten Sehnhügel ein Klumpen geronnenes Blut von der Größe einer Wallnuß.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 46. 67. 438. 464).

491. Quesnay in ac. de chir. II. p. 141. Ein Schlag mit einer Hellebarde einen Quersfinger tief in das Gehirn; Geschwür in der Rinde; Tod am 40sten Tage.

492. Dease p. 70. Nach einem Schlage auf den Kopf bildeten sich wiederholt Hirngeschwüre; genesen.

n) Am Oberlappen. a) An der Oberfläche. aa) Nach Kopfverletzungen.

x) Ueber der festen Hirnhaut. (Siehe 114).

493. Morgagni LI. 18. Steinwurf auf das Scheitelbein; Eiter auf der festen Hirnhaut; die Hirnsubstanz darunter 1½ Zoll tief blau; Tod am 11ten Tage.

494. Bilguer S. 22. Streifschuß am rechten Scheitelbein; jauchiger Eiter auf der festen Hirnhaut; Tod am 18ten Tage.

495. Ebd. S. 140. Hieb durch das Scheitelbein; genesen.

xx) Unter der festen Hirnhaut und an der Oberfläche des Gehirns. (Siehe 32. 114. 829).

496. Quesnay in *ac. de chir.* II. p. 162. Fractur des linken Scheitelbeins; oberflächliche Eiterung des Gehirns.

497. Dease p. 122. Hautwunde über dem linken Scheitelbeine; Eiterung auf der linken Hemisphäre; Tod am 10ten Tage.

498. Morgagni LI, 14. Steinwurf; Tod am 11ten Tage.

499. Quesnay in *ac. de chir.* I. p. 349. Fissur des Scheitelbeins; Eiter auf und unter der festen Hirnhaut; Tod am 11. Tage.

500. Dease p. 105. Schlag auf das linke Scheitelbein; Eiter auf der linken Hemisphäre; Tod am 15ten Tage.

501. Ebend. p. 131. Fractur am linken Theile des Stirnbeins; der linke Vorderlappen entzündet; am linken Oberlappen in der Rinde und in der Gefäßhaut 2 eiternde Stellen; Tod am 13ten Tage.

502. Schmucker's Wahrnehmungg. 5te Wahrn. Schuß; Tod am 15ten Tage.

503. Clossy p. 4. Schlag auf das linke Scheitelbein; Eiter auf der verdickten Gefäßhaut; Tod am 16ten Tage.

504. Schmucker's Schriften II. S. 275. Fractur u. Depression des linken Scheitelbeins; die linke Hemisphäre schwarz, weich, aufgelöst und mit Eiter bedeckt; Tod am 23ten Tage.

505. Dease p. 138. Fissur im linken Scheitelbeine; Eiter an der festen Hirnhaut, der Gefäßhaut und dem Gehirne; Tod am 20ten Tage.

506. van Lijl in *Haarlemers Maatschappie VIII* p. 257. Fractur mit Verlust von Hirnsubstanz; 2 Unzen Eiter auf dem Gehirne; Tod am 20ten Tage.

507. Schmucker's Wahrnehmungg. 7te Wahrn. Fissur an der vordern obern Ecke des linken Scheitelbeins von einem Schusse; rechts Splitter in der festen Hirnhaut; Eiter auf dem rechten Oberlappen und unter dem rechten Vorder- u. Unterlappen; Wasser in den Höhlen; Tod am 21ten Tage.

508. Morgagni LI, 11. Fall; Eiter auf der Gefäßhaut; die Hirnsubstanz darunter hellbraun; Tod am 40sten Tage.

509. Nollason im *Journ. de med.* XXV. p. 177. Wunde am rechten Scheitelbeine; genesen.

510. Widemann in Loder's Journ. II.

S. 49. Fractur des rechten Scheitelbeins; Zerreißung der festen Hirnhaut; genesen.

511. Wittmann in med. Jahrb. des österr. Staats VI. Fractur und Depression des rechten Scheitelbeins; genesen.

512. Roux in Gräfe's Journ. IV. S. 485. Fractur des Scheitelbeins; nach 5 Jahren weißgelber, dicker Eiter ausgeleert; genesen. bb) Von innern Ursachen. (S. 458, 792).

513. Bonet *med. sept. lib. I. sect. 5. c. 20* Ein Geschwür unter der Mitte des rechten Schläfens von der Sichel bis zum Schläfenbeine; die Gefäße der Haut strotzend; viel Wasser in den Höhlen.

514. Olaus Borich ebend. *sect. 14. c. 20*. Ein Geschwür von der Größe eines Hühnereys mit stinkendem Eiter im rechten Oberlappen; Wasser in den Höhlen.

515. Baader in Sandifort *theat. III* p. 28. Im rechten Oberlappen ein Geschwür wie ein Hühnerey groß, mit gelber, körniger, schleimiger Substanz und bläulichbrother Wandung mit Gefäßen; Rinde und Mark darüber verhärtet.

516. Störck I. p. 110. Der Oberlappen einen Zoll tief brandig; die Höhlen trocken und faltig.

517. Anderson in *ausert. Abhh. für Aerzte XII* S. 710. Ein 1 Zoll tiefes, 2½ Zoll langes, ¼ Zoll breites Geschwür mit steiniger Concretion auf dem Boden.

518. Bang in *act. 100. med. Haen. I* Das rechte Scheitelbein carios; 3 Geschwüre in der rechten Hemisphäre.

519. Walter's anatom. Museum S. 120. Als Ueberbleibsel vormaliger Eiterung eine 1½ Zoll breite, 1 Zoll lange, am Umkreise mit einer Art Zellgewebe besetzte, mit der festen Hirnhaut dicht verwachsene Grube an der Oberfläche.

520. Lallemand I. p. 354. Geschwür im rechten Oberlappen mit 2 Löffeln grünlich gelbem Eiter.

521. Ebend. p. 366. Zwey Geschwüre daselbst; die Spinnwebenhaut entzündet und die Gefäßhaut mit Eiter infiltrirt.

522. Ebend. p. 406. Geschwür im linken Oberlappen.

523. Ebend. p. 611. Geschwür mit drey Unzen Eiter im rechten Oberlappen.

524. Bloyntie ebend. II. p. 75. Ebend.

525. Pariset ebend. p. 40. Im linken Oberlappen ein aus 3 Häuten bestehender Balg, der sich ausschälen liefs, mit grünlichem, stinkendem Eiter.

526. BroUSSAIS ebend. p. 52. Zwey große Balggeschwüre in beyden Oberlappen.

527. Taucheron III. p. 377. Im rechten Oberlappen ein Geschwür, dicht an der Höhle.

528. Ebend. p. 379. Der Schädel carius; der rechte Oberlappen eiternd; gallertartige Ergiefsung zwischen Gefäßhaut und Spinnwebenhaut.

β) In der Substanz. aa) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 17. 41. 62. 66. 69. 72. 76. 88. 469. 470. 472).

529. *Ac. de Paris*. 1700. p. 44. Fall auf den Scheitel; Eiterung der linken Hemisphäre.

530. Petit in *prix de chir.* XI. p. 97. Steinwurf auf den obern hintern Theil des rechten Scheitelbeins; in der Rinde des rechten Oberlappens Entzündung und Eiterung; im Marke 2 Geschwüre von der Größe einer Erbsen; Tod am 11ten Tage.

531. Herpin bey Lallemand I. p. 385. Fractur im rechten Scheitelbein; Geschwür im rechten Oberlappen; Tod am 15. Tage.

532. Delase p. 115. Kothlösung des linken Scheitelbeins; die Gefäßhaut stark entzündet, und in der rechten Hemisphäre ein Geschwür; Tod am 26ten Tage.

533. Quesnay in *ac. de chir.* II. p. 140. Fall auf das linke Scheitelbein; Geschwür in der Hirnsubstanz; Tod nach 4 Wochen.

534. Ducrot bey Lallemand I. p. 386. Stofs; Geschwür im Oberlappen. 4 Linien im Durchmesser, mit rother Umgehung; Tod am 35ten Tage.

535. Diemerbroeck III. III. c. 5. p. 346. Steinwurf auf den obern Theil des rechten Scheitelbeins und Stirnbeins, Geschwür über der rechten Seitenhöhle und zur Seite der dritten Höhle; Tod am 37. Tage.

536. Lallemand I. p. 358. Schufs in das rechte Scheitelbein; feste Hirnhaut und Spinnwebenhaut entzündet; Eiterung im rechten Oberlappen; Tod nach 5 Wochen.

537. Ebend. p. 414. Fall; Geschwür im rechten Oberlappen, 3 Zoll im Umfange

mit erweiterter Umgehung und mit beginnender Bildung eines Balges; Tod am 55. Tage.

538. Metzger's verm. Schriften III. S. 168. Schlag auf die linke Schlafgegend; Balggeschwür über der linken Seitenhöhle mit 3 Unzen Eiter; viel Wasser in den Höhlen; Tod am 93ten Tage.

539. Prochaska *adnot.* I. p. 195. Ein Balggeschwür über der linken Höhle mit erweiterter Umgehung, hatte den linken Schügel und Streifenhügel zusammengedrückt, den linken Oberlappen ausgedehnt und den rechten comprimirt; der rechte Sehnerv abgezehrt; Tod nach 5 Monaten.

α) Am Unterlappen. α) Von innern Ursachen. (Siehe 426. 454).

540. Petit in *ac. de Paris*. 1741. p. 207. 3 Zoll langes, 2 Zoll breites und tiefes Geschwür.

541. Morand I. p. 161. Beinfraks und ein Geschwür in der Hirnsubstanz, so dafs man die Sonde einen Zoll tief einbringen konnte.

542. Schumacher S. 501. Die feste Hirnhaut am linken Felsenbein verhärtet; ein 3 Zoll langes, 1 Zoll breites Geschwür im linken Unterlappen, und ein zweytes im linken Hinterlappen; in den Seitenhöhlen Eiter.

543. O'Brien in *med. chir. Journ.* 1819 Oct. p. 255. Geschwür im linken Unterlappen auf dem cariösen Felsenbein.

544. Brodie bey Lallemand II. p. 126. Im linken Unterlappen auf dem cariösen Felsenbein ein 3 Zoll großes Balggeschwür mit Gefässen im Balge; die Umgehung weich und gelb; 2 Unzen Wasser in den Höhlen.

545. Itard S. 70. Im rechten Unterlappen ein Balggeschwür, dessen Wände verdickte Marksubstanz zu seyn schienen; das rechte Felsenbein carös, und die feste Hirnhaut auf ihm durchlöchert, verdickt und mit dem Gehirne verwachsen.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 85. 507).

546. Le Dran p. 167. Hieb in den linken Unterlappen; dasselbst eine Höhle, welche 3 Unzen Flüssigkeit fassen konnte; Tod am 16ten Tage.

547. Klein S. 151. Zerachmetterung des linken Schlafbeins; ein Balggeschwür

von der Größe eines kleinen Eys, mit grünem, dickem, stinkendem Eiter, härtlichen und schwarzgrauen Wänden, und schwarzen, breyartiger, an die feste Hirnhaut angewachsener Umgebung; Tod am 24. Tage.

548. Abercrombie S. 38. Ein Jahr nach einem Falle auf den Kopf; im hintern Theile des rechten Unterlappens ein großes Geschwür; die innre Fläche des Schädels an der Wölbung rauh, und zwischen ihr und der festen Hirnhaut eine gelbliche Membran.

549. Acrell S. 3. Fractur des linken Schuppenbeins; Abgang von eiternder Hirnsubstanz; genesen.

p) Am Hinterlappen. a) An der Oberfläche, aa) Von innern Ursachen.

550. Vicrac in *Haarlemmer Verhandlungen* XIV. p. 49. Caries des Schädels; eine Unze Eiter unter der festen Hirnhaut.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 1051.)

551. Dease p. 147. Fractur im hintern Theile des linken Scheitelbeins; die Gefäßhaut auf dem Hinterlappen eiternd; Tod in der 5ten Woche.

552. Morgagni *op. LI. art. 27*. Wunde am linken, obern Theile der Lamdanath; Eiter an der Gefäßhaut, die darunter liegende Hirnsubstanz bläulich; Tod am 29sten Tage.

553. Gooch II. p. 12. Fissur im obern Theile des Hinterhauptbeins; Eiter auf der festen Hirnhaut; genesen.

ß) In der Substanz. aa) Von innern Ursachen. (Siehe 265. 542. 583. 782. 1030.)

554. Ac. de Paris. 1754. p. 63. Beinfraß im Schläfebeine; im untern Theile des rechten Hinterlappens ein aus einer äussern, dünnen, glatten, und einer innern, dicken, rauhen, schwammigen, schwarzen Membran bestehender Balg von der Größe eines Hühnereys mit dunkelgelbem Eiter und orangefarber, weicher Umgebung.

555. Andral bey Laticmand II. p. 20. Im rechten Hinterlappen zwey durch einen Fistelgang verbundene, von einer dünnen graulichen Haut gebildete Balggeschwüre von der Größe eines Hühnereys und einer Wallnuss.

556. Ebend. p. 56. Im linken Hinterlappen ein aus einer äussern, fibrösen, und einer innern mucösen Haut bestehender Balg

mit 4 Unzen Eiter, und weicher grünelber Umgebung; die Randwülste platt, die Furchen verwischt; 2½ Unzen Wasser in den Höhlen.

557. Bateman in *Edinburgh med. Journ.* 1805. I. p. 150. Im rechten Hinterlappen ein leicht anzuschwellender, gefäßreicher, dichter, dicker Balg mit 4 Unzen Eiter; viel Wasser in den Höhlen.

558. Ronander in *med. chir. Ztg.* 1822. II. S. 274. Das Gehirn weich, blutreich; Wasser in den Seitenhöhlen; dicker Eiter im Hinterhorne; die Gefäßgeflechte in eine schleimartige Masse mit durchsichtigen Knötchen verwandelt; das Rückenmark weich, mit gelbgrünlichem Eiter umgeben.

bb) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 450.)

559. Morgagni *op. LI. art. 28*. Fall auf die Lamdanath; 1 Zoll tiefe Eiterung im Gehirn; Tod am 23sten Tage.

560. Pyl's Aufsätze VI. S. 105. Steinwurf auf den hintern Theil des Scheitelbeins; der Hinterlappen 3 Linien tief in Eiterung; Tod nach 3 Wochen.

561. Saucerotte in *pr. de chir.* X. p. 372. Fractur im hintern Theile des linken Scheitelbeins; der untre Theil des rechten Hinterlappens vereitert; Tod nach 2 Monaten.

562. Sculteti *armamentarium obs.* 19. p. 217. Hieb auf das Hinterhaupt bis in das Gehirn; im linken Hinterlappen ein Balg mit stinkendem Eiter; Tod nach 6 Monaten.

563. Metzger's Schriften II. S. 192. Fall vor 1 Jahre; der untre Theil des Hinterlappens in graulichen, dicken Eiter verwandelt; die feste Hirnhaut daselbst sehr dick und hart, beynahe knorplig.

564. Meckel in *ac. de Berlin*: 1761. p. 68. Fall vor mehreren Jahren; ein Geschwür vom Hinterhaupte bis zur Seitenhöhle; aus einem vereiterten Gefäße 8 Unzen Blut in die Höhlen und Furchen ergossen.

565. Nobel *de apoplexia ex abscessu cerebri lethali*. Heidelberg. 1790. 4. Fall vor 10 Jahren auf den Hintern, vor 8 Jahren auf den Kopf; Geschwür im rechten Hinterlappen, fast bis zum Zelte; das kleine Hirn von Blut strotzend.

566. Dease p. 122. Depression am obern und rechten Theile des Stirnbeins; Gehirn und Gefäßhaut entzündet und eiternd; Tod am 11ten Tage.

567. Ebend. p. 82. Perikranium am obern linken Theile des Stirnbeins zerrissen; 2 oberflächliche Geschwüre in der Rinde und Eiterung der Gefäßhaut; Tod am 13ten Tage.

568. Sauter in Baldingers Magaz. IV. 2 St. S. 117. Schlag auf den obern und rechten Theil des Stirnbeins; Eiter auf dem Gehirne und dem Chiasma; eine $\frac{1}{2}$ Zoll große Stelle suppurirt; Tod am 13ten Tage.

569. Pyls Aufsätze VII. S. 120. Schlag 2 Zoll hoch über dem linken Auge; Fissur im vordern Theile des Scheitelbeins, der Vorderlappen mit Eiter bedeckt und einige Linien tief verdorben; Tod am Ende der 2ten Woche.

570. Morgagni *op. LL. art. 30.* Wunde auf der rechten Seite der Stirne; Eiter an der Basis; Tod am 14ten Tage.

571. Dease p. 108. Perikranium über dem linken Auge zerrissen; Eiter an der Oberfläche des Gehirns; Tod am 19. Tage.

q) Am Vorderlappen. e) An der Oberfläche.

aa) Nach Kopferletzungen. (S. 437, 507).

572. Dease p. 100. Schlag; die feste Hirnhaut verdickt und gelb; Eiterung auf der Gefäßhaut; Tod am 21sten Tage.

573. Will. Stark S. 99. Stoß an die Stirne; eiterförmiger Stoff auf der festen Hirnhaut; Tod am 28sten Tage.

574. Schmucker's Wahrnehmungen. 1. Wahrn. Streifschuß; Eiter auf der Gefäßhaut; Tod am 28ten Tage.

575. Brown Cheston p. 36. Zerreißen des Perikraniums; die feste Hirnhaut abgelöst und etwas Eiter auf ihr; Tod nach 5 Wochen.

576. Mursinna's Beobachtg. S. 12. Das Perikranium zerrissen; die feste Hirnhaut vom Schädel getrennt und auf ihr 3 Unzen stinkender Eiter; auch Eiter auf der Oberfläche des Gehirns bis auf den Balken; Tod nach 5 Wochen.

577. Ebend. S. 13. 15 Jahre nach einem Falle auf die Stirn Beinfuß des Stirnbeins und Eiter auf der festen Hirnhaut.

578. Dease p. 77. Das Perikranium zerrissen; Eiter auf der festen Hirnhaut; genesen.

bb) Von innern Ursachen. (Siehe 475).
ß) In der Substanz. aa) Von innern Ursachen.

579. Lancisi *de subit. mort.* p. 35. Ein Balgeschwür von der Größe eines Apfels, mit breyartiger Umgebung, und Verdickung der Hienhäute.

580. Fantoni *opusc.* p. 171. Ein Stück vom Vorderlappen verdorben; die Gefäße strotzend; Wasser in den Höhlen.

581. Pringle S. 356. Ein Geschwür von der Größe eines Eys im rechten Vorderlappen.

582. Störck II. p. 250. Der rechte Vorderlappen fast ganz vereitert.

583. Abercrombie S. 22. Zwey Geschwüre im linken Vorderlappen mit 6 bis 8 Unzen Eiter, und eins im linken Hinterlappen.

584. Guerin bey Lallemand I. p. 391. Auf untern Theile des rechten Vorderlappens ein Geschwür, welches durch das Siebbein mit einem Geschwür in der Nase zusammenzuhängen schien.

585. Breschet ebend. p. 7. Ein Balgeschwür mit 3 Unzen grünlich gelbem Eiter im rechten Vorderlappen; der Balg aus einer ziemlich festen Haut gebildet, mit Streifen, die wie Gefäße aussahen, doch mit den Gefäßen des Hirns nicht zusammenhängen.

586. Tacheron III. p. 426. Zwey Geschwüre im rechten Vorder- und Oberlappen mit erweichter Umgebung; Wasser in den Höhlen.

586 a. Duncan in *Edinburgh med. Journ.* Nr. 68. Ein Fall. Im rechten Vorderlappen ein großes Geschwür; die feste Hirnhaut darüber verzehrt; Eiter in den Höhlen, am Rückenmark und an allen Hirnnerven; verflüchtigtes Mark und Halsrückmark erweicht.

bb) Nach Kopferletzungen. (Siehe 27. 54. 55. 98. 100. 101. 106. 107. 108. 823).

587. Hill p. 93. Eine Scheere über dem äußern Augenwinkel eingestochen; $\frac{1}{2}$ Pfund Eiter im Gehirne; Tod am 16ten Tage.

588. Pyls Aula V. S. 102. Steinwurf

auf das linke Scheitelbein; oberflächliche Eiterung des rechten Vorderlappens; Tod am 18ten Tage.

589. Schmucker's Schriften II. S. 273. Schuß auf die rechte Seite des Stirnbeins; Geschwür von der Stirne bis zur Seitenhöhle; die rechte Hemisphäre erweicht; Eiter auf dem Siebbeine; Tod am 18. Tage.

590. Roziert im *Journ. de méd.* XXVII. p. 257. Fractur und Depression; Eiterung des Vorderlappens; Tod am 30sten Tage.

591. L'ouvier S. 25. Fractur; Splitter unter der festen Hirnhaut; diese darüber vernarbt; das obre Ende des Splitters mit der Spinwebenhaut verwachsen, das andre, spitze Ende gegen das Gehirn gekehrt; Balggeschwür im Gehirn; Tod am 41sten Tage.

592. Mursinus Beobachtg. S. 1. Hieb über der rechten Stirnhöhle; die rechte Hemisphäre $\frac{1}{2}$ Zoll tief eiternd; Tod in der 7ten Woche.

593. Schmucker's Schriften I. S. 286 Ein Messer 15 Linien tief in den Vorderlappen gestochen; die Sonde konnte 5 Zoll tief in die Wunde gebracht werden, ohne anzustößen; Tod am 73sten Tage.

594. Walther in med. chir. Ztg. 1816 II. S. 28. Fractur; dickhäutiges Balggeschwür von der Größe eines Hühnerneys mit dickem, stinkendem Eiter; die Umgebung eiterig; Tod nach einigen Monaten.

595. Schaarschmidt III. S. 198. Fall vor sechs Monaten; ein Geschwür von der Größe eines Taubenneys; der linke Sehnerv atrophisch.

596. Ehend. V. S. 99. Unter einer vor 7 Jahren gekommenen und zugeheilten Hühnerwunde des Stirnbeins cariös und ein Geschwür von der Größe eines Hühnerneys, welches sich bis zur Seitenhöhle erstreckte; diese voll Eiter; ein 1 Zoll langer, $\frac{1}{2}$ Zoll breiter Splitter frey auf der festen Hirnhaut liegend.

597. Lallemand II. p. 65. Vor acht Jahren eine Contusion; großes Geschwür im linken Vorderlappen; die Umgebung erweicht und mit einzelnen Körnern.

598. Home in Meckel's Archiv III. S. 116. Wunde im rechten Vorderlappen von einem durch die Augenhöhle eingedrungenen Stücke Kupfer.

598a. Ehend. S. 117. Eiterung bis an das Vorderhirn durch Verletzung der festen Hirnhaut beim Trepaniren veranlaßt.

599. Petit in *ac. de chir.* II. p. 142. Fractur und Depression über dem rechten Auge; Eiter und Hirnsubstanz abgegangen; genesen.

600. Schmucker's Schriften III. S. 126. Wunde in der Mitte des Stirnbeins; Eiter durch die Nase abgegangen; genesen.

Dritte Classe. Abnormitäten der Bildung.

I. Ursprüngliche Bildungsfehler.

a) Hemicephalie. *) Ohne Rückenmark.

601. Rayger in *Eph. N. O. Dec. I.* an. S. obs. 64. p. 107. Anstatt des Gehirns eine rothe Masse mit 2 Höhlen.

602. Liffre in *acad. de Paris*, 1701. p. 90.

603. Faumel ebend. 1711. p. 26.

604. Mery ebend. 1712. p. 38.

605. Valsalva in Morgagni *op. XLVIII.* art. 48. Ohne Wirbelhöhle. Anstatt des Gehirns eine schwammige, wie die Vierhügel gestaltete Masse.

606. Morgagni *ibid.* art. 50. Zwey dicke, braunrothe, weiche Massen mit geronnenem Blute auf der Schädelbasis.

607. Lallemand *observations pathologiques* p. 25. Anstatt des Rückenmarks bloß weißte Knötchen, als Endpunkte seiner Nerven; im Schädel eine schwammige, gefäßreiche Masse mit einzelnen Stücken Gehirn.

β) Mit unvollkommenem Rückenmark.

608. Marcot in *ac. de Paris*, 1716. p. 329. Das Rückenmark so dünn, wie Bindfaden; das Gehirn eine aus Blutgefäßen

und Hydatiden bestehende, weiche, röhliche, schwammige Masse.

609. Prochaska *disquis.* p. 151. Das Rückenmark gelb, welk, platt, durch bloße Fäden in das schwammige, unformliche Gehirn übergehend.

610. Otto *monstr. diag.* p. 11. Das Rückenmark bloß aus parallelen Fäden bestehend; das Gehirn eine kleine, röhliche graue, ungetheilte Masse.

611. Ebend. p. 14. Das Rückenmark aus einzelnen Fäden bestehend; kein Gehirn.

612. Das ganze Rückenmark eine blutige, markige Masse; das Gehirn eine dünne Schicht braunrother, faseriger und brüchlicher Masse; nur ein zirkelförmiger Körper hinter dem platten Sattel ausgebildet.

613. Meckel's anat. phys. Beob. und Unters. 80. Der untere Theil des Rückenmarks eine röhlichweiße Masse, worin ein Knochen in einem Balge, der obere Theil halb zerstört; das Gehirn eine röhliche harte, vorne ungetheilte, hinten durch eine weiche Längenfurche getheilte Masse.

614. Ebend. 93. Das Rückenmark eine Linde dick, weich, röhlich; das Gehirn mit braunrother Masse, worin eine Höhle mit breyigen, unebenen Vorrugungen.

γ) Obere Theil des Rückenmarks fehlend.

615. Ruysch *thes.* VIII, 1. Rückenmark bloß von den unteren Brustwirbeln an vorhanden.

616. Bussiera in *philos. transact.* XXI. Nr. 251. p. 141. Rückenmark erst vom vierten Halswirbel ab vorhanden.

617. Prochaska *adnotatt.* III. p. 165. Rückenmark erst vom dritten Halswirbel ab vorhanden.

618. Ebend. p. 172. Der obere Theil des Rückenmarks häutig und hohl; die Schädelhöhle leer.

619. Rouaut in *ao. de Paris.* 1730. p. 20. Rückenmark erst vom dritten Halswirbel ab vorhanden.

δ) Gehirn in eine rothe, zellgewebige Masse ausgetraut ohne Schädeldecke.

620. Preston in *phil. transact.* XIX. 1697. Nr. 226. p. 457.

621. Monton in *Journal des sçavans.* 1722. *Acad.* p. 186.

622. Saviard *recueil d'obs. chir.* (Paris. 1784.) p. 174.

623. Brisseau in *Sammlg. chir. Bemerkg.* I. S. 202.

624. Haller *opera min.* III. p. 13.

625. Van Doeveren *specim. obs. anat.* (Groning. 1765. 4.) p. 46.

626. Ebend. p. 49.

627. Barrows in *med. chir. transact.* III.

628. Prochaska *adnotatt.* III. 181.

629. Busch Beschreibung menschlicher Mißgeb. S. 15.

630. Otto *monstrorum disquisitio* p. 15.

x) Mit Hydatiden.

631. Harder in *EpA. N. C. Dec. I. ann. 3.* p. 224. Dunkelroth, fleischig, drüsigg, mit Wasserblasen.

632. Romberg in *EpA. N. C. Dec. III. ann. 9. et 10 obs.* 106. p. 197. Schwammige Masse mit Hydatiden.

633. Huxham in *Duncan's med. comment. Dec. II. vol. III.* Masse bloß aus Blutgefäßen und Hydatiden bestehend, aber durch eine Längenfurche und eine Quersfurche getheilt.

xx) Mit herabgesenkter Schädeldecke.

634. Van der Wiel *Cent. I. p. 6.* Schwammige Masse mit Hydatiden auf dem verlängerten Marke.

635. Otto *monstr. disquis.* p. 1. Braunes Gewebe mit breyiger, unformlicher, brauner Hirnsubstanz.

636. Panada p. 59. Schwammige Substanz auf dem verlängerten Marke.

α) Schwammige Masse mit Rudimenten von Gehirn.

637. Wepfer in *EpA. N. C. Dec. I. ann. 3. obs.* 129. p. 205. Am Sattel ein markiger, etwas grauer Körper, wie eine Erbse, und 2 wie Bohnen groß, von welchen das Rückenmark und die Nerven ausgingen.

638. Büttner's Wahrnehmung. S. 110. Zu beyden Seiten des Sattels rothe, hohle Markklumpchen mit dem Ursprünge der Schnerven; der obere Theil des Rückenmarks weich und mit Blut bedeckt.

639. Sandifort *anatomie infantis cerebro destituti.* Lugd. Bat. 1784. 4. In blutiger Masse ein fester, körniger, weißer Körper zu beyden Seiten des Sattels, woraus die Nerven zu entspringen schienen.

640. Klein *descriptio* 4. *monstrorum* p. 12. Markknöpfchen mit einer Höhle und einem Hirnanhange.

f) Rückenmark in ein Rudiment des Gehirns ausgehend. (Siehe 290. 347. 348. 350. 355. 360. 361).

642. Büttner's anat. Wahrn. S. 101! Hirnstamm mit den dritten bis zwölften Hirnnerven; zwey vordere Markklümpchen mit dem Ursprunge der Sehnerven.

643. Mohrenheim's Wiener Beyträge II. 314. Ein kleines Stückchen Gehirn.

644. Bayle in *Journ. de med.* XXF. p. 518. Broyée Masse, wie ein Hühnerrey groß.
645. Lawrence in *med. chir. transact.* F. Markknopf, aus welchem die fünften bis zwölften Hirnnerven entsprangen.

646. Lavergne in Meckel's Archiv IV. S. 309. Verlangertes Mark und $\frac{2}{3}$ des kleinen Hirns.

h) Mit geringerer Abnormität des Gehirns. c) Bey mangelnder Schädelswölbung.

647. Rolof in *acad. de Berlin*, 1761. p. 73. Das Gehirn in unförmlichen Säcken herabhängend.

648. Penchionati in *mém. de Turin*, IV. p. 118.

g) Unvollkommene Ausbildung des Gehirns.

649. Bianchi *storia di due corpi* p. 100. Rückenmark, kleines Hirn und Vierhügel normal; verlängertes Mark u. Brücke schwach entwickelt; im großen Hirne weniger Mark, als graue Substanz; ohne Siegel, Balken, Scheidewand, Gewölbe, Ammonshörner, Zirbel und Gefäßgeflechte; die Sehhügel und Streifenhügel in eine Masse vereint; eine einzige ungetheilte Höhle.

650. Eller in *ac. de Berlin*, 1754. p. 112. Das Gehirn so klein, daß das ganze Stirnbein und der größte Theil der Scheitelbeine und des Hinterhauptbeins leer war; dabey unförmlich, ohne Abtheilungen, ohne Siegel und Zelt; die Rinde platt auf dem Marke liegend; die Pyramiden und Oliven fehlten; das kleine Hirn, seine Schenkel, die Brücke, die Schenkel des großen Hirns, und die Vierhügel eine verworrene Masse; die Seitenhöhlen enge; die Sehhügel weit hinten; die Streifenhügel und das Gewölbe kaum zu erkennen; der Hirnanhang fehlte;

eine rüsselförmige Nase und über derselben ein einziges Auge.

651. Klinkosch in *Diss. Prag.* I. p. 199. Das Rückenmark, verlängerte Mark, kleine Hirn und das VII. bis XII. Hirnnervenpaar normal; die 6 ersten Nervenpaare fehlten in der Schädelhöhle, indem das Keilbein keine Oeffnungen für sie bildete und das durchbohrte Siebbein nach aussen hervortrat als Nase; ansserhalb des Schädels waren die Nerven, namentlich alle Zweige des V. Paares vorhanden; der Stamm des großen Hirns war mit seinen Ganglien, dem Gewölbe und der vordern Commissur vorhanden; übrigens bildete das große Hirn eine ungetheilte Masse ohne Scheidewand und Siegel; die ungetheilte Hirnhöhle enthielt 9 Unzen Wasser und setzte sich in den hohlen Hirnanhang fort, welcher weiche, 1 Linie dicke Wandungen hatte, und von einer sackförmigen Ausdehnung der festen Hirnhaut eingeschlossen, als ein Körper von der Größe einer Wallnuß in der Mundhöhle lag, indem der Trichter durch eine Oeffnung des Sattels ging; die meisten Knochen des Antlitzes, so wie die Muskeln desselben, fehlten; die Nase war eig. Wulst von der Größe einer halben Nuß, ohne Löcher; das rechte Auge fehlte, und das linke war wie eine Hydatis, ohne Iris, Nerven, Muskeln und Thränenorgane; Lippen und Gaumen waren gespalten.

652. Rudolphi in Berliner Akademie. 1813.

II. Atrophie und unvollkommene Entwicklung.

a) Gehirn überhaupt. (Siehe 655. 744).

653. Romberg in Nasse's Ztschr. 1823. 3. Heft. S. 222. Der Schädel 8 bis 12 Linien dick und elfenbeinartig; die Spinnwebenhaut trübe, verdickt, mit salziger Ergießung, Granulationen und Verwachsungen; das Gehirn klein, fest, mit schmutzig weißem Marke; das kleine Hirn hinten ganz flach; 4 Unzen trübes, gelbes Wasser in den Höhlen; die Hirnnerven sehr dick; der sympathische Nerve sehr stark, dick und gelb, mit mehreren knorpelartig harten Ganglien.

b) Verlangertes Mark. (Siehe 654).

c) Kleines Hirn. (Siehe 739. 886. 929).

654. Larrey bey Gall III. p. 119. Die

Hervorragung des Hinterhauptsheins auf der rechten Seite abgehoben; die rechte Hemisphäre des kleinen Hirns niedriger u. gelblich; das Rückenmark und das verlängerte Mark mit ihren Nerven matt weiß; fest und atrophisch; Tod am 30sten Tage.

d) Brücke. (S. 429. 886).

e) Bindehäute. (Siehe 940).

f) Vierhügel (Siehe 940. 980).

655. King in *philos. transact.* 1686. Nr. 183. p. 230. Die Vierhügel klein und eingeschrumpft; in der Zirbel ein Stein; der Hirnanhang halb verzehrt, der übrige Theil hart und spröde; Wasser in den Höhlen und an der Oberfläche; die Gefäße erweitert; das Gehirn schlaff, klein, mit wenig grauer Substanz.

g) Zirbel. (S. 673. 674. 704. 865. 984. 985).

656. Meckel in *ac. de Berlin.* 1764. p. 70. Das Gehirn fest; die Zirbel ohne Sand; Knochen an der Sichel.

657. Wenzel *cor.* p. 317. Die Zirbel ohne Sand.

h) Stammganglien. (Siehe 368—371. 379. 381. 384. 388. 392. 395).

i) Sehhügel. (Siehe 218. 707. 800. 1039).

658. Morgagni *epist.* IX art. 20. An der Oberfläche der rechten Hemisphäre ein Extravasat mit erweichter Umgebung; der rechte Sehhügel klein.

659. Wenzel *cor.* p. 115. Der rechte Sehhügel flach und schmal; der linke ungewöhnlich hoch und lang.

660. Ebd. S. 117. Der rechte Sehhügel flacher und niedriger.

661. Tacheron III. p. 446. Seröse Ergießung an der Oberfläche des Gehirns; am rechten Sehhügel eine Vertiefung von der Größe einer Mandel, und seine Oberfläche daselbst faltig.

k) Streifenhügel (Siehe 218).

662. Wenzel *cor.* p. 102. Der linke Streifenhügel flach, schmal und bleich.

663. Ebd. p. 306. Eben so; mit Extravasat auf der linken Hemisphäre.

l) Hirnanhang. (Siehe 401. 850).

664. Morgagni *ep.* III. art. 6. Der Hirnanhang sehr flach; Blut im Gehirne ergossen.

665. Ebd. *ep.* IV. art. 20. Der Hirn-

anhang ganz klein, kaum zu erkennen; röthliches Wasser in den Höhlen.

666. Ebd. art. 33. Der Hirnanhang fast verschwunden.

667. Ebd. *ep.* IX. art. 20. Sehr klein mit Höhlungen im Gehirne.

668. Ebd. *ep.* XII. art. 2. Klein, bräunlichgelb, abgezehnt, flach, ohne hintern Lappen; triebes Wasser in den Seitenhöhlen.

669. Ebd. *ep.* XXV. art. 10. Eingesunken und abgezehnt; an der innern Carotis gelbe, unebene, morsche Stellen; die Gefäßgeschlechte bleich; das Gewölbe weich; die Scheidewand dünn.

670. Ebd. *ep.* LVII. art. 34. Niedrig und eingesunken; eine Stelle im großen Hirne ausgeartet; kein Wasser in den Höhlen.

672. Ford in *ausrl. Abh.* für Aerzte XIII. S. 376. Eingeschrumpft bey Hirnwassersucht.

673. Wenzel Hirnanhang S. 41. Abgenommen; die Zirbel klein, blaß, weich.

674. Ebd. S. 65. Oben concav; die Zirbel klein und blaßgrau.

675. Ebd. S. 74. Concav; der Sattel eng; die Zirbel groß mit einer Hydatide.

676. Ebd. S. 76. Concav; der Sattel eng; die Zirbel weich; Wasser in den Höhlen.

m) Balken. (Siehe 370. 381. 388. 1066).

677. Greding II. S. 391. Der Balken nur 3 Linien lang.

678. Reil XI. S. 341. Der Balken der Länge nach getrennt, und das Gewölbe bloß an dessen Seitentheilen anhängend; ohne Scheidewand; die Seitenhälften des großen Hirns bloß durch die Vierhügel, die vordere Commissur und das Chiasma zusammengehalten.

n) Mantel des großen Hirns. (Siehe 193. 216. 313. 339. 362. 363. 364. 370-372. 375. 376. 379. 381. 384. 395. 444).

o) Oberlappen.

679. Meckel in *ac. de Berlin.* 1764. p. 79. Der Scheitel in seiner ganzen Länge aussen vertieft; innen vorragend.

p) Hinterlappen. (Siehe 886).

680. Kerkring *spicilleg. anat.* p. 76. Das kleine Hirn frey liegend, nicht vom großen Hirne bedeckt; die Zirbel fehlte; in den Seitenhöhlen saßiges Wasser, und in der rechten ein weißlicher Stein, 13 Gran

schwer; die Hirnsubstanz weik; die Gefäßhaut leicht davon zu trennen.

q) Feste Hirnhaut. (S. 586 a. 855. 1030. 1031).

r) Schädel (S. 309. 393. 875. 1016. 1019. 1031. 1065).

III. Höhlungen.

a) Im kleinen Hirne. (Siehe 1000).

b) In der Brücke. (Siehe 199).

c) In den Stammganglien. (Siehe 193).

681. Wepfer *hist. apoplect.* p. 437. Im Streifenhügel eine Höhlung, deren Wände einander berühren, und aneinander geklebt, doch leicht zu trennen waren; eine andre Höhlung im Sehhügel, und 2 im Hirnmantel.

682. Bährhenda in Hufeland's Journ. XL. 2. St. S. 1. Der rechte Sehhügel und Streifenhügel klein, weik, zusammengefallen; an Extrem tiefe Längsfurchen; in Letztrem eine 7 Linien tiefe, becherförmige, mit Wasser gefüllte Höhlung; in den Gefäßgeflechten Hydatiden; an 2 Stellen der innern Schädelfläche gleichsam aufgetragene Knochenlamellen, und die feste Hirnhaut dazwischen roth; in der Sichel 2 Knochen; in der *Arteria fossae Sylvii* Verknöcherungen; die Spinwebhaut verdickt; die Gefäßhaut lose am Gehirn.

d) Im Sehhügel. (Siehe 199. 682).

e) Im Mantel. (Siehe 134. 145. 273. 667. 681. 876. 960).

f) Im Oberlappen. (S. 150. 202. 242. 818).

683. Pinel in Nasse's Zeitschrift. 1821. 4. St. S. 145. Die Decke der linken Seitenhöhle am Boden fest geklebt, und über derselben eine Höhlung von der Größe eines Hühnereys, mit gelblicher, ölgiger Flüssigkeit und speckigen Wänden; eine ähnliche Höhlung im Hinterlappen.

684. Ebend. S. 149. An den Streifenhügeln Höhlungen mit gelblichem Gerinsel; auf der linken Seite mehr, als auf der rechten.

685. Romberg ebend. 1822. 1. St. S. 129. Am linken Oberlappen nach unten, in der Nähe der *Fossa Sylvii* eine runde Höhlung von der Größe einer kleinen Orange, mit röthlicher, seröser Feuchtigkeit, und einer dunkelbraunen, 2 Linien dicken, mit Gefäßen versehenen Wandung.

686. Clarus in Hufeland's Journ. LL. 4. St. S. 120. Verknöcherung in den Arterien;

Gallert unter der Spinwebhaut; 2 Unzen trübes Wasser in den Höhlen; die Gefäße an den Wänden derselben erweitert; die Zirkel ein mit Wasser gefüllter; durchsichtiger Sack; im linken Oberlappen eine Höhlung von der Größe einer kleinen Wollnuss mit unebenen Wänden und brauner gallertartiger Masse; die Umgebung erweicht.

687. Cruveilhier I. p. 206. Unter der festen Hirnhaut Wasser; unter der Spinwebhaut Gallert; im linken Oberlappen eine Höhlung mit einer festen, nach innen glatten, nach aussen fest anhängenden Membran und 2 Drachmen gelblichem Wasser; die Umgebung gelblich, fest und an einigen Stellen erweicht; eine ähnliche Höhlung weiter nach innen, eine zweyte weiter nach vorne, und eine dritte im Unterlappen; ausserdem frisches Blut ergossen.

688. Ebend. p. 208. Etwas Wasser unter der festen Hirnhaut; der linke Oberlappen eingesunken, und am Eintritte des Hirnstamms in die Hemisphären eine Höhlung, welche eine feste, gelbliche, mit Gefäßen versehene Wandung hatte und ein gelbliches, blättriges, von Wasser durchzogenes Gewebe enthielt.

g) Im Unterlappen. (Siehe 199. 687).

689. Pinel in Nasse's Zeitschrift. 1821. 4. St. S. 151. In jedem Unterlappen eine 2 Zoll lange, 1 Zoll tiefe Höhlung mit röthlicher, fast gallertartiger Flüssigkeit; der Schädel verdickt; an der Gefäßhaut eyweißartige Ergießung.

h) Im Hinterlappen. (Siehe 193. 683).

III. Hypertrophie.

a) Des Gehirns überhaupt.

690. Dessessars in auserl. Abhh. für Aerzte XVII. S. 99. Die Suturen am Schädel eines 13jährigen Knaben verwachsen; als die dicke und, wie das Perikranium ganz lose am Schädel liegende feste Hirnhaut verletzt wurde, drang das Gehirn, welches sehr groß war, mit einer Explosion heraus; das kleine Hirn dicht, fest und ebenfalls sehr groß; die Gefäßhaut lose auf dem Gehirn liegend; Aderknoten im Gefäßgeflechte und in andern Venen; ein Aneurysma an der *Arteria ophthalmica*.

691. Fahnor's Beyträge z. prakt. und gerichtl. A. K. I. (Stendal. 1799). Nach

Abnahme der Schädeldecke hob sich das Gehirn elastisch empor und wurde wenigstens um $\frac{1}{4}$ größer; der Schädel war sehr hart, mit der festen Hirnhaut fest verwachsen, und hatte zwischen Sattel und Hakenkamm mehrere Exostosen; die Riechstreifen fehlten.

692. Nold in Meckel's path. Anat. I. S. 296. Die Masse des Gehirns so vergrößert, daß der Schädel stark ausgedehnt und die Höhlen fast ganz verschwunden waren.

693. Vering in Nasse's Zeitschr. 1820. Bey Abnahme der dicken, mit der festen Hirnhaut verwachsenen Schädeldecke drängte sich das weiche, blutreiche Gehirn gewaltsam hervor.

h) Zirbel. (Siehe 320. 327. 388. 405).

694. Morgagni *op. I. art. 14.* Die Zirbel groß, fest, weiß, sieben Fächer zu haben; das Gehirn blutreich, an der Oberfläche erweicht und mit der festen Hirnhaut verwachsen.

695. Ebendas. *op. XXIX. art. 12.* Die Zirbel groß, kuglich, weiß, fest; die Gefäßflechte gleich.

696. Fantoni *opusc. p. 206.* Die Zirbel groß, weich; Wasser in den Höhlen.

697. Günz p. 239. Zirbel angeschwollen, ungleich, mit 3 erbsengroßen Steinen und 10 Sandkörnern; die Hirnschizanz sehr fest, und an einer Stelle collös.

698. Ehend. p. 240. Die Zirbel ungewöhnlich groß, mit 7 Sandkörnern; Wasser in den Höhlen; die Hemisphären verwachsen, ohne Sichel; in der Gefäßhaut an der Einsenkung der Venen in den Sichelblutleiter weiche zerreibliche Materie.

699. Barrère p. 9. Die Zirbel so groß, wie eine halbe Bohne; die dritte Höhle voll Wasser.

700. Haller *deum. IV. p. 319.*

701. Wenzel *op. p. 53.* Doppelt so groß, als gewöhnlich.

c) Trichter. (Siehe 369. 372. 384. 388).

d) Hirnanhang. (Siehe 344. 340).

704. Wenzel Hirnanhang S. 44. Der Hirnanhang groß, höckerig, roth, mit strotzenden Gefäßen; der vordere Theil ohne weißliche Substanz, der hintere Theil dunkelblau; die Zirbel klein und weich.

e) Verdickung der Scheidewand. (S. 707).

705. Baader in Sandifort *thes. III. p. 34.* Die Hirnhäute entzündet; die Rinde strotzend; am vordern Theile der Sichel ein 1 Linie dicker, 5 Linien breiter, 14 Linien langer Knochen mit spitzem Ende; die Gehirnthelle dick und fest, namentlich die Scheidewand, wo sie am dünnsten war, 2 Linien dick.

f) Verdickung der Spinnwebhaut.

g) Ueberhaupt. (S. 150. 200. 201. 214. 254. 653. 682. 729. 818. 974. 1031. 1070).

706. Romberg in Horn's Archiv 1825. I. S. 52. Gelbliches, trübes Wasser unter der festen Hirnhaut; fast die ganze Spinnwebhaut verdickt, opalfarbig und an mehreren Stellen beutelförmig aufgetrieben; die Höhlen voll Wasser, und ihre Wandung, besonders auf den Streifenhügeln, aufgelockert, sammtartig, röthlichbraun.

707. Derselbe in Nasse's Zeitschr. 1823. 3. St. S. 211. Die feste Hirnhaut strotzend; die Spinnwebhaut sehr trübe und verdickt, mit vielen Granulationen, von denen mehrere rauh und erdig waren; die Randwülste etwas abgeflacht; das Gehirn fest, zäh und blutreich; in der rechten Seitenhöhle drey Unzen trübes, gelbes Wasser, und die Auskleidung verdickt; die Scheidewand straff, dick und zäh; das Gewölbe fest; die Sehhügel äusserst klein; die vordern Vierhügel flach und weich; der Schistren in drey dünne Fäden getheilt; das Chiasma dünn und weich; der Sehnerv atrophisch.

ß) Am Hinterlappen.

708. Ducrest bey Lallemand I. p. 326. Fractur nad Depression auf der linken Seite des Stirnhirns; der rechte Hinterlappen entzündet; seine Spinnwebhaut entzündet, weiß und verdickt; Tod am 11ten Tage.

7) Am Vorderlappen.

709. Theden III. S. 64. Fall auf die Stirne; die Gefäßhaut und Spinnwebhaut entzündet und verdickt; Tod am 11. Tage.

g) Verdickung der Höhlenhaut. (Siehe 201. 364. 371. 453. 707. 739. 928. 1006. 1070).

h) Verdickung der Gefäßhaut. (S. 505. 725. 828. 1067).

i) Verdickung der festen Hirnhaut. (Siehe 79. 80. 278. 345. 563. 572. 690. 961. 1117).

k) Verdickung des Schädels. (Siehe 344. 633. 639. 693. 756. 854. 856).

IV. Erweichung.

- a) Verlängertes Mark. (Siehe 586a).
- b) Am kleinen Hirne. a) Von innern Ursachen. aa) Weichheit. (Siehe 130. 131. 432. 756. 851. 855. 928. 930. 931. 943. 946. 947. 951. 952. 980. 1070).
710. Lancisi *de cutibus mort.* p. 149. Mit Blutergießung in der rechten Hemisphäre des großen Hirns.
711. Chambon p. 594.
712. Greding II. S. 383. Mit Erweichung am obern Theile des großen Hirns.
713. Ebendas. S. 591. Mit Weichheit des Balkens.
714. Baldinger's Journ. II. 2. St. S. 136. Mit Weichheit des Hinterlappens des großen Hirns.
- x) Mit Festigkeit des großen Hirns.
715. Morgagni *ep. I. art. 10.*
716. Ebend. *ep. VIII. art. 4.* Die Schenkkel fest; die graue Substanz weich.
717. Ebend. *art. 15.* Eben so.
718. Ebend. *art. 4.* Mit Wasser in den Höhlen.
719. Ebend. *art. 11.* Eben so.
720. Ebend. *epist. XLII. art. 41.* Eben so.
721. Ebend. *epist. LIV. art. 49.* Eben so.
722. Bang in *comm. Lips. XXVII. p. 201.*
- bb) Auflösung. (Siehe 201. 272. 326).
723. J. Timm's *observationes aliquot anatomico-practicae.* (Bremen 1735. 8.) S. 50. Die Hirnhäute am Felsenbeine vereitert; das kleine Hirn darobst verdorben.
724. Rougier bey Lallemand I. p. 134. Die linke Hemisphäre breyartig.
725. Duncan in *Edinb. med. Journ.* 1821. 3. Fall. Das kleine Hirn erweicht; seine Gefäßhaut gelb, verdickt, gallertartig; das große Hirn weich und weiß.
726. Serres in Magendie *Journ. III. p. 135.* Am Eintritte des rechten Schenkels in die Hemisphäre eine Vertiefung mit ausgearteter, breyiger Substanz; die übrige Hemisphäre fester, als die linke, und ihr Mark gelblich.
- g) Nach Kopferletzungen.
727. Fantoni obs. 9. Fractur und Depression des Scheitelbeins; die Hirnhäute entzündet; das kleine Hirn verdorben; Tod am 19ten Tage.
728. Morgagni *ep. VII. art. 15.*

c) Brücke. (Siehe 742. 751. 956. 971).

729. Parent et Martinet p. 433. Die rechte Seite der Brücke erweicht, und erweichte Stellen im großen Hirne.

730. Laennec *auscultat. med. I. p. 168.* Die ganze Brücke erweicht; eben so der untre Theil des linken Vorderlappens; das übrige große Hirn fest; 4 Unzen Wasser in den Höhlen.

731. Brieheteau in *Journ. compl. 1818.* IV. p. 306. Die Brücke oben ein weißer, unten ein graulicher Brey.

732. Lallemand I. p. 47. Einige erweichte Stellen im linken Theile der Brücke, im rechten Sehhügel und linken Streifenhügel; die Spinnwebhaut entzündet.

733. Ebend. p. 162. Eine erweichte Stelle, von der Größe einer Haselnuß.

734. Solon ebend. p. 158. Die Brücke gelblich, zerfließend; Wasser in den Höhlen und an der Oberfläche; die Spinnwebhaut entzündet.

735. Germain ebend. p. 164.

736. Tacheron III. p. 422. Die Brücke gelblich, breyartig, rechts angeschwollen.

d) Stamm des großen Hirns. (S. 198. 580).

e) Bindearm. (Siehe 143. 739).

f) Vierhügel. (Siehe 756).

738. La Peyronie in *ac. de Paris.* 1741. p. 204. Vierhügel und Zierbel faul.

739. Romberg's Nasse's Zeitschr. 1823. 3. Heft. S. 218. Die Spinnwebhaut trübe, verdickt, mit rauhen Granulationen; die Gefäßhaut strotzend; die Rinde dunkelbraun und gegen das Mark sehr breit; das Gehirn fest und rauh; die Höhlen mit etwas gelblichem Wasser und verdickter Auskleidung; in den Streifenhügeln viel graue Substanz; der rechte Sehhügel um die Hälfte kleiner, als der linke, und hinten erweicht; die vordern Vierhügel weich und platt; die hintern mit den Bindearmen ganz flach, rauh und breyartig; der Hinterlappen erweicht und rauh; das kleine Hirn flach.

g) Sehhügel. (Siehe 154. 157. 187. 201. 209. 732. 739. 751. 753. 756. 803).

740. Morgagni *ep. V. art. 6.* Der linke Sehhügel aufgelöst und mit blutiger Feuchtigkeit durchzogen.

741. Ebend. *ep. IX. art. 18.* Der hintere

Theil beyder Schhügel schwärzlich braun und aufgelöst.

743. Solon bey Lallemand I. p. 138. Der rechte Schhügel weniger weiß und breyartig; ein Theil des rechten Streifenhügels, das Gewölbe, und der linke Oberlappen erweicht.

h) Streifenhügel. (Siebe 145. 154. 157. 172. 173. 186. 187. 188. 201. 203. 204. 209. 215. 436. 459. 432. 742. 743. 800. 805. 931. 974. 976).

744. Willis *de morbis cerebri*, p. 128. Das Gehirn klein; die Randwülste sparsam; Wasser an der Oberfläche und in den Höhlen; die Streifenhügel beynahe breyartig.

745. Ebend. p. 136.

746. Petit in *prix de voir*, XI. p. 165. Der linke Streifenhügel und Vorderlappen in eine Masse wie Weinhefen aufgelöst.

747. Prochaska *adnat*, III. p. 198. Der rechte Streifenhügel ohne Streifen und wie fahler Käse; die Gefäßhaut strotzend.

748. Rochoux p. 175. Der rechte Streifenhügel breyig, grau, ohne Markstreifen, am vordern Theile seiner obern Fläche angefressen; das beschabte Mark gelblich und weich.

749. Ebend. p. 178. 2. des rechten Streifenhügels, der rechte Vorderlappen und ein Stück des Balkens erweicht und breyartig.

750. Lallemand I. p. 15. Der rechte Streifenhügel in eine Masse wie Weinhefen aufgelöst; starke Erweichung im rechten, geringere im linken Oberlappen.

751. Ebend. p. 55. Ein Zoll im rechten Streifenhügel breyig, aussen grünlich gelb, innen dunkelgrün.

754. Parent et Martinet p. 428. Der rechte Streifenhügel vorne erweicht; Arachnitis

755. Ebend. p. 451. Eben so der linke.

756. Hopfengärtner in Hufeland's Journal LI. 4. St. S. 39. Der Schädel sehr dick; die feste Hirnhaut gespannt; im Marke viel rothe Punkte; Schhügel und Streifenhügel breyig aufgelöst; das Gewölbe aufgedunsen und gallertartig; die Gefäßgeflechte ganz blutleer und in weiße Fäden aufgelöst; die Wände der Seitenhöhlen einander herüberdrehend; Vierhügel, Markhügeln und Zirkel in gallertartige Masse aufgelöst; das kleine Hirn weich.

i) Zirkel. (Siehe 450. 676. 738. 756. 767. 768. 773. 984. 993. 1016).

757. Morgagni ep. XXI. art. 24. Die Zirkel von der Größe einer Weinbeere; innen trübes Wasser und etwas gelbliche, schleimige Substanz.

758. Ebend. ep. LXI. art. 2. Groß und schleimig.

759. Greding II. S. 395. Sehr weich, ohne Sand; Hirnanhang ganz weich; Wasser in den Höhlen.

760. Simon's in auserl. Abhh. für Aerzte XI. S. 142. Groß, weich, breyig; die Höhlen voll Wasser.

762. Wenzel ver. p. 53. Die Zirkel ein großer Sack, worin kleisterartige Substanz.

763. Ebend. Blausgrau, breyig.

k) Hirnanhang. e) Weichheit. (S. 759).

764. Greding II. S. 426. Klein und weich.

765. Ebend. S. 442. Eben so.

766. Ebend. S. 437. Zäh.

767. Wenzel *cerebr*, p. 256. Roth, entzündet, weich, mit dicker Lymphe bedeckt; die Zirkel roth entzündet und weich.

768. Ebend. p. 257. Zirkel und Hirnanhang weich und blausgrau.

769. Wenzel Hirnanhang S. 42. Eben so.

770. Ebend. S. 45. Eben so.

ß) Auflösung. (Siehe 655).

771. Bonet *med. septentr. lib. I. sect. 15. c. 7*. Hirnanhang aufgelöst und an ihm einige Knochenstücke; die Höhlen trocken; die Gefäßgeflechte groß und hart.

772. Morgagni ep. IV. act. 19. Der Hirnanhang in gelblichen Schleim aufgelöst, so daß nur ein kleiner, unförmlicher Theil von ihm übrig war; Verknöcherung in beyden Carotiden; Erweiterung der Schenkelarterien.

773. Wenzel Hirnanhang S. 43. Hirnanhang breyig; Zirkel blaß und weich.

774. Nasse zu Abercrombie. S. 73. Hirnanhang zum Theil in honiggelbe Substanz angeteigt.

1) Gewölbe. (Siehe 157. 434. 669. 743. 756. 800. 931).

775. Morgagni ep. VIII. art. 12. Das Gehirn fest.

776. Ebend. ep. XIV. art. 35. Eben so.

777. Ebend. ep. IX. art. 9. Die Gefäßgeflechte bleich.

778. Ebend. ep. LXII. art. 15. Mit Wasser in den Höhlen und Scirrhus am kleinen Hirne.

779. Abercrombie S. 19. Gewölbe und Scheidewand breyartig aufgelöst.

780. Ebend. S. 20. Mit Wasser an der Oberfläche und in den Höhlen; Auflösung der Höhlenwandung und Lymphe am kleinen Hirne.

781. Ebend. S. 21. Mit Wasser in den Höhlen.

782. Ebend. S. 26. Mit Eiterung im rechten Hinterlappen und einem Aftergelbe nahe an der Basis.

783. Lallemand I. p. 179. Mit Erweichung des Balkens, Zerstörung der Scheidewand und milchigem Wasser in den Höhlen.

784. Ebend. p. 184. Mit Erweichung des Balkens.

m) Scheidewand. (Siehe 434, 779, 800, 980).

785. Greding II. S. 375. Mitte der Scheidewand und Rand des Balkens breyartig.

786. Bang in Kopenhagener Societät. S. 320. Scheidewand ganz verschwunden bey Wasseranhäufung in den Höhlen.

n) Balken. o) Weichheit. (Siehe 713, 749, 783, 784, 809).

787. Greding II. S. 436. Balken weich, das übrige Gehirn fest.

788. Ebend. S. 441. Eben so.

789. Loder's Journ. IV. S. 167. Eben so.

790. Parent et Martinet p. 425. Mit trübem Wasser in den Höhlen u. erweichten Stellen an der Oberfläche des großen Hirns.

ß) Auflösung. (Siehe 261, 951).

791. La Peyronie in *ac. de Paris*. 1741. p. 210. Der obere Theil des Balkens fast ganz aufgelöst in dicke, trübige Lymphe.

792. Ebend. p. 211. Der Balken bleich und grau unter einem Geschwür im rechten Oberlappen.

793. Greding II. S. 782. Am Rande breyartig.

794. Ebend. S. 381. Breyartig.

o) Mantel des großen Hirns überhaupt.
a) Von innern Ursachen. (Siehe 214, 219,

224, 658, 671, 694, 714, 725, 729, 750, 837, 851, 944, 975, 995, 1002, 1042).

795. Coin d'et p. 47. Die linke Hemisphäre erweicht; Gallert zwischen Gefäßhaut und Spinnwebhaut.

796. Lallemand I. p. 175.

797. Bricheteau in *Journ. compl.* 1818. IV. p. 303. Mehrere Stellen der Rinde in einen granlichen Brey aufgelöst, zum Theil eiterartig.

798. Duncan in *Edinb. med. Journ.* 1821. 2. Fall. Die rechte Hemisphäre, besonders der vordere und hintere Lappen, weich, breyartig; der Sehhügel mit breyiger Masse bedeckt; Wasser an der Oberfläche.

799. Abercrombie S. 16. An mehreren Stellen 1 Zoll tief erweicht, dunkelroth, gelfärblich.

800. Reil *memorab. clinica. fasc. IV.* p. 15. Die feste Hirnhaut strotzend; auf der rechten Hemisphäre und dem linken Vorderlappen eine $\frac{1}{2}$ Linie dicke Schicht schwarzen, geronnenen Blutes; längs der ganzen linken Hemisphäre ein weißgelber, schmutziger, aufgelöfter Streifen; diese Auflösung erstreckte sich bis über den Streifenhügel, die Skalen des Gewölbes und die Scheidewand; der Sehhügel klein und atrophisch; die rechte Hemisphäre und das kleine Hirn normal.

ß) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 34, 59, 93, 225, 589).

801. Lallemand I. p. 349. Tod am 19ten Tage.

802. E. G. Schmidt *obs. chir. tetras.* Gotting. 1751. 4. Das Stirnbein von einer matten Kugel getroffen; die rechte Hemisphäre kleiner, und wie klare Gallert zerfließend; im kleinen Hirne eine schmutzige, brandig aussiehende Stelle; Tod nach vier Monaten.

803. *Med. chir. Ztg.* 1815. II. S. 118. Vor 20 Jahren ein Fall auf die linke Seite des Hinterhauptbeins; eine Stelle von der Größe eines Gänseys im Marke der linken Hemisphäre in breyartige Masse verwandelt; 5 Unzen Blut in der linken Höhle, besonders im Unterhorne; der hintere Theil des linken Sehhügels wie durch Brand aufgelöst; das linke Ammonshorn verschwunden

und das rechte glatt und von der normalen Gestalt abweichend.

p) Oberlappen. a) Von innern Ursachen. (Siehe 212, 213, 215, 243, 247, 248, 252, 254, 272, 458, 686, 687, 712, 743, 748, 750, 753, 898, 900, 901, 969, 1003, 1008, 1009, 1012).

804. Schaarschmidt III. S. 36a. Ein Zoll groß im rechten Oberlappen erweicht, wie mit Wasser gemischt.

805. *Revue medic.* V. p. 298. Der linke, obre und untere Lappen in Brey aufgelöst; eine 2 Zoll breite, 1 Zoll tiefe Stelle im rechten Unterlappen in gallertartige Masse verwandelt; der untere Theil vom Sehhügel und Streifenhügel erweicht und stark mit Blut unterlaufen.

806. Dan de la Vauterie obs. 5. Ein Theil des rechten Oberlappens breyartig; die Umgebung roth, hart und entzündet; Wasser in den Höhlen.

807. Lallemand I. p. 151. Der linke Oberlappen erweicht, in der Rinde eiterartig; die Hirnhäute angewachsen; 5 Löffel Wasser in den Höhlen.

808. Tacheron III. p. 397. Der linke Oberlappen weich, röthlich gelb, strotzend.

809. Duncan in *Annal. Abh. f. Aerzte* XXVIII. S. 526. Der Oberlappen bis in den Balken ausgeartet und so aussehend, als ob ausgeartete Mark und Lymph abwechselnd mit einander gemengt wären; das linke Hinterhorn erweitert.

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 17. 66. 255. 257. 537. 539).

q) Unterlappen. (S. 261. 265. 544. 800. 805).

810. Coindet p. 97. Die Gegend am Felsenbein entzündet und erweicht; Wasser in den Höhlen.

r) Hinterlappen. a) Von innern Ursachen. (Siehe 201. 269. 270. 272. 326. 714. 759. 888. 1021. 1022. 1028. 1100).

811. Wenzel ed. p. 105. Der linke Hinterlappen in dünnen, röthlichen Brey verwandelt; Nekrose an der linken Seite des Schädels.

812. Dan de la Vauterie obs. 6. 2 Zoll am unteren Theile des linken Hinterlappens in Brey aufgelöst; die Umgebung 2 Linien tief roth.

813. Lallemand I. p. 34. Der linke Hinterlappen erweicht, breyartig, fast zerfließend; in der Rinde des linken Vorderlappens 2 Blutklumpen wie Haselnüsse mit infiltrirter Umgebung.

814. Ebend. p. 166. Der untere Theil des rechten Hinterlappens erweicht, breyig.

815. Tacheron III. p. 275. Die Basis des rechten Hinterlappens erweicht und aufgelöst.

816. Hebréart in *annuaire med. chir.* Sier Fall. Ein Theil des linken Hinterlappens erweicht, breyig, gelb; die Umgebung verhärtet.

β) Nach Kopfverletzungen. (S. 319. 1051).

817. Alb. Guil. Arnold *Diss. sistens fungi medullaris in cerebro inventi exemplum.* Vratisl. 1822. 8. Die Rinde über das Mark überwiegend; im rechten Hinterlappen eine Stelle von der Größe eines Hühnereys breyig weich, mit runden, rothbraunen, erbsengroßen Flecken; mehrere Unzen gelbes Wasser in den Höhlen; das II. und VII. Hirnnervenpaar aussen normal, im Innern gelblich grau.

818. Duncan in *Edinburgh med. Journ.* 1821. Nach einem Falle auf die Stirne das Mark der linken Hemisphäre, vorzüglich des Hinterlappens, weich, gallertartig, bläulich, halbdurchsichtig; im Oberlappen eine große Höhlung mit geronnenem gelber Materie; die Rinde wenig geändert; die rechte Hemisphäre fester, als gewöhnlich; 3 Unzen Wasser in den Höhlen; die feste Hirnhaut mit dem dünnen Schädel wenig, mit der verdickten Gefäßhaut fest zusammenhängend, mit vielen Pacchionischen Körpern.

s) Vorderlappen. a) Von innern Ursachen. (Siehe 249. 282. 284. 579. 586. 730. 746. 749. 900. 1034. 1036. 1040. 1041.)

β) Nach Kopfverletzungen. (Siehe 277. 286. 321. 597. 1050).

819. Lallemand I. p. 146. Fall; Rinde des linken Vorderlappens weich, gelb, breyartig.

820. Winkel in *Harless rhein. Jahrb.* VII. 2. St. S. 142. Fractur des Stirnbeins, Keilbeins, Oberkiefers n. s. w.; der linke Vorderlappen weich und mürbe an der Oberfläche; die feste Hirnhaut an ihm zerissen und entzündet; die Gefäßgeflechte

bleich, und im Gehirne nicht mehr Blut, als gewöhnlich; Tod am 5ten Tage.

822. Dease p. 120. Quetschung an der Stirn; der linke Vorderlappen faul; Tod am 12ten Tage.

823. Hoffmann in *Act. Helvet. phys. med. III.* p. 290. Fractur im linken Schläfelbein und Stirnbein; am Vorderlappen Eiter; die Rinde aufgelöst; die Hirnhäute brandig; Tod am 31sten Tage.

824. Sömmerring bey Jäger V. S. 183. Eine Kugel am innern Winkel des rechten Auges herein, und an der linken Schläfe herausgedrungen; der untere Theil des Vorderlappens theils entzündet, theils brandig, theils in halbflüssige, aschgraue Substanz aufgelöst; Gallert unter der festen Hirnhaut; Tod nach einigen Monaten.

825. Prochaska *diagn.* p. 172. Vor mehreren Jahren Kopfverletzungen; dann Anschwellung der Knochen, namentlich Geschwulst und Erweichung der Basis des Schädels; der untere Theil des Vorderlappens mairarbig, aschgrau, breyrartig mit der Knochengeschwulst verschmolzen.

t) Höhlenhaut. (Siehe 174. 183. 193. 706. 780).

u) Gefäßgeflechte. (Siehe 170. 188).

v) Gefäßhaut. (Siehe 936).

w) Feste Hirnhaut. (Siehe 576).

x) Schädel. (Siehe 825).

V. Brand. a) Kleines Hirn. (Siehe 802).

826. Tulpus p. 3. Schuß an das Hinterhauptbein; Fissuren an der innern Tafel; die feste Hirnhaut darunter blau; das kleine Hirn brandig; viel Blut an der Basis ergossen; Tod am 6ten Tage.

b) Oberlappen. u) Von innern Ursachen. (Siehe 835).

827. Störck I. p. 110. $\frac{3}{4}$ Zoll tief brandig; Gallert unter der festen Hirnhaut; die Höhlen trocken.

ß) Nach Kopfverletzungen. (S. 67. 504).

828. Dease p. 111. Quetschung am rechten Scheitelbein; die Gefäßhaut entzündet, eiternd, verdickt, und, wie die Rinde, brandig; Tod am 22sten Tage.

830. Dease p. 96. Quetschung am linken Scheitelbein; einige Stellen der Gefäßhaut und der Hirnsubstanz der linken Hemisphäre brandig und wenige Stunden

nach dem Tode schon sehr stinkend; Tod am 48sten Tage.

c) Unterlappen. (Siehe 547).

d) Hinterlappen.

831. Klein S. 120. Fissur auf der linken Seite des Hinterhauptbeins; unter der Wunde die feste Hirnhaut schwarz und brandig, und die Rinde stark entzündet, mürbe und graulichschwarz; Splitter in der festen Hirnhaut; Pseudomembran unter derselben; dicke Salze unter der Gefäßhaut; viel Wasser in den Höhlen; Tod am 17ten Tage.

832. Quesnay in *ae. de chir.* 71. p. 148. Stoß an den obern Theil des Hinterhauptbeins; die Hirnhäute blau, und die Hirnsubstanz drey Querfinger tief schwarz und brandig; Tod im 4ten Monate.

e) Vorderlappen. (Siehe 191. 824. 1056).

833. Morgagni *ép. Ll.* art. 12. Fall auf die Stirne; Vorderlappen schwarz und stinkend; Tod am 28sten Tage.

f) Hirnhäute. (Siehe 318. 462. 823).

VI. Beinfraß des Schädels.

a) Am Oberlappen. (S. 32. 479. 518. 326).

834. Bilguer S. 85. Hieb in das linke Scheitelbein; Beinfraß in demselben, Exfoliation und Genesung.

835. Eller's *chirurg.* Anmerkng. S. 28. Am linken Scheitelbein eine cariöse Stelle; die feste Hirnhaut u. Rinde daseibst schwarzgrünlich.

b) Am Unterlappen. (Siehe 541).

c) Am Hinterlappen. (Siehe 811. 1024).

836. Quesnay *ae. de chir.* I. p. 377. Fall auf das Hinterhauptbein; Exfoliation und Genesung.

d) Am Vorderlappen. (Siehe 324. 577. 596. 1055).

e) An der Basis. (Siehe 441. 467).

837. Duncan in *Edinb. med. Journ.* Nr. LXXVIII. 6ter Fall. Das Keilbein, die Basis des Hinterhauptbeins und der Carotidencanal cariös; das Gehirn erweicht.

f) Felsenbein. (Siehe 410. 415. 424—426. 428. 483. 543—545. 554).

VI. Abnorme Festigkeit u. Härte.

a) Gehirnssubstanz überhaupt. (Siehe 200. 214. 253. 327. 393. 656. 707. 739. 775. 776. 818. 1017. 1065. 1074. 1112. 1113).

b) Verlängertes Mark. (Siehe 552).

838. Stoll I. p. 186. Das verlängerte Mark so fest, wie Leder; die Rinde des Gehirns braun, blanroth; Hydatiden in den Gefäßgeflechten.

839. Chambon p. 271. Das verlängerte Mark fest; die feste Hirnhaut entzündet; die Gefäßhaut von Wasser angeschwollen, und grüne Gallert unter ihr; Wasser in den Höhlen.

840. Maly in *med. obs. et ing. by a soc. of phys. in London* III. p. 257. Das verlängerte Mark angeschwollen, collös, und seine Häute sehr dicht und fest; die Zungenerven dicht und sehnartig; die Gefäßhaut strotzend mit Hydatiden; an der Sichel etwas Eiter; die Höhlen voll Wasser.

841. Loder in Becholz Beytr. II. S. 233. Verlängertes Mark, Brücke und Schenkel des großen Hirns so zäh und fest, daß man daran das ganze Gehirn in die Höhe ziehen konnte; eine zähe Haut über, und Wasser unter der Spinnewebenhaut; die Hirnarterien mürbe und mit gelben Verdickungen der Wände; viel Hydatiden in den Gefäßgeflechten; 2 bis 3 Löffel Wasser in der dritten Höhle; das Gehirn strotzend, zähe und fest; die Zirkel hart, mit einem großen Klumpen Sand.

842. Portal IV. 111.

843. Hopfengärtner in Hufeland's Journ. I. S. 579. Das verlängerte Mark und die Brücke so fest, wie eine Sehne; das kleine Hirn sehr weich, u. mit wenig Mark; das linke Gefäßgeflecht aus lauter Hydatiden bestehend; 4 Unzen Wasser unter der festen Hirnhaut.

c) Kleines Hirn. (Siehe 431, 875).

844. Littere in *acad. de Paris*. 1705. p. 55. Das kleine Hirn und ein Theil des verlängerten Marks scirrhus, kreisförmig, nur im Innern von normaler Konsistenz; viel Wasser in den Höhlen; das große Hirn weich; die Zirkel knorpelhart; der Hirnanhang eben so, und klein; der Trichter 1 Zoll breit und 2 Zoll tief.

845. Zinn in Haller *Disp.* VI. p. 453. Das kleine Hirn und der hintere Theil des verlängerten Marks scirrhus.

846. Saubourant in *proc. de chir.* XI. Das kleine Hirn fest; der Hinterlappen des großen Hirns noch fester.

847. Meckel in *ac. de Berlin*. 1764 p. 69. Das kleine Hirn ungewöhnlich fest; das große Hirn noch fester; Knochen von der festen Hirnhaut in das Gehirn stehend.

848. Ford in *auserr. Abh. für Aerzte* XIII. S. 273. Das kleine Hirn wie eine scirrhus Brust, einformig, aschgrau, knottig; zwölf Unzen Wasser in den Höhlen.

849. Marshal S. 184. Das kleine Hirn fest; das große noch fester.

d) Brücke. (Siehe 841, 843).

850. Ford in *auserr. Abh. f. Aerzte* XIII. S. 374. Die Brücke scirrhus; der Hirnanhang klein; 8 Unzen Wasser in den Höhlen; Hydatiden in der rechten.

851. Home in Meckel's Archiv III. S. 117. Die Brücke kaum mit dem Messer zu schneiden; der obere Theil des kleinen Hirns sehr weich; im unteren Theile viel erdige Substanz; ein Theil des großen Hirns sehr weich; die Fontanelle weit offen.

852. Portal IV. p. 110. Das verlängerte Mark verhärtet; die Brücke angeschwollen und verhärtet.

e) Großes Hirn. (Siehe 150, 925, 931, 932, 1042, 1091, 697, 841, 866, 926).

853. Hebreart in *annaire med. chir.* Sterb. Fall. Das Gehirn so fest, wie Leber.

854. Pinel *sur l'endoreissement* p. 4. Der Schädel dick, hart, ellenbeinartig; die rechte Hemisphäre eingestunken, mit festem, nur in Fasern zerfallbarem Marke, überwiegend, dicker Rinde, vorne und hinten mit schmalen Randwülsten, und mit sehr kleiner, trockener Seitenhöhle; das Rückenmark in den obersten Rückenwirbeln breyig erweicht.

f) Hirnstamm. (Siehe 841, 1065, 1116).

855. Pinel *sur l'endoreissement* p. 14. Der Schädel dick, ellenbeinartig; die feste Hirnhaut dünn und durchsichtig; die rechte Hemisphäre kleiner, und mit einer nur in Fasern zerfallbaren, umschriebenen Verhärtung unter der rechten Seitenhöhle; das kleine Hirn, besonders in seinem untern Theile, erweicht.

856. Ebend. p. 16. Der Schädel dick, blatteich; die feste Hirnhaut mit den Scheitelbeinen stark verwachsen; unter den Seitenhöhlen, besonders links, eine feste, harte

Stelle; das Rückenmark, besonders an seiner hintern Fläche, fest.

g) Schhügel. (Siehe 922).

857. Marcat in *hist. de Fac. des sciences à Montpellier I.* p. 334. Verlängertes Mark, Brücke, Schhügel, Streifenhügel und Hinterlappen verhärtet.

858. Bergmann in Nasse's Zeitschrift 1823. S. 412. Das Gehirn weich; die Hirnschenkel gelblich; Vierhügel und Sehnerven normal; die Schhügel callös; aus gleichförmiger, gelblicher, fettiger Substanz bestehend.

h) Streifenhügel. (Siehe 922).

859. Greding II S. 372. Der rechte härter, als der linke.

i) Hirnanhang.

860. Petit in *ac. de Paris.* 1718. p. 99. Groß und hart; Wasser in den Höhlen.

861. Greding II S. 379.

862. Ebd. S. 389. Sehr hart.

863. Ebd. S. 404. Klein und hart; der Trichter durch eine zarte Haut verschlossen.

864. Baldinger IV. 2. St. S. 101. Hydatiden und Exostosen.

865. Wenzel Hirnanhang S. 59. Die Zirbel klein.

866. Rudolphi bey Hertel p. 11. Hart, klein, bleich; das Gehirn fest, zäh und mit Attergebilden.

k) Zirbel. (Siehe 841).

867. Kauw in *Nov. Comment. Petropol. I.* p. 356. Die Zirbel wie scirrhös; Wasser an der Oberfläche des Gehirns und in den Höhlen; das kleine Hirn trocken; die Rinde hart, fast scirrhös.

868. Barrère p. 67. Zirbel hart; das kleine Hirn schwarzgelb.

869. Greding II S. 422. Zirbel wie eine große Erbse, und kaum zu verdücken.

870. Meckel in *ac. de Berlin.* 1761. p. 78. Klein und hart.

871. Günz p. 248. Fest und derb.

l) Scheidewand. (Siehe 200. 1166).

m) Balken.

872. Lancisi *de sede anim.* p. 158. Der Balken hirtlich; die Querfasern unscheinbar; die Längsstreifen nicht parallel.

873. Fantoni p. 87.

874. Meckel in *ac. de Berlin.* 1764. p.

69. So hart, daß er mit der Piacette gefaßt werden konnte.

n) Oberlappen. (Siehe 140. 515. 806. 968. 1071).

875. Pinel sur *l'endureissement* p. 8. Der Schädel dünn; die Randwülste breit; die Furchen tief; im großen Hirn 6 Höhlungen, wovon 5 mit einer gelblichen Haut ausgekleidet u. mit häutigen Bündern durchzogen waren und röthliche Flüssigkeit enthielten, nämlich 3 im rechten, 2 im linken Oberlappen und 1 im linken Unterlappen; 2 Verhärtungen wie gekochtes Eyweis, von der Größe der Wallnüsse in linken obern und untern Lappen; das kleine Hirn am hintern und untern Rande fast wie Faserknorpel verhärtet; in seiner linken Hemisphäre ein Extravasat von der Größe einer Haselnuß mit einer in der Bildung begriffenen röthlichen Haut; das Rückenmark fest.

o) Unterlappen. (Siehe 875).

p) Hinterlappen. (Siehe 816. 1076).

876. Anderson in *auscult. Abhh.* für Aerzte. XIII. S. 713. Nach einem Stofse auf den hintern Theil des Scheitelbeins die beyden Hinterlappen entzündet, verhärtet und an die feste Hirnhaut angewachsen.

877. Schweikhard's med. gerichtl. Beobachtg. (Straßburg 1789). III. S. 304. Hinterlappen hart, wie Sand anzufühlen, und mit der verdickten festen Hirnhaut verwachsen.

q) Vorderlappen. (Siehe 888).

r) Gefäßgeflecht. (Siehe 771).

s) Schädel. (Siehe 378. 691. 888).

VII. Verwachsung. A) Ueberhaupt.

a) Hemisphären des großen Hirns. (S. 698).

878. Carlisle in *transact. for the improvement of med. knowledge II.* p. 212. Die Hemisphären nur durch eine $\frac{1}{2}$ Zoll tiefe Längenspalte geschieden; der Balken von der übrigen Masse kaum zu unterscheiden.

b) Seitenhöhlen. (Siehe 440. 448. 685).

B. Verwachsung der Hüte unter einander und mit dem Gehirne.

a) Am kleinen Hirn. (Siehe 1091).

b) Am großen Hirn. (Siehe 19. 214. 477. 655. 694. 818. 896. 899. 1066).

c) Am Oberlappen. (Siehe 807. 1070).

d) Am Unterlappen. (Siehe 543. 547).

- e) Am Hinterlappen. (Siehe 876, 877, 1029).
f) Am Vorderlappen. (S. 282, 463, 1035—1038).

C. Pseudomembranen.

- a) Am kleinen Hirne. (Siehe 453, 446).
b) An der Brücke. (S. 1016).
c) Am großen Hirne. (Siehe 446, 841, 548).
D. Pseudomembranen der Spinnwebenhaut.
a) Uebenhaut.

879. Cruveilhier I. p. 176. Unter der festen Hirnhaut Wasser; unter der Spinnwebenhaut eine weißliche Pseudomembran.

880. Ebd., p. 175. Eben so; die Pseudomembran $\frac{1}{2}$ Linie dick.

- b) Am Oberlappen. (Siehe 517, 974, 1016).
c) Am Unterlappen. (Siehe 1070).
d) Am Hinterlappen. (Siehe 831).
e) Am Vorderlappen. (Siehe 322, 324).

E. Verwachsung der festen Hirnhaut mit dem Schädel. (Siehe 368, 370, 372 a. 691, 693, 856, 971, 1065, 1117).

F. Verwachsung der Suturen. (Siehe 394, 392, 393, 395, 690).

VIII. Aftergebilde A) der festen Hirnhaut.

- a) Am kleinen Hirne.
881. Abercrombie S. 230. Feste, unregelmäßige, mit Gefäßen versehene Geschwulst von der Größe eines Hühnereys, am Zelte; 4 Unzen Wasser in den Höhlen.
882. Ebd., S. 235. Eine der grauen Hirnsubstanz ähnliche Geschwulst am linken Felsenbeine, den V. und VII. Nerven drückend.

883. Pinel in Nasse's Zeitschrift 1821. 4. St. S. 153. Eine faserknorpelige Geschwulst von der Größe einer Nuss in einem eignen Sacke zwischen der festen Hirnhaut und dem Schädel, am Körper des Keilbeins, vorwärts und links vom Hinterhauptloche.

884. Tacheron-III. p. 41. Ein Balg von der Größe einer Wallnuss, mit dicker, weißlicher Materie, unter der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns; 6 Unzen Wasser in den Höhlen.

885. Gall III. p. 137. Eine 2 Zoll im Durchmesser haltende fleischige Masse am Zelte.

886. Arvers in *bulletin de la fac. de med. de Paris*, 1815. Nr. 1, p. 260. Eine

weiße, gefäßreiche Geschwulst, wie ein Ey groß, 1 Unze schwer, von der Farbe und Consistenz des Hirnmarks, an andern Stellen auch grau wie Rinde, an andern speckartig und halbdurchsichtig, und an noch andern mit schwarzen Streifen und halb geronnenem Blute; sie saß mit ihrer Basis auf der hintern Fläche des linken Felsenbeins auf, drang in dasselbe ein, und hatte es zum Theil zerstört; die daranliegenden Theile der Brücke, des kleinen Hirns und des Hinterlappens waren davon zusammengedrückt und abgezehrt.

b) Am großen Hirne.

887. Larrey in *revue médicale VIII*. 2 Schwämme der festen Hirnhaut; von außen nach innen gehender Beinfraß des Schädels.

888. Wishart in *Edinb. med. Journ.* 1822. Der Schädel fest und hart; über dem linken Hinterlappen ein Schwamm mit einer von aussen nach innen gehenden Caries; die darunter liegende Hirnsubstanz weich, dunkel, schwammig; an der Vereinigung der Pfeilnath mit der Kranznath eine ähnliche Geschwulst, ohne Zerstörung der innern Tafel und mit normalem Perikranium; am innern Blatte der festen Hirnhaut eine Menge schwammige, fibröse Geschwülste von der Größe einer Erbse bis einer Wallnuss, in Gruben des Gehirns liegend; in der Rinde des rechten Vorderlappens eine Verhärtung von der Größe eines kleinen Eys; am V. Hirnnerven der linken Seite eine harte, erbsengroße Geschwulst, und an dem der rechten Seite eine Menge kleiner Geschwülste, wie Nadelknöpfe; an beyden Antlitznerven harte Geschwülste, wie kleine Nüsse; ähnliche Geschwülste am Beynerven in der Schädelhöhle; sie schienen in der Hirnsubstanz zu wurzeln; im kleinen Hirne eine Geschwulst von der Größe einer Wallnuss.

c) Am Großhirnstamme.

889. Sabourant in *prix de chir. XI*. p. 96. Ein fleischiger Körper von der Größe eines Hühnereys am linken *processus clinoides*, auf den Schnauern drückend.

890. Schmalz chirurg. u. med. Vorfälle. (Leipzig 1784). S. 152. Eine schwammige Geschwulst des Perikraniums durch

die Kieferkeilbeingrube und Augenhöhle bis an den Sattel sich erstreckend und den Sehnerven drückend.

891. Pfeufer in Henke's Zeitschrift 1822. 3. St. S. 84. 4 Unzen dunkelgelbes Wasser unter der festen Hirnhaut; das Gehirn strotzend und mürbe; auf dem Sattel, wo der Hirnanhang ganz verschwunden war, und auf den Sehnerven lag ein $2\frac{1}{2}$ Zoll langer, 1 Unze 1 Drachme schwerer, birnenförmiger Körper, aus einer osteotomatischen Masse in fibröser Haut mit Gefäßen bestehend.

d) Am Oberlappen. (Siehe 1073).

892. Sand de *fungo cerebri* in Haller *Diss. chirurg. I.* p. 169. Geschwulst von der Größe eines Hühnereys.

893. Louis in *ac. de chir. XIII* p. 1. Eine faustgroße Geschwulst, welche mit dem Schädel nicht zusammenhing und eine Grube im Oberlappen gemacht hatte.

894. Ebend. p. 25. Eine Geschwulst unter dem linken Scheitelbeine, in deren Substanz von allen Seiten Knochen spitzen sich erstreckten; zwey andre unter dem Stirnbeine und Hinterhauptsbeine.

895. Ebend. p. 23. Ebendasselbst.

896. Ebend. p. 66. Ebendasselbst, von der Größe eines Kinderkopfs, mit eindringenden Knochenzacken; die feste Hirnhaut darunter mit dem Gehirne verwachsen.

897. Kaufmann p. 4. Ebend.; schwärzlicher, verdorbener Eiter in der linken Seitenhöhle; die Wände derselben entzündet und vereitert.

898. *Comment. Lips. XVII* p. 126. Ebendasselbst; das Gehirn darunter verdorben.

899. Bander in Sandifort *theor. III.* p. 36. Auf der festen Hirnhaut unter den Scheitelbeinen zwey Geschwülste wie Wallnüsse; das rechte Scheitelbein sah aus, als ob es gebrochen gewesen wäre; daselbst war die feste Hirnhaut mit Schädel und Gefäßhaut verwachsen, und unter ihr ein Knochen, wie eine Linse groß; 2 Unzen Wasser in den Höhlen.

900. Acrel I. S. 36. Ebend.; der linke Oberlappen und Vorderlappen in fauligen Brey verwandelt.

901. Hill p. 89. Unter dem rechten Scheitelbeine eine Lücke im Gehirne von

früherem Hirnschwamme, und 2 Zoll groß in Eiter aufgelöst; Wasser in den Höhlen.

902. Simon's 1789. S. 216. Ebend. Die Geschwulst hatte eine Grube im Gehirne gemacht, die 7 bis 8 Unzen Flüssigkeit fassen konnte.

903. Klein in Gräfe's und Walther's *Journ. III.* S. 614. Ein Schwamm von milchähnlicher Substanz, mit schwammigen Fächern und blutiger Jauche, hatte eine $1\frac{1}{2}$ Zoll tiefe Grube im Oberlappen und eine Oeffnung mit zackigen Rändern im untern Theile des Scheitelbeins und obern Theile des Schuppenbeins gemacht; die rechte Seitenhöhle ganz zusammengedrückt; der Sattel und Hirnanhang ganz zerstört u. bloß die feste Hirnhaut davon übrig.

904. Abercrombie S. 40. Eine theils feste, theils aus weichem Gerinsel bestehende, 5 Zoll lange, $2\frac{1}{2}$ breite, $\frac{3}{4}$ Zoll dicke Geschwulst zwischen den Blättern der festen Hirnhaut über dem rechten Oberlappen.

905. Pigeot in Nasse's Zeitschrift 1821. 4. St. S. 152. Eine 1 Zoll dicke Geschwulst zwischen Schädel und fester Hirnhaut über der rechten Hemisphäre.

906. Wenzel *ver.* 103. Fettige, graue, feste Geschwulst von der Größe eines Hühnereys am rechten Oberlappen.

e) Am Unterlappen.

907. Louis in *ac. de chir. XIII* p. 64. Unter dem linken Schläfebeine, welches größtentheils zerstört war.

908. Schmaucker's Schriften I. S. 246. Ein acht Unzen schweres Steatom an der hintern Fläche des kleinen Winkels des Keilbeins.

f) Am Hinterlappen. (Siehe 894).

909. Marignies in *ac. de chir. XIII* p. 37. Ein Schwamm, der eine Grube im linken Hinterlappen gemacht hatte; der Schädel bis auf die Oeffnung gesund.

910. Louis ebend. p. 57. Ein Schwamm, welcher die Verbindung des Scheitelblatlers mit den Querblättern drückte; der Schädel wie *carrié*.

911. *Journ. de méd. XXII* p. 535. Unter dem hintern Theile des linken Scheitelbeins.

912. Home in Meckel's Archiv III. S. 116. Eine weiche Geschwulst von der Größe

ße einer Haselnufs an der Sichel am linken Hinterlappen.

g) Am Vorderlappen. (Siehe 896. 1044).

913. Louis in *ac. de chir.* XIII. p. 33. Ein Schwamm unter dem untern, rechten Theile des Stirnbeins hatte eine Grube im Gehirne gemacht.

914. Ebd. p. 63. Ein Schwamm über dem Vorderlappen, ein andrer über dem Oberlappen.

915. Ebd. p. 69. An beyden Schläfen und über der Augenhöhle.

916. Brien in *Journ. de med.* XIV. p. 315. 7 scirrhus Auswüchse in der festen Hirnhaut, welchen kleine Gruben im Schädel entsprachen; viel Wasser in den Höhlen.

917. Morand in *Sammlg. chin. Bemerkungen* I. S. 324. Geschwulst von der Größe eines Apfels an der rechten Seite der Stirn.

918. Stoll I. p. 285. Balggeschwulst von der Größe eines Taubeneyns am Sattel.

919. Siebold in *Arneemann's Magazin* I. S. 392. Am obern äussern Theile der Stirne.

920. Gall III. p. 53. Ueber dem linken Auge.

h) Knoten der Spinwebenhaut. (Pachionische Drüsen). (Siehe 150. 217. 282. 633. 707. 739. 818. 928. 966. 1002. 1039. 1058. 1102. 1105).

i) Knoten der Gefäßgeflechte. (Siehe 327. 332. 690. 702. 940. 1070).

B. Aftergebilde am Gehirne.

a) Verlängertes Mark. (S. 935. 948. 1060). 920 a. Lanceli *de anat. mort.* p. 39. Scyrhus am verlängerten Marke unter dem kleinen Hirne.

921. Home in *Meckel's Archiv* III. S. 118. Ein welches Steatom, wie eine Wallnufs groß, an der Rautengrube.

922. Joh. Conrad *de hydrocephalo cum fungo cerebelli coniuncto.* Argentor. 1778. 4. Eine grane, weiche Geschwulst, von der Größe einer Wallnufs, mit Gefäßen, an der Seite der Rautengrube; viel Wasser in den Höhlen und in der Wirbelsäule; Schüdel und Streifenhügel klein und zäh wie Leder.

923. Abercrombie S. 227. An der hintern Fläche des verlängerten Marks eine

mit den Umgebungen wenig zusammenhängende, rothe fette Geschwulst in einem dünnen Sacke, von der Größe einer Wallnufs; eine Verhärtung in der linken Hemisphäre des kleinen Hirns; Wasser an der Oberfläche und in den Höhlen.

924. Salter in *Edinburgh Journ.* XL. 470. In der verhärteten Brücke 2 fleischige Geschwülste, wovon die eine in das verlängerte Mark, die andre in den Schenkel des kleinen Hirns hervortrat; sie waren in Salzsäure vollkommen auflöslich; die Umgebung erweicht; das Gehirn weich und von Blut strotzend; unter der Spinwebenhaut viel trübe, milchige Flüssigkeit mit Fäden.

b) Kleines Hirn. a) An der Oberfläche:

aa) Sechiten. (Siehe 397).

926. Portal *sur l'apoplexie* p. 144. Das kleine Hirn von einer einen Thaler dicken knorpeligen Concretion bedeckt; verhärtete Stellen im großen Hirne; eitrige Flüssigkeit in den Höhlen.

bb) Kugliche Aftergeschilde. (S. 778. 959).

927. Camell in *med. repository* VII. p. 92. Am untern Ende der linken Hemisphäre eine Geschwulst von der Größe einer Wallnufs mit einer Hydatide; auf der andern Seite eine erbsengroße, hellrothe, wie neue Gefäßsubstanz ausgehende Masse; Wasser in den Höhlen.

928. Deslandes bey Parent et Martinet p. 451. Unter dem hintern Theile der linken Hemisphäre zwischen Gefäßhaut und Spinwebenhaut eine Geschwulst von der Größe eines kleinen Eys, aussen mit Hydatiden, innen mit klumpigem, dickem, ausgeartetem Blute und gallertartiger Materie; das kleine Hirn grünlich gelb; die Spinwebenhaut der Rautengrube mit Granulationen; das Felsenbein carös; die Höhlen erweitert, mit wenig Wasser und mit verdickter Auskleidung; Gallert unter der festen Hirnhaut.

929. Nasse Leichenöffnungen I. S. 40. An der untern Fläche der rechten Hemisphäre eine 13 Linien lange, 8 Linien breite, ovale, weißröthliche Geschwulst mit faserigen Wänden, innen hohl und in 3 Räume getheilt mit Wasser; die anliegenden Blätter des kleinen Hirns verdünnt.

930. Parent et Martinet p. 463. Hinten gegen die kleine Sichel zu eine Geschwulst mit weicher, grauer Wandung, und halb durchsichtiger Substanz; das kleine Hirn weich; Arachnitis an der Basis; viel Wasser in den Höhlen.

β) In der Substanz. (Siehe 398. 888. 925. 995. 996. 1001. 1004. 1026).

aa) Verdichtungen.

931. Morgagni ep. LXII. art. 15. Der Wurm und fast die ganze linke Hemisphäre hart, blaß fleischfarbig, wie aus runden, dicht aneinander liegenden Körnern bestehend; die rechte Hemisphäre bloß blättrig, ohne ästige Structur; Streifenlängel, Gewölbe und Balken aufgelöst; viel Wasser in den Höhlen; der Hirnmantelfest.

932. Pyls Aufsätze VII. S. 89. 2 der rechten Hemisphäre so fest, wie frische Wallnuss; das große Hirn fest.

933. Medio. repository VIII. p. 398. Das Zeit und die Oberfläche des kleinen Hirns knorpelig; das Rückenmark verhärtet.

934. Abercrombie S. 245. Die linke Hemisphäre scirrhus, die rechte eiterartig aufgelöst; eine feste, weiße Geschwulst über dem Chiasma; in den Höhlen 1 Pfund Wasser.

935. Hehreart *anatomie med. chir.* Erster Fall. Die Wände der Rautengrube und das kleine Hirn 1 Linie tief gelblich und speckig.

bb) Umschriebene Aftergebilde mit fester Substanz.

936. Ebend. Zweyter Fall. Eine 5 Linien breite, mehrere Linien tiefe Stelle im untern Theile der rechten Hemisphäre, hart, gelblich, speckig; die Gefäßhaut darüber zerstört, und die feste Hirnhaut gelb.

937. Lancisi de paludum effusis lib. II. ep. 3. c. 6. p. 218. Eine zwey Finger breite, weiße, harte, aus mehreren Klumpen zusammengesetzte Stelle.

938. Brisseau in Sammlung chir. Bemerkg. I. S. 198. In der Mitte des kleinen Hirns eine gelbliche, sehr harte Balggeschwulst von der Größe eines Hühnerneys; in den Höhlen viel Wasser; die Gefäße strotzend.

939. Planque bibl. III. p. 348. Eine in-

nen harte, aussen weiche Stelle von der Größe eines Taubenys.

940. La Peyronie in *ac. de Paris* 1741. p. 208. Eine harte Geschwulst von der Größe eines Hühnerneys, mit den Gefäßgeflechten der vierten Höhle zusammenhängend, und aus harten Klumpen bestehend, wovon einige einen eiternden Kern hatten; vom kleinen Hirne war bloß der peripherische Theil als eine 1 Linie dicke, schmierige Haut vorhanden; seine Schenkel, so wie die Bindearme und Vierhügel, waren von der Geschwulst gedrückt und atrophisch; die Zärbel 4 mal so groß, als sonst, und mit grauem Eiter gefüllt; der Hirnanhang angeschwollen, und die Corotiden unter seinem Drucke ausgedehnt; in den Seitenhöhlen viel dickes Wasser; ihre Gefäßgeflechte voller Knoten; die Gefäße strotzend.

941. Haller *opera minora* p. 282. Ein großer Scirrhus in der linken Hemisphäre, gleichförmig, dicht, faserig, ohne Gefäße.

942. Meier in Baldinger's Magazin IV. 1. St. S. 1. Eine Verhärtung von der Größe eines Taubenys; 8 Unzen röthliches Wasser in den Höhlen; die Gefäße strotzend.

943. Kölpin p. 86. Eine Verhärtung von der Größe einer Haselnuss in der linken Hemisphäre, und 3 in der rechten, wovon die eine wie eine Wallnuss groß war; die Umgebung eiternd; viel Wasser in den Höhlen.

944. Ebend. S. 89. 4 einförmige, weiße, knorpelige Stellen; von der linken Hemisphäre war nur noch 2, von der rechten die Hälfte übrig; das große Hirn sehr weich; viel Wasser in den Höhlen.

945. Hutchinson in Horn's Archiv 1821. I. S. 376. Verhärtung in der linken Hemisphäre; Verküsterung am Zelte.

946. Brunn ebend. 1823. I. S. 122. In einer Eiterhöhle ein knorpelig harter, grauer, schillernder Knoten, wie eine Wallnuss groß; Wasser in den Höhlen.

947. Rochoux p. 151. Eine Verhärtung von der Größe einer Haselnuss, wie ein Lungenknoten aussiehend, in der linken Hemisphäre; die Umgebung erweicht; 4 Unzen Wasser in den Höhlen.

948. Merot in anat. Abh. f. Anat. XXIV. S. 26. In der linken Hemisphäre ein Knoten; ein andrer von der Größe einer

Wallnufs hinter dem verlängerten Marke, mit den benachbarten Theilen wenig zusammenhängend, fettig, rosenroth, mit Gefäßen durchzogen; Gallert auf dem großen Hirne; die Randwülste platt; 2 bis 3 Unzen Wasser in den Höhlen.

949. Ebd. S. 32. Im obern Theile der linken Hemisphäre ein mit den Umgebungen wenig zusammenhängender Knoten wie 2 Taubeney groß; am rechten Oberlappen des großen Hirns ein gelblicher, fester Knoten von der Größe eines Taubeney, in dünner, röthlicher Haut; 3 Unzen Wasser in den Höhlen.

950. Rudolphi in *ad. Bogisl. Hertel Diss. de cerebri et meningium tumoribus*. (Berol. 1814.) p. 6. In der linken Hemisphäre unten 1, oben 2 Knoten, 1 Zoll breit, 1½ Zoll lang.

951. Nasse zu Abercrombie S. 8. In der linken Hemisphäre ein ovaler, harter, weißröthlicher Kern, 15 Linien lang, 10 Linien breit, aus abwechselnden Schichten von Eyweissstoffe und kohlensaurem Kalke bestehend; die Umgebung speckartig und eiternd.

952. Itard p. 78. Mehrere kleine Schirben. cc) Aftergebilde mit Auflösung.

953. Recamier bey Parent p. 456. Im obern Theile der linken Hemisphäre ein Beutel von der Größe eines Hühnereys mit grünlichem Eiter; viel Wasser in den Höhlen.

954. Hebreart in *annuaire med. chir.* 3ter Fall. Die untere Fläche der linken Hemisphäre 4 Linien tief, gelb und gallertartig, mit festen, glatten Wänden, wie bey einem Balge; das Gehirn von Blut strotzend; viel Wasser in den Höhlen.

955. Laugier in Nasse's Ztschr. 1823. S. 498. Ein Sack, worin 3 weiche, ovale Körper, von der Größe der Taubeney, eiternd.

c) Brücke. a) An der Oberfläche. (S. 924).

956. Coindet p. 98. Ein Körper von der Größe einer Bohne, an der linken Seite der Brücke; die angrenzende Stelle weich und der Eiterung nahe; 4 Unzen Wasser in den Höhlen.

957. Yelloly in *med. chir. transact.* I. p. 181. Ein Körper von der Größe einer Haselnufs, wie eiternd, an der linken Seite

der Brücke, drückte den VI. Nerven und die Pyramide.

958. Parent p. 439. An der rechten Seite der Brücke perlweisse, zerreibliche, wie Reibrey aussiehende Materie ohne Gefäße und Zellgewebe; eine ähnliche Substanz am Chiasm; Eiter in den Seitenhöhlen, Erweichung der Oberfläche des Mantels.

959. Mitivie ebd. p. 467. Ein Tuberkel an der Brücke; eias an der Oberfläche des kleinen Hirns, und 2 von der Größe der Haselnüsse an der Seite des rechten Vorderlappens; viel Wasser in den Höhlen; Arachnitis an der Basis.

960. Kelen S. 91. Die Brücke mit geronnenem Blute und knorpelartiger Substanz bedeckt; in den Seitenhöhlen ein 1½ Unzen schwerer, aus Knorpel u. geronnenem Blute bestehender Körper; in der rechten Hemisphäre ein leerer Sack, wie eine Wallnufs groß.

β) In der Substanz.

961. Serres in Magendie *Journal* III. p. 139. Verhärtung am Austritte des V. Nerven; linke Hemisphäre des kleinen Hirns erweicht.

962. Horn im Archiv 1813. I. S. 238. An der rechten Seite der Brücke eine Verhärtung, wie ein Taubeney groß, die an mehreren Stellen eiterte; Eiterung in der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns bis in das verlängerte Mark.

963. Home in Necker's Archiv III. S. 116. Ein talgähnliches Aftergebilde von der Größe einer Wallnufs; 4 Unzen Wasser in den Höhlen.

Kern des großen Hirns.

d) Großhirnstamm. (Siehe 934. 987).

e) Seitenhöhlen. (Siehe 9060. 1012).

964. Brown Cheston p. 142. In den Höhlen viel Wasser; im Vorderhorne ein dicker Schwamm; die feste Hirnhaut verdickt und Eiter auf ihr.

965. Galli in *atti dell' accademia di Siena* II. p. 210. In der rechten Höhle ein dichter, aschgrauer Körper mit ungleicher Oberfläche, von der Größe eines Hühnereys; die Hirnhäute entzündet.

966. Farloni *rivista obs. med. andr.* (Sens. 1769) I. p. 49. In der linken Höhle eine Balggeschwulst mit klebriger, eyweis-

artiger, gelblicher Materie; an der festen Hirnhaut erbsenförmige Geschwülste und variköse Gefäße.

967. Vallisneri in *eph. N. C. Cent. VIII. appendix* p. 72. In der rechten Höhle eine Geschwulst von der Größe einer Muscatnuss mit blandlicher Materie.

968. Schmücker's chirurg. Schriften I. 247. 3 Unzen geronnenes Blut in der rechten Höhle, in der linken eine Geschwulst, wie eine Muscatnuss groß und wie graue Substanz aussehend; das Mark des linken Oberlappens verhärtet; die Rinde gallertartig.

f) Schlägel. (Siehe 1006).

969. Schallgruber's Aufs. u. Beobachtg. im Gebiete der Heilkunst. (Grätz, 1816). S. 59. Auf dem rechten Schlägel eine 2 Zoll große Geschwulst, welche bis in den Oberlappen reichte, wo die Hirnsubstanz erweicht war und große Sandkörner enthielt.

970. Tacheron III. p. 381. Im rechten Schlägel eine Balggeschwulst von der Größe einer Nuss mit eitrigem Kerne; sie reigte in die dritte Höhle herein.

971. Rose in *London med. repos.* XI. p. 32. Die feste Hirnhaut fest am Schädel; Gehirn und Häute strotzend; auf den Schlägeln 2 in die Quere gehende ovale Erhabenheiten; das *tuber cinereum* sehr weich; das kleine Hirn am hintern Rande der obern Fläche entzündet; die Brücke, besonders auf der linken Seite, erweicht.

g) Streifenhügel. a) An der Oberfläche.

972. La Peyronie in *acc. de Paris*, 1741. p. 205. Ein harter Körper von der Größe einer Bohne auf dem rechten Streifenhügel; in Letztem die graue und weiße Substanz verwischt.

973. Morgagni *opist.* I. art. 11. Eine rothe Geschwulst, wie eine Bohne groß, auf der Mitte des linken Streifenhügels; dieser rauhlich und etwas eingesunken; der rechte gelblich und well.

974. Blüke in *med. repository* 1822. Mark. Blut über und unter dem rechten Hinterlappen; einige verdickte Stellen der Spinnwebhaut; auf dem linken Oberlappen etwas geronnene Lymphe; in den Höhlen trübes, röthliches Wasser; der rechte

Streifenhügel hart, mit einem Anstruche von der Größe einer großen Erbsen, in dessen Mittelpunkte Eiter war; in dem erweichten linken Streifenhügel ein Geschwür. ß) In der Substanz.

975. Nasse in Abercrombie S. 1. 21 kleine, runde, erbsengroße Geschwülste in den Streifenhügeln und an der Oberfläche des Gehirns, aus einer kussern lockern Hülle, dann aus einer dichten Masse, und einer innern Höhlung mit blafgrünlicher Feuchtigkeit bestehend; die Umgebung weich und breyig.

976. Tacheron III. p. 415. Im vordern Theile des linken Streifenhügels ein weicher, gelbröthlicher Balg von der Größe einer Haselnuss, mit erweichter Umgebung.

h) Zirkel.

977. Drelincourt in *Mongeti theat. anat.* lib. IV. c. 2. p. 309. Von der Größe eines Hühnereys und versteinert.

978. Morgagni *op.* VI. art. 12. In der Zirkel ein Körper, wie ein Pfefferkorn, doch nicht steinig oder knöchern.

979. Desportes in *hist. des maladies de St. Domingue*. II. p. 209. Von der Größe eines Eys, schwammig, und f aus einem Balge mit fettiger Substanz bestehend.

980. Blane in *ausert Abh.* I. Aergz. XX. S. 564. Die Zirkel wie eine Muscatnuss gestaltet, außen hart und fest, innen wie weicher Käse; die Vierhügel undeutlich; Gewölbe, Scheidewand und kleines Hirn erweicht; 3 Unzen Wasser in den Seitenhöhlen.

981. Meckel in *Archiv* I. S. 644. Die Zirkel sehr groß, hart, höckerig, innen hohlen und zellig, mit gelbem eiterartigem Schleime umgeben; 4 Unzen Wasser in den Seitenhöhlen.

982. Tübinger Blätter III. S. 51. Die Zirkel sehr groß, aus Wasserblasen von der Größe kleiner Erbsen bestehend, fast ohne allen Sand.

i) Hirnanhang.

983. Wenzel *med.* p. 237. Am vordern Theile des Hirnanhangs 2 Blasen, wie Hirsenkörner groß, mit gelber, gallertartiger Materie; ein ähnliches Bläschen an der großen blafgrauen Zirkel.

984. Wenzel Hirnanhang S. 46. Der Hirnanhang groß, mit einem Bläschen; die Zirbel klein, weich und mit wenig Sand.

985. Ebend. S. 49. Zwischen den Lappen des Hirnanhangs feste, dunkelgelbe Körperchen, wie Hirsenkörner; die Zirbel sehr klein.

986. Kelch S. 110. Der kleine, weiche, rüthliche Hirnanhang enthält unten in einer Höhle 4 grüne, weiche, fast durchsichtige, rundliche Körner, wie Froschlisch, von milchiger Feuchtigkeit umgeben; der Sattel eng und tief.

987. Abercrombie S. 231. Der Hirnanhang 4 bis 5 mal größer als sonst, mit einer Geschwulst zusammenhängend, welche die Größe eines Hühnereys hatte, zwischen den Schreisten lag und sich in die 3te Höhle erstreckte.

988. Ebend. S. 234. Eine Geschwulst von der Größe einer Wallnuß, aus dünner Haut und gelblicher Marksubstanz bestehend, lag auf dem Sattel und drückte die Sehnen; viel Wasser in den Höhlen.

k) Balken:

989. Plater obs. lib. I. p. 12. Eine harte, fleischige Geschwulst in einer eignen Haut mit Gefäßen.

990. Fantoni opusc. p. 87. Eine feste Geschwulst von der Größe einer Wallnuß.

991. Ebend. p. 202. Eben so.

992. Mursinna's Beobachtg. S. 115. Ein aschgrauer, aussen knorpeliger, innen ganz steinerger Körper von der Größe einer Erbse, mitten im Balken.

-l) Ammonshorn. (Siehe 1029).

m) Mantel des großen Hirns. a) An der Oberfläche.

993. Bock in Hammer *tumores morbosum in cerebro obs. nov.* (Lips. 1817). p. 26. In der rechten *Fovea Sylvii* eine große, schirbenartige Geschwulst mit gelben Flocken; auch die linke Hemisphäre des kleinen Hirns schirbös; die Zirbel groß und weich; Hydatiden in den Gefäßgeflechten; viel Wasser unter der festen Hirnhaut.

994. Powell in *med. transact.* 7. p. 219. An der rechten Hemisphäre 3 Knoten an der Oberfläche und 1 in der Substanz; einer an der Oberfläche der linken Hemisphäre.

995. Hebréart in *annuaire med. chir.* 6ter Fall. Das Gehirn strotzend; am innern Rande der Hemisphären des großen Hirns rothe, callöse Auswüchse; viel Wasser in den Höhlen.

996. Abercrombie S. 226. Eine 1½ Zoll dicke, feste, weiße Geschwulst hing an der Sichel, und hatte im rechten Oberlappen eine Gröbe gemacht; 2 ähnliche, kleinere hing an vornem und hinterm Ende der Sichel; eine vierte lag im Vorderlappen; viel Wasser in den Höhlen; mehrere erweichte Stellen in der Hirnsubstanz.

ß) In der Substanz. (Siehe 411. 792. 866. 975. 994).

997. Fel. Plater obs. lib. I. p. 108. In der linken Hemisphäre ein Knoten, größer als ein Ey, 14 Drachmen schwer, mit einer festen Haut, innen weiß, fest und gleichförmig.

998. Reil *memorab. obs. fasc. III.* p. 39. Das Gehirn strotzend; die Gefäße der Gefäßhaut erweitert; in der Rinde des großen und kleinen Hirns über 200 runde und längliche, weiß, bläsiggelbe Körper von der Größe einer Linse und Erbse, mit einer einfachen äussern Haut, einer dem Kartoffelfrey an Farbe und Consistenz ähnelnden Substanz und etwas dunklerem Kerne; sie waren aussen glatt und nicht anzuschälen; viele saßen in den Furchen, die meisten an der obern Fläche des großen Hirns, wenige im kleinen Hirne, die wenigsten an der Basis; 6 — 8 Unzen Wasser in den Höhlen bis in die Wirbelsäule sich erstreckend.

999. Andral in Magendie Journ. II. p. 105. An der rechten Hemisphäre die Randwulste platt; an der Seite des rechten Sehügels und Streifenhügels eine 4 Querfinger lange, 2 bis 3 breite und beynahe bis zur Basis herab sich erstreckende Ausartung; höckerig, blaulich, halbdurchsichtig, fest, hin u. wieder zellig mit gallertartiger Feuchtigkeit; an einigen Stellen fest, schmutzig-weiß, mit rothen Streifen; an noch andern rüthlich, breig.

1000. Ebend. p. 110. Mehrere feste faserharte, dem Faserknorpel ähnliche Stellen. In der rechten Hemisphäre des kleinen Hirns kleine Höhlungen und ein Sack von der Größe einer Haselnuß, mit glat-

ten Wänden, welcher kleine, steinartige Concremente enthielt.

1001. Chomel in med. chir. Zig. 1820. I. S. 289. Einige runde Körper, welche an Farbe, GröÙe und Consistenz der Krystalline ähnelten, im großen und kleinen Hirne und im Rückenmarke.

1002. Pidagnel in Magendie Journ. III. p. 247. Ein Knoten im vordern, 2 im obern, 2 im hintern Lappen, in graulichen, dicken Bälgen, die wie seröse Häute aussahen; je größer sie waren, um so weicher waren sie; die Umgebung erweicht; Granulationen an der Spinnwebhaut.

n) Oberlappen. a) An der Oberfläche. (Siehe 949).

1003. Wepfer's Beobachtg. Nr. 143. Auf dem linken Oberlappen eine Geschwulst von der GröÙe eines Hühnerneys, mit dickem, klumpigem Blute und aufgelöseter Umgebung.

1005. Abercrombie S. 239. Zwischen GefäÙhaut und Spinnwebhaut des linken Oberlappens eine weiÙe, sehr feste Geschwulst, wie ein Ey groß, innen mit seröser Flüssigkeit.

1006. Tacheron III. p. 45. 1 Knoten am linken Oberlappen, und einer an der Commissura mollis; die Höhlen mit 4 Unzen Wasser, und ihre Anakkidung etwas verdickt.

1007. Gräfe in dessen Journ. IV. S. 154. Ein Aßergebilde hatte die feste Hirnhaut durchbohrt und das rechte Schellbein verdünnt; in der rechten Seitenhöhle war viel Wasser, und unter dem kleinen Hirne flüssiges u. verdicktes, gelbes Serum.

ß) In der Substanz. (Siehe 968. 1002).

1008. J. J. Huber obs. aliquot. anatom. (Casellid. 1760. 4.) in Sandfort obs. III. p. 299. Hörtlich, kuglich, bräunlich weiß, mit einer eignen Haut, von der GröÙe einer Wallnuß im linken Oberlappen; der Kern der Geschwulst eiterig; die Umgebung erweicht.

1009. Perotti in raccolta d'opusc. scient. e filolog. XLVII. p. 339. Ein harter Körper von der GröÙe einer Wallnuß im rechten Oberlappen; die Rinde des linken Oberlappens fast zerstört.

1010. Meckel in ac. de Berlin. 1764. p.

84. Eine scirrhöse Verhärtung, $\frac{1}{2}$ Zoll lang, $\frac{1}{2}$ Zoll breit, $\frac{1}{2}$ Zoll dick von der GefäÙhaut bis in das Mark des linken Oberlappens sich erstreckend.

1011. Med. chir. transact. IV. p. 188. Eine verhärtete Stelle, größer als ein Hühnerney, ziemlich in gleicher Höhe mit dem Balken; ein Knochen am Siechelblutleiter.

1013. Blane in auserl. Abhh. f. Aerzte. XX. S. 572. Im rechten Oberlappen eine große Höhlung mit einem darin passenden Knoten.

1014. Hnr. Westphal Diss. sistens descriptionem tumore in ventriculo cerebri laterali inserti. Kilon. 1817. 4. Eine Gehirnartige, schwammige, dichte Geschwulst, die sich von der Oberfläche des rechten Oberlappens bis in die Seitenhöhle erstreckte und den rechten SchöÙel drückte.

1015. Pinel in Nasse's Zeitschrift 1821. 4. St. S. 153. Ueber den Seitenhöhlen eine gelbliche, halb speckige, halb durchsichtige Stelle, in deren Mitte eine bräunliche, künftige, schwer zerreißbare Substanz; der Boden der Seitenhöhlen mit graulichen Flocken; das Gehirn fest; Wasser an der Oberfläche.

1016. Rosenmüller in Hammer tumorum in cerebro nov. obs. p. 17. Im linken Oberlappen zwey Steatome wie Haselnüsse, gelblich, ohne eigne Häute; die Hirnhäute darüber durch weißgrünliche, käsige Materie verwachsen und der Schädel dazwischen dünn; 1 Pfund Wasser in den Höhlen; die Sängaden der GefäÙgeflechte aufgetrieben; die Zärbel groß und käsig; der Trichter weiß; an der Brücke eine zähe Ausschwitzung.

1017. Cruveilhier II. p. 80. Das Gehirn fest; im untern Theile des rechten Oberlappens eine in die Seitenhöhle ragende Geschwulst mit einem faserknorpeligen Kerne von der GröÙe eines Taubenneys, und einer graulichen, in die Hirnsubstanz übergehenden äußern Substanz.

o) Unterlappen.

1018. Bulletin de la fac. de med. 1816. Von der GröÙe eines Hühnerneys, bräunlich, speckartig, in einer eignen Haut.

1019. Abercrombie S. 250. Ueber dem linken Felsenbeine, welches $\frac{1}{2}$ Zoll tief

absorbirt war, eine Geschwulst, deren vorderer Theil von der Größe eines Eys, blaßroth, schwammig, gefäßreich, und mit kleinen Eiterhaltenden Blasen besetzt war; der mittlere Theil von der Größe einer Wallnuss, war weiß und beynahe knorpelig; der hintere Theil war wie der vordere, doch nur halb so groß.

p) Hinterlappen. (Siehe 1002).

1020. *Acad. de Paris*. 1754. p. 63. Geschwulst von der Größe eines Hühnereys am rechten Hinterlappen, hatte eine äussere, dünne, und eine innere, rauhe, dicke, schwarze Haut, und enthielt dunkelgelbe, eitrige Flüssigkeit.

1021. Meckel in *ac. de Berlin*. 1754. p. 70. Scirrhus von der Größe einer Nuss im linken Hinterlappen; auf Letztem Blut ergossen; die Umgebung erweicht; Wasser in den Höhlen.

1022. Ebd. 1761. p. 61. Hinter dem linken Hinterhorne ein aus 3 Kugeln bestehendes, 2 Unzen 2 Drachmen schweres Aftergebilde; die Umgebung erweicht; Wasser in den Höhlen.

1023. Daniel S. 142. Harter Knoten, wie eine Wallnuss groß, im linken Hinterlappen; Wasser in den Höhlen.

1024. Har. Palmat Leveling *Diss. de carie cranii militis quondam venet.* Ingolst. 1777. 4. Ein grauer, harter, körniger, aus Lappchen bestehender Knoten; die Umgebung erweicht und die Hirnhäute daselbst fest angewachsen; Beintrags des Schädels.

1025. Walter *obs. anat.* p. 42. Ein 6 Linien langes und breites Concrement im linken Hinterlappen.

1026. Merot in *ausert. Abhh. f. Aerzte* XXIV. S. 26. Ein rother, fettartiger Körper, wie eine Wallnuss groß, in einer feinen Haut, mit den übrigen Theilen wenig zusammenhängend; ein kleineres Aftergebilde im kleinen Hirne; Wasser in den Höhlen und an der Oberfläche.

1027. Home in Meckel's Archiv III. S. 116. Ein Steatom, wie ein Hühnerey groß.

1028. Abercrombie S. 252. Im linken Hinterlappen ein weicher, gefäßreicher Sack mit zwey Unzen dicker, eyweisartiger Flüssigkeit und erweichter Umgebung.

1029. Ebd. S. 252. Am rechten hintern und untern Horne; ein mit dem Ammonshorne zusammenhängender, fester, blaß fleischrother, körniger Körper von der Größe einer Wallnuss; 3 Unzen Wasser in den Höhlen; das Gehirn sehr fest.

1030. Clarke in *Edinb. Journ.* VI. p. 275. Eine harte, 1 Unze grünen Eiter enthaltende Geschwulst lag im linken Hinterlappen, und hing mit dem Zelte zusammen; wo sie das Hinterhauptbein berührte, war die feste Hirnhaut zerstört; 2 Unzen Wasser in den Höhlen.

1031. Tacheron III. p. 380. Eine Geschwulst des linken Hinterlappens, welche die feste Hirnhaut und den Schädel durchbohrte, bestehend aus 5 bis 6 leicht zu trennenden Lappen, war graulich und hart wie ein Faserknorpel, und knirschte unter dem Messer.

1032. Cruveilhier I. p. 300. Die Gefäße strotzend; die linke Hemisphäre weicher; im linken Hinterlappen eine vom Hinterhorne bis zur festen Hirnhaut der Lamina sich erstreckende Geschwulst mit einer äussern, festen und einer innern, weichen, eyweißartigen Haut, und einem fettigen Kerne.

q) Vorderlappen. a) An der Oberfläche.

1033. *Loder anatomica observatio tumoris scirrhus in basi cranii reperi.* Jenae. 1779. 4. — An der Basis des Vorderlappens hing eine 18 Linien lange, 16 Linien breite, und 8 Linien dicke, grau, hart, drüsig aussehende, innen faserige, weiß, harte Geschwulst, welche Gefäße, Gefäßhaut, Mark und Rinde hatte; der Riectstreffen atrophisch, und nur wenig Fäden in die Nasenhöhle gebend, deren Nerven vom V. Paare normal waren.

β) In der Substanz. (Siehe 959. 1002).

1034. Santorini *obs.* p. 51. Eine Hirschnuß groß, fest und gelblich; die Umgebung erweicht.

1035. Morgagni *op.* IX. art. 25. Colosse Stelle an der Basis, mit der festen Hirnhaut verwachsen; Blut unter dem Vorderlappen ergossen.

1036. Röderer *de cerebri scirrhus.* Götting. 1762. 4. Eine 2½ Zoll lange, 21 Linien breite, 16 Linien dicke, aussen röhli-

che, innen grünliche, viele kugliche Körnchen enthaltende Geschwulst, hing mit den Hirnhäuten zusammen, von welchen sie Gefäße erhielt, und reichte bis in die Höhle; die Umgebung erweicht und gallertartig; die Rinde dünn und aschgrau ein Aneurysma der Hirnhautarterie am Scheitelbeine; die Gefäßgeflechte voll Hydatiden; viel Wasser in den Höhlen.

1037. Anderson in auserl. Abhh. für Aerzte. XIII. p. 711. Am innern Theile des linken Vorderlappens eine Verhärtung von der Größe einer Wallnuss, an die verdickte feste Hirnhaut angewachsen; 1½ Unzen Blut in das kleine Hirn ergossen.

1038. Monro ebend. S. 605. Der rechte Vorderlappen dunkelroth, verhärtet, gleichförmig, ohne graue und Marksubstanz, gefäßreich, mit der Basis an das Stirnbein angewachsen.

1039. Bock in Hammer tum. in cerebro obs. p. 24. Im rechten Vorderlappen ein Steatom von der Größe eines Hühnereys, in einer eignen Höhlung, auf deren Wandung es mit einem markigen Stiele saß; die Wand der Höhlung gelblich, mit strotzenden Gefäßen; das Steatom aussen rothbraun, innen gelblich grün und kissig; an einer Stelle zwischen beyden Massen eine kleine Höhlung mit Eiter; Gefäßhaut und Spinnwebhaut an der Basis des Vorderlappens roth und granulös; 6 Unzen Wasser in den Höhlen; Hydatiden in den Gefäßgeflechten; der linke Schbülgel kleiner und ohne Markfasern; der linke Sehnerv dünner.

1040. Rochoux p. 149. Am äussern Theile des linken Vorderlappens eine feste, grauliche, rothbraune, knotige, mit Blut gefüllte, mit den Hirnhäuten zusammenhängende Geschwulst; das Gehirn erweicht; 1 Unze Wasser in den Höhlen.

1041. Med. transact. V. p. 241. Am untern Theile des linken Vorderlappens eine Geschwulst von der Größe einer Wallnuss, inwendig wie eine Saugaderdrüse aussehend; der grösste Theil der linken Hemisphäre weich, breyartig, hellbraun.

1042. Abercrombie S. 245. Eine feste, weisse, flache Geschwulst über dem Chiasma; die linke Hemisphäre hart, wie

ein Scirrhus; die rechte in eine Masse, wie skrophulöser Eiter verwandelt.

1043. Hebréart in *annuaire med. chir.* Vierter Fall. Speckartige Geschwulst, wie eine Nuss groß im rechten Vorderlappen, in einem Balge, der mit der Umgebung innig verbunden war.

1044. Baader in Sandifort thes. III. p. 38. Im rechten Vorderlappen ein fettiger Klumpen von der Größe einer Wallnuss; auf der festen Hirnhaut desselben Lappens 3 Geschwulste, die mit Schädel und Rinde verwachsen waren; der Schädel darüber rauh.

IX. Hirn schwamm.

a) Am großen Hirn überhaupt.

1045. Thackrah in *London med. Journ.* XLV. Fractur; Splitter im Gehirne; Hirn schwamm von der Größe einer Orange; genesen.

b) Am Oberlappen.

1046. Fabricius Hildanus p. 31. Fractur und Depression des rechten Scheitelbeins mit Zerreißung der Hirnhäute; am 21. Tage zeigte sich Hirn schwamm; genesen.

1047. Ebend. p. 29. Fractur des rechten Scheitelbeins; von der 6ten bis zur 10ten Woche Hirn schwamm; genesen.

1048. Quesnay in *an. de chir.* II. p. 150. Fractur des rechten Scheitelbeins; Hirn schwamm in der 3ten und 4ten Woche; genesen.

1049. Grandchamps in Hufeland's Annalen III. S. 1. 3 Monate nach dem Bruche des Scheitelbeins den Hirn schwamm entdeckt; genesen.

1050. Taylor in auserl. Abhh. f. Aerzte XXVII. S. 216. Fractur und Depression am untern Theile des linken Scheitelbeins; 12 Tage darauf die feste Hirnhaut zerrissen, und Hirn schwamm.

c) Am Hinterlappen.

1051. Neale in auserl. Abhh. f. Aerzte XXVII. S. 189. Fractur u. Depression nahe an der Lamdanath; am 10ten Tage Hirn schwamm; die feste Hirnhaut dasselbst veröfthet, mit schwarzen, verdickten Rändern; Blut auf ihr; 2 Unzen dunkle, stinkende Flüssigkeit unter ihr; die Spinnwebhaut verdickt und undurchsichtig; die Hirnsubstanz unter dem Schwamme erweicht und aufgelöst; viel Wasser in den Höhlen;

Fractur in der Schädelbasis; Tod am dreizehnten Tage.

d) Am Vorderlappen. (Siehe 46).

1052. La Peyronie in *ac. de Paris*, 1741. Fractur des Stirnbeins; Hirnschwamm vom 2ten bis 11ten Tage; genesen.

1053. Hill p. 61. Genesen.

1054. Eberd. p. 67. Eben so.

1055. Pearson in auserl. Abhh. für Aerzte XXVII. S. 223. Durch das cariöse Stirnbein hervorgetretener Hirnschwamm am rechten Vorderlappen; in diesem ein Geschwür mit 2 bis 3 Unzen Eiter; einige Unzen blutiges Wasser in den Höhlen.

1056. Nealey ebend. S. 198. Fractur und Depression der rechten Seite des Stirnbeins; Hirnschwamm wie eine Hühnerey groß; die Oberfläche des Gehirns schwarz, unrein, mit Eiter bedeckt; der rechte Vorderlappen brevig erweicht; die Umgebung graublau; 2 Unzen Wasser in den Höhlen und an der Oberfläche; Tod am 27. Tage.

1057. Eberd. S. 193. Fractur und Depression im obern Theile des Stirnbeins; Hirnschwamm am 7ten Tage; genesen.

X. Hydatiden.

a) An der festen Hirnhaut.

1058. Baader in Sandfort thes. III. p. 59. An der festen Hirnhaut mehrere Hydatiden von der Größe der Erbsen, und sehr große Pachionische Körper; über und unter der Gefäßhaut Gallert; in den Höhlen 2 Unzen Wasser; die Gefäßgeflechte mit gelbem Serum, ohne Blut.

b) An der Gefäßhaut. (Siehe 840).

d) Im verlängerten Marke.

1059. Morgagni ep. I. art. 20. Geronnenes Blut am verlängerten Marke; in diesem hin und wieder durchsichtige Körperchen, wie Hirsenkörner groß; viel Wasser in den Höhlen.

1060. Zeder Anleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer S. 320. Viel Wasser in den Höhlen; in der Rautengrube und dritten Höhle zwölf Hydatiden, wovon eine wie ein Hühnerey groß war; in der rechten Wand der Rautengrube eine gelbe Verhärtung wie eine Mandel groß.

d) An den Gefäßgeflechten. (S. 17. 176. 254. 277. 285. 319. 330. 334. 411. 558. 682. 838. 841. 843. 993. 1036. 1039. 1080. 1117).

1061. Wepfer *hist. apoplect.* p. 375. Hydatiden von der Größe einer Erbsen bis einer Haselnuß; blutiges Wasser in den Höhlen; unter der strotzenden festen Hirnhaut viel Wasser.

e) In den Seitenhöhlen. (Siehe 850).

1062. Fracassati in *Mangeti bibl. II.* p. 70. Ein großer Balg mit Wasser.

1063. Wepfer *hist. apoplect.* p. 358. Die Wände der Höhlen rauh und uneben; in der rechten 2 Bäume; wie Hühnerey groß, mit trübem, bräunlichem Wasser; unter der Gefäßhaut Wasser; unter der festen Hirnhaut Wasser und Gallert.

1064. Pyls Aufsätze II. S. 37. Das Gehirn blaß, blutleer, weich; 2 bis 3 Unzen Wasser in den Höhlen; in der rechten eine 1 Zoll große Hydatide.

1065. C. Rendtorf *Dis. de hydatidibus* (Berol. 1822. 8.) p. 36. Der Schädel sehr dünn und mit der festen Hirnhaut fest verwachsen; das Gehirn etwas test, gelblich bleich; die Seitenhöhlen von einer 2 Pfund 3 Drachmen schweren Masse ausgefüllt und ausgedehnt, bestehend aus einer durchsichtigen, fast $\frac{1}{2}$ Linie dicken Haut, welche 71 einzelne Hydatiden, meist von der Größe einer Weinbeere, einschloß, worin *Echinocoeci* saßen; nach oben war die rechte Hemisphäre nur $\frac{1}{2}$ Linie, nach unten 3 bis 4 Linien dick; der Boden der Seitenhöhle war eine fleckige Haut; in der linken Seitenhöhle eine Unze Wasser; die Gefäßgeflechte bleich und blutleer; Nerven u. Hirnanhang normal; die Zirkel ohne Sand.

1) Am Schlägel.

1066. Kaltschmid *de nervis opticis in cadavere latiss inventis*, Janas. 1752. -- in Haller *Disp. path. I.* p. 375. Hydatiden am Schlägel und Sebstreifen bis zum Chiasma; viel Wasser in den Höhlen; der Balken kaum so dick, wie die Scheidewand; $\frac{1}{2}$ Pfund Wasser unter der festen Hirnhaut; diese an mehreren Stellen mit der Gefäßhaut verwachsen; unter Letzterer ebenfalls Wasser; die Gefäße strotzend.

g) Am Streifenbügel. (Siehe 1066).

h) Am Balken.

1067. Panaroli bey Fantoni p. 48.

f) An der Zirkel. (Siehe 675. 982. 983).

k) Am Hirnanhange. (S. 384. 864. 935. 984).

1) Im Mantel des großen Hirns überhaupt.
1068. Home in Moeckel's Archiv III. S. 115. In der Substanz der rechten Hemisphäre eine aus festen Häuten bestehende Blase mit 4 Unzen Wasser.

1069. Marrah in *Med. chir. transact.* XI. p. 260. In einer Grube der rechten Hemisphäre eine 3 Zoll lange, 2 Zoll breite gefäßreiche Wasserblase mit Gefäßen.

1070. Romberg in Nasse's Zeitschrift. 1822. 3. St. S. 195. Der Kopf schieft; die Spinnwebhaut trübe, verdickt, am Scheitel mit der festen Hirnhaut verwachsen; über ihr Lympe, und unter ihr trübe, gelbe, gelatinöse Feuchtigkeit; 4 Hydatiden, mehrere Linien tief in die Rinde eindringend, mit *Cysticercus cellulosus*, nämlich 2 auf der obern, 1 an der untern Fläche der Vorderlappen, und 1 auf dem rechten Hinterlappen; die Membran der Seitenhöhlen verdickt; in diesen etwas gelbliches Wasser; die Gefäßgeflechte varikös und mit vielen kleinen Hydatiden; am rechten Unterlappen ein Pseudomembran, wie ein Groschen groß; die rechte Hemisphäre des kleinen Hirns 3 bis 4 Linien tief grünlich und erweicht.

m) Am Oberlappen.

1071. Fantoni *opusc.* p. 22. An der Oberfläche des linken Oberlappens eine 4 Zoll lange, 2½ Zoll breite Blase mit gelblichem Wasser; die Rinde darunter ausgehöhlt und fest.

1072. Schaarschmidt III S. 363. Eine 1½ Zoll lange Hydatide unter dem Schielblutleiter; viel Wasser unter der festen Hirnhaut.

1073. Baader in Sandifort thes. III. p. 33. Zwei Geschwülste auf der festen Hirnhaut, welche mit der Rinde verwachsen waren und die Scheitelbeine verdünnt hatten; im linken Oberlappen und zum Theil im Vorderlappen Hydatiden mit dicker, schleimiger Lympe; durch die ganze Länge des linken Gefäßgeflechtes lief geschlängelt eine Vene von der Dicke eines Strohhalmes.

1074. Hopfengärtner in Hufelaut's Journ. LI. 4 St. S. 52. Die feste Hirnhaut und Gefäßhaut strözend; 2 Löffel Wasser an der Basis; Gallert unter der Spinnwebhaut bild auf dem Sattel; das Gehirn

fest; wenig Wasser in den Höhlen; im Gefäßgeflechte ein von Blut aufgetriebenes Gefäß; unter der Gefäßhaut des rechten Oberlappens eine mit Feuchtigkeit gefüllte und einen Warm enthaltende Blase von der Größe einer Erbse.

1075. Abercrombie S. 244. Eine Blase mit 16 Unzen Wasser, von der linken Seitenhöhle bis zur Oberfläche der linken Hemisphäre sich erstreckend; Wasser in den Höhlen.

n) Im Hinterlappen.

1076. Lancisi *de subit. mort.* p. 35. In der Rinde des rechten Hinterlappens eine Hydatide von der Größe eines Taubeneys; mit theils flüssiger, theils gallertartiger Substanz; sie schien von der Gefäßhaut ausgegangen zu seyn, und war zerissen; die Umgebung verhärtet.

o) Am Vorderlappen.

1077. Balme in *Journ. de med.* XLI. p. 504. Von der Größe eines Hühnereys.

1078. Morgen obs. *anat. path. Regiom.* 1792. 4. Im linken Vorderlappen.

1079. Wenzel *cor.* p. 114. Im rechten Vorderlappen eine Höhlung mit festen Wänden, worin 1½ Unzen gelbliches Wasser.

1080. Hufelaut's Journ. V. S. 813. Unter der Kranznath saß in einer Furche auf der Gefäßhaut eine Hydatide, von der Größe einer Wallnuss, worauf noch zwey kleinere saßen; 1½ Unze Wasser in den Höhlen und Hydatiden an den Gefäßgeflechten.

XL Exostosen (Siehe 682. 864).

a) Ueber dem Oberlappen.

1081. Wepfer *hist. anat.* p. 508. Exostose 1 Zoll lang, 2 Zoll breit.

1082. Greding II. S. 398. An der Verbindung der Pfeilnath mit der Kranznath.

1083. Lientaud IV. p. 17. Am linken Scheitelbeine.

1084. Richter in *Acta chirurg.* 1811. S. 522. Eine spitze, 3 Linien lange Exostose vom rechten Scheitelbeine in das Gehirn sich senkend; dieses einen Zoll rings herum, so wie an dem carösen Sattel, entzündet.

1085. Voßgel I. S. 175. Eine zwey Zoll dicke, vier Linien hohe Exostose am rechten Scheitelbeine.

b) Am Unterlappen. (Siehe 1088).

c) Ueber dem Vorderlappen. (Siehe 691, 1086, Lientaud IV. p. 18.

1087. Home in Meckel's Archiv. III. S. 115. Mit Verdickung des Schädels und der Gefäßhaut.

1088. Ebd. Exostosen über dem untern und seitlichen Theile des vordern und untern Lappens.

XII. Freye Knochenbildung.

a) An den Häuten des kleinen Hirns. (S. 945. 1101).

1089. Lientaud in *ac. de Paris*. 1737. p. 51. Der Knochen ragte in das kleine Hirn herein.

1090. Greding II. Der Knochen mit dem kleinen Hirne verwachsen; dieses weich und schwammig.

1091. Hünze in Baldinger's neuem Mag. XIV. S. 471. Das Zellgarn Obervirne angewachsen und darzwischen ein mit beyden verwachsen, 3 Linsen langer Knochen; das Gehirn hart, fast knorpelig; die Gefäße strotzend; viel Wasser in den Höhlen.

b) An den Häuten der Hemisphären.

c) An der Spinnwebenhaut. (S. 165. 217).

β) An der Sichel. (Siehe 164. 309. 656. 682. 705. 1011. 1116).

1092. Pitschel S. 56. Die Sichel ganz verknochert; in der Mitte 2 Linsen dick. An der festen Hirnhaut. (Siehe 399. 899).

1093. Ebd. Die ganze feste Hirnhaut von Knochenfasern durchwebt, so daß nicht ein Zoll breit davon frey war.

c) Am Hirnanhange. (Siehe 731).

d) Am Oberlappen. e) An den Hirnhäuten.

1094. Bonet *med. sept. lib. I. sect. 5. c. 10.* An der Spinnwebenhaut des linken Oberlappens ein Knochen, wie ein Gerstenkorn; der Schädel daselbst verdünnt.

1095. Bilguer S. 575. Ein Knochen zwischen Balken und Sichel, in die Rinde gedrückt, und mit einer Membran überzogen, die nirgends anhing; noch ein ähnlicher Knochen zwischen den Vorderlappen.

1096. Conradi in Arneemanns Magazin I. S. 69. Drey weiche, zerreibliche und 4 feste Knöchelchen, wie Rosinenkerne, mit dem dicken Ende gegen die feste Hirnhaut, mit dem spitzen gegen die Gefäßhaut gerichtet; Letztre daselbst mit dem Gehirne

verwachsen; 4 Unze blutiges Wasser in den Höhlen.

β) In der Hirnsubstanz.

1097. Bährere p. 46. Auf der Rinde beyder Oberlappen 2 weisse Knochen, von der Consistenz der Fischschuppen.

1098. Hünze in *Hufeland's Journ.* 1813. April. Im rechten Oberlappen zwischen Rinde und Mark in einer Höhlung ein 1 Zoll langes, 9 Linsen dickes, 3 Linsen breites, mit dem Gehirne nicht verbundenes Knöchelstück.

c) An den Häuten des Hinterlappens.

1099. Vater in Haller *Disp.* VI. p. 237. Knochen in der Sichel u. hinter dem Balken.

1100. Craveilhier II. p. 82. Auf der obern Fläche des Felsenbeins saß mit einem Stiele eine Knöchelgeschwulst von der Größe eines Eys, bestehend aus einem sehr festen Knochenkerne, von welchem biegsame Knochenzacken strahlig ausgingen, die in einer zelligen, fibrösen Masse an der Oberfläche endigten; die darüber liegende Hirnsubstanz ausgehöhlt und brevig erweicht; an der hintern Fläche des Felsenbeins eine ähnliche Geschwulst von der Größe einer Haselnuß.

f) Am Vorderlappen. a) An den Hirnhäuten. (Siehe 1095).

1101. Scheid *Diés. de duobus ossiculis in cerebro humano, mulieris apoplexia extinctae repertis. Argentor.* 1687. — In Haller *Disp. path.* I. p. 211. Ein Knöchel in vordern Theile der Sichel und ein kleinerer im Zelte; Blutklumpen in den Höhlen.

1102. Wepfer's Beobachtg. Nr. 60. In der Nähe des Hahnenkamms 2 Knochen mit sägeartigen Zähnen; Granulationen an der Gefäßhaut; die Gefäße strotzend; Wasser an der Oberfläche und in den Höhlen.

1103. Vater in Sammlg. chir. Bemerkungen. II. S. 317. An der Sichel.

1104. Fr. Lud. Albrecht *de ossificatione durae matris. Hal.* Ein Stück der festen Hirnhaut über der rechten Augenhöhle knöchern; über der linken knorpelig.

1105. Romberg in *Nasse's Zeitschrift* 1823. 3. St. S. 203. Der vordere Theil des Schädels dicker; unter der festen Hirnhaut etwas trübes Wasser; die Spinnwebenhaut mit vielen Granulationen, Verwachsungen

und einem gegen 6 Linien langen Knochen über dem linken Vorderlappen; die Gefäßhaut leicht abzulösen; die Gefäßgeflechte mit Hydetiden.

β) In der Substanz.

1106. Lentin I. S. 474. Im linken Vorderlappen, über dem Balkenkno, nahe bey der Sichel ein 1 Zoll langer und hoher, 2½ Linie dicker Knochen mit scharfem Rande.

γ) An den Arterien. (Siehe 206. 212. 229. 652. 686. 772).

1107. Bonet *med. sept. lib. I. sect. 5. c. 8.* Verknöcherung der Carotis am Sattel; Wasser unter der Gefäßhaut und in den Höhlen.

1108. Stoll I. p. 215. Die Carotiden vom Eintritte in den Schädel an, besonders auf der rechten Seite, verknöchert, und nur stellenweise normal; dagegen die linke Carotis und Wirbelarterie erweitert; die Gefäßhaut dick und von Blut strotzend; Wasser unter der festen Hirnhaut.

XIII. Erdige Substanz und Steine.

a) Im kleinen Hirne. (Siehe 851. 1000).

b) In den Vierbügeln. (Siehe 438).

c) An den Häuten des großen Hirns.

1109. Walter *obs. anat. p. 6.* Ein Stein in der festen Hirnhaut am Sichelblutleiter in einer Grube des Schädels.

d) Am Schistrefen.

1110. Walter *obs. anat. p. 42.* Ein ovales, erbsengroßes, hartes, nicht zerreibliches Concrement am linken Schistrefen.

e) In den Seitenhöhlen. (Siehe 680).

1111. Meckel in *aa. de Berlin. 1754. p. 95.* Im linken Hinterhorne ein höckeriger Stein, 138 Grän schwer, faserig und leicht,

wie Bimsstein, von der Farbe der Rinde, in einer Membran, die mit der Gefäßhaut zusammenhängend und viel Gefäße hatte.

1112. Walter's *enot. Museum S. 155.* Im Gefäßgeflechte der rechten Seitenhöhle ein weißgelber, runder, flach gedrückter Stein, zehn Grän schwer; die Hirnsubstanz etwas fest.

1113. Bergmann in Nasse's Zeitschrift 1823. S. 416. Im Gefäßgeflechte 50 durchsichtige Krystalle, aus phosphorsaurem Talk mit Ammonium bestehend; das Gehirn fest.

f) Im Oberlappen. (Siehe 517. 969).

g) Am Hinterlappen.

1115. Fabrici. Hildanus p. 26. Gypsige Steine in einer Blase zwischen Gefäßhaut und fester Hirnhaut am Hinterhaupt; 2 Pfund Wasser in den Höhlen.

h) Den Gefäßgeflechten. (Siehe 224).

i) Im Balken. (Siehe 992).

XIV. Erweiterung der Arterien und Aneurismen.

1116. Blane in *ausert. Abth. f. Aerzte XX. S. 560.* Aneurismen beyder Carotiden am Sattel, 7½ Linien im Durchmesser, mit geronnenem Blute gefüllt; die Hirnschenkel braun und, so wie die Scheidewand, fest; die Scherren atrophisch; in der Sichel spitze Knochen.

1117. Biumi in Sandifort *thes. III. p. 373.* Die feste Hirnhaut trocken, faltig, fest am Schädel hängend, und an den Blutleitern, so wie am Zelte, verhärtet; Gellert am Hirnanhange; Hydetiden an den Gefäßgeflechten; die Carotis im Zellenblutleiter aneurismatisch.

Verzeichniss

der

an mehrern Stellen und mit abgekürzten Titeln oder ohne Bemerkung der Ausgabe

angeführten Schriften.

Abercrombie — John Abercrombie über die Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks. A. d. Engl. v. Fr. de Blois. Mit einem Anhange über Geschwülste im Gehirne, v. Fr. Nasse. Bonn. 1821. 8.

ac. Bonon. — De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia commentarii. Bononiæ. 1733.

ac. de chir. — Mémoires de l'académie de chirurgie à Paris. Paris. 1764. 8. 12.

Achillius — Alexandri Achillii Bononiensis opera omnia. Venet. 1545. fol.

Ackermann — Die Gallische Hirn- Schädel- und Organenlehre, vom Gesichtspuncte der Erfahrung aus beurtheilt und widerlegt von J. F. Ackermann. Heidelberg. 1806. 8.

— De nervi systematis primordiis commentatio, auctore Iacobo Fidele Ackermann. Manheim. 1813. 8.

Acrel — Olof Acrel chirurgische Vorfälle; in dem Königl. Lazareth und aussershalb desselben angemerkt. A. d. Schwed. übersetzt von Murray. Göttingen. 1777. II. 8.

Albinus — Bernh. Sigfr. Albini academicae notationes. Leidæ 1754—68. VIII. Libr. 4.

Arantius — Iulii Caesaris Arantii de humano foetu Liber, eiusdem anatomicorum observationum Liber, ac de tumoribus Liber. Venet. 1595. 4.

Argentieri — Ioh. Argentieri opera. Venet. 1592. III. fol.

Aristoteles — *Αριστοτέλους τὰ Ζωολογικά καὶ ὁμοίως*. Lugd. 1690. fol.

Arnemann — Versuche über die Regeneration an lebenden Thieren. Göttingen. 1782. 8.

Arnemann — Justus Arnemanns Versuche über das Gehirn und Rückenmark. Göttingen. 1787. 8.

— Magazin für die Wundarzneywissenschaft, herausgegeben von Justus Arnemann. Göttingen. 1797. 8. 4.

Arsaky — Apostolos Arsakaky Diss. de piscium cerebro et medulla spinali. Halae. 1813. 4.

Antenrieth — Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie, von Joh. Heinr. Ferd. Antenrieth. Tübingen. 1801. III Bde. 8.

Averroese *Abh.* — siehe Sammlung.

Averroese — Averrois Cordubensis Colligati libri VII. Venet. 1554. fol.

Baillie — Matthew Baillie Anatomie des krankhaften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen Körper. Aus d. Engl. übersetzt mit Zusätzen von S. Th. Sommering. Berlin. 1794. 8.

Barrère — Observations anatomiques, tirées des ouvertures d'un grand nombre de cadavres. Nouv. edit. par Pierre Barrère. Perpignan. 1753. 4.

Bartholin — Nouveaux Éléments de la science de l'homme. Par P. J. Bartholin. II. Edit. Paris. 1806. II. Vol. 8.

Bartholin — Thomae Bartholini anatomia ex Casperi Bartholini Institutionibus. Lugd. Bat. 1651. 8.

— Thomae Bartholini historiae anatomicae rariores. Haebiae. 1654—57. 8.

Bauhin — Casp. Bauhini, Basileensis, thesaurum anatomicum. Francof. 1605. 8.

Becket — A collection of surgical tracts,

- written and collected by Will. Becket. London. 1740. 4.
- Benedetti* — Omnium a vertice ad calcem morborum signa, causas, indicationes et remedium compositiones; praeterea h. c. anatomie, auctore Alexandro Benedicto, Veronense. Basil. 1539. 4.
- Berengar* — siehe Carpus.
- Beyträge* — Beyträge zur nähern Kenntniss des Gehirns, in Hinsicht auf Physiologie, Medicin und Chirurgie, von K. F. Burdach. Leipzig. 1805. 1806. II Bde. 8.
- Bichat* — Allgemeine Anatomie, angewandt auf die Physiologie und Arzneywissenschaft, von Xavier Bichat. A. d. Franz. u. mit Anmerkungen v. C. H. Pfaff. Leipzig. 1802. II Bde. 8.
- Abhandlung über die Häute im Allgemeinen und über die Häute insbesondere, von Xav. Bichat. A. d. Franz. v. C. F. Dörner. Tübingen. 1802. 8.
- *Traité d'anatomie descriptive* par Xav. Bichat. Paris. 1801—1803. V. 8.
- *Recherches physiologiques sur la vie et la mort*. Par Xav. Bichat. Paris. 1800. 8.
- Bilguer* — Chirurgische Wahrnehmungen, welche meistens während dem von 1751—1763 gedauerten Krieg über in denen K. Preussischen Feldlazarethen aufgezeichnet und herausgeg. v. Joh. Ubr. Bilguer. Berlin. 1763. 8.
- Blas* — Ger. Blasii observata anatomica. Lugd. Bat. 1674. 12.
- Bock* — Beschreibung des fünften Nervenpaaß und seiner Verbindung mit andern Nerven, vorzüglich mit den Gangliensystemen. Von Aug. C. Bock. Meissen. 1817. fol.
- Boneti* — Boneti medicina septentrionalis, s. rei medicae nuperis omnis a medicis Anglis, Germanis et Danis emissae sylloge et syntaxis. Genev. 1685. fol.
- Bouhonne* — *Traité de la cephalotomie*, par J. B. Avignon. 1748. 4.
- Bromfield* — Chirurgische Wahrnehmungen durch Will. Bromfield. Aus dem Engl. Leipzig. 1774. 8.
- Brückner* — Car. Aug. Brückner Diss. sistens prodromum experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum. lenae. 1790. 4.
- Bruno* — Ioh. Hnr. a Bruno experimenta quaedam circa ligaturas nervorum in vivis animalibus instituta. Götting. 1753. — in *Lodwig script. neurol.* II. p. 271.
- Bucholz* — Beyträge zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit und zur medicinischen Polizey, von Wilh. Hnr. Seh. Bucholz. Weimar. 1782—93. IV. 8.
- Büttner* — Chph. Glob. Büttners in vielen Jahren gesammelte anatomische Wahrnehmungen. Königsberg. 1761. 4.
- Burdin* — Vom Menschen. Aus dem Franz. des Herrn Burdin übersetzt, mit Zusätzen und Anmerkungen versehen von Reuss. Tübingen. 1803. 8.
- Cabanis* — *Rapports du physique et du moral de l'homme*. Par P. J. G. Cabanis. II. edit. Paris. 1805. II. 8.
- Camerarius* — *Camerarius de apoplexiis plac. matris*. Tübing. 1722. — in *Haller Disp. posth.* I. p. 197.
- Carpus* — *Cargi commentaria cum amplissimis additionibus super anatomia mundi*, una cum textu eadem. Bonon. 1521. 4.
- Carus* — Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns, nach ihrer Bedeutung, Entwicklung und Vollendung im thierischen Organismus, v. Karl Gust. Carus. Leipzig. 1814. 4.
- *Lehrbuch der Zoologie*. Mit steter Hinsicht auf Physiologie ausgearbeitet von K. G. Carus. Leipzig. 1818.
- Casseri* — *Iulii Casseri Placentini, pentasthesion, h. e. de quinque sensibus liber*. Francof. 1610. fol.
- Chambon* — *Nicolas Chambon de Montaux observations cliniques, curieuses morborum periculorum et rariorum, aut phaenomena ipsorum in cadaveribus indagata referentes*. Paris. 1789. 4.
- Chaussier* — *Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encephale du cerveau, suivant la methode adoptée à l'école de médecine de Paris*. 1807. 8.
- Cheston* — *Pathological inquiries and observations in surgery, from the dissections of morbid bodies*. Withan appendix containing 12 cases on different subjects. By Richard Browne Cheston. Lond. 1766. 4.
- Classy* — *Observations on some of the di-*

- senses of the parts of the human body, chiefly taken from the dissection of morbid bodies. By Sam. Clossy. London. 1763, 8.
- Coindet* — Mémoire sur l'hydrocephale, ou cephalite interne hydrocephalique, par J. F. Coindet. Paris. 1817, 8.
- Colleg. Amstel.* — Observationes anatomicae selectiores collegii privati Amstelodamensis. Amstelod. 1667, 12.
- Columbus* — Realdi Columbi, Cremonensis, de re anatomica libri XV. Venet. 1559, fol.
- Comment. Lips.* — Commentarii de rebus in scientia naturali et medicina gestis. Lips. 1752 sqq.
- Cruveilhier* — Essai sur l'anatomie pathologique en général, par Jean Cruveilhier. Paris. 1816, II. 8.
- Cuvier* — Vorlesungen über vergleichende Anatomie, von G. Cuvier. Uebersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von J. F. Meckel. Leipzig, 1809, 10. IV. 8.
- Dan. de la Vanterie.* — Dissertation sur l'apoplexie. Par Dan de la Vanterie. Paris. 1807, 8.
- Daniel* — Chr. Fr. Daniels Sammlung medicinischer Gutachten und Zeugnisse. Mit einigen Anmerkungen herausgegeben von dessen Sohne. Leipzig. 1776, 8.
- Dease* — Observations on wounds of the head. With an particularly enquiry into the parts principally affected in those, who die in consequence of such injuries. By Will. Dease. Lond. 1776, 8.
- De le Boe* — Francisci de le Boe, Syllii, opera medica. Trajecti. 1695, 4.
- Des Cartes* — Renati Des Cartes tractatus de homine et de formatione foetus, quorum prior notis perpetuis Ludovici de la Forge illustratur. Amst. 1686, 4.
- Dessault* — Auserlesene chirurgische Wahrnehmungen, nebst einer kurzen Uebersicht der chirurgischen Vorlesungen, welche im Hôtel dieu zu Paris gehalten werden, vom Herrn Dessault. Frankf. a. M. 1791—99. VIII. 8.
- Diemerbroeck* — Isbrandi de Diemerbroeck opera omnia anatomica et medica, collecta, et recognita per Timannum de Diemerbroeck Ultraj. 1685, fol.
- Döllinger* — Ignaz Döllinger's Beyträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns. Frankf. a. M. 1814, fol.
- Dreslincourt* — Car. Dreslincourtii praedilectum anatomicum, quod Lugdunensium in amphitheatro ad primam anatonies suae catechesin adhibuit. Edit. II. Lugd. Bat. 1672, 12.
- Dubois* — In Hippocratis et Galeni physiologiae partem anatomicam isagoge, a Jacobo Sylvio Venet. 1556, 8.
- Du Laurent* — Historia humani corporis illustrata ab Andrea Laurentio. Paris. 1600, fol.
- Edinburger* — Medicinische Commentarien von einer Gesellschaft der Aerzte zu Edinburg. A. d. Engl. Altenburg. 1774 — 89. X. 8.
- Eller* — Nützliche und auserlesene medicinische und chirurgische Anmerkungen, sowohl von innerlichen, als äusserlichen Krankheiten und bey selbigen zum Theil verrichteten Operationen, u. s. w. von Joh. Theod. Eller. Berlin. 1730, 8.
- Eschenmayer* — Psychologie in drey Theilen, als empirische, reine, und angewandte. Von C. A. Eschenmayer. Stuttgart. 1817, 8.
- Eustach* — Bab. Sgr. Albini explicatio tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii Auctor recognovit, castigavit, auxit, denao edidit. Leidac. 1761, fol.
- Fabritius* — Guili. Fabricii, Hildani, observationum et curationum chirurgicarum centuriae Lugd. 1611, 4.
- Fallopius* — Gabrielis Falloppii, Mutinensis, opera omnia. Francof. 1600, fol.
- Fantoni* — Ioh. Bapt. Fantoni observationes anatomico-medicae. Tertia editione recensuit et auxit Ioh. Fantonus, filius. Venet. 1713, 4.
- Ioh. Fantoni opuscula medica et physiologica. Gener. 1738, 4.
- Feider* — Basil. Ioh. Feider Dias. de halytidum structura. Halae, 1814, 4.
- Flourens* — Recherches experimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés. Par P. Flourens. Paris. 1824, 8.
- Fontana* — Felix Fontana Abhandlung über das Viperngift u. s. w. A. d. Franz. Berlin. 1787, 4.
- Foville* — Recherches sur le siège spécial

de différentes fonctions du système nerveux. Par Foville et Pinel-Grandchamp. Paris. 1823. 8.

Frörise — Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, herausg. von L. v. Frörise. Weimar. 1822. fgg. 4.

Fraccassati — Ceroth Fraccassati epist. de cerebro — in Mangeti bibl. II. p. 63.

Galeus — Gsleni omnia, quae extant in latinum sermonem conversa. Venet. 1556. III. Fol.

Gall — Anatomie et physiologie du système nerveux, en général, et du cerveau en particulier. Par F. I. Gall et G. Spurzheim. Paris. 1810-19. IV. Vol. 4.

— Untersuchungen über die Anatomie des Nervensystems überhaupt und des Gehirns insbesondere. Ein dem französischen Institute überreichtes Mémoire von Gall und Spurzheim. Paris. 1809. 8.

Gennari — Francisci Gennari de peculiari structura cerebri nonnullisque eius morbis observationes. Parmae. 1782. 8.

Georget — De la physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau. Par Mr. Georget. Paris. 1821. II. 8.

— M. Georget über Verrücktheit. A. d. Französ. von Heinroth. Leipzig. 1821.

Gerson — Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg. Herausgegeben von G. H. Gerson und Nic. Hnr. Julius. Hamburg. 1821. fgg. 8.

Gesner — Joh. Aug. Phil. Gesner's Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelehrtheit. Neue Aufl. Nördlingen. 1789. III. 8.

Girardi, siehe Santorini.

Görres — Exposition der Physiologie, von I. Görres. Koblenz. 1806. 8.

Gooch — Cases and practical remarks in surgery, by I. Gooch. Secd. edit. Norwich. 1767. II. 8.

Gordon — A system of human anatomy by John Gordon. I. Vol. Edinburgh. 1815. 8.

Gräfe — Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, herausgegeben von C. F. Gräfe und Ph. v. Walther. Berlin. 1821. fgg. 8.

Greding — Joh. Ernst Greding's sämtliche

medizinische Schriften, herausgegeben v. Karl Wihl. Greding. Greiz. 1790, 91. II. 8.

Günther — Kurzer Entwurf der anatomischen Nervenlehre, von D. E. Günther. Uebersetzt und mit Zusätzen des Verfassers herausgegeben von H. W. Pottgiesser. Düsseldorf. 1789. 8.

Günz — Inst. Godofr. Günz Progr. lapillos glandulae pinealis in quinque mente alienatis inventos proponit. Lips. 1753. — in Haller Disp. patli. I. p. 233.

Guidi — Vidi vidi, Florentini, de anatome corporis humani libri VII. Venet. 1611. fol.

Haase — Cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita, auctore Joh. Glob. Haasio. Lipsiae. 1781.

Haller — Elementa physiologiae corporis humani. Auctore Abl. v. Haller. Lausannae. 1757—56. VIII. 4.

— Alberti v. Haller opera anatomici argumenti minora. Lausannae. 1768. IV. 4.

— Iconum anatomicarum, quibus praecipuae partes corporis humani exquisita cura delineatae continentur fascic. I—VIII. Göttingae. 1753—56. fol.

— Bibliotheca anatomica, qua scripta ad anatonem et physiologiam facientia a rerum initis recensentur. Auctore Alberto von Haller. Tiguri. 1774—77. II. 4.

— Dissertationum anatomicarum selectarum volumina VIII. Collegit, edidit praefatus est Albertus Haller. Götting. 1746. 4.

— Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes, quas collegit, edidit et recensuit Hallerus. Lausannae. 1747. I. 4.

Harles — Versuch einer vollständigen Geschichte der Hirn- und Nervenlehre im Alterthume. Von Chr. Fr. Harles. Erlangen. 1801. 8.

— Neues Journal der ausländischen medicinisch-chirurgischen Literatur. Herausgegeben von Hufeland und Harles. Nürnberg. 1804 fg. 8.

Henckel — Sammlung medicinischer und chirurgischer Anmerkungen, von Josch. Fr. Henckel. Berlin. 1747—63. VIII. 4.

— Josch. Fr. Henckels neue med. u. chirurg. Anmerkungen. Berlin. 1769—72. II. 8.

— Medicinische und chirurgische Beobachtungen und Abhandlungen, welche

- größtentheils der Kön. Akademie der Wissenschaften und schönen Künste zu Berlin vorgelesen worden, von J. F. Henckel. Berlin. 1779. 8.
- Haslam** — Beobachtungen über den Wahnsinn, nebst praktischen Bemerkungen über diese Krankheit und einer Nachricht von den krankhaften Erscheinungen, die bey den Leichenöffnungen wahrgenommen worden. Von J. Haslam. Aus dem Engl. übers. Stendal. 1780. 8.
- Highmor** — *Corporis humani disquisitio anatomica, in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis prosequutus est* Nath. Highmorus. Hag. Com. 1651. fol.
- Hill** — Jam. Hill's chirurgische Beobachtungen, welche hauptsächlich den Krebs und die Verletzungen des Kopfs betreffen. A. d. Engl. übersetzt. Leipzig. 1777. 8.
- Hippocrates** — *Hippocratis opera omnia graeco et latine*, ed. Joh. Anton van der Linden. Lugd. Bat. 1665. II. 8.
- Hofmann** — Caspari Hofmanni commentarii in Galeni de usu partium corporis humani libb. XVII. Francf. 1625. fol.
- Huarter** — Joh. Huarter's Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. A. dem Span. übers. von Gouth. Ephr. Lessing. Zerbst. 1752. 8.
- Huber** — Joh. Inc. Huber observationes aliquot anatomicae. Cassellis. 1760. 4.
- Jäger** — Vermischte chirurgische Cautele für ansehende Praktiker der Wundarzneykunst, von J. C. Jäger. Frankf. a. M. 1789 — 97. V. 8.
- Ingram** — *Practical cases and observations in surgery*, by Dale Ingram. London. 1751. 8.
- Journ. compl.** — *Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales*. Paris. 1816. fgg. 8.
- Ital. Bibl.** — Italienische, medicinisch-chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Herausgegeben von C. G. Kühn und Carl Weigel. Leipzig 1793—98. IV. 8.
- Kard** — Kard von den Krankheiten des Gehörs. A. d. Franz. übers. Weimar. 1822. 8.
- Kauw** — Abr. Kauw Boerhaave impetum faciens dictum Hippocrati. Leidae. 1745. 8.
- Kees** — Joh. Phil. Kees Diss. sistens observationes binas de laesionibus capitis eorumque epierisis. Argent. 1770. 4.
- Klein** — *Chirurgische Bemerkungen* v. Christ. Klein. Stuttgart. 1801. 8.
- Kurze Beschreibung einiger seltenen Wasserköpfe, von D. C. Klein. Stuttgart. 1819. 4.
- Kölpin** — *De capitis laesionibus maletemata medico-chirurgica cum adiectis observationibus*, conscript. ab Alex. Kölpin. Havniae. 1772. 8.
- Konrad** — Ge. Fr. Konrad Diss. de asteri-arum fabrica. Halae. 1813. 4.
- Kopenhagener Soc.** — Merkwürdige Krankengeschichten und seltene Beobachtungen berühmter Aerzte. Ein Auszug aus den Abhandlungen der Kön. med. Societät zu Kopenhagen. A. d. lat. Halle. 1795. 8.
- Kosse** — Joh. Fr. Jul. Kosse Diss. de pteropodum ordine et novo ipsius genero. Halae. 1813. 4.
- Kreyszig** — Die Krankheiten des Herzens, systematisch bearbeitet und durch eigne Beobachtungen erläutert von F. L. Kreyszig. Berlin. 1814—16. III. 8.
- Kunzmann** — Anatomisch-physiologische Untersuchungen über den Blutegel. Von Joh. Hnr. Liebr. Kunzmann. Berlin. 1817. 8.
- Lallemand** — *Recherches anatomico-pathologiques sur l'encephale et ses dépendances*. Par F. Lallemand. Paris. 1820—23. II. 8.
- Lancisi** — Joh. Mariae Lancisi diss. de sede cogitantis animae ad Joh. Fantonium — in Fantoni obs. p. 145.
- J. M. Lancisi de subitaneis mortibus. Romae. 1707. 4.
- J. M. Lancisi de structura usque gangliorum — in Morgagni advers. anat. V. p. 182.
- Landi** — Bassiani Landi, Placentini, de humana historia vel singularum nominis partium cognitione libri II. Basil. 1542. 8.
- Latta** — System der praktischen Wundarzneykunde, von James Latta. A. d. Engl. übers. v. F. L. Augustin. Berlin. 1803. II. 8.
- Le Dran** — *Observations de chirurgie, aux quelles on a joint plusieurs réflexions en faveur des étudiants*. Par Henri François le Dran. Paris. 1731. II. 8.

- Legallois* — Expériences sur le principe de la vie. Par Mr. le Gallois. Paris. 1812. 8.
- Lentin* — Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft, von Lebr. Fr. Büd. Lentin. 3te Ausg. Leipzig. 1797 — 1804. III. 8.
- Leve* — Steph. Fr. Leve Diss. de pleurobranchaea, novo molluscorum genere. Halle. 1813. 4.
- Lieutaud* — Essais anatomiques, par Mr. Lieutaud. Paris. 1742. 8.
- Lombard* — Remarques sur les lésions de la tête, pour servir à l'instruction du jeune chirurgien. Par Lombard, ptre. Strasbourg. 1796. 8.
- Lomvri* — Abhandlungen über die Durchbohrung des Schädels (Trepanatio cranii), als Beantwortungen einer von der K. K. Josephinischen med. chir. Akademie aufgestellten Preisfrage. Wien. 1800. 4.
- Lucas* — S. C. Lucas de cerebri in homine vasis et motu. Heidelberg. 1812. 4.
- Ludwig* — Scriptores neurologici minores selecti, sive opera minora, ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit Chr. Frid. Ludw. Lips. 1791—95. IV. 4.
- Chr. Fr. Ludwig Diss. de cinerea cerebri substantia. Lips. 1779. 4.
- Magendie* — Précis élémentaire de physiologie, par F. Magendie. Paris. 1816. II. 8.
- Journal de physiologie expérimentale et pathologique, par F. Magendie. Paris. 1821. fgg. 8.
- Mémoire sur quelques découvertes récentes, relatives aux fonctions du système nerveux. Par Magendie. Paris. 1823. 8.
- Recherches physiologiques sur la vie et la mort, par X. Bichat. IV. edit. augmentée de notes par Magendie. Paris. 1822. 8.
- Malacarne* — Encefalotomia nuova universale, di Vincenzo Malacarne. Torino. 1780. 8.
- Neuroencefalotomia. Pavia. 1791. 8.
- Nuova esposizione della vera struttura del cervello umano, di Vinc. Malacarne. Torino. 1776. 8.
- Malpighi* — Marcelli Malpighi exercitatio epistolaris de cerebro ad Car. Fracassatum — in Mangeti bibl. II. p. 56.
- Manget* — Bibliotheca anatomica, a recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus; digesserunt Dan. Clericus et Io. Iac. Mangetus. Genevae. 1699. II. Fol.
- Marchetti* — Petri de Marchettis, Patavini, observationes et tractatus medico-chirurgici. Neapolis. 1772. 8.
- Dom. de Marchettis anatomia. Lugd. Bat. 1688. 12.
- Marshall* — The morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia, as collected from the papers of the late Andrew Marshall, by S. Sawrey. London. 1815. 8.
- Massa* — Nicolai Massa, Veneti, liber introductorius anatomiae, sive dissectionis corporis humani. Venet. 1556. 4.
- Mayer* — Anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückenmark u. Uebersprung der Nerven. Von Joh. Chrp. Andr. Mayer. Berlin. 1779. 4.
- Beschreibung des ganzen menschlichen Körpers, von L. C. A. Mayer. Berlin. 1783—94. VIII. 8.
- Mayo* — Anatomical and physiological commentaries. By Herbert Mayo. London. 1822. 23. II. 8.
- Meckel* — Handbuch der menschlichen Anatomie von Joh. Fr. Meckel. Halle. 1816—20. IV. 8.
- Handbuch der pathologischen Anatomie von J. F. Meckel. Leipzig. 1812—18. II. 8.
- Deutsches Archiv für die Physiologie, herausgegeben v. J. F. Meckel. Halle. 1815. fgg. 8.
- Beiträge zur vergleichenden Anatomie, von J. F. Meckel. Leipzig. 1811, 12. II. 8.
- Anatomisch-physiologische Beobachtungen und Untersuchungen von J. F. Meckel. Halle. 1822. 8.
- Méhée de la Touche* — Traité des lésions de la tête par contrecoup, par Méhée de la Touche-Meaux. 1773. 8.
- Mebius* — Commentatio de morbis hominis dextri et sinistri, auct. C. F. E. Meiblis. Götting. 1818. 4.
- Mém. prés.* — Mémoires de mathématique et physique, présentés à l'académie royale des sciences. Paris. 1750 aqq. 4.
- Metzger* — J. D. Metzger's vermischte medicinische Schriften. Königsberg. 1782. III. 8.

- Metzger** — *Adversaria medica*, autore J. D. Metzger. Traj. ad Mosam. 1775. 8.
- Mohrenheim** — Wienerische Beyträge zur praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshülfe, herausgegeben von Jos. Mohrenheim. Wien. 1781-83. II. 8.
- Jos. Mohrenheim's Beobachtungen verschiedener chirurgischer Vorfälle. Wien. 1780-83. II. 8.
- Mondini** — siehe Carpus.
- Monro** — *Observations on the structure and functions of the nervous system*. By Alex. Monro. Edinb. 1783. fol.
- Alex. Monro's u. Richard Fowler's Abhandlung über thierische Elektricität u. ihren Einfluß auf das Nervensystem. Leipzig. 1796. 8.
- Molinetti** — *Antonii Molinetti dissertationes anatomicae et pathologicae de sensibus et eorum organis*. Patavii. 1699. 4.
- Morand** — *Opusculum de chirurgie* par Mr. Morand. Paris. 1768-72. II. 4.
- Morgagni** — Ioh. Bapt. Morgagni de sedibus et causis morborum per anatomem indagata. Venet. 1762. fol.
- Ioh. Bapt. Morgagni adversaria anatomica omnia. Venet. 1762. fol.
- Murray** — *Observationes anatomicae de infundibulo cerebri*. Upsal. 1772 — in Ludwig script. neur. II. p. 242.
- Mursinna** — Medicinisch-chirurgische Beobachtungen, nebst einigen Anmerkungen darüber v. Chr. Lud. Mursinna. Berl. 1782. 8.
- Neue medicinisch-chirurg. Beobachtungen v. Chr. Lud. Mursinna. Berlin. 1796. 8.
- über Trepanation — siehe Louvrier.
- Nasse** — Zeitschrift für psychische Aerzte. Herausgegeben von Fr. Nasse. Leipzig. 1818. 8.
- Leichenöffnungen. Zur Diagnostik u. pathologischen Anatomie. Von Fr. Nasse. Bonn. 1821. 8.
- Neues Journ. d. ausl. Lit.** — siehe Harles.
- Olivier** — *De la moelle épinière et de ses maladies*. Par C. P. Olivier. Paris. 1826. 8.
- Otto** — *Adph. Guil. Otto monstrorum sex humanorum anatomica et physiologica disquisitio*. Francof. 1811. 4.
- Paquin** — *Anatomie chirurgicale*, par Mr. J. Paquin. Nouv. edit. revue, corrigée et augmentée par B. Boudon. Paris. 1784. II. 8.
- Palletta** — *de nervis crotaphitico et buccinato*. Mediolani. 1784. — in Ludwig script. neur. III. p. 63.
- Parent** — *Recherches sur l'inflammation de l'arachnoïde cérébrale et spinale*. Ouvrage fait conjointement par Parent-Duchatelet et L. Martinet. Paris. 1821. 8.
- Parry** — *Experimental-Untersuchung über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des arteriellen Pulses*. Von Caleb Hillier Parry. A. d. Engl. übers. durch E. von Emblen. Hannover. 1817. 8.
- Penada** — *Saggio d'osservazioni e memorie sopra alcuni casi singolari riscontrati nell'esercizio della medicina e della anatomia pratica* da Jac. Penada. Padova. 1793. 4.
- Perrault** — *Oeuvres diverses de physique et de mécanique*, par Claude et Pierre Perrault. Leyde. 1721. II. 4.
- Pfaffinger** — Jo. Pfaffinger de structura nervorum. Argentor. 1782. — in Ludwig script. neur. I. p. 1. 31.
- Phys. med. Journ.** — *Physisch-medicinisches Journal*, nach Bradley und Wälfch für Deutschland bearbeitet und mit Originalheften vermehrt von K. G. Kühn. Leipzig. 1800-1802. VI. 8.
- Piccolomini** — *Anatomicae praelectiones Archangeli Piccolomini, Ferrariensis*. Romae. 1586. fol.
- Pinel** — *Mémoire sur l'endureissement du système nerveux*. Par Pinel, fils. Paris. 1822. 8.
- Pitschel** — Fr. Lebegott Pitschel's anatomische u. chirurgische Anmerkungen. Dresden. 1784. 8.
- Portal** — *Cours d'anatomie médicale, ou éléments de l'anatomie de l'homme*. Par Ant. Portal. Paris. 1804. IV. 4.
- *Histoire de l'anatomie et de la chirurgie*. Par Mr. Portal. Paris. 1770 — 73. VI. 8.
- Pringle** — J. Pringle's Beobachtungen über die Krankheiten der Armen. Uebers. von Brande. Wien. 1787. 8.
- Prix de chir.** — *Recueil des pièces, qui ont concouru pour le prix de l'académie royale de chirurgie*. Paris. 1753-78. XI. 12.
- Prochaska** — Ge. Prochaska annotationes academicae. Pragae. 1780-84. III. 8.
- Ge. Prochaska de structura nervorum. Tractatus anatomicus. Vindob. 1779. 8.

- Prochaska** — Ge. Prochaska opera minora anatomici, physiologici et pathologici argumenti. Viennae. 1800. II. 8.
- *Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani eiusque processus vitalis.* Auctore Ge. Prochaska. Viennae. 1812. 4.
- Pyl** — Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft, herausgegeben von Joh. Theod. Pyl. Berlin. 1783 — 95. VIII. 8.
- Ramsay** *Anatomy of the heart cranium and brain,* by Alex. Ramsay. New. edit. Edinburgh. 1813. 4.
- Reil** — Joh. Chr. Reil exercitationum anatomicarum fasciculus primus de structura nervorum. Halae. 1796. Fol.
- Archiv für Physiologie. Halle. 1796 — 1812. XII. 8.
- Beiträge zur Beförderung einer Curmethode auf psychischem Wege, herausgegeben von Reil und Hoffbauer. Halle. 1810-12. XII. 8.
- J. C. Reil's kleine Schriften, wissenschaftlichen und gemeinnützigen Inhalts. Halle. 1817. 8.
- Repertorium** — Repertorium chirurgischer u. medicinischer Abhandlungen f. praktische Aerzte und Wundärzte, aus den wichtigsten und neuesten englischen Zeitschriften. Leipzig. 1794. II. 8.
- Ridley** — Henrici Ridley anatomica cerebri. Lugd. Bat. 1725. 8.
- Riclan** — Anatome Johannis Riclani, filii. Paris. 1610. Fol.
- *Encheiridion anatomicum et pathologicum,* a Ioh. Riclano, filio. Lugd. Bat. 1649. 8.
- Rochoux** — Recherches sur l'apoplexie par J. A. Rochoux. Paris. 1814. 8.
- Rolando** — Saggio sopra la vera struttura del cervello dell'uomo e degli animali, e sopra le funzioni del sistema nervoso, di Luigi Rolando. Sassari. 1809. 8.
- Rosenmüller** — Beiträge für die Zergliederungskunst. Herausgegeben v. H. F. Lenflam und J. C. Rosenmüller. Leipzig. 1800. 1802. II. 8.
- Rosenthal** — Ein Beytrag zur Encephalotomie. Von Fr. Rosenthal. Weimar, 1815. 8.
- Rudolph** — Anatomisch-physiologische Abhandlungen. Berlin. 1802. 8.
- Rufus** — Aretaei Cappadocis libri VII. et Ruffi Ephesi de corporis humani partium appellationibus libri III. a Junio Paulo Crasso latinisati donati Venet. 1552. 4.
- Ruyssch** — Friderici Ruyssch opera omnia. Amstel. 1721. 4.
- Sabatier** — *Traité complet d'anatomie,* par Mr. Sabatier. Nouv. edit. Paris. 1781. III. 8.
- Sammlg. auserl. Abh.** — Sammlung auserlesener Abhandlungen z. Gebrauche praktischer Aerzte. Leipzig. 1774. fgg. 8.
- Sammlg. chir. Bemerkg.** — Sammlung chirurgischer Bemerkungen aus verschiednen Sprachen übersetzt. Altenb. 1758-78. V. 8.
- Sammlg. für Wundärzte** — Sammlung der auserlesenen und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. Leipzig. 1778-80. IV. 8.
- Sandifort** — *Thesaurus dissertationum, programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum ad omnem medicinae ambitum pertinentium.* Edidit Ed. Sandifort. Roterod. 1768-78. III. 4.
- Ed. Sandifort observationes anatomico-pathologicae. Lugd. Bat. 1777-81. IV. 4.
- Santorini** — *Observationes anatomicae* Ioh. Dominici Santorini. Venetis. 1724. 4.
- Ioh. Dom. Santorini XVII. tabulae; quas nunc primum edit atque explicat. Mich. Gimrdi. Parmae. 1775. 4.
- Scarpa** — *Anatomicarum annotationum libri II.* Auctore Ant. Scarpa. Ticini. 1785.
- Schaaarschmidt** — Sam. Schnaarschmidt's medicinische und chirurgische Nachrichten. Berlin. 1743-48. VI. 4.
- Schalck** — Hnr. Fr. Schalck Diss. de Ascidiarum structura. Halae. 1814. 4.
- Schmidt** — Ern. Glh. Schmidt observationum chirurgicarum tetras. Gotting. 1751. 4.
- Schmucker** — J. Lebr. Schmucker's chirurgische Wahrnehmng. Berlin. 1774. 75. II. 8.
- Vermischte chirurgische Schriften, herausgegeben von J. L. Schmucker. Berlin. 1776-82. III. 8.
- Schneider** — Conr. Vict. Schneider libri V. de catarrhis. Witteberg. 1660-62.
- Schönlein** — Joh. Lucas Schönlein von der Hirnmetamorphose. Inauguralabhandlung. Würzburg. 1816. 8.

- Schreger* — *Synonymia anatomica*, auctore Chr. Hnr. Theod. Schreger. Furth. 1803. 8.
- Schuhmacher* — *Medicinish-chirurgische Bemerkungen v. Chr. Fr. Schuhmacher*. Kopenhagen. 1800. 8.
- Serres* — *Anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes des animaux vertébrés, appliquée à la physiologie et à la pathologie du système nerveux*. Par R. A. Serres. Paris. 1824. I. Vol. 8.
- Siebold* — K. K. Siebold's chirurgisches Ta-gebuch. Nürnberg. 1792. 8.
- Simmons* — Sammlung der neuesten Beobachtungen englischer Aerzte und Wundärzte, von Foart Simmons. Frankf. am M. 1790-94. IV. 8.
- Sommerring* — S. Th. Sommerring de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V. Gotting. 1778. — in Ludwig script. near. II. p. 1.
- S. Th. Sommerring Lehre vom Hirne und den Nerven. Zweyte Ausg. Frankf. am M. 1800.
- S. Th. Sommerring über das Organ der Seele. Königsberg. 1796. 4.
- S. Th. Sommerring tabula basica encephali. Francof. 1799. fol.
- S. F. Sommerring academicae adnotationes de cerebri administrationibus anatomicis — in Denkschriften der Münchener Akademie. 1803. 8. 5.
- Spigel* — Adriani Spigeli, Bruxallensis, opera quae extant omnia. Amstelod. 1643. fol.
- Spiz* — *Cephalogenesis s. capitis ossis structura, formatio et significatio*. Auctore Iob. Bapt. Spix. Monachii. 1815. fol.
- Spurzheim* — The physiognomical system of Drs. Gall and Spurzheim. II. edit. London. 1815. 8.
- Stark* — Will. Stark's klinische und anatomische Bemerkungen, nebst diätetischen Versuchen. Herausgegeben v. J. C. Smyth, und aus dem Englischen übersetzt v. C. F. Michaelis. Breslau. 1789. 8.
- Steenberg* — Jan. Guil. van Steenberg diss. de cerebro. Lugd. Bat. 1731. 4.
- Stenson* — Nicolai Stenonis de cerebri anatomie dissertatio. — in Mangeti bibl. Anat. II. p. 87.
- Stiebel* — Sal. Stiebel Diss. sistens Linnæi sternalis anatonien. Gotting. 1815. 4.
- Störck* — Ant. Störck annus medicus, quo sistuntur observationes circa morbos acutos et chronicos. Vindob. 1760. 61. II. 8.
- Stoll* — Max. Stoll ratio medendi in nosocomio practico Viennensi. Viennae 1780-90. VIII. 8.
- Stumph* — Nic. Stumphius de cerebro. Lugd. Bat. 1736. 4.
- Tacheron* — Recherches anatomico-pathologiques par Tacheron. Paris. 1822. III. 8.
- Teubeler* — Diss. de vulneribus cerebri non semper lethales. Auctore Io. Chr. Teubeler. Hala. 1750. 4.
- Theden* — Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Arzneygelehrtheit, von J. C. A. Theden. Berlin. 1795. III. 8.
- Tiedemann* — Zoologie. Zu seinen Vorlesungen entworfen v. Fr. Tiedemann. Landshut. 1803-10. II. 8.
- Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbases in den Thieren. Von Fr. Tiedemann. Nürnberg. 1816. 4.
- Anatomie der Röhren-Holothurie, des pomeranzfarbigen Seesterns und Steingels, verfasst v. Frdr. Tiedemann. Landshut. 1816. 8.
- Fr. Tiedemann's Anatomie der kopflosen Mischebarten. Landshut. 1813. fol.
- Fr. Tiedemann icones cerebri simiarum et quorundam mammalium rariorum. Heidelb. 1821. fol.
- Timm* — Ioh. Timm's observationes aliquot anatomico-practicae rariores, oder einige von Eröffnungen verstorbenen menschlicher Körper hargenommene u. selten vorkommende Anmerkungen. Bremen. 1755. 8.
- Treviranus* — Biologia oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher u. Aerzte, von Gfr. Reinh. Treviranus. Göttingen. 1802-1825. VI. 8.
- Ueber den innern Bau der Arachniden. Von G. R. Treviranus. Nürnberg. 1812.
- Vermischte Schriften anatomischen u. physiologischen Inhalts. Von G. R. Treviranus u. Lud. Chr. Treviranus. Bremen. IV. 4.
- Tübinger Blätter* — Tübinger Blätter für Naturwissenschaft und Arzneykunde, herausgegeben von J. H. F. v. Autenrieth und J. G. F. v. Bohnenberger. Tübingen. 1815, 1816. III. 8.

- Tübingen Dissertationen* — Sammlung medicinischer Dissertationen von der Tübinger Universität. A. d. Lat. übers. v. Weher. Tübingen. 1821-24. III. 8.
- Tulp* — Nicolai Tulp's observationes medicæ. Amstelod. 1652. 12.
- Valverde* — Anatomie corporis humani, auctore Iob. Valverde, nunc primum a Mich. Columbo latine reddita. Venet. 1589. fol.
- Varoli* — Constantii Varolii, medici Bononiensis de resolutione corporis humani libri IV. Francof. 1591. 8.
- Const. Varolii de nervis opticis, nonnullisque aliis præter communem opinionem in humano capite observatis. Francof. 1591. 8.
- Verheyen* — Corporis humani anatomia, authore Philo. Verheyen. Ed. II. Bruxellæ. 1710. 4.
- Vesal* — Andr. Vesalii opera omnia anatomica et chirurgica, cura Herm. Boerhaave et Bernh. Sgræ. Albin. Lugd. Bat. 1725. II. fol.
- Vesling* — Iohann. Veslingii syntagma anatomicum, commentario atque appendice illustratum et auctum a G. L. Blasio. Amst. 1666. 4.
- Vetter* — Aloys Rud. Vetter's Aphorismen aus der pathologischen Anatomie. Wien. 1803. 8.
- Vicq d'Azyr* — Traité d'anatomie et de physiologie. Par Vicq d'Azyr. Paris. 1786-90. fol.
- Vienssens* — Raymundi Vienssens, Monspelienensis, neurographia universalis. Ed. nova. Lugd. 1885. fol.
- Voigtel* Handbuch der pathologischen Anatomie, von F. G. Voigtel. Halle 1804. 5. III. 8.
- Walter* — Iob. Glob. Walter observationes anatomicae. Berol. 1775. fol.
- anatomisches Museum, gesammelt von Iob. Glob. Walter; beschrieben von Fr. Aug. Walter. Berlin. 1795. II. 4.
- Warner* — Ioh. Warners chirurgische Vordrücke und Bemerkungen. A. d. Engl. Leipzig. 1787. 8.
- Wæber* — Anatomia comparata nervi sympathici. Auctore Ein. Hnr. Weber. Lips. 1817. 8.
- Wedemayer* — Physiologische Untersuchungen über das Nervensystem und die Respiration. Von Ge. Wedemayer. Hannover. 1817. 8.
- Wenzel* — Ioh. Wenzels Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode herausgegeben von Karl Wenzel. Mainz. 1810. 8.
- Wenzel* — Joh. u. Carl Wenzel's Prodomus etnes Werks über das Hirn des Menschen und der Thiere. Tübingen. 1806. 4.
- — Ios. et. Car. Wenzel de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Tübing. 1812. fol.
- Wepfer* — Io. Inc. Wepfer historiae apoplecticorum observationibus et scholis anatomico-medice illustratae Scavus. 1653. 4.
- — Wepfers Beobachtungen von den innern und äussern Krankheiten des Kopfs. A. d. Latein. von Weiz. Leipzig. 1797. 8.
- Wetzler* — Beiträge zur theoretischen und praktischen Medicin. Von Ioh. Ev. Wetzler. Mainz 1819. 8.
- Wharton* — Adenographia s. glandularum totius corporis descriptio. Authore Thom. Whartono. Amstel. 1671. 12.
- van der Wiel* — Corn. Stalpaart van der Wiel observationum rariorum medicorum, anatomicarum, chirurgicarum cent. II. Ed. nova. Leidæ. 1727. II. 8.
- Willis* — Thomae Willis opera omnia. Gener. 1676. 4.
- Wilson* — Eine auf Versuche gegründete Untersuchung über die Gesetze der Functionen des Lebens. Von A. P. Wilson Philpp. A. d. Engl. von Ioh. v. Sontheimer. Stuttg. 1822. 8.
- Winslow* — Exposition anatomique de la structure du corps humain. Par Jacques Benigne Winslow. Amsterdam. 1752. IV. 8.
- Wohnlich* — Guil. Wohnlich Diss. anatomica de Helice pomatia. Wirceburgi 1813. 8.
- Wreden* — Kurze und gründliche Demonstration des Gehirns und derer Theile, welche dasselbe umgeben, von Otto Iust. Wreden. Leipzig. 1791. 8.
- Wrisberg* — Herm. Aug. Wrisberg commentationes medicæ, physiologiæ, anatomici et obstetricii argumenti. Götting. 1800. 8.
- Wutzer* — Car. Guisl. Wutzer de corporis humani gangliorum Fabrica atque usu monographia. Berol. 1817. 4.
- Yonge* — wounds of the brain, proved curable, by James Yonge. London. 1682. 12.
- Zerbi* — Opus præclarum anatomie totius corporis humani et singulorum membrorum illius, editum a Gabrieli Zerbo, Veronensi. Venet. 1533. fol.

Register.

(Die deutschen Ziffern bezeichnen die Paragraphen; die römischen bezeichnen die Anmerkungen; boy den längern Anmerkungen sind auch die Seitenzahlen beygefügt).

Abhang des Berge 123.
Abmagerung durch Abnormitäten des Gehirns bestimmt
 707. Vergl. Ernährung.
Abnormitäten des Gehirns 257.
 Beseitigung derselben wird möglich 514.
 durch Seelenfähigkeit bestimmt 389.
 gleichzeitig mit Abnormitäten im Bumpfe
 518. 514. 506.
Absehung durch das Gehirn bestimmt 508.
Aerphalen 250.
 Ernährung 509.
Aetivitas 168.
Activität der Sinne 578.
Additamentum cerebri membranacea subtile CCXXX.
Adipositas CCXXX. S. 370.
Adipositas CCXXXIV. S. 374.
Adipositas Wirkung auf die Seelenfähigkeit 397.
Adipositas CCXXX. S. 370.
 der winden Höhle. CCXXXIII.
 kleineres. CLXXVI.
Adipositas CLXXVII. a.
Adipositas ad squamosum CCXXXIII. S. 378.
 infundibulum, ebend. S. 379.
 ventriculus tertius, ebend. S. 378.
Aetia des kleinen Hirns 109. CCXXXVIII.
Aetia des durch das Innere bestimmt 478.
Altergebilde des Gehirns 260.
 durch Erschütterung veranlaßt 258.
 glühende 269.
 veranlassen Erweichung u. Wassergießung 248.
 Wirkung auf den Puls 503.
 auf die Seele 570.
Alimung 19.
 Beziehung zum Geruche 583.
 zum Vorderhappen 1049. 1050.
Aktionen 250.
Alia formica CCV.
 lobli centralia 121.
 processus vermiformis inferioris CLJ.
Alia. Verhältnisse der Hirnabnormitäten zum Leben 333.
Alia 109. b. CCXXXV. S. 286. CLXI.
Alia exterior de substantia cinerea de grand ganglion
 cerebralis superioris. CCCLX.
Alia cerebralis 96.

Anmuthern. Ben 109. CCXVI.
 Entdeckung. CXII. S. 206.
 Leben 999. 1033.
Anomalen der Hirnabnormitäten 223.
Anomale, pathologische, für Physiologie des Gehirns
 654—657.
Anomale. CXCL. CCXCV.
Anomalen 230.
Anomale des Hirnmarks. CCXVI. S. 280.
Anomale 90. CCX.
Anomale der verschiedenen Systeme im Gehirn 780.
Anomale cerebralis. CXCL.
Anomale des Hirnmarks. CXCL.
Anomale, Beziehung zum Leben 103. 294. 295.
 Centralende 148.
 Leben 811—814.
 Rückenmarksnerven 812.
Astrum CLXXIV.
 nervosum motorium communium. ebend.
Astrum CCXXXIII. S. 378.
Apertura ad ventriculum tertium. Ebend. S. 378. 380.
 anterior. Ebend. S. 380.
 dorsalis. Ebend. S. 378.
 posterior. Ebend.
Apices subduralis oblongatus. CCXCVI.
Apoplexie von Gehirnartern 662. 663.
 von Abnormitäten des Hirnsystems 725.
 verlagerten Mark 883.
Apoplexie von Abnormitäten des
 Mark 725.
 Strahlengänge 958.
 Strahlengänge 970.
 von Wassergießung 248.
Apoplexie picea 251.
Apparatus de formatione CXIX.
 function, ebend.
 reinforcement, ebend.
 remission, ebend.
Appendix ad cerebrum CCXXXV.
 benedictina CCXVI.
 cerebralis CLXXXVII. a.
 cerebralis veri formica CCV.
 glandula pituitaria CLXXXVII. a.
 lobularis CLJ.
 strophomedealis CLXXXVII. a.

Appendix ventriculi CCXXIX. S. 382.

Aqueductus 201. CLXXXVII. d. CCXXIII.
S. VII. CCXXVIII.

Arachnoidea. CCXXIV. S. 274.

Arachnoides, siehe Meningitis.

Arantiussemer. CLXII.

Arteriae. CCXXVII. S. 360.

Arcus concentricus. CXL.

Ares. CLXI.

quadrate nervi optici. CCXXIX.

Artiglio. CCXXVII.

Asteria auricularis interna 153, b.

bulbula 153.

callosa 215. CCXXIII.

cerebelli inferior 152, a.

media 153, b.

superior 153, c.

cerebri anterior CCXXIII.

media, ebend.

posterior 215. CCXXIII.

profunda CCXXIII.

communicans anterior, ebend.

posterior, ebend.

corporis callosi, ebend.

cruralis cerebri 215.

encephalon CCXXIII.

anterior 215.

posterior 152.

fossa Sylvii CCXXIII.

hemisphaerica anterior, ebend.

media, ebend.

insularis 215.

mesolobica CCXXIII.

apicalis anterior 152, c.

posterior 152, b.

Sylviana CCXXIII.

vertebralis 151.

Arteria des Gehirns

Anastomosis 228.

Beziehung zur Hirnbewegung 270, 271.

zur Hirnbildung 250, 265.

zur Hirnthätigkeit 565.

zur Seelenhätigkeit 406.

Durchschneidung von Blut 246.

Krümmungen 270.

Lage, ebend.

Unterbindung, ebend.

Verknöcherung 241.

Verlauf 24, 226, 270.

Vordere und hintere 825.

Wandung 244, 270, 271.

Zertheilung 244.

Zusammensetzung mit den Venen 227.

Arteria des großen Hirns 215. CCXXIII.

des kleinen Hirns 151 — 153.

Arterien des Körpers: Beziehung z. Hirnthätigkeit 564, 565.

Artiglio CCXXVII.

Atmen, bestimmt durch Gehirnthätigkeit 435.

Gemeinshätigkeit 436.

Hirnthätigkeit 224 — 229, 565.

mittels Holznerven 228.

Hirnnerven 225, 228, 245, 250.

Hirnstamm 222.

Atmen, best. durch Hirnthätigkeit mittels kleines Hirn 900.

Mantel 722.

verlängertes Mark 826.

Rückenmark 58. LXXVI.

Wurm 229.

Beziehung zum Gehir 589.

zum Geruche 585.

einwirkend auf Hirnbewegung 272.

Hirnthätigkeit 275 — 275, 555.

Seelenhätigkeit 528, 409 — 413.

Warme 507.

erschwert bey Hirnsernichten 224, 201.

Wesenheit für das Hirnleben 547 — 551.

Atmungstrieb 821.

Atrophie des Gehirns 251.

durch Druck 242.

durch Wasserschlaffung 248.

einwirkend auf Seelenhätigkeit 568.

Augapfel Bewegung 847.

Augt, bestimmt durch Hirnthätigkeit 354, 839.

einwirkend auf Hirnthätigkeit 280.

Augenlieder, bestimmt durch Hirnthätigkeit 344, 692.

805, 812, 813, 840, 841.

Augenmuskeln, bestimmt durch Hirnthätigkeit 344, 693 —

699, 807, 812, 813, 840.

Augenmuskelnerven. Aculifer. Centrales Ende 169.

Leben 847.

Gemeinschlicher. Centrales Ende 210.

CCXXVIII.

Leben 847.

Hinter CLXXIII.

Kleiner CCXXVII.

Mittlerer CCXXVIII.

Obrer. Centrales Ende 210. CCXXVII.

Leben 847.

Vorder CCXXVIII.

Aura epileptica 348.

Anastomosis in den Gefäßgeflechten 758.

Anastomosis aus dem Gehirne 268, 272, 477, 618, 756, 878.

CCII. S. 123, 134, 197, 210.

durch Darn 320.

Harwege 527.

Nase 357.

Ohr 236.

Ausschnitt des kleinen Hirns, bestellirriger CXL. S. 295.

halsmondförmiger, ebend.

hinter, ebend.

vorder, ebend.

Augenwelt, Wirkung auf Hirnthätigkeit 566. Vergleich-

che: Reize und dernde Körper.

Bach CCXXVI.

Bündchen der Zäbel CLXXXVIII. S. 535. CXG. S. 558.

gefuchtes CLXXV. S. 526.

Balg 244, 260.

Balggeschwüre 252.

Balggeschwüre 260.

Balggeschwüre 249.

Balken 189. CCVIII.

Geschichte CXII. S. 128, 202.

im Ammonshorn 192, 2.

Leben 1005 — 1020.

im Hinterlappen 1037, 1040.

im Unterlappen 1037.

Balken, Leben im Vorderleppen 1037. 1047.

Balkenarterie 215. CCXXXII.

Balkenkeile 102. CCX.

Balkenkanal 190. CCIX.

Balkenstrahlung 101.

Balkensystem CCX. S. 885.

Balkenstapels 193.

Balkenwulst 193. CCXI.

Balkenzange 193.

Basis CCXVI. S. 575.

bedecktes CCXII.

des Gefäßgeflechts der vierten Hohlk 158. g.

halbkreisförmiges CCXV.

intendiert CCXVI. S. 576.

quergerichtetes CL.

weiches CCXII. d.

Basis transversale derrière le ganglion olivaire CCXXIV. S. 186.

Basis transversale derrière la réunion du cer-
vix CLXX.

Basis coronae radiatae 182.

corpore striati CCXVI.

formis CCV.

ventriculi tertii CLXXXIV.

Bau des Gehirns überhaupt 87.

Bauchingeweide, Nerven 45.

Bauchmark 544.

Bauchnerven. Beziehung zum Rücken 291. 297. 298.

Bauchingeweide, Nerven 44.

Bedeutung der Organe 649.

Begattung. Wirkung auf das Gehirn 277. (Vergl. Ge-
schlechtsfunktionen).

Begabung, Organ 646.

Belagungsorgan 89.

Belagungsorgan, ebend.

des großen Hirns 194—197.

des kleinen Hirns 115.

Belagungsorgan 89.

des großen Hirns. Bau 185—193.

Leben 994—1020.

Belagungsstrahlung 89.

Belagungssystem 88. 89. CCXX. a.

Leben 738—742.

Beziehung des Gehirns. Wirkung auf Muskeln 345.

Beziehung von Abnormitäten des Gehirns 660. 663.

des Hirnstammes 725.

des Nostels, ebend.

Bengemarken 565.

Bewegung der Muskeln 21. 567. (Vgl. Augenlider. An-
genmuskeln. Gesichtsmuskeln. Gliedmaßen.
Halbmuskeln. Hrn. Kiefer. Speiseröhrenkopf.
Zunge).

bestimmt durch Hirnstrahlung 541—551. 592. 593.

Balken 2020.

Belagungssystem 741.

Hirnhäute 772.

Hirnstamm 726. 727.

Kleines Hirn 905—911.

Körnervorn 10. VLXXXVIII. 9. 1.

Mastel 726. 727.

Oberlappen 1025.

Rückenmark 53. LXXII. 69.

Rumpfvorn 36. 41. LVIII. LX. LXXX.

Bewegung, bestimmt durch Schlägel 962.

Stammesregeln 732. 958.

Strahlstrahlung 560. 569.

Vorhänge 952.

Seelenstrahlung 446. 594—601. 446.

Einfluss auf Hirnstrahlung 181. 211.

Seelenstrahlung 430.

Verhältnis zur Empfindung 26. 549. 852. 865. XLVI.

zu den Seiten des Gehirns 770. 776—816.

CCXII. S. 105.

gründlich willkürlicher und unwillkür-
licher Bestimmung 55. 603. 707. 885.

908. LVIII. LXXX.

Wesen 591.

Bewegung des Gehirns

Beschreibungen 268. 269.

Geschichte CCX. S. 197.

Grund 270.

Mechanismen 271.

intendiert durch Bildendheit 755.

Wirkung 272.

auf Blutlauf 250.

Schädel 241.

Seelenstrahlung 401—401.

Bewegung im Gehirn 503—507.

in Nerven II.

Bewegungsnerven 852. 864. 9. CCXII. S. 206.

Bewusstseyn. Beziehung zum Rücken 1015.

zum großen Hirns 917.

zum Hirnstamm 715.

zum Mastel, ebend.

zum Oberlappen 1029.

zum Schlägel 969.

zu Stammesregeln 958.

zum Strahlstrahlung 971. 972.

zu Vorhängen 951.

Beynerv. Centralende 145.

Leben 297. 298. 850.

Bildende Tätigkeit im Gehirn 224.

Bildung des Gehirns 225.

aus Wasser 474.

Bestimmungsgünde 265.

Moment des innern Lebens 508.

unwillkürlicher 250.

Bilde CCXVI. S. 575.

Bildende Bau 164. g. CLXXXV. f.

im kleinen Hirns 118.

im Schlägel 175. f. CCXIII. h.

Geschichte CCX. S. 198.

Leben 928. 929. 957.

Bildsystem 164. f.

Bildchen, gerolltes CCX.

Blätter des kleinen Hirns 111. CXL.

Blasen 294.

Blasenäste 111.

Bündelheit von Abnormitäten des Gehirns 672.

Kleines Hirn 914.

Gehirns 380. 664. 665.

Balken 1024.

Hirnstamm 725.

Kleines Hirn 917.

Mastel 725.

verlängertes Marks 885.

- Blöden von Absonderung des Schlägels 361.
Wirkung auf Hirnbildung 386.
- Blut. Androg gegen das Gehirn 305. 367. 759.
das Oberlappen 1027.
angedogen durch das Gehirn 305. 385.
ergossen 214.
- Einfluß auf Adhäs 304.
Leben 385.
Puls 303.
im Strichhügel 957.
abgeführt 335.
eingezogen 335. 344. 252.
Wirkung auf Hirnschichten 244. 254.
Schädel 244.
- Lauf im Gehirn 227—251. CXXKIL.
- Geschichte CXXL S. 208.
in den Hügeln 206.
im kleinen Hirn 254.
- Qualität 225.
Wirkung auf Seelenfähigkeit 398. 399.
- Quantität 225. CXXIII. S. 270. 39.
bestimmt durch Hirnfähigkeit 305.
- Wirkung auf Erhaltung 225.
Bewegung 371. 354.
Erregung 32. 226. 371. XLII.
Seelenfähigkeit 391—408. 536. 746. 767.
- Blutleiter CXXIII. S. 271.
dreieckiger CXXKXV.
kreisförmiger des Hinterhauptes CLXXVIII.
langförmiger CXXKXV.
oberer siebelförmiger, ebend.
- Blutgefäße CXXIII. S. 271.
Blutgefäß Beziehung zum Gehirne 384.
Einfluß des Gehirns 300—306.
des Gehirns 431.
des verlängerten Marks 876.
des Nerven 25. XLIII.
des Rückenmarks 61. LXX.
des Rumpfes 55. LIX.
- Blutleiter gk. CXXIII. S. 271. 19.
Anatomie 225.
Geschichte CXXL S. 196.
Leben 225.
Verhalten beim Atmen 273.
elliptischer CXXKXV.
gerader CLXXVII. a)
kammförmiger CXXKXV.
quergelegener CLXXVII. b)
ringförmiger des Hinterhauptes 157.
CLXXVIII.
schiefes CLXXVII. a)
senkliches CLXXVII. b)
- Blutung. Wirkung auf die Seele 397.
Hinterhaupt 245.
- Boden der dritten Hölle CLXXIV.
der Sylvischen Grube CXXKL.
der vierten Hölle 167. b)
der Wasserleitung 167. a.
- Bogen CCV.
Bogenbündel 167. CCKV.
Leben 1025.
- Bogenförmiger vorderer CCV.
Bosbyr CCKVL

- Bourlet ansticht CCK.
arrault CCKI.
- Brachia cerebelli 169.
corporum quadrigeminae 169.
forata CCVL.
paria 129.
- Brach 216.
- Brach 87.
im kleinen Hirn 920.
- Brachsystem, siehe Quersystem.
- Bruch, siehe Hirschbruch.
- Bruch der Krongrube CLXII. e)
- Brücke. Des 128. CXXII.
Entdeckung CXXI. S. 204. 205.
Leben 721. 632.
- Brücken 126. CLIII.
Brückensystem, siehe 132. CLVII. 138. CLXII.
Leben 925. 928.
- Brückenkörper 130. CLIV.
Brückenschicht CLIII.
Brückenschiebung 116.
Brückensystem. Leben 928.
Brückengewebe. Nerven 46.
- Brückenvenen. Beziehung zum Atmen 290. 298.
Buchten der vierten Hölle 141. CLXIV.
- Bündel hinteres des hinteren Strangs CXXVII.
hinteres des vorderen Strangs CXXVII.
hinteres des hinteren Strangs CXXVII.
vorderes Strangs CXXVII. S. 282.
mittleres des vorderen Strangs CXXVII.
mittleres CXXKXIV. CXXKXV. 2)
vorne CXXKXIII.
- Bulbus cinereus CCKXX.
nervi olfactorii, ebend.
piriformis cruris forata CCV.
rachidialis superior CCKXV.
- Calamus CLXI.
scapularis 128. b). CLXI.
- Calcar, s. CLXXVII.
- Cavata anteriora ventriculorum CCVII.
medullaris CCKX S. 383.
- Cavata CCKXI.
- Canal CCKVIII.
des Rückenmarks 65.
der Vierhölle CCKVIII.
- Canales durae matris CCKXIII S. 271.
- Cauda CCKVIII.
a) s. s. ad cerebrum CCKXX.
arachnoidea 214.
corporum quadrigeminae CCKVIII.
essentiae quadrigeminae, ebend.
intermedia ventriculorum, ebend.
mediana, ebend.
qui posteriora ventriculorum cum tertio comi-
nat, ebend.
tuberculorum quadrigeminae, ebend.
- Capsula lateralis 180. CC.
des Gliedkörpers CCKXVIII S. 288. CCKXIX.
inter 178. CCKVIII.
- Capsula exterior 180.
interior 178.
- Capsula medullaris CCKVIII.
medullaris oblongata CCKI.

- Caput processus vermiformis inferioris CLX.
 Caput CLXXXVII. d. 2. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Commissura Endocranium CXII. S. 202.
am großen und kleinen Hirne 924.
der Hirnserven CXXII. S. 267.
Lehen, siehe Querbelegungsraum.
Commissurae receptivorum CXXXV.
Commissura 108.
Commissura communis ventriculi dextri et sinistri CXXVIII.
S. 578.
cerebulae CLXXXVII, d.
Cauda, eband.
Caudamenta, s. 284.
am kleinen Hirne 995.
durch Eröfthung veranlaßt 288.
Wirkung auf die Sechthätigkeit 570.
Congressus nervorum opticozum CXXXIX.
Congestiones CXIX, f.
Conus S. V.
der Hirnhäute 781.
Consistentia des Gehirns 254. CXVL (Vgl. Weichheit und
Festigkeit).
Contactus lateralis nervorum opticozum CXXXIX.
Continuitas nervorum opticozum, eband.
Contre-coup, siehe Gegenstoß.
Conus asperus striati CXCVL
Convulsiones, s. Krämpfe.
Cospersoria CXXIV.
Cupula alba cerebri CCVIII.
nervorum opticozum CXXXIX.
Cortex de heller CCXVL S. 576.
Corticis CCV.
Corticis, eband.
Cortex ammonis 109. CCXVI. CCMIX. S. 382.
aristia CCXVI.
anterior 202. CCKIX. S. 581.
descendens, eband. 382.
inferius 202. eband.
posterior 202.
Cortex ventriculorum CCXIX.
Cortex radiata 182.
Corpus bordi frangi CCXVI. S. 575.
Corpus albacum CCIV.
album subcorticalum thalami CXCH. b.
callosum 189. CCVIII. CCKX. S. 383.
cortex modo extractum CCV.
compressum, eband.
corticium CXVL
corticale pyrozum CCXV. S. 385.
ciliare 110. CXXXIX.
de genere glandularum CLXXXVIII.
dentatum cerebelli CXXXIX.
olive 100.
eminens oblongum album CXCH. b.
expulsum 89.
fissuratum CCXVI.
ciliare CCKIX. S. 284.
fo nida 186.
modo extractum CCV.
geniculatum externum 172. CXCH. e.
internum, eband.
glandulare CCIV.
globosum CLII.
medullare cerebelli CXXXIX.
transversum certum refectis CCVII.

Corpus alvare CXXXVII. CXXIX. S. 284.
posterior CXXXVIII. S. 288. CXLI, b.
dextra CXXIX. S. 284.
pallidum CCV. CCVIII.
pallidum CCXL.
pyramidale CXXXVII.
antrum CXXVIII. CXXXVIII. S. 288.
inferius CXXXVIII.
internum CXXVII.
laterale CXXIX. S. 284. CXXXVIII.
S. 288.
posticum CXXXVIII. CXXIX. CXXXVIII.
S. 288. CLXII, b.
superius CXXVII.
quadrigeminum 159.
resistente CXXXVIII. S. 288.
rhomboidum cerebelli CXXXIX.
olive CXXIX. S. 284.
seriatum cerebelli CXXXIX.
eminens olivae CXXIX.
S. 284.
speculare CCIII.
striatum 176. CXCL. CXCVI.
antrum inferius CXCVL.
inferius externum, eband.
posticum CXXIX.
internum CXVI.
medium CXXVIII.
posterior internum CXCL.
superius anterior CXCV.
posterior CXCL.
teres CXXIX. S. 284.
trapezoidum 89.
turbidum CLXXXVIII.
vorticatum CXX.
Corpuscula quatuor emolentia CLXXXIX.
Cortex 90. CXVI. S. 284.
Caudas intermediarias duas la ligae molles CXIX, e.
Conus CXCL.
Cochet CCXVI. S. 575.
Crura ventriculorum CCKIX.
Crura cerebelli CLIII.
ad cerebrum LXXXV, f.
ad emulsionem quadrigeminam, eband.
ad medullam oblongam CXXXVIII. S. 288.
ad posteriorem CLIII.
anterior, eband.
descendens CLXXXV, f.
descendens CXXXVIII. S. 288.
nigra CLIII.
postica CXXXVIII. S. 288.
superior CLXXXV, f.
cerebri 163. CXIX. CLXXXIII.
encephali 89.
fornix 187. CCV. CCXVL
antrum CCV.
posticum CCVI.
medullae oblongae CLXXXIII. CXCL.
antrum CLXXXIII.
epialis superior, eband.
medullare, eband.
glandulae pinnalis, eband. CX. S. 338.
Callosa cerebelli 122.

Conus 194.
 Curvatura perpendicularis communis CCXL S. 293.
 Cusca cerebri CCXIV. S. 275.
 Dach der Sylvischen Grube CCXXI.
 vierten Hühle 140.
 Darm. (Vgl. Darmablenkung. Diarrhoe. Gaur'sche Zu-
 fälle. Verstopfung.)
 Einfluß des Gehirns 517—522, 0.
 Hirnstamm und Mantel 722.
 Wirkung auf die Seelenthätigkeit 426.
 Darmablenkung, unwillkürliche, von Hirsnnormitten
 321. 705.
 Darmwürmer. Wirkung auf die Seele 416.
 Davidshorn CCXL.
 Deike der Höhlen des großen Hirns CCXX. S. 586.
 Decliv. cerebelli 122.
 Decussatio nervorum opticozum CCXXIX.
 Dehnung von Abnormitäten des Gehirns 578. 557. 658.
 Balkens 1016.
 Hirnstamm 725.
 Mantel, ebend.
 Schlingel 950.
 Denken, Verhältnis zum verlängerten Marke 385.
 nicht Blut in's Gehirn 385.
 Denkhraft. Organ 546.
 Diaphragma cerebri CLXXX. CCXL.
 Diarrhoe von Hirsnnormitten 520. 704.
 Dignit. pedis hippocampi CCXVI. S. 576.
 Dimensionen 88.
 des Gehirns 87. 785—870.
 des großen und kleinen Hirns 320.
 Diverticulum CCXIX. S. 582.
 Dreyeck CXG. CCV. CCXLI.
 gefaltetes CXG.
 vertebales CCXL.
 Dreieckene 156.
 Durchbindung 238. 273.
 Druck. Von Blutergießung 244.
 Einfluß auf A-donen 294.
 Erweichung 309.
 Hirn 500.
 Hirnbildung 242. 243.
 Hirnthätigkeit 507.
 Magen 513.
 Muskeln 543.
 Puls 503.
 Seelenthätigkeit 554—559. 404.
 Drüsen im Gehirn 648. 278.
 Pschyologische CCXIV. (S. 276. 6p.) 259. 771.
 Entwicklung der Seelenthätigkeit 467.
 Ductus medullaris CXCV.
 nervos CCXXX.
 Duplicität 87. CCXVII. 785—788. C.
 im großen Hirn 925.
 im kleinen Hirn 112. 925. CXLI.
 im Rückenmark 72. CXVI.
 in den Seelenthätigkeiten 789—793. (Vergl.
 Rechts und Links. Schlingel).
 Durchmesser des Gehirns. 88. (Vgl. Dimensionen).
 Durs. im großen Hirn. 881.
 Dynamische Erscheinungen 7.
 Echmocrate perpendicularis posterioris moyens CXLI.
 S. 293.

Eingang der Sylvischen Grube CCXXI.
 Einheit der Empfindung durch den Balken 1014.
 der Hirnorgane 87. 780—784.
 des Bewusstseins durch das Gewölbe 925.
 durch Sensibilität 8.
 Einseugung 94. 255. 266. 281.
 von ergoischen Blute 244.
 durch Gefäßschlinge 753.
 der Zerkel 286.
 Einschnitt des kleinen Hirns, vesicul. und Minter 112.
 CXLI. S. 295.
 der Scheidewand 285.
 Einschnitte 91.
 Erweichung 249.
 durch Erweichung veranlaßt 238.
 im Streifenhügel 967.
 Wirkung auf Hirn 555.
 Magen 513.
 Seele 566.
 Ekel 458. 558.
 Elektr. 415.
 Elektricität. Erregung 913.
 Leitung 925.
 Embryon. CLXXXVII. d.
 Embryonogenese 651.
 Eminentia annularis CLII.
 canaliculi CCIV.
 cerebelli CCXLI.
 callosales CCXVI. S. 576.
 digitalis CCXVII.
 glanulosa CCIV.
 inferior CLXXXIX.
 lateralis bulbi rostralis CCXXIX. S. 284.
 mammillaris CCIV.
 vallis inferioris CL.
 mediana bulbi rostralis CCXVII.
 medialis apicalis ossa CCXXIX. S. 284.
 medullaris CCIV.
 minor CCXVII.
 oblonga CCXVII.
 olivaria CCXXIX. S. 284.
 papillaris CCIV.
 perpendicularis CCXXIV.
 posterior bulbi rostralis CCXXVIII. S. 283.
 pyramidalis, ebend. CCXXX.
 pyriformis CCXVI.
 quadrigenus CLXXXIX.
 spinilis coxae lumbales CCXCV.
 superior CLXXXIX.
 transversalis vincturalis guard CLXII. u. CLXX.
 unifornis CCXVII.
 Eminentia CCXXIII. S. 271. 272.
 Eminentia aquae CCXVIII.
 Empfindlichkeit, ohne Gemüthsgefühl.
 Empfindung 28. 567. 569. (Vgl. Sensation).
 Verhältnis zur Bewegung 24. 519. 852. 865.
 XLVI.
 Verhältnis zu den Seiten des Gehirns 820.
 von der Seele bestimmt 445.
 Wirkung auf die Seele 427.
 Empfindungsmerkmale 852. 864. 865. CCXXI. S. 286.
 Encephalus 246.
 Wirkung auf die Seele 562.

Encephalocoele 313.
 Encephaloma 84.
 Endbläschen des Saums, breites CXXVI. S. 373.
 Endköpfe des Rückenmarks 81.
 Verhältnis zum Hirnstrange 985.
 Endplatte, graue 157, c. CLXXXVII, c.
 Endknospe 426. (Vgl. abgeschnittener Kopf)
 Entozoon im Gehirn 255.
 Entschleimung transversal CXL. CXXXV. S. 286.
 CLXXXVI. CXXIV. CXXVII. S. 350.
 Entwicklungsgeschichte, für Physiologie des Gehirns 610.
 Entzündung 266.
 durch Erschütterung 238.
 Wirkung auf Consistenz des Gehirns 254.
 Magen 313.
 Puls 353.
 Epilepsie, siehe Krämpfe.
 Epiphyse medullaris CXXIV.
 piae nostrae CXXIII. S. 270.
 Epithelium 91. CXXI. S. 265. (Vgl. Hohlhaut)
 des Schädels 175, l. CXXIII, l.
 des Streifenlängels 177, d.
 Erhabenheit, braunförmige CCIV.
 erbsenförmige CL.
 eyförmige CXXIX. S. 284.
 fingerförmige CXXVII.
 geweiße CXXVI.
 kugelförmige CCIV.
 hintere CXXXVIII. S. 288.
 innere CXXVII.
 insigliche CXXVII. CXXVI. S. 376.
 mittlere CXXVII.
 pyramidenförmige, ebend.
 varia, ebend.
 ringförmige CLII.
 schleimige CXXIX. S. 284.
 vielfache CLXXXIX.
 weiße CCIV.
 Ergot CXXVII.
 Erbrechen von Hirnschnecken 512: 515. 722.
 Wirkung auf das Gehirn 272. 276.
 Ernährung des Körpers. (Vgl. Abseugerng.)
 Einfluss des Gehirns 500. 510.
 des Hirnstammes 722.
 des kleinen Hirns 878.
 des Nabels 722.
 des Nerven 510. XLV.
 des Rückenmarks 51. LXX.
 Verhältnis zum Gehirn 224.
 Ernährung des Gehirns 254. (Vgl. Atrophie)
 aus Wasser 475.
 Erstickung 238.
 Einfluss auf Atmen 294.
 Blutlauf 503. 506.
 Consistenz des Gehirns 255.
 Erzeugung v. Aftergebilden 250.
 Hirnthätigkeit 307.
 Leben 333.
 Magen 313.
 Warme 307.
 Eris CXXVI. S. 373.
 Erweichung des Gehirns 254.
 bey Erweiterung 266.

Erweichung bey Wassereingießung 218.
 im Streifenlängels 157.
 Wirkung auf Magen 313.
 Seelethätigkeit 369.
 Eristen, siehe Nahrungstrieb.
 Expansio reticulata CXXXIII.
 trans CLXXXV, g.
 Expansion des Gehirns durch Hohlhautreue 758.
 Experimente für Physiologie des Gehirns 638.
 Extremitas septi CCV. S. 359.
 ventralis lateralis superior CXXIX.
 posterior, ebend.
 Extremum ophthalmicum medullae spinalis CXXVI. S. 280.
 Eyaute, siehe Frachthüllen.
 Fascia, grand. fibrosa des hemisphaeres CLXXXIII.
 de l'innervation blanche dirigée vers l'extrémité
 transversale au dessus du nerf opti-
 que CCIV.
 originaria du cerebel CXXXVIII. S. 288.
 primifia du cerebel, ebend.
 Falte CXXVII.
 große CLXXXV, g.
 Fala cerebeli CXXXVI.
 minor 218.
 memoria CXXXV.
 minor 155. CLXXX.
 transversalis CLXXX.
 Fascia CXXVI. S. 376.
 dentata 179, b. c. CXXVI. S. 374.
 medullaris CXXVII.
 Fasciculus arcuatus 197.
 bascos lateralis 194.
 longitudinalis inferior 195.
 obscuro 99.
 uniformis 195.
 Fasciola cinerea CLXX.
 Faserheit des Gehirns CXXIV. S. 275.
 Faserung des Gehirns 86. 87. 503. CXXII. S. 206. 214.
 CXVI. S. 251-253. CXXII.
 des Rückenmarks 65.
 Faser. Wirkung auf die Seele 414.
 Fastidium vesperale quatuor 161.
 Felsch, durch Hirnwinden begünstigt 309.
 Federrische CLXI.
 Federschädel, ebend.
 Felsenbläschen, oberflächlicher CLXXVII, c.
 ober 156, ebend.
 tiefer, ebend., d.
 tinter 156, ebend.
 Ferne. Wirkung in dieselbe 7. IV.
 Festigkeit des Gehirns 218. 255.
 Fibrae ad nervum facialem accessoriae CLXXI.
 pyramidum decussantes 98.
 primifia, ebend.
 Fila convergencia CXXIX.
 rastroa, ebend.
 sortina, ebend.
 Fimbria CCV. CXXVI. S. 374. 375.
 serpica CXXVI. S. 376.
 medullaris hippocampi, ebend., S. 375.
 transparens CXXII.
 Fingerhülle CXXIX. S. 522.
 Floscula anterior 204.

Gedächtniß. Beziehung zum Rücken 1016.
zu Ganglien 731.
zum Gehirn 581. 646. 656. 667.
zum Hirnstamme 725.
kleines Hirne 317. CXII. S. 208.
Nistel 725.
verlangerten Marke 883.
zu den Rückenmarken 168.
zur Rinde 767.
zu den Sehhügeln 951.
Verhügel 951.
Gefäße des Gehirns 91. CXXIII. CXXII. S. 193.
in einzelnen Theilen 715. 751.
Gefäßblatt CCXXXIII.
Gefäßgeflecht 91. CXXIII. S. 269. fg.
ley Hirnstamm 243.
Entwicklung CXII. S. 196.
Leben 767. 758.
Beziehung zum Gewölbe 956.
zur Phantasie 765.
Gefäßgeflecht der dritten Höhle 315. CCXXXIII.
Seitenhöhle, ebend.
vierten Höhle 154. 591. CLXXVI.
Gefäßgrube CCXXX.
Gefäßhaut 95. CXXIV.
Ablösung 351.
äußere CXXIV. S. 174.
Bildung 313.
Blutgefäßung 244.
Ernährung 218.
Entwicklung CXII. S. 196.
Entzandung 245.
des großen Hirns 214.
kleinen Hirns 158. CLXXIX.
Leben 769-771.
Regeneration 226.
des Rückenmarks 67. LXXXVII.
Verdickung 253.
Wassersucht 218.
(Vgl. plastische Hirnhäute).
Gefäßkranz CCXXXII.
Gefäßnetz 759.
Gefäßplatte 96.
obere 216. CCXXXIII.
untere 154. e.
Gefäßsystem, siehe Herz und Blutlauf.
Gefäßvorhang CCXXXIII.
Gefühl. Beziehung zum Athmen 412.
Rückenmark 918.
Fühlhüte 330.
Gehirne 382.
Gehör 584.
Gewölbe 997.
großen Hirns 918.
Hirnen 408. 512-546. 556.
Hinterlappen 1040.
zur Längsbelegung 742. 744. 747.
zum Rumpfe 556. 558.
Schlüssel 950.
Streichhölz 970. 972. 974.
Vorhügel 949. 951.
Gefühllos, siehe Fühlhüte.
Gegenstoß 783.

Gehirnarterie hiezu 753.
vordere 215.
Gefühl. Beziehung zum Antlitznerven 844.
Blut 356.
drei getheilten Nerven 836.
zur Flocke 950.
zum Gefühle 587.
Gehirne 356. 558. 573.
Geschmacks 588.
großen Hirns 917.
Hirnen 830.
kleinen Hirns 918.
Streichhölz 974.
Vorhügel 947.
Zangenschlundkopfnerven 848.
Organisation und Vitalität 576.
Weisheit 584.
Wirkungsweise 577. 578.
Geistesfähigkeit. Beziehung zum Athmen 435.
zum Blutlaufe 431.
zum Gefühle 543-546.
s. d. Geschlechtsfunktionen 442. 564.
zum Herzen 431.
Leibe 561.
Rumpfe 556. 558.
Schnur 585.
zur Sprache 607.
zum Tastlaufe 581.
zur Verdauung 413. 414-416. 437-439. 547-552. 561.
zum vordern Theile des Gehirns 825.
Weisheit 561.
Geister, thierische 370. 408. 504. 756. CXII. S. 196.
Gemeingefühl 12. 570. XXXVII.
Gemeingefühl des Gehirns überhaupt.
der Abgrenzung 570. 376.
der äussern Reizung 574.
der Hirnbewegung 574.
der physischen Hirnthätigkeit 574.
der psychischen Hirnthätigkeit 575.
Gemeingefühl d. vordern Hirnteile als Hülfsmittel der Physiologie 642.
des Halses 1017.
des Gewölbes 997.
der hintern Hirnteile 825.
des Hirnstammes 725.
des kleinen Hirns 966.
des Mantels 725.
der Markshäute 760.
des verlängerten Marks 881.
der Rinde 760.
der Sehhügel 950.
der Streichhölz 971. 972.
der Vorhügel 950.
der vordern Hirnteile 825.
(Vgl. Schmerz, Schwindel).
Gemeingefühl des Körpers.
Beziehung zur Bewegung 503.
zu den Ganglien & Hirnstamm 730.
zum Gehirn 333. 646.
zu den hintern Hirnteilen 825.
zum Hinterlappen 1058.
zum kleinen Hirns 922.

Gemüthsgefühl. Beziehung zum verlängerten Marke 381. 382.

zur Seele 428.

zu des Vierhügels 949.

durch den Aetherserven 844.

den dreigetheilten Nerven 831-836.

zum Rückenmark 845.

zum Rückenmark 845.

zum Rückenmark 845.

zum Rückenmark 845.

Gemüth. CLXXXIX.

Gemüth. Beziehung

zum Rückenmark 436.

zum Rückenmark 387, 388, 451-454.

zum Rückenmark 754.

zum Rückenmark 638-671.

zu den Geschlechtsfunktionen 421. 422.

442. 443. 565.

zum Rückenmark 918.

zur Haut 424. 463.

zum Rückenmark 431-434.

zu den beiden Hirnhäuten 825.

zum Rückenmark 725.

zum Rückenmark 418. 449. 562.

zum Rückenmark 725.

zum Rückenmark 381.

zur Milch 419.

zur Muskelbewegung 436.

zum Rückenmark 1027.

zur Fortdauer 417.

zum Rückenmark 617.

zur Seele 443.

zu den Speicheldrüsen 434.

zum Rückenmark 606.

zu den Thymusdrüsen 434.

zur Verdauung 437.

Weisheit 561.

Gem. corpus callosum 102.

Gemüth. Beziehung

zum Rückenmark 537. 578.

zum Rückenmark 583.

zum Rückenmark 939.

zur Phantasie, ebend.

zum Rückenmark 836.

zum Rückenmark 825.

zum Rückenmark 975.

zur Verdauung 583.

zu den Vierhügeln 918.

zum Rückenmark 1027.

Organisation und Vitalität 576.

Weisheit 583.

Wirkungsweise 577. 578.

Geschlechtsfunktionen. Beziehung zu. Gehirne 277. 331. 709.

zum Rückenmark 382.

zum Rückenmark 722.

zum Rückenmark 922-923.

zum Rückenmark 60.

zur Seele 421-423. 442.

zur Zirkel 993.

Weisheit 561.

Geschlechtsgefühl 421. 423. 903.

Geschmack. Beziehung

zum Rückenmark 338.

zum Rückenmark 588.

zum Rückenmark 836. 848.

zu Zungen- und Kehlkopfarterien, ebend.

Geschmack. Organisation und Vitalität 576.

Weisheit 583.

Wirkungsweise 577. 578.

Gesicht, siehe Sehen.

Gesichtsmuskeln.

Beziehung zum Rückenmark 502. 690. 691.

zum Rückenmark 841.

zum Rückenmark 417.

zu den Seiten des Gehirns 804. 812. 813. 819.

Gewebe des Gehirns 86. CXVI.

Gewicht des Gehirns 84. CXIV.

Gewölbe, Bar 184. CCV.

Entdeckung. CXII. 8. 193.

Leben 994-997.

Gesicht. CLXXX.

Gehirn inferior thalami CXCV. f.

Gehirn der vorderen Höhle 141.

Gipfel des Bergs 122.

Glandula. CLXXXVII. e.

cardiacae CCIV.

canalis CLXXXVII. e.

inferior CLXXXVIII.

in appendicula sella postica CLXXXVII. e.

pinaculi CLXXXVIII.

pituitaria CLXXXVII. e.

posterior, ebend.

apendicula, ebend.

sub infundibulo CCIV.

superior CLXXXVIII.

turbinate, ebend.

Glandulae parathyroidae CCXIV. 8. 576.

Glas und placcus similis CLXXXVIII.

pituitaria CLXXXVII. e.

qua cerebri pituita excipitur, ebend.

quae post adhaerent CLXXXVIII.

Glieder 616.

Glieder 75.

Beziehung zum Rückenmark 674-683.

zum Rückenmark 885. 886.

zum Rückenmark 51. 75. XCIX. C.

zu den Seiten des Gehirns 799-803. 810.

813. 817.

zum Rückenmark 908.

zum Rückenmark 581.

ohne und unter 78. 604.

Beziehung zum Rückenmark 678-685.

zum Rückenmark 910.

zum Rückenmark, ebend.

zum Rückenmark, 886.

zum Rückenmark 909.

zum Rückenmark, ebend.

Gliederung in großen und kleinen Hirne 921.

Globulus 185. CCIV.

Globulus pallidus 179.

Glossa CCXXIII.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Glossa CXCI.

Geßeltrichter, s. Schenkel des großen Hirns.
Großhirnstamm 162.

Gruhe CLXI.

Es das dritte Nervengehirn CLXXXIV.
Gefäßreiche CCXIX, S. 382.
kleine Hirne CCXXI.
des Markhorns CLXI.
des Sylvius CCXXI.

Gefäß der vierten Höhle CLXI.
Grund der Sylvischen Grube CCXXI.

Gefäßhaube CLXXVIII, s. d.
Gefäßhaube 193.

Gefäßhaube 193.
in 1833, 1836.

Gefäßhaube der vierten Höhle CLXI.
Grundgestalt des Gehirns 382.

Gefäßhaube 193, s. CCXXI.
im Streifenläng 177, b.

Gyr CXX.
breves CCXXII.

cerebelli CXL.
Gyrus hippocampi magni CCXXV.

Hirne, Beziehung zum Gehirne 332, 778.
Hirngewebe des Gehirns 94, CCXXIII, S. 269.

Hirngewebe 225.
Luf 226, 234.

Hirngewebe des Kleinhirns.
Beziehung zum Gehirne 271, 305, 306, 359.

Hirne des großen Hirns CCXX.
Hirne des Gehirns CCXXII.

Hirnscheiden CCXXVII.
Hirne 199, CCXXVI, S. 375.

Leben 999.
Hirnscheiden 193, CCXXII.

Hirnscheiden CCXXII, S. 234.
Leben 1033.

Halbkugel des Rückenmarks CLXI.
Halbkugel des kleinen Hirns CCXL.

Hals, Beziehung zur Bewegung 739.
zum Gehirne 341, CCXL, S. 292.

zur Seelenfähigkeit 403.
Halsgewebe, Nerven 177.

Halsmark, Beziehung zum Gehirne 341, 689.
zum verlängerten Marke 884.

zum Spalten des Gehirns 805, 812, 813.
Halsnerven, Beziehung zum Hirne 297.

Halsarterien, Beziehung zum Gehirne 326—329, 708.
Hirnstamm 722.

kleinen Hirne 902, 903.
Rückenmark 59, LXXVIII.

zur Seelenfähigkeit 420, 445.
Haut 164, CLXXX, CLXXXIII, 2.

Leben 939.
Haut, Beziehung zum Rückenmark 580.

zum Gehirne 231, 278, 332.
zum kleinen Hirn 168.

zum Rückenmark 54, 57, LXXV.
zur Seelenfähigkeit 421, 444, 503.

des Kopf 239, 248, 778.
des Rückenmarks, feste 69, XC.

(Vgl. Hirnhaut).
Hirnkraft der Nerven im Gehirne 240, 476.

Hemiphasen 250.
Entstehung 775.

Ernährung 304.
Leben 333.

Hemiphasen cerebelli CCXL.
Hemiphasen des großen Hirns 203, 204, 245, CCXX.

des kleinen Hirns 112, CCXL, 904, 915.
Leben 931.

JVXJ, J, der vierten Höhle 904.
Zinnenscheiden 791, 792.

(Vgl. Diphtherie, Blasen, Seelen).
Hervorragung, denticulata 999.

Hirn, Beziehung zum Hirne 271.
zum Gehirn 408, CCXL, S. 192.

zum Gehirne 250, 265—271, 300—303.
408, 555, 559, CCXL, S. 192, 193, 195.

zum Gehirn 584.
zum Gehirn 408, 431.

zum kleinen Hirne 809.
zum verlängerten Marke 809.

an den willkürlichen Muskeln 603.
zum Rückenmark 61, LXXXI.

zum Rückenmark LXX, LXVIII.
zur Seele 401—403, 407, 432, 512—545.

CCXL, S. 192, 201.
Hirnscheiden 304, 305.

Wachung auf die Seele 408.
Hirnscheiden, Beziehung zum Gehirn CCXXVIII.

ad infundibulum CCXXVIII, S. 380.
Hippocampus CCXXVI.

minor CCXXVII.
Hirnscheiden CCXXIX.

Hirnscheiden, Beziehung zum Gehirn 257, CCXXVIII d.
258, CCXXVIII b.

Hirnscheiden 203, CCXX, S. 382.
Hirnscheiden 209, CCXXVI.

Leben 1037—1042.
Beziehung zur Bewegung 739.

zum Gehirn 280.
zum Gehirne 825.

Hirnscheiden 204, CCXXI.
Hirnscheiden des Körpers, Krimpe 909.

Hirn, großes und kleines 892—894, 924, 925.
Athens 900.

Bewegung 905—911.
Consistentia CCXL, S. 192.

Diploë 920.
Diploë 923.

Gliederung 921.
Lage 861, 919.

Leben CCXL, S. 212, 825.
Menschenverhältnis 161, CLXXXII.

Placenta 904.
Seelenfähigkeit 919, 918.

Seelenfähigkeit CCXL, (S. 205.) 914—916.
Spaltung 920.

Verdichtung 921.
Hirn, großes 161, CLXXXII.

Leben 931.
Hirn, kleines, Beziehung zum Gehirn CCXXVI—CLII.

Beziehung 258.
Beziehung zur Bewegung 906—911.

zum Gehirn 917.

Hirn, kleines, Beziehung zum Gefühl 918.

Gefühlsged. 825. 917.
 großes Hirn 107. CXXXVI.
 832—835.
 verästelter Nerve 836.
 Ohr 280.

Rumpfflecken 897—903.
 zur Seelenbewegung 913.
 zur Sinnesethik 914. 915.
 zu den Vierfüßlern 913.
 zur Zirkel 913.

Beitrag 96. CXXXV.
 Charakter 855. 860. 919—924.
 Gefühlsged. 905.
 gestreckter Körper CXXXIX.
 gestörter Körper, ebend.
 Glieder 918.
 Plasticität 904.
 Weichheit 916. 925.

Hirnanhang 167. c. CLXXXVII. c.

Beziehung zur Ausbreitung CXXI. S. 197.
 zum Hals 1013.
 zum Gefäßnetz 759.
 zu den Markhäutchen 908.
 zur Zirkel 592. CLXXXVIII. S.
 351. 69.

Hierher CLXXXVIII.
 Leben 978—985.
 vordere CLXXXVIII.

Hirnhaut 245. 509.

Hirnhaut, große CCVIII.

hinter GNG. S. 537. 559.
 kleine, ebend.

Hirnhautarbeit CLII.

Hirnhaut, große CCIX. S. 565.

Hirnhaut GNV. (S. 246. 82.) 218. 528. 562.

Hirnganglien CXIX.

gestreift CXCVI.
 hinter CXCI.
 (Vgl. Ganglien des Gehirns).

Hirnhaut 95. CXXIV.

Leben 93. 769—773. 779. CXXII. S. 267.
 Verwachsung 267.
 plastische

Beziehung zur Seelenethik 772.

Entzündung, siehe Meningitis.

Wunden 259.

(Vgl. Gehirn und Spinnwebhaut).

Hirnhaut, dicke CXXIV. S. 275.

hinter 95. CXXIV. S. 276.

am großen Hirn 208. CXXXV.

am kleinen Hirn 219.

Auswuchs 258.

Bewegung 268. CXXII. S. 200. CXXIV. S. 276.

bei Atrophie des Gehirns 251.

Beziehung zum Ohr 280.

Perikranium 776.

Schädel 258. 774.

Blutergussung 214.

Eiterung 210. 563.

Entzündung CXXII. S. 125.

Entzündung 214.

Leben 769—774.

Hirnhaut, feste Regeneration 256.

Verklebung 253.

Verklebung 262.

Verwachsung 257.

Wassereingussung 268.

Wunden 259.

harte CXXIV. S. 275.

harte CXXI. S. 265.

harte CXXIV. S. 276.

weiche, ebend.

Hirnhautwundbruch 215.

Hirnhautwundbruch 218.

Hirnhäute 91. CXXI. S. 195. 208.

Leben 752—756. CXXI. S. 193. 200.

(Vgl. Hölle.)

Hirnhäute CXXII.

Hirnhäute, kleine, kleine GLI.

Hirnhäute GLI.

Hirnhäutepolader CXXXVII.

Hirnhäute, Beziehung 83.

Geschichte CXXI.

Hirnhäute CXXXVII.

Hirnhäute 93. CXXII.

allgemeine 832—846.

Anatomie 609.

besondere 828—831.

Centralnerven CXXI. S. 262. CXXII. S. 267.

Dicke 607.

Länge 626.

mittlere 847—850.

Paar CXXII. (Vgl. Par. nerven ebend.)

Richtung 631.

rückwärts 630.

Stammbildung 623.

System 827—832.

untere hinter 122. CXXV.

Verhältnis von Cerebrum u. Peripherie 621—625.

zum Rumpfflecken 557.

zum Rumpfnerven 41.

zu den vordern und hinteren Strän-

gen 863. 870.

Weichheit 620.

Hirnhäute, vordere CXXXVII.

Hirnhäute 268. CLXXXVIII. (S. 332. 82.) 989. 993.

Hirnhäute CLXXXIII.

(Vgl. Sehenkel).

Hirnhäutekapsel 215. CXXXIII.

Hirnhäutekapsel CXXII. 2.

Hirnhäutekapsel CXXI. CXXX. S. 565.

Hirnhäuten 259. 261.

Hirnhäute CCVIII.

Hirnhäute, große CXXXV.

Hirnhäute, große CXXII.

Hirnhäute, quere GLIV.

Hirnhäute 83. CXXI.

Hirnhäute 871.

Hirnhäute 269.

Hirnhäute 376.

Hirnhäute 862.

Hirnhäute 717—727.

Hirnhäute zu den Nerven CXXII. S. 267.

Hirnhäute und hinterer Teil 825.

Hirnhäute, geschichtlicher 97.

- Hirnstamm des großen Hirns 163. CLXXXIII.
Leben 856. 860. 893. 955.
- Hirnhöhle. Leben 645.
- Hirnvorn, äußere 218. CCXXXV.
große 217. CCXXXIV. CXII. S. 198.
innere 156. 217.
- Hirnvindung, lateralisirende CCXII.
- Hirnwulst, große CCXX.
- Hirnwurzel CLXXX.
- Höcker, grauer 167. c. CLXXXVII. b.
des Schlägels CXCH, c.
ober, ebend.
ober hinter, ebend.
mittlere hinter CXCH, c.
unter, ebend.
hinter CXCH, f.
- Höckerchen CXCH.
- Höhle, siehe oben und unten.
- Höhle des Acanthi CLXI. CLXII.
dorsale CCXX.
dritte 201. CCXVIII. (S. 378.) 825.
erste CLX. CCHL.
fünfte, ebend.
des kleinen Hirns CXIV.
des Markkopfs CLXI.
der Schädelswand 183. CCHL.
Sylvische CCHL.
vierte 156. CLX. CLXIV.
Leben CXL. (S. 127.) 820.
- Höhlenblassewandsicht 248.
- Höhlendarm, siehe Wurm.
- Höhlensatz 91. CXLI. S. 262. CCXIV. S. 275.
Alveolen 248. 275.
Leben 751.
- Höhlensatz 248.
- Höhlungen im Gehirne 255. 264. 251. 262.
- Hörnerv, Centralhöle 217. CLXX.
Leben 830.
- Horizontalfalte CXII.
- Horizontalfalte des kleinen Hirns 113. CXII.
- Horn der Seitenhöle 201. CXII. S. 205. CCXX. S. 582.
- Hornblatt 175. CCXV.
- Hornstreifen, ebend. CXII. S. 211.
- Hügel, ziehbarer CLXXXVII. b.
gelblich 86.
gestreifter CXXV.
grauer, ebend.
harter, gelblicher CCXVI. S. 375.
weißer CCIV.
- Hühnerhahn CCIV.
- Hüllen des Gehirns 95.
des Rückenmarks 66.
- Hühnertrag, außer im verlängerten Marke 101.
im Brückenstamme 185.
im Großhirnstamme 164. b.
im Vierhügel 163. 170. b. c. d. 935.
im Schlägel 175. b. g. CXCH, c.
im Stiefelhügel 177. b.
harter 808.
im verlängerten Marke 90. CCXXVII.
im Brückenstamme 184. 185.
im Großhirnstamme 163. b.
im Stiefelhügel 177. a. 964.
- Hunger 881.
- Itaca 237.
- Itakiden 238. 263. CCXXIII. S. 275.
- Hydrocephalus 243.
- Hymen CCXVIII. S. 380.
- Hypertrophie 255. 308.
- Hypophyse 167. c.
- Impetum CCX.
- Incile CCXVIII.
- Incisura cerebelli anterior 112.
posterior, ebend.
palpi 204.
supra 185.
- Incisura longitudinalis 91.
- Incrementa fibrosa CLXXXV. S. 524. 526.
- Inciditio CCXXIX.
- Infiltration 243.
- Infratubulus 167. d.
- Infratubulus CLXXXVII. d.
- Insel 205. CXII. S. 234. CCXXII.
- Inselarterie 215.
- Inselart 21. 205.
- Integumentum ventriculorum CCXI. S. 265.
- Intelligenz 646.
- Intervall zum Fortgange des Menstruations CCXX.
- Intervall des großen ganglion inférieure CCXVIII. S. 379.
sind devant la partie fondamentale du cervicel CLX.
les tubercles quadrangulaires CCXVIII.
- Interventionsnerven CXII. S. 266.
- Intestinal CCX.
- Involutions, ebend.
- Iris, Beziehung zum gemeinschaftlichen Augennachher-
von 847.
zum Gehirne 350. 700. 857.
zum großen Hirne 911.
zu den Seiten des Gehirns 808. 812. 813.
zum Visus 916.
- Isthmus CLXXXV.
- Iter ad infundibulum CCXVIII. S. 380.
ventriculorum testium, ebend.
- Iugum curvum medullare CXCI.
- Iusticia CXIX, f.
- Kachexie, Einfluss auf das Gehirn 258. 260. 279.
die Seele 851.
- Kammer des kleinen Hirns CLX.
mittlere CCXVIII. S. 379.
der Schädelswand CCHL.
- Kante 208.
- Kammern 544.
- Kehlkopf, Beziehung zum kleinen Hirne 911.
zum herumschweifenden Nerven 845.
zum Zungenstirnerv 847.
- Kehltrichter 287. 297.
- Keilblutleiter CCXXVIII. a.
querer 157. CLXXXVII. a.
- Keilstrang 868.
im verlängerten Marke 105. CCXXIII.
im Brückenstamme 185. 186. 180.
im Großhirnstamme 164. d.
im Schlägel 175. d.
im Trichter 167.
- Keifer CLXXXVII. a.
- Kern 80. 90. CXVIII.

Kera, Gemüthsgefühl 371.
des großen Hirns 198.
Keras, glashar 86.
im Gehirnstamm 165. CLXXXVI.
kleinen Hirns CXXXIX.
Schädel 179.
Kernblatt des Aussehenhoras 199. b. 57.
Kernstrang im Gehirnstamm CLXXXV, d.
im Hirnstamm 285.
in den Zirkeln 392.
Kette 104. 138. CLXII, b.
Kiefer, Beziehung zum Gehirn 684. 685.
kleinen Hirns 311.
Aulicnerven 841.
dreygeheilten Nerven 840.
Kleppdeckel 207.
Klappe 112. 113. 164. b. CXIL S. 108. CXIL CLXXXV, g.
des kleinen Hirns CLXXXV, g.
Klappenhäutchen 169. CLXXXIX. S. 306.
Klappenwulst 254. CLXVIII.
Klaus 202. CCXXII.
Leben 1040.
Kleinarterie, mittlere 153. a. CLXXV.
obere 153. c.
untere 152. a. CLXXIV.
Kleinhirnbeizir 95. CCXXV.
Elisabirschenschel, siehe Schenkel.
Klumpen, blauer, des Linsenkeras 179.
Knie des Balkens 192. CCX.
Kniehöcker, innerer 172. CCXII, d.
innerer, oberer. a.
Knipfchen CCIV.
Knöchel 117. CII.
der plastischen Hirnhäute 159.
Knoten im Gehirn 260.
Knochen CCXVI CCXVI.
grauer CCXXX.
Körper des Balkens 192.
eyförmiger CCXIX. S. 284.
fremde, im Gehirn 210.
Wirkung auf Constantia des Gehirns 254.
den Magen 303.
den Puls 303.
gegliedeter CCXII, c.
gestülpter, hinter oberer CCXL.
vorderer unterer CCXVI.
des Gehirns 186. CCV.
gestülpter, der Olive 100.
harter CCVII.
keulenförmiger CCXVI.
knerpliger CCVIII.
oberer CCXIX. S. 284.
Pachionische 95.
pyramidenförmiger hinter CCXVIII.
natter, ebend.
rautenförmiger des kleinen Hirns CXXXIX.
schweifiger CCVIII.
seitlicher CCXIX. S. 284.
stielähnlicher CCXVIII. S. 283.
der Zwillingsbinde CCV.
- Kopf, abgeschnittener 291. 302. 307. (Vgl. Beschneidung).
Athenabewegung 292-294.
Muskeln, Beziehung zum kleinen Hirns 311.

Kopf, Muskeln, Beziehung zum verlängerten Marke 381.
zu den Seiten des Gehirns 310. 311.
plastische Organe, Beziehung zu, verlängerten Marke 373.
Kopfigeweide, Nerven 45.
Kopfsche des Rückenmarks CCXVI. S. 280.
Kopfschmerz 375. 653. 684.
Kopfscheil des Rückenmarks CCXVI. S. 280.
Kopfschneidungen, Einfluss auf Athmen 294.
Lieber 324.
Magen 313.
Leihern 313.
(Vgl. Wunden).
Kraft 3.
Kraftgefühl 33.
Kämpfe von Abnormitäten des Gehirns 343. 344. 347. 675.
676. 680. 683. 685. 688. 691. 699.
des Hirnstamms 384.
Rückenmarks 153.
Fortschreiten 348.
Wirkung auf das Gehirn 281.
die Seelenthätigkeit 450.
Krankheiten 611. 647.
Krankheiten des Gehirns, Erkenntnis 503. 510.
Gang 512.
Symptome 511.
Krebs des Gehirns 250.
Kreuzung 825. 824.
der Bewegung 725-819.
des Gemüthsgefühls 819.
der Plasticität 822.
der Sensation 821.
durch das Gewebe 305.
die Pyramide 98. 708. CCXXV. S. 282.
die Rotationslinie CLXII.
die Schenkel 212. CCXXIX.
des Streifenbügels 268.
Krümmung, vordere CCXXIX. S. 301.
Kugelform des Nervensubstanz 12. CXII. S. 215.
Kugelform 79. 87. CVII.
im Gehirn 782. 783. CXII. S. 192. CXVII.
Labrum CLXXXVII, d.
Lacuna, ebend. CCXXVIII. S. 378.
Lacunar CCXII, d.
ventriculär quere CLXXXV, g.
Vomeronä CCXII, c.
Lähmung von Abnormitäten des Gehirns 346. 347. 350. 674.
677-679. 681. 682. 684. 686-688.
690. 692-697. 702.
des Hirnstamms 726.
des Rückenmarks 153.
Fortschreiten 348.
Länge 79. 87. 743. (Vgl. vorne und hinten).
Längsbänder CCXII.
Längsbänderpaar 89.
Leben 743-748.
am großen und kleinen Hirns 924.
Längsbänder, oberer CCXXV.
natter, ebend.
Längsbänder, untere 195. 1053. CCXVI.
Längsbänder 91.
Lage des Gehirns 84. CXIV.
Körper 251.
Rückenmarks 71. 861. 873.

Lamellae cerebelli CXL.

Laminae choroidae 95.
 inferior 158, c.
 superior 216.

lobata CXC.

convoluta 199, b. f.
 convolutiva eorum amnionis, ebend.

convoluta CXC.

cornua 175, CXC.

cribrata CCXXII.

externa meningiae CCXIV. S. 375.

gyrus lenticularis nervorum optico-rum CLXXXVII, c.

tenuis striatae CXC.

interna meningiae CCXIV. S. 374.

medullaris CCXI. S. 365.

corua amnionis 199, b. f.

media cerebelli CLXXXV, g.

thalami 174, d.

triangularis CCXI.

serbiteris cineris mammillaris vermis inferioris CII.

tumida 167, c.

Laminae cerebelli CXL.

cribrata 97.

Lappchen des kleinen Hirns 111. CXL.

Lungenmagenserven CII.

Leitner des kleinen Hirns, ebend.

Lopis speculata CCIII.

Lappen des Gehirns 90.

großen Hirns CXII. S. 305, CCXXIII. (Siehe

Hinter-Oben-Unten-Vorderlappen).

kleinen Hirns 111. CXL.

größer unter CL.

dünner CXLVIII.

hinter oben 128.

unter CXLVIII.

innerer unter CL.

innerer unter CXLIX.

keilförmig, ebend.

oberer CXLVII.

keilförmiger, ebend.

unter 124.

vierseitiger CXLVI.

viereckig, ebend.

gehörig ober 122. CXLVI.

unter CXLIX.

unter CXLVIII.

zweyhäufiger 125. CXLIX.

Mark CL.

verlängertes Mark, ebend.

Laquearia CCVIII.

Laqueus 164, b.

Latre midollare 891.

Leben, Einfluß des Gehirns 284, 335, 516, 538.

Hirnstamm 722.

kleinen Hirns 896.

Verhältnis des verlängerten Marks 875, 876.

zur Seele 18, 458-461.

Wenn 4, 460-470.

Leben des Gehirns, Erlösens 220, 221.

Beziehung zu mechanischen Verhältnissen 507, 508.

zum Rumpf 507-519, 557-559.

Leben des Gehirns, Beziehung zur Wärme 559.

Modus 501-507.

pulsisches 222, 225, 473.

zum Atmen 225.

zur Bewegung 502, 506-509.

zum freygeübten Nerven 838.

zu den Sinnen 578.

2. Seelenthätigkeit 480-488, 722.

Rhythmus 227, 228.

Richtung 505.

Leben, thierisches 19.

Lebensbaum CXII. S. 306. CXL.

Leben, Beziehung zum Gehirns 225, 524.

zur Seele 418, 419, 562.

Leib, Verhältnis zum Gehirns 622, 623, 649.

Antagonismus 518, 520.

Cosensus 517, 519.

Qualität 530, 531.

Quantität 521-529.

zur Seele 390-430, 517-520.

(Vgl. Leben, Rumpf).

Leichten CCX. S. 367.

der Zerkel CLXXXVIII. CXG. S. 338.

gedrückt CCXVI. S. 574.

des Gefäßsystems der vierten Hölse CLXII, c.

geröhrt 199, b. c. CCXVI. S. 574.

Leiste grobe CCXII.

der Baueingrube 147, 891. CLXX.

markig, Bege des vorderen Endes des Schlägels

CLXXXVIII.

Leitung im Gehirn und Nerven 16, 518, 503, 506.

im Zickzack 802.

durch Hüllensmant 255.

Nerven 621-624, III. XXIV-XXVII.

Rückenmark 611, 612.

Scheidewand 1008.

Leiternerven, siehe Baueingrube.

Leyer 193. CXXI.

Liquor CXVI. S. 250. CCXVI. S. 573, 574.

cerebr. CCXII.

corpore striati anterior CCXVII. S. 519.

posterior CXC.

exterior alba meningeae, quae medullae oblongatae

crucis obstruunt, ebend.

Sylvii CCXVI. S. 574.

Liquor alba CLXXXVIII. S. 335, 354.

media meningeae CCIX. S. 505.

Lingula 120. CXL.

laminosa CXLIV.

Linsenorn 179. CXII. S. 284. CCXIX.

Blutgefäß 244.

Leben 977.

Lippen, Beziehung zum Gehirns 544.

kleinen Hirns 911.

Auditorischen 841.

dreygeheilten Nerven 819.

Lobi cerebelli CXII.

cerebri CCXX. CCXXIII.

cephalic 92.

Lobus cerebri. CCXXIII.

Lobus centralis 122.

cerebelli intermedium anterior CXII.

interior, ebend.

Lobulus cerebelli intermedius posterior CXLI.
superior, ebend.

medius, ebend.

parvus CL.

postnigricans, ebend.

posterior CXLVII.

spissus CL.

subpeduncularis CL.

superior externa, ebend.

interna CXLVI.

lobuli frontalis CXXXIII.

interior CXXXV.

interna CXXVI. S. 375.

occipitalis CXXXVI.

temporalis CXXXV.

medullae oblongatae CL.

Lobus caudalis cerei vagi CL. 205.

cerebelli anterior inferior CXLIX.

biventer 225.

cuneiformis CXLIX.

centralis CXLV.

inferior CXLVIII.

interna CL.

posterior 124. CXLVIII.

semilunaris CXLVIII.

intermedia CXLII.

minor, ebend.

minor, ebend.

quadrangularis CXLVI.

quadrangularis, ebend.

semilunaris CXLVIII.

subula CXLVIII.

superior anterior 122. CXLVI.

posterior 123. CXLVII.

cerebelli anterior 205.

inferior 205. 209.

posterior 209.

superior 207.

hippocampi 209.

Locus coeruleus 140.

niger cerei CXXXIV.

unius nervorum opticonum CXXXIX.

Lücke des großen Hirns 204. CXXXI.

Luft im Gehirnbite 205. 207.

in den Hirnhäuten 270. 276. CXII. S. 197.

Lungen. Beziehung zum Gehirn 275. 288.

Rückenmark LXXXIII.

(Vgl. Athema).

Lungenarterien CLXVIII.

Lungenvenen, ebend.

Lysa 105. CXX.

Masculi CXX.

Magen. Beziehung zum Gehirn 210-216.

aus Rückenmark 59. LXXVII.]

zur Geistesfähigkeit 414. 415.

(Vgl. Erbrechen, Verdauung).

Mammellen CXXVI. S. 375.

Mandeln 208.

Mandel 120. CL.

Masse 375. 689.

Menschlichkeit des Hirns 27.

Mistel 85. 90. CXXVIII. CXX.

Mistel Duplicit 787.

Geruchsfühl 574.

Leben 717-727.

Verhältnis zu den Ganglien 733.

zum Hirnstamm 864.

Mistel des großen Hirns 205. CXXIX.

Leben 1021-1024.

Verhältnis a. Großhirnstamm 938.

Mistelschneid 204. CXXIX.

Margo internus denticulatus cerei amplexus CXXVI. S. 574.

Mark, verknüpfte 27-105. CXXV. CXXVI. CXXVII. CLII.

Beziehung zur Bewegung 726. 881-885.

zum Hirnschlag 201. 879.

Leben 871-891.

Verhältnis a. Großhirn. 871. 955. 956.

kleinen Hirn 959.

Schlag 955.

Verschlag 953.

oberer Theil 855. 860.

unterer Theil 854. 860.

Markband, großes CXXVIII.

Markhorn des kleinen Hirns 111. CXL.

Markhäutchen, rundes CXXVI. S. 375.

Markhäutchen im Großhirnstamm 165. CLXXXVI.

Markblatt an der Rautengrube 891. CXXI. S. 205.

des Schädels 174. d.

Markbündel des großen Hirns CLXXXIII.

hakenförmiges CXXIII.

Markdecke CXXI. S. 205.

Markfortsatz des großen Hirns CLXXXIII.

Markhautband LL.

Markhaut CCX. S. 567.

strahlige 2000.

Markhügel CCIV.

Markkern der Foce Sybeli CXXIII.

des kleinen Hirns CXXXIX.

Markknochen CXXII. f.

Markknopf CXXVI. S. 280.

Markknoten CLII.

Markknoten 185. CCIV. CXL. S. 204. 206-209.

Leben 928.

Marklager 90.

des großen Hirns 205. CXXIX. S. 385.

Leben 1024.

des kleinen Hirns 110. CXXXIX.

Marklinie der Rautengrube 130. d. 147. CXXII. a. CLXX.

CXXII. S. 217.

Leben 891.

des inneren Randes des Schädels CLXXXVII.

S. 354.

Markplatte CXXI. S. 263.

des kleinen Hirns CXL.

Markschicht CLXXXIII.

der Hirnschneid, ebend.

Ziel CXX. S. 539.

Marksegel, hinteres CLII.

anteres CLXXXV. g.

Markstamm des kleinen Hirns CXXXIX.

Markstreifen der fünften Rolle CLXII. a.

an der Übergangsstelle der inneren a. oberen

Fläche des Schädels CLXXXVIII. S. 354.

Marksubstanz, siehe Substanz des Gehirns.

intermedia. CCXV.

- Marksubstanz, querschnittliche CCXL
 tangente CCXLII.
 Markwielhel CCXLVI S. 280.
 Massa centralis cerebelli CCXXXIX.
 Nause de connexion de la partie primitive du cerveau
 avec les tubercles quadrifurques CLXXXV, g.
 de reunion du cerveau CCV.
 des enroulements inférieurs du
 lobe antérieur CCXa.
 Masse, seltige CCXVI S. 250.
 Maudern, Einfluß des Rückenmarks 59. LXXVIII.
 Mater CCXLIV.
 dens, ebeud.
 pia, ebeud.
 Materie 3.
 Mentes ex tertio ventriculo ad quartum CCXVIII.
 inter ventriculorum anteriorem et posteriorem CCXLV.
 S. 378.
 Mechanische Bedingung der Hirnthätigkeit 238.
 Mediantium CCIII.
 cerebri CCXXXV.
 Medullam cerebelli 210.
 palli 90.
 Medulla CCXL.
 foveata CCV. S. 259.
 globosa CCXLIII.
 in ventriculo cetero CCV. S. 259.
 oblongata 97. CCXLIII. CCIX.
 intra calvariam CCXXVI.
 spinosa, ebeud.
 quae oblongata incipit, ebeud.
 spinosa CCIX.
 Membrana choroides CCXXXIII.
 externa cerebri CCXLIV. S. 276.
 interna cerebri CCXLIV. S. 274.
 media cerebri, ebeud.
 medullaria CCXI. S. 265. CCX. S. 338.
 inter crura posteriora forata CCXL.
 mollis CCXLIV. S. 274.
 ramosa, ebeud.
 propria cerebri, ebeud.
 laevis, ebeud.
 quae cerebellum cerebro committitur
 CLXXXV, g.
 ventriculi CCXLIV. S. 274.
 Meninges CCXLIV.
 Meningitis 216. 561.
 Meninx CCXLIV.
 arachnoidea 95.
 fibrosa 95.
 media CCXLIV. S. 274.
 vasculosa 95.
 Mesencephalon CLII.
 Mesolobium CCVIII.
 Metastasen auf das Gehirn 268. 269. 278. 279. 275.
 Methode, das Gehirn zu untersuchen CCIII.
 Nafe, Beziehung zum Gehirne 525.
 zur Seelenthätigkeit 419.
 Nimitz 594. 595. 605.
 durch den Antikranium 822.
 den dreygetheilten Nerven 839.
 das verlängerte Mark 884.
 Nimische Sinne 598.
 Minings CCXLIV.
 grossa, ebeud. S. 275.
 subtilis, ebeud. S. 274.
 Mischung der Hirn- u. Nervensubstanz 12. 85. X. CCV.
 des Hirnsubstanz CLXXXVIII. S. 332. 19.
 Mitterballen, markiger CCVIII.
 Mitterlache der vierten Höhle CCXL.
 Mittellinie 72. 87. 286. 288. CCXLV.
 Mittelpunkt, halbkugelförmiger, zweyacher CCXV.
 halbkugelförmiger CCXX. S. 286.
 Mittelspalte CCXVIII. S. 279.
 Mithelich des kleinen Hirns CCXL.
 Mithelsubstanz CCXL. S. 261. CCX. S. 269.
 Mithelteil des kleinen Hirns CCXL.
 ebener CCXLII.
 anstret, ebeud.
 Mond, Einfluß auf das Gehirn 266.
 Moss cerebelli 122. CCXVI.
 Moutonius CCIX. u. CL. CCCL. CCXXV.
 cerebelli CCXVI.
 Morphologie für Physiologie des Gehirns 645.
 Mühle 295. h.
 Mund, Hütung 228. 244.
 Nafche, Beziehung zum Gehirne 501. 510.
 Verhältniß zum Nerven 603.
 (vgl. Bewegung).
 Nacken des kleinen Hirns 109. CCXXXVIII. S. 288.
 Nackenmuskeln 544. 603.
 Nackenmarksubstanz CCXLVII.
 Nafe der peripherischen Organe am Gehirn 578. 606.
 Nafche. 774.
 Auseinanderweichen 269.
 Verwundung 265.
 Nagel CCXLVII.
 Nahrungsmitel, Wirkung auf Seelenthätigkeit 414.
 Nahrungstrieb, Charakter 415.
 Beziehung zum großen Hirne 881. 908.
 zum Vierhügel 914. 915.
 zur Seelenthätigkeit 429.
 Nare, Beziehung zum Gehirn 537.
 Nasenbluten 228. 244.
 Nasenmuskeln 841.
 Nafch des kleinen Hirns CCXL.
 Nates CLXXXIX. CCCL.
 Natur 1. 2. 419. 451. 455.
 Nebenhabenheiten CCXL. S. 376.
 Nebenlinie 350.
 Beiragen 583.
 Nerve, abweichender CLXVIII.
 des abweichenden Augenmuskels CLXXII.
 dreygetheilte, Centralende 150. CLXXIII.
 Athene 294. 298.
 Fehlsinn 587.
 Gefühls 759.
 Leben 839-840.
 Nahrungsbewegung 295.
 Tauten 587.
 vom Vierhügel 268.
 herumschweifender, Centralende 145. 882.
 Athene 284-289. 294. 297. 298.
 Darm 317.
 Herabschlag 501.
 Einfluß auf das Leben 284. 286.

Nerve, herumschweifender. Leben 845.

Leber 514.

Rumpfnerv LXVIII.

Seele 410.

Wärme 507.

Das obere schläfer Anagnathus CCKVII.

sympathischer LIV.

Nerven. XXII. XXIII. CXII. S. 192.

Beziehung zum Gehirn 554.

zum großen und kleinen Hirn 871. CLXV.

Depth 787.

Richtung zum Centrum 75. 93. 717.

Verhältnis zur Peripherie 16. 293.

(Vgl. Hirnnerven. Rückenmarksnerven. Rumpfnerven.)

Nervengleiche 16. XXVIII.

Nervengüter 458. (Vgl. thierische Güter.)

Nervoring an der Speiseröhre LI.

Nervensaft XL.

Nervensubstanz 13. XI—XX.

graue und weiße 13.

bei wirbellosen Thieren XLVIII.

Nervensystem 14.

autonomisches LIV.

in der Thierreihe 25.

vegetatives LIV.

der wirbellosen Thiere 26—32. LVI.

der Wirbeltiere 38.

zurückkehrendes CXIX. e.

Nerventhätigkeit, siehe Sensibilität.

Nervus abducens CLXXII.

accessorius 144.

ad patheticum CCKXVII.

ad sympathicum medium CLXVII.

ad vocalem, ebd.

motorium oculi communis CCKXVIII.

Wallii CLXVII.

acutus 147.

mollis CLXX.

ambulatorius CLXXVII.

anagnathus CLXXIII.

anterior pars octavi CLXX.

audibilis CLXX.

communicans faciei CLXXI.

complexus CLXVI.

concomitans capitis magnus CLXVIII.

medius CLXXIII.

parvus CLXXI.

corpore striata coniungens CCVII.

ditans CLXXIII.

ethmoidalis CCKXX.

facialis 148.

glandulae pinealis CLXXVIII. S. 535.

glossopharyngeus 146.

gustatorius CLXVI. CLXXIII.

tertius CLXVI.

gustus, ebd.

hyoglossus, ebd.

hypoglossus 143. CLXVI.

externus CLXVI.

magnus, ebd.

lancinans CLXXIII.

indigatorius CLXXIII.

intermedius CLXVII.

Nervus labyriothicus CLXX.

lingualis CLXXIII.

medius CLXVI.

paris octavi CLXX.

linguam movens CLXVI.

loquax, ebd.

mutus CLXXIII.

mollis CLXX.

motorius capitis CLXVII.

linguae CLXVI.

oculi externus CLXXII.

internus CCKXVII.

medius CCKXVIII.

musculi obliqui superiores CCKXVIII.

oculorum CCKXIX.

externum CLXXII.

oculomotorius communis 212. CCKXVIII.

externus 146. CLXXII.

inferior CCKXVIII.

internus CCKXVII.

medius CCKXVIII.

mutus CCKXVII.

posterior CLXXII.

superior 210.

oculorum motorius CCKXVIII.

communis, ebd.

olfactorius 215. CLXXIII. CCKXIX.

opticus 212. CCKXIX.

motorius CCKXVIII.

patheticus CCKXVII.

pharyngoglossicus CLXX.

pneumogastricus CLXXIII.

qui menses oculorum movet CCKXVIII.

prope nates oritur CCKXVII.

recurrens octavi paris superior CLXVII.

sensorius linguae CLXX.

spialis CLXVII.

ad originem nervi vagi accedens, ebd.

spico-transtrapedalis, ebd.

sublingualis CLXVI.

magnus, ebd.

sympathicus medius CLXVIII.

minor CLXXI.

parvus, ebd.

thalamus coniungens CXI.

tinidus CLXXI.

trachelo decussis CLXVII.

trifidus CLXXIII.

trigeminus 150. CLXXIII.

trimellus CLXXIII.

trium funium, ebd.

trichiletris CCKXVII.

vagus 145.

vivus CCKXIX.

visceris, ebd.

vocalis CLXVII.

Nerv 120. CCKXIX. CXII. S. 225.

Nexus nervorum optocorum CCKXIX.

thalamorum nervorum optocorum CXII. d.

Nidus 110.

Nixus 272. 357.

Nodus 127.

Nodus CLI.

Nasali ganglion 86.
 Nodulus encephali 90.
 Nodulus 209.
 osseus CXXXVII.
 cartilagineus, eband.
 lamina 179.
 thalami anteriores 174, b.
 internus 175, a.
 superior 174, c.
 Nodus der Organe 68a.
 Oben und unten 87. 881-883.
 am großen und kleinen Hirne 919;
 an den Nisteln 881.
 am Rückenmark 77-79.
 am Rumpfe 41.
 (Vgl. Glieder, oben und unten).
 Oberfläche des Gehirns 87. 239. 751.
 großen und kleinen Hirns 924.
 (Vgl. Höhlen, Randwälze, Rinde).
 Oberlappen 207.
 Leber 1006-1030.
 Oberspalte 204. CXXII.
 Oves CXXVII.
 Öffnung, Monocula CXXVIII. S. 379.
 Ohnmacht 503. 537. 411.
 Ohr. Beziehung zum Gehirne 180. 536.
 Blase 244.
 Ohrmarken 851.
 Olive 100. CXXIX. CXH. S. 211.
 Leber 809.
 Verhältnis zu Vierhügeln 913.
 Olivenhügel 99.
 in der Schkigel 960.
 Olivenkern. Blüthenzweig 244.
 Olivenkernstrang 886.
 im verlängerten Marke 100. CXXIX.
 S. 261.
 im Rückenmark 155. CLIX.
 im Großhirnstamme CLXXIV.
 im Schkigel 175, a. 954.
 im Streifenhügel 177, b.
 in der Capsel 178.
 Operculum 207.
 Oia tota inferioris 208.
 Organ 468-470.
 Organe exempli 89.
 Organ des Gehirns 87. CXVII.
 ohne Function 68a.
 Organisation des Gehirns 476.
 Organos olfactus CXXX.
 Organos communis auditorii CXXVIII. S. 580.
 posterior, eband. S. 578.
 ventralis tertii anterior, eband. S. 580.
 posterior, eband. S. 578.
 Organ medullae spinalis CLXXXIII.
 Organ glandulae pituitariae CLXXXVIII.
 anterior ventralis tertii CXXVIII. S. 580.
 Paucis CXVII. (Vgl. Seilchen, Duplicität).
 Pellum 90.
 Pater de pigeo CXXXIX.
 Pankreas 853.
 Panniculi CXXIV.
 Panniculus grossus, eband. S. 275.

Panniculus subtilis, CXXIV. S. 274.
 Papilla medullaris CCIV.
 Pars nervorum cerebri primam 213. CXXIX. CXXX.
 secundam 212. CLXX. CCXXVIII.
 CXXIX. CXXX.
 tertiam 210. CLXXII. CLXXIII.
 CXXVIII. CXXXVIII. CXXX.
 quartam 210. CLXX. CLXXII.
 CLXXIII. CXXVIII. CXXXVIII.
 quintam 150. CLXVI. CLXX.
 CLXXI. CLXXIII. CXXXVIII.
 sextam 149. CLXVI. CLXXIII. CLXX.
 CLXXII. CLXXIII. CXXXVIII.
 septimam 148. CLXVI. CLXXIII.
 CLXX. CLXXI. CLXXII. CLXXIII.
 octavam 147. CLXVI. CLXXIII.
 CLXX. CLXX. CLXXI. CLXXIII.
 CLXXIII. CXXXVIII. CXXX.
 novam 146. CLXVI. CLXXIII.
 CLXXIII. CXXXVIII.
 decimam 145. CLXVI. CLXXIII.
 CLXXIII. CLXXIII.
 undecimam 144. CLXVI.
 decimam secundam 143. CLXVI.
 CLXX.
 decimam tertiam CLXXI.
 decimam quartam CLXXIII.
 decimam quintam CLXXIII.
 decimam sextam CLXXI.
 medullae primam CLIX.
 secundam CLXXIII.
 tertiam CLXXIII.
 tuberculum primum CXXVI.
 secundum CXXI.
 posterius CLXXXIX.
 Pars centri semicircularis superior CXXV.
 cerebelli anterior CLXXXIII.
 fundamentalis CLXI.
 medialis, eband.
 primitiva, eband.
 cerebelli anterior CLXXXII.
 posterior CXXXVI.
 crura cerebri ante nervum opticum locata CXXIII.
 fasciculi centralis lateralis anterior CXXIX. S. 581.
 posterior, eband.
 medialis, eband.
 infundibuli superior CXXVIII. S. 278.
 medullae spinalis cephalica CXXXVI. S. 280.
 posterior CXGI.
 superior CXXXVI.
 truncus medullaris superior et anterior CLM.
 ventriculi lateralis descendens CXXIX. S. 582.
 inferior, eband. S. 581.
 posterior, eband. S. 582.
 superior, eband. S. 581.
 vermis inferioris medialis CL.
 posterior CLXII.
 Pars cerebri distans CXXI.
 truncatus cerebelli, quae pertinent ad partem pte-
 oca medullae oblongatae CLXXXV. S.
 Particula femoralis CXCI.
 segregata cerebelli anterior CLXVI.
 medialis CLII.

Particula segregata cerebelli posterior CL.
 Partie antérieure de la masse cérébrale ascendante CLII.
 Passage, oblong CXXXI.
 Passivität der Sinne 578.
 Pathologische Anatomie 634-657. 652-709.
 Pedicellus glandulae pinealis CLXXXVIII. S. 535.
 Pedunculus cerebelli CXXXVIII. CLIII. CLXXXIII.
 anterior CLXXXV. f. CLIII.
 in anteriora productus CLXXXV. f.
 inferior CXXXVIII. S. 288. CLIII.
 medius CLIII.
 posterior CXXXVIII. S. 288.
 primus CLXXXV. f.
 secundus CLIII.
 tertius CXXXVIII. S. 288.
 superior CLXXXV. f.
 chordae spinulae CXXXVIII. S. 288.
 osseae 168.
 ossis ossis CXXII.
 spec. 127.
 glandulae pinealis CX. S. 359.
 medullae oblongatae CXXXVII. S. 288.
 septi 125.
 trigoni cerebri anterior.
 Pellicula subulis CXXIV. S. 274.
 Pelvis CLXXXVIII. f.
 callosa, ebend.
 Penis CLXXXVIII.
 Pericranium 218. 249. 258. 771. 775.
 internum CXXIV. S. 276.
 Perimeningia 245. 560.
 Peripherie des Nervensystems 14. 15. XXI.
 Verhältnisse zum Centrum 10. 24. 56. 295. 559.
 621-625. XLVII. LIII.
 Psa hippocampi CXXVI.
 minor, ebend.
 minor CXXVII.
 hippocampi CXXVI.
 Petiolus glandulae pinealis CLXXXVIII. S. 535.
 Pharynx 417.
 Phantasia. Beziehung zum Gehirne 646.
 zum Gefäßgeachte 757.
 zum Gewölbe 996. 997.
 zur Lungenbelegung 712-718.
 zur Schilddrüse.
 Physiologie des Gehirns, speciell 652.
 Aufgaben 644-651.
 Hülfsmittel 635-643.
 Fillers of the Visceraria valvula CLXXXV. f.
 Plancher du cerveau CLXXX.
 Plasticität, Einfluss auf die Thätigkeit 279.
 Sensibilität 22.
 bestimmt durch Thätigkeit 286.
 Nerven 552.
 dreygetheilten Nerven 839.
 bornenschweiften Nerven 845.
 Rumpfnerven 38. LV.
 Sensibilität 23.
 Verhältnis zur Sensibilität 55.
 Stetigkeit 560.
 gekreuzte Wirkung 822.
 Plasticität des Gehirns durch seine Organe 648.

Platta, grana CLXXXVII. b.
 Plazae choroidae 91. CXXXIII. S. 398.
 glandulae pinealis, ebend.
 impar, ebend.
 lateralis 216.
 medius CXXXIII. S. 398.
 tertius, ebend.
 ventriculi lateralis, ebend.
 quartus 154.
 tertius 216.
 glandularum CXXXIII. S. 379.
 mirabilis CXXXIII. S. 399.
 testiformis CXXXIII. S. 379. CXXXIII.
 S. 599.
 Plica longistipula meningis CXXXV.
 Plicae CXXIV. S. 274.
 Plicata cerebri CXX. S. 283.
 Plicatae CX.
 Polypen in Bluthieren 257.
 Pons 128. CXIX. CXXVI.
 Syll. CLXXXIX.
 Tarsi CLXXXIV.
 testibus et aethae ornatis CLXXXIX.
 Vasa CXIX.
 Portio ascendens brachiorum cerebelli CLXXXV. f.
 cephalica processus radiiformis CXXXVI.
 cerebelli, processus veriformis scutulae CL.
 alba cerebri, quae principium medullae spinalis
 exprimit CXXIV.
 corpora striata externa CXXIX.
 interna CXXVI.
 dura pars quinti CLXXI.
 septimi, ebend.
 mammillaria CXXX.
 media inter communicantem faciei et acusticam
 CLXXI.
 minor cervi facialis, ebend.
 mollis pars quinti CLXX.
 septimi, ebend.
 transversa, qua radices foris coniectae sunt CXXVII.
 veris inferioris crasse CLXX.
 Portio der gestreuten vordern Hirnganglien infere CXXIX.
 infere CXXVI.
 der grauen Hirnganglien, ebend.
 crani, of the spinal cord CXXVI.
 gedrehte de la corne d'ammon CXXVI. S. 574.
 Frenae des Hirnganglien CLXXVII. a.
 Principium medullae spinalis CXIX. CXXVI. CLXXXIII.
 Processus anconiformis a. anconiformis CXXXV. S. 285.
 CLXXXIX.
 a cerebello ad medullam oblongatam CLII.
 spinulosa CXXXVIII.
 S. 288.
 testes CLXXXV. f.
 a protuberantibus orbicularibus emisi, ebend.
 a testibus in cerebelli medulla, ebend.
 ad testes, ebend.
 anconiformis CLII.
 cerebelli CLXXXIII.
 ad corpora quadrigena CLXXXV. f.
 ad medullam oblongatam CXXXVIII.
 S. 288. CLIII.

Processus cerebelli anterior CLIII.
 inferior CXXXVIII. S. 388.
 medius CLIII.
 medialis CXXXVIII.
 posterior, ebend.
 secundus CLIII.
 superior CLXXXV, f.
 tertius CXXXVIII. S. 388.
 transversus CLII, CLIII.
 cerebri lateralis CCXVI.
 cornu amonis digitalis, ebend. S. 376.
 corpora collosa pyramidalia CCX. S. 366.
 datus matris foliiformis, CCXXXV.
 maior, ebend.
 minor, CLXXX.
 superior CCXXXV.
 longitudinalis, ebend.
 posita CLXXX.
 secundus, ebend.
 transversus, ebend.
 membranae dextrae et sinistrae cerebri
 partem intercedens CCXXXV.
 e testibus in cerebri medulla CLXXXV, f.
 anteriori CCX.
 foliiformes CCXIV. S. 374.
 fuscae centrales anteriores CCXIX. S. 381.
 verticillae CCXVIII. S. 379.
 CCXIX. S. 381.
 medullae perpendiculares CCXVIII. S. 379.
 glandulae pineales CLXXXVIII. S. 333. CXC.
 S. 338.
 glandulae CCIV.
 globosae CL.
 mamillariae CCIV.
 medullae cerebri CLXXXIII.
 oblongatae anterior CCXVI.
 medullaria CLXXXVIII. S. 333. CCXIV.
 a cerebello ad testes CLXXXV, f.
 descendens CLIII.
 qui transit in medulla oblongata in
 protuberantia orbitalares esse vi-
 detur CCXII, c.
 transversus CLII, CLXXXV, g. CCVII.
 corpora stylia connectens
 CCXV. CCVII.
 majoris nervi inter CCVII.
 medullae cerebri CLXXXIII.
 mesencephalica CLXII, c.
 medullaris CLXXXIX.
 papillaris CCIV. CCXXX.
 protuberantia cerebri anterior CLXXXIII.
 cerebri, ebend.
 cerebellaris CLIII.
 posterior, ebend.
 testiformis CLXXXIX.
 transversus CLIX, f.
 ventriculi laterales descendens CCXIX. S. 382.
 veriformis CXLI.
 anterior CXLI, CLV.
 superior CXLI.
 lateralis CL.
 posterior CXLI, CLXVIII.

Processus veriformis posterior inferior CXLI.
 superior CLV.
 vermis inferior CXLI.
 superior, ebend.
 verus principia aequosum apicatum CLXXXIX.
 S. 366.
 Protractio processae CCXXX.
 Prominentia allicina CCIV.
 cerebri CCXXXIII.
 gemina CLXXXIX.
 hemiformis CCXVI.
 lobis inferioribus 208.
 media et inferior cerebri CCXV.
 testiformis CLXXXIX.
 sibilantia, ebend.
 minor, ebend.
 minor, ebend.
 semiovalis CCXIX. S. 364.
 sphaerica CXI.
 testiformis CLXXXIX.
 Propago corporis striati CCXXX.
 Proca cerebri CLXXXII.
 Protentio glandularis CCIV.
 Protuberantia amplexus CLII.
 minor 394.
 basilaris CLII.
 cerebelli media CXLI.
 veriformis CL.
 cerebri CLII.
 cinctae substantiae similis CCXXX.
 circularis minor 394.
 cornu medullae oblongatae CCIV.
 cylindroides CCXVI.
 encephalica CLII.
 glandulosa CCIV.
 testiformis CLXXXIX. S. 399.
 tuberculata CCIV.
 striata CXCI.
 testiformis CLXXXIX.
 transversalis CLII.
 Psallidoides CCVIII.
 Psalterium CCXI.
 Pupille, albae lris.
 Pupille cerebri CCXXXVI.
 Pannum 379.
 Pubis 379.
 Pyramide 98. CXII. S. 211. CCXXXVIII.
 Leben 798. 800. 803. 814. 820. 888.
 Verhältniß zum Großhirnstankel 956.
 hinc CLXII, b.
 obre CCXVII.
 scitellae CCXXXVIII. S. 288.
 Pyramidenstrang 868.
 im verlängerten Marke 98.
 im Brückenhirnstamm 154. CLVIII.
 im Großhirnstamm 163. a. CLXXXIV.
 im Streifengeg 177. a. 964.
 in der Caput 178.
 Pyramis 98.
 laminae CXLI.
 posterior CCXXXVIII. S. 288.
 vermis 126.

- Quantität des Gehirns 521-523.
 Querbläschen, hinteres CXC.
 vorderes CCVII.
 Querbalcken CXIX, f.
 grauer CXCH, d.
 Querband CXIX.
 großes CCVIII.
 des kleinen Hirns CXLVII.
 kleines CXLVIII.
 langes, ebend.
 sichtbar, ebend.
 verdicktes, ebend.
 Querbelegung. Leber 743-750, 783. 791. 798 996.
 Querblinde, vordere CLXX.
 Querblinder 156. CLXXVII, b.
 Querschnitt des kleinen Hirns CXLVII.
 Querschnitt der Brücke 151. CLV.
 Querfortsatz der harten Hirnhaut CLXXX.
 des kleinen Hirns CLII.
 der Wirbelsäule 75. CII.
 Quergefäße des Rückenmarks 74.
 Querschnitt 91. CXKI.
 des großen Hirns 204. CXXI.
 des kleinen Hirns 141. CXLIV.
 Querspalte, mittlere CXXXL.
 Querschnitten CLXXXV. S. 305.
 der Zirkel CXG. S. 538.
 Querschnitt der Schlägel CXCH, d.
 Querschnitt des Gehirns 245. 246.
 Radiatio 90. CXX.
 caudalis 89.
 supplementi 89.
 Radiation des Hirns CXXXXVII, e.
 der Zirkel CXG. S. 539.
 Radius cerebelli CXXXVIII. S. 284.
 fornicis CCV.
 ascendens 185.
 descendens 185.
 medullae spinalis CXIX. CLXXXIII.
 Räumliches Uebereinstimmung mit dem Psychischen 555.
 Ränge CXXVI. S. 375.
 Ranges medullae oblongatae parvae CXXXVIII. S. 283.
 posterior, ebend.
 Rand, hinter, der Scheidewand CCVI.
 Randwulst 90. CXX.
 des großen Hirns 1021. 522.
 des kleinen Hirns CXL. 522.
 Leber 762-765.
 Symmetrie 795.
 Ringe CXLL CXX. S. 365.
 externa CXIX. S. 365.
 interna, ebend.
 postica CLIV.
 Rinden 578.
 Rindengrube 157-160. CLXI.
 Bildung 895.
 Leber 890.
 Receptaculum CXXXV.
 Reosum CXXIX.
 Rechts und Links, siehe Seitliches.
 Regeneration des Gehirns 236. 246.
 der Nerven XII.
 Reiz, äussere. Wirkung auf das Gehirn 295. 303. 836.
 auf die Seele 400.
 vom Gehirn abhängig 511.
 auf das Gehirn angebracht 301. 306. 518. 545.
 Relief entre les peduncules du corps calleux CXX.
 Renflement, grand, au dessus des nerfs cervicaux CXXVI.
 Repli ascérieur CXX.
 Resorption, siehe Einziehung.
 Rete choroidale CXXXIII.
 murale, ebend.
 Reunion, grande, du cerveau CCVII.
 du cervelet CLII.
 des circovolutions du lobe moyen CCVII.
 des nerfs auditifs CLXX.
 Revolutionen CXX.
 Rhomboidalgrube CLXI.
 Rhythmus der Hirnthatigkeit 478.
 Richtung der Faserung 87.
 Entwicklung am Gehirne 924.
 Hirnthatigkeit 515. 716.
 Nervenzweige 75. 93. 717.
 der Spinalthatigkeit 550.
 Ridge, lateral, of the corpus bigyminum CLXXXIX. S. 536.
 Richtungslinie CXXXIX.
 Rückenbalcken 215. 750. CXXXIX.
 Leber 1048.
 Verhältnis zum Anus cerebri 995.
 Centralwulst 215. CXXXIX.
 Rückennerve, Entwicklung CXII. S. 200. 201.
 Leber 838.
 zum Anus cerebri 995.
 zum Anus 298.
 zur vorderen Commissur 1008.
 zum Hirnschnitz 981.
 zum Unterlappen 1056.
 zum Zirkelschnitt 991.
 Rückstreifen 215.
 Ringel 158, f. CLXII, d.
 Ritz CXL.
 Rima transversa 91.
 cerebelli 1417.
 cerebri 204.
 Rinde CXXXV. S. 286.
 Rinde 90.
 Leber 750 761.
 des kleinen Hirns 115. CXG.
 Ringblinder des Hinterhauptlochs CLXXVI, e.
 Sattel 218.
 Ringform 87. 1015.
 Rinne CXX. S. 367. CXXII.
 Rinne im Gehirne 244.
 Rischels 294.
 Rindenscheitel 111.
 Rückwärtigen 99.
 Rückenmark 69-80. LXIX.
 Bewegung 268-270.
 Beziehung zum Dorsum 59. 517.
 zum Gehirne 69. 82. 93. 250. 538.
 603-613. CX. CX. CXII. S. 199.
 205. 207. 208. CXXVI.
 zu den Geschlechtsfunctionen 277. 531.
 zu den Gliedmaßen 51-57. 73.

Rückenmark, Beziehung zu den Hamifunctionen 59. 507.
508. 509.

zum Hirnen 61. 500.

zum kleinen Hirne 596.

zur Leber 61. 501.

zum verlängerten Marke 572.

zur Verdauung 61. 516.

zum Vierfüßler 943.

zur Wärmezeugung 507.

Durchschneidung 290.

Entwicklung 72. 225. XCV.

Fasern 64. LXXXIV.

Lage 71. 851.

Beizung 505.

Zerstörung 507. 492.

Rückenmarkarterie, hintere 150, b.

vorde 152, c.

Rückenmarksleyerre CLXXVII.

Rückenmarkscanal 65. LXXXVI.

in der Rautengrube 158. CLXX.

im Gehirne 825.

Rückenmarksfasern 82. CVIII.

Rückenmarksnerven, Beziehung zum Athmen 230. 231. 297.

Fühlnerve 387.

Tastnerve, ebd.

Ganglien 17.

Verbindung mit Rumpfnerven 61.

LXXXIX.

Verhältnis zu Hirnnerven 95. CXXII.

S. 266.

zum Rumpfnerven 61.

Wurzeln 75. (Vgl. Stange).

748. 862. 905.

Rückenmarkskabel CXXXVIII. S. 285.

Rückenmarksnerven, siehe Brustnerven.

Rumpf, Beziehung zum Gehirne 250. 279. 425. 537. 654. 557.

748. 862. 905.

zum Hirnstamme 722.

zum kleinen Hirne 896.

zum verlängerten Marke 875. 880.

zum Oberlippen 1028.

zu den Sinnes 615. 618.

zur Seelenthätigkeit 425. 426. 534. 615.

zum Schlägel 953.

zum Streifenhügel 976.

Rumpfnerven, Beziehung zum Athmen 232.

zur Bewegung 36.

zur Bildung 58.

zum Darme 517.

zum Gehirne 225. 519. 955.

zum Gesehtsgefühl 39. 537.

zur Leber 324.

zum Magen 516.

zum herumschweifenden Nerven

LXVIII.

zum Rückenmarke 235. 61. LXXXIX

zur Seelenthätigkeit 419.

zu den Sinnes 614. 618.

zur Wärmezeugung 374.

Ganglien 19.

Rumpfnervensystem 34. LIV.

Centrum 45.

Peripherie 35-39. 44-48.

Rumpfnervensystem, Verloof 40-42.

Stücken des Bogens CCV.

der Zübel CXC. S. 539.

Stiele des Gewölbes 285. CXXII. S. 207. CCV.

Sängiductus CXXIII. S. 271.

Schädelruss CLXXXVII. 2.

Sängiductus des Gehirns 95. 255. 248. CXXIII. S. 273.

Saum 199. 1. 5. CCXVI. S. 379. 375.

gerader CXCV.

halbkreisförmiger, ebd.

unter, der großen Hirsafalte CCV. S. 362.

müßiger CXXVI. S. 575.

Schädel 95.

Beziehung zum Gehirne 255. 269. 774. 775.

CXXIV. S. 279.

zur festen Hirnhaut 248. 258. 774.

bei Atrophie des Gehirns 251.

bei Hemisphären 250.

beim Hirnschne 245.

bei Hirnwassersucht 248.

Depression 241. 269. 305.

Erkältung durch Blutandrang 267. 271.

Leben 769. 774.

Regeneration 256.

Wunde 259.

Schädelknochen CXIV.

Schädelhaut, innere CXXIV. S. 275.

Schädelknochen für Nerven 95.

Schädeltheil des Rückenmarks CXXVI.

Schädelwirbel 95. 855. 860. 870. CXXIV. S. 277. 499.

des großen Hirns 219.

des kleinen Hirns 219. 955. CLXXII.

Schale CXXVIII.

des Linsenkorps 179.

Scheidenhaut CXXIV. S. 274.

Scheidewand 285. CXXII. S. 298. 208. CCHL.

Leben 1000-1009.

Schleimhaut, siehe Ohnmacht.

Schenkel 89.

für die Brücke CLIII.

des Gewölbes 187. CCVI. 199. 1.

vorde CCV.

des großen Hirns 163. CLXXXIII. CLXXXIV.

Leben 936.

Beziehung zur Bewegung 726.

Verhältnis z. Blutsaure 537.

der hintern Hemisphäre 955.

des kleinen Hirns 103. CXXXVIII.

Leben 936.

Strahlung 117.

abwärtiger CXXXVIII. S. 288.

abwärtiger CLXXXV. 1.

hintere CXXXVIII. S. 288.

mittlere CLIII.

obere CLXXXV. 1.

seitlicher CLIII.

unter CXXXVIII. S. 288.

zum verlängerten Marke, ebd.

müßiger CLXXXIII.

der Zübel CLXXXVIII. S. 334.

müßiger, ebd. S. 335. CXC. S. 338.

der Zwillingshinde, hinter CCVI.

Schlicht, gerollte graue, des Ammonshorns 199, b. g.
 graue, des Streifhügels 177, c.
 schwarzgraue 164, CLXXXIV.
 senkrechte CXXXV, S. 286, CLXXX, c. CLXXXV, c.
 wagerechte 106, CXXXV.

im Bruchschichtentum 155, d.
 im Gefäßhinterum 155, e.

Schichten der Brücke 155-156, CLVII.
 des kleinen Hirns 114.
 des Schlägels 173, CXIII.
 des Streifhügels 177, CXVII.

Schlaf 568, 913.

Schlaflosigkeit 377.

Schlafswind 656.

Schritte 164, b. 169, CXII, S. 234, CLXXXV, b.

Schleimhaut CXXXVII, a.

Schleimhaut CXXXIV, S. 274.

Schlingen, siehe Speiseröhrenlopf.

Schlucken 373.

Schlundganglienring 50, LI.

mit Gargelstamm 52, LIII.

mit Nervenstäben 51, LII.

Schnabel CXX, S. 367.

Schnarchen 294.

Schreibfeder 138, b. CLXI, CLXI.

Schreyen 373.

Schwalbentanz CXXXIX.

Schwamm des Gehirns, siehe Hirschschwamm.

der festen Hirnhaut 258.

Schwanz 80.

des Gehirns CXXXVI.

des gestreiften Körpers CXXVII, S. 519.

Schwind, ebend.

Schwere, spezifische des Gehirns CXV.

Schwundel 376, 655, 656.

Schwundelkur 415.

Schwinden des Gehirns 260.

Schreib, ventral, quasi CLXI.

Seccation im Harnabfluss 973.

in der Zirkel 985.

Secundo secunda cruris-arterialis CXCL.

Secundaria cerebri CXXIV, S. 379.

Seale 5.

erstes Erscheinen 18.

ist Naturerscheinung 450-456.

ist dynamische Erscheinung 457.

ist Lebenserscheinung 458-461.

Einheit 784.

Selbstbestimmung 531.

Spitzen 742.

Beziehung zum Arterien 409-412, 435, 436, 517-525.

zum Blute 383, 387, 395-408.

zur Empfindung 427, 443, 367, 569.

zum Gefäße 520-523, 489-506.

zum Geringfügigkeit 428, 370.

zu den Geschlechtsfunktionen 421-425.

442, 443, 564, 565.

zu den Harnfunktionen 420, 441.

zur Harnfähigkeit 421, 444, 565.

zum Harnen 407, 431-433, 512-516.

zur Leber 418, 440, 562.

Seele, Beziehung zum Leiblichen 18, 219, 423, 421.
 431-446, 463-468, 309, 516-520, 554.
 567, CXII, S. 191, 211, 216.

zur Mitte 419.

zur Pfortader 417.

zur Muskelbewegung 430, 445, 502-507.

zum Rumpfe 423, 426, 554-510, 551-561, 616, 619.

zur Secretion 434.

zu den Sinnen 420, 571-590.

zur Verdauung 413-416, 437-439.

517-550.

Seelenkräfte, Vertheilung am Hirnsorgane 615, 616, CXII.
 S. 199, 202, 201, 204, 208.

Seelenorgane 6, 467, 471, 473, CXII, S. 193, 194, 196.
 203, (Vgl. Sensorium).

besonders im Gehirne 614.

Seelenfähigkeit, vertheilt am Hirnsorgane 432, 502-507.
 Gemüthsgefühl derselben 573.

Seepferdchen CXXVI.

kleiner CXXVII.

Segel 127, CXII, S. 223, CLII.

Sehen, Beziehung zu dem Augenmuskelnerven 377.

zum Gerüche 589.

zum kleinen Hirns 914.

zum verlängerten Marke 914.

zum durchgetheilten Nerven 837.

zum Schorren 829.

zu den Seiten des Gehirns 821, 829.

zum Schlägel 957.

zum Tactile 587.

zum Vordrängen 916.

Metastase 577, 578.

Organisation und Vitalität 576.

Weisheit 585, (Vgl. Bluthier).

Schlagel 173, (g. CXII, S. 204, 205, CXCL, g. CLXXXIX.
 Leben 951-953, 776, 969, 999, 829.

eigentlicher CLXXXIX.

vernünftiger CXCL.

Schlagel 916.

Schmerz, Centralende 212, CXXIX.

Leben 829, 830.

zum Harnabfluss 981.

zum Muskelgelenken 998.

zum Zirkelende 991.

Schmerzschwellen CXCL.

Schweif 212.

Seiten des Gehirns zu den gleichen Seiten des Rumpfs
 275, 291.

Seitenarm des Vierhorns 169, CLXXXIX, S. 536.

Seitenarmlichkeit CXXVI, S. 376.

Seitengelenk 216.

Seitenhaken 222, 726, 825.

Seitenhorn CXXIX, S. 532.

Seitenhörnchen des großen Hirns CXXIX.

Seitenhörnchen des kleinen Hirns CXXXVIII.

Seitenpolle CXXIX.

Seitenstrang 824.

im verlängerten Marke 100, CXXIX.

im Rückenmark 100, CLIX.

im Gefäßhinterum 164, c. CLXXXV, c.

im Schlägel 173, c.

Seitenzentr. im Trichter 167.
 Seidchen, Bechtes und Lintes 745.
 am Rückenmark 72.
 an des Hirngefäßes 228.
 Charakter 72. 795. 815.
 Cerebrum 261. 750. 795.
 Lösung 677. 710.
 Vergleichheit 723. 734.
 Verküpfung 788.
 Vervandte Fähigkeit 223.
 (Vgl. Duplicität. Hemisphären. Symmetrie).

Seitenh. des kleinen Hirns CXLI.
 Sensation. Beziehung zum Gehirnsysteme 744.

zum Gehirn 616.
 zum Hinterlappen 1038.
 zu den Hirnhäuten 770.
 zum Hirnstamm 724.
 zum kleinen Hirn 916.
 zum Nasen 794.
 zum verlängerten Marke 882.
 zu den Stammganglien 729. 958.
 zum Vierhügel 918. 949.

Duplicität der Eindrücke 750.

Sensibilität 7-11. I-IX.
 Sensorium im Balken 1019.
 im Hirnschlage 986.
 in den Hirnhäuten 772.
 in den Hirnhäuten 750.
 im Hirnstamm 918.
 im Marklager des großen Hirns 1024.
 in der Schädelschale 1002.
 im Strahlengang 975.
 in der Zirkel CXLI. (S. 209). 986.

Sensitiv. cerebralis CLXXXVII. d.

Sensitivus. CLII.
 medullare CCX. S. 565.

Septum 183. CCVIII.
 cerebelli CLXXX.
 medium, ebend.
 transversum, ebend.

encephali, ebend.
 incisum CCII.
 medium, ebend.

cerebri CCXXXV.
 medullare CCXIV.
 occipitale CLXXX.
 petiolatum CCIII.
 sagittale CCXXXV.
 verticale, ebend.

Stando CCX.
 Stiel, große 218. CCXXXV.
 kleine 189.

Stielhülshaut, kleiner CCXXXV.
 ober 156. 218. CCXXXV.
 unter 156. CCXXXV.

Stielfortsatz CCXXXV.
 des kleinen Hirns CLXXX.

Stielplatte 205. CCXXXII.
 Stielplatten 94. CCXXXII. S. 270.
 Stiel collateral CCXXXII.
 Stiel 20.
 Stiel 571-575. 595.

Sinus. Beziehung zum Gehirn 380.
 zum großen und kleinen Hirn 924.
 zum Harnpfaffen 618.
 zum Harnpfaffen 48. 614. 615.
 zur Seele 429.

Modellist 578.
 Qualität 577.
 Quantität 576.
 Relation 575-589.

Stanshügel CXIX. a.
 Stansnerven 20.
 Stanshügel. Beziehung zur Phantasie 748.
 zur Sonnenstrahlung 756.

Stans 91. CCXI. CCXII. CCXXX.

anterior CCXX.
 adversus CLXXXVII. a.
 avens, ebend. b.
 basilaris anterior CLXXXVIII. a.
 posterior, ebend. b.
 bulbi radialis CLXI.
 cerebri 218.
 cerebelli CLX.
 circularis CCXXXV. S. 400.
 fornicatus 157.
 inferior CCXXXV. S. 400.
 bilobatus, ebend.
 scilicet equinus, 218.
 superior CCXXXV. S. 400.

clinoides, ebend.
 anterior, ebend.
 posterior, ebend. CLXXXVIII. a.
 coronoides CCXXXV. S. 400.
 ellipticus, ebend.

falciformis CCXXXV. S. 599.
 inferior 156. 218.
 major CCXXXV.
 superior 156. 218. CCXXXV.

inferior fides CCXXXV. S. 400.
 hippocampi CCXXX. S. 582.
 scilicet alacens CLXXXVII. b.

lateralis, ebend.
 inferior CLXXXVIII. d.
 superior CLXXXVII. b.
 longitudinalis inferior CLXXXVII. d. CCXXXV. S. 400.
 superior CCXXXV. S. 599.

medianus inferior CLXXXVII. a.
 medianus CCXXXVIII. S. 578. CCXXXV. S. 400.
 minor CCXXXV.
 obliquus CLXXXVII. a. b.

occipitalis CLXXXVIII. b.
 anterior 157. CLXXXVIII. a. b.
 inferior CLXXXVIII. b.
 superior, CLXXXVIII. a.
 posterior 157.
 transversus CLXXXVIII. a.

ovatus CLXXXVII. a.
 ovalis CCXXXV. S. 400.
 perpendicularis CLXXXVII. a.
 petalis, ebend. c.
 petrosus anterior CCXXXV.
 inferior 156.
 profundus CLXXXVII. b.

Sinus petrosus superficialis CLXXVII. a.

superior 156.

polymorphus CCXXXV.

posterior CLX. CLXXVII. b.

petiosus CLXXVII. b. CCXXXV.

et secundus CLXXVII. b.

procerberianae acuminatae CIV.

quintus CLXXVII. a. CCXXXV. S. 400.

quintus CCXXXV. S. 400.

et septimus CLXXVII. b.

rectus, eband. a.

rhomboideus CLXI.

sagittalis CCXXXV.

secundus CLXXVII. a.

et tertius, eband. b.

septi CCIII.

septimus CCXXXV.

sphenoidale, eband.

transversus 157. CLXXVIII. a.

superior cellae adiacens CLXXVII. a.

tutoril 156. b.

tertius CLXXVII. b. CCXXXV.

et quartus CLXXVII. a.

transversalis cellae equinae CCXXXV. S. 400.

transversus 156.

coarctator CLXXVIII. a.

triangularis CCXXXV.

transversus choroidaleum CLXXVII. a.

vertebralis CLXXVIII. b.

Spalte CCX. S. 367.

Sylvius 204.

Spalten 91.

Spannung des Gehirns 507. 509.

Speculum CCIII.

lucidum, eband.

Species CCXI.

Speicheldrüsen, Beziehung zum Gehirn 323.

zum kleinen Hirn 911.

zum dryogefüllten Nerven 839.

zur Seelenthätigkeit 434.

Speiseröhre, Beziehung zum Rückenmark LXXXII.

Speiseröhrenkopf, Beziehung zum Gehirn 687. 845. 848.

zum kleinen Hirn 911.

Spinalnerve CCXXVIII. S. 375.

Spinalnervenast 214. CCXXXI.

Spinalnervenast 95. CXII. S. 215. CCXI. CCXIV. S. 274. 46.

Erkrankung 205.

Leben 248. 774.

Verdickung 255.

Wassersucht 248.

des großen Hirns 214.

des kleinen Hirns 158.

des Rückenmarks 68. LIV.

Spirae CCX.

Spiraglio CCXXI.

Splenium 195.

Spon CCXXVII.

Spon 607. 686.

Stalkranz 182. CIL CXII. S. 354.

Stamina foris CCV. S. 559.

Stamm des großen Hirns 167.

Stranganglien 89. 728-735. 938. CCIX. c.

Stammleppen 208. 1025.

Stammstrahlung 89. 751-756. 826. 1015.

Stammtrypsen 83. 89. CXIX.

Starrheit der Masken 675. 698.

Starrkrampf 544.

Stoffs, blasse 140. 891. CLXIII.

durchbohrte vordere CCXXII.

Stellung, aufrechte 78. 871. CVI.

Beziehung zum Athmen 294.

zum Blute 225. 231.

zum Darne 321.

zum Gebirne 308.

zum Herzen 305.

zum Magen 313.

zur Markthierung 545.

zur Seelenthätigkeit 355.

Sterben, Exaltation der Seele vor demselben 518.

Stiesel CCXXII.

Stiel der Seelendwand 185. 1000. CCIII. S. 354.

Stimme 296. 309. 606.

Stimmnerve CLXXIII.

Stimmritze 287. 297.

Stimmung des kühlichen Lebens 552.

des psychischen Lebens 531.

durch das kleine Hirn 913.

den Hirnschlag 984. 985.

die Zäbel 992. 995.

Stoffs, fremde, aus dem Gehirn in's Blut zurückgeführt 255.

Stränge des Rückenmarks 97. CCXXVI. S. 281.

im verlängerten Marke 97-105.

CXCVI. S. 281. CCXXV.

im Gehirn 801. 802. CLXXXIII.

grau 64. 75. LXXXV. XCVII.

vordere u. hintere 76. 122. 708-803.

808. 908. 995. CIV. CXII. S. 218.

CXIII. S. 267.

Strahlung 95.

Periphrastische CCIX. c.

des Halses 191.

Strang, mittlerer des Rückenmarks CCXXVII. S. 282.

vorder 808.

im verlängerten Marke 105. CCXXIV.

im Rückenmarkstamme 158. 158. c. 110.

im Großhirnstamme 164. c.

im Schlingel 175. c.

im Trichter 167. CLXXXVII. c.

zarter 808.

im verlängerten Marke 104. CCXXIII.

im Rückenmarkstamme 135. 138. 140.

im Trichter 167.

Strata cerebri primaria, secundaria, tertiae CXL.

Stratum horizontale 106.

nigrum 164.

Streckmuskeln 595. 609. 912.

Streifen, eingetragter markiger CLXXXVIII. S. 333.

gekürbter CCXXVI. S. 574.

gleichlaufende auf der Rückenfläche CCX. S. 306.

quergelagerter markiger CLXXXV. S. 326.

Streifenhöhl 176. CXII. S. 211. CCXVI.

Leben 725. 858. 860. 940. 964-976.

Stia corae 175. CXLY.

Stria medullaris lateralis internam marginem colliculi optici CLXXXVIII. S. 335.

terminalis inter colliculum opticum et corpus striatum CXCV.

transversalis CLXXXV. S. 326.

Striae medullares in basi ventriculi quarti CLXII, e. ventriculi quarti, eband.

transversales Willisi CXIX.

Subiculum cornu ammonis 193, d. &.

Substantia alba CXVI.

collata, eband.

canthata, eband.

ciacritata, eband. S. 250.

coarctata, eband.

flava, eband. S. 251.

gelatinosa, eband. S. 250.

glaudivola, eband.

intermedia CXIX, e.

medullaris CXVI. CCXX. S. 335.

palmaria CCXXII.

media CLXXXIV.

primaria CXVI.

rhomboides CCXXIX.

secundaria CXVI. S. 250.

vires, eband.

Substantia, laevissima, eband.

gelata, eband. S. 251.

grisea, 15. CXVI.

der Brücke 151. CLVIII.

intermedia CXVI. S. 250.

markige 15. CXVI.

weisse, eband.

Substantien des Gehirns und der Nerven 12. 13. 64. 85.

CXII. S. 202.

Bau 86.

Blutgefäßung 244.

Gewebsgefüge 374.

Lagerung 87.

Leben 710-716.

Verhältnis zu den Teilen des Leibes 803.

Substanzia brevis CCV. 259.

vegetativa 245.

Seid 95.

Substia basilaris CLIV.

cerebelli horizontalis CXLIH.

lateralis CXLVIII.

exterior CXLIX.

superior CXLVII.

lateralis circularis CXLIH.

communis, eband.

magna, eband.

longitudinalis CCXXIII.

ventriculi cerebelli CLXI.

transversalis CXLIH.

ventriculi cerebelli CXLI.

Summitates medullae oblongatae CXCI.

Sarculus transversus CXCV.

Satura corporis colliculi CCIX. S. 305.

Suturen, siehe Niche.

Symmetrie 72. 87. 743. 755. XCIII. CXVII.

Systema caudicem 89.

copulativum 164, f.

Systema complementi 89.

Systeme des Gehirns 88.

Tennis 193, a. & CXCV.

cineres foveae rhomboides 147.

coepetis striati CXCV.

fibrosa, eband.

eminentiae pyramidalis, eband.

foveae rhomboidales 158, d.

griseae CLXX.

hippocampi CCXVI.

plexus choroidis ventriculi quarti 158, a.

medullares laterales internam marginem colliculi optici

CLXXXVIII. S. 333.

semicircularis CXCV.

striata, eband.

Tentacula cerebri CLXXXVIII. S. 333. CXG. S. 358.

Tapete 193. CXII. S. 234. CCXL.

Leben 193. 193.

Tentaculum des Kopfes 833. 834. 844.

Tentaculum. Beziehung zum Rückenmark 56.

Modellist 577. 678.

Organisation und Vitalität.

Weisheit 581.

Verhältnis zum Fühlhorn 587.

zum Gesichtssinn, eband.

Tentaculum 536. 673. 915.

Tentaculum ventriculi quarti 141.

Tentaculum semicircularis CCXIV. S. 274.

caudicem cerebri 154.

ventriculorum CCXX. S. 335.

Telo choroidis CCXXIII.

anterior 216.

Tentaculum 156.

Tentaculum CLXXXIX.

Tentaculum, eband. CCIV.

Tentaculum CCV. CCXVI. S. 574.

Tentaculum 678.

Thal 112. CXII. CCXXI. CCXXII.

Thalamus 171. CXII.

anterior CXCI.

Thall, vordringender des mittleren Lappens CCXVI. S. 575.

Thalamische Organe im menschlichen Gehirn 650.

Thalamische 434. 839.

Tige pituitaria CLXXXVII, d.

supraorbitalis, eband.

Tomenta cerebri CCXIV. S. 274.

Tonillae 126.

Top of the spinal cord, CCXXVI.

Torcular hippocampi CLXXXVII, a. CCXXVIII. S. 380.

Tori anales 90.

Totalelementen des kleinen Hirns CXLI.

Tubercula foveae medullaris thalamicae CXG. S. 338.

medullaris cerebelli CLXXXV. S. 326.

Tubercula transversae medullares CCIX.

Tuba cerebri CCVIII.

medullaris, eband.

transversae clavae thalamicae CXGII, d.

Tractus medullares corporis callosi CCIX. S. 356.

longitudinalis, eband.

medullaris glandulae pinealis CLXXXVIII. S. 333.

medullares anales CXG. S. 338.

Tractus medullaris, qui interstitio inter thalamum et corpus striatum CXXV.
 transversus CLXXXV. S. 326. CXG.
 200 et glandulae pineales laterales CXG. S. 338.
 medialis cerebri obliquus CCVII.
 teres ventriculi CXCH. d.
 olfactorius 213.
 opticus 212. CCXXIX. 10.
 Transfusa 399.
 Transitus ad ventriculum quartum CCXVIII.
 Trapesium 896.
 Truncus 616.
 Triangulum medullare CCV.
 Trichor 167. d. CLXXXVII. d. CXIL (S. 193). 978.
 Trigeminus cerebri CCV. 10.
 medullae, eadem.
 Trichor 200.
 Beziehung zum Hirnstamme 737.
 Kleinen Hirns 708. 912.
 verlängerten Hirns 881.
 zu den Stammganglien 730.
 Viethgela 940.
 Truncus communis pedunculus cerebelli CCXXXII.
 corporis colli 190.
 medullae spinalis CCIX.
 medullae cerebelli CCXXIX.
 Tubus annularis CLII.
 clavicula 167. a.
 externus CCXVI. S. 576.
 valvula 124.
 Tuberculum CLXXXIX.
 anterius, eadem.
 cerebelli laterale anterius inferius CL.
 posterius inferius CXLV.
 cerebri minus 610.
 olivace, eadem.
 ganglii postici posteriori CXCH. a.
 hemisphaerico CCV.
 laminae CLII.
 mamillare CCIV.
 mesencephali CLXXXIX.
 opticus 910.
 ovale CCXIX. S. 334.
 pedunculi cerebri CXCH. l.
 piliforme CCIV.
 posteriori CLXXXIX.
 quadrigemina, eadem.
 thalami anterius 172. CXCH. b.
 magnum rotundum CXCH. d.
 inferius, eadem. a.
 posterius, eadem. a.
 Tubercula 259. 260.
 Tunicas prima CCXIV. S. 375.
 Turbe CLXXXVIII.
 Turgescentia des Gehirns 258. 268. 270. 275. 755. 757.
 Tympanum CCIII.
 Typus 246. 248. 254. 255.
 Ueberzug der Hirnhäuten CCXI. S. 263.
 Uebung 802.

Umbilicus, grüßter, des Marks. CCXX. S. 336.
 Ursprung, aufsteigender CCXII.
 Uterus 199.
 utri hippocampi magni CCXXV.
 Utricle 200.
 Uniposita 706. 791. 923. 985. 993. 998. CXVIII.
 Uteriorum 202. CXII. S. 201. 202. CCXII. S. 381.
 Uterus des Ammonshorns 199. b. 6.
 Utriculi 202. CCXXV.
 Leber 280. 929. 1051-1056.
 des Kleinen Hirns 124. CXVIII.
 Unterschendelkappen CLII.
 Uterspina 204. CCXXI.
 Utriculi 126.
 Vallicula 112.
 Valvula 164. b.
 cerebri major CLXXXV. g.
 Galeni, eadem.
 magni cerebri CLXXXV. f.
 ovalis, eadem. g.
 semicircularis posterior inferior CL.
 semilunaris, eadem.
 Varolische CLII.
 Velum CCXVI.
 Velum 127.
 apophysis vermiciformis obtentum CLXXXV. g.
 cerebri vasculosum CCXXXIII.
 choroides, eadem.
 medullare anterius CLXXXV. g.
 posterius CLII.
 plexiles choroidales interpositae CCXXXIII.
 processus a cerebello ad testes interpositae CLXXXV. g.
 Vasa falcia inferior CCXXV.
 Galeni CCXXXIV.
 ingulnis 156.
 magna cerebri 217. CCXXXIV.
 Galeni 156.
 Venae mastoideae 156.
 Venae des Gehirns 94. CCXIII.
 Verlauf 229.
 Verhalten bey Anathem 275. 274.
 des Kleinhirns 156.
 des Seitenflügelgeflechtes 217.
 des Strickflügel, eadem.
 Venenblut 226.
 Ventriculi 91.
 Ventriculus anterior CCXIX.
 Arantii CLXI. CXII.
 bombiculus CCXIX. S. 382.
 cerebelli CLX.
 cerebelli et medullae dorsali communis, eadem.
 dexter et sinister CCXIX.
 hippocampi, eadem. S. 382.
 Morrelli 202. CCXIX.
 magnus CCXIX.
 medius anterior CCXVIII. S. 575.
 nobilis CLX.
 primus, eadem. und CCIII.
 quartus 156. CLX. CCXVIII. S. 575. CCXVIII.
 quintus CLX. CLXI. CCXVIII. S. 378.
 submedullaris CLXI.

Wille, Bezeichnung zur Seitenverteilung 735-737.
zum Stiefelhügel 969. 977.

Windungen 90. CXX.

Wipfelheit 203. CXLVII.

Wübel 70. CXL.

(Vgl. Schädelswübel).

Wirbelarterie 94. 151.

Wissen 646.

Wulstchen, rundes CCV.

Wulste CXX.

Wulst, aufgesetzte CCXI.

gerollte CXXVI.

linke CCXVIII.

linke, ebend.

Wunden des Gehirns 239.

Einfluß auf das Leben 353.

den Magen 572.

die Seckstichtigkeit 367.

Wurm 112. CXL S. 198. CXLI.

Leben 929. 945.

eigenthlicher, vorder CXLV.

Wurmpyramide 126. CXLIX.

Wurzel des Gewölbes 188. CXII S. 217. 220. CCIV.

des Schmerz CXXI.

umgekehrte der Zwillingshäute CCIV.

Zähe, große CCXVI. S. 375.

Zähen, ebend.

Zäuge 195. CCXI.

Zäugen 126. C.

Zäugenarterie 188. CLXXV.

Zäugenblutleiter CLXXVIII. a.

Zäugenstiel 578.

Zäugenblutleiter 218.

Zäuge 153. CLXIV.

dreyschiges CLXIV.

Zähe, kleines CLXIV.

äußeres 935. 925.

Zäugenblutleiter 126. CLXXVII. a.

Zerstörung des Gehirns, Wirkung auf Blutlauf 300. 306.

Zerkasch im kleinen Hirne CXXIX.

Zerkel 168. CLXXVIII. CXII S. 195.

Leben 986-993.

Zerkelstiel 168. 971. 972. CXII S. 208. CLXXVIII.

Zerkelstielstiel 1618.

Zerkelstielstiel 156.

Zerkelstiel für Physiologie des Gehirns 639.

Zerkelstiel vom Trichter CCXVIII. S. 380.

zur Wasserleitung CCXVIII S. 378.

Zerkelstiel 120. CXLIV.

Zäuge, Bezeichnung zum Gehirne 538. 586.

zum großen Hirne 911.

zum dreyschigen Nerven 859. 860.

zu den Seiten des Gehirns 818.

zum Zäugenblutleiter 819.

zum Zäugenblutleiter 819.

Zäugenblutleiter. Centralende 145. CLXVI.

Leben 819.

Zäugenblutleiter. Centralende 146.

Leben 258. 848.

Zäugenblutleiter. Centralende 95. 650.

Zäugenblutleiter. Centralende 95. 650.

287. 297. 299.

Zäugenblutleiter. Centralende CLXX.

Zäugenblutleiter 220. 297. 298.

Zäugenblutleiter CLXXIX.

Zäugenblutleiter 194. 1835.

Zäugenblutleiter CCV.

Zäugenblutleiter CXII S. 156. CCXII.

im Aumonskops 199. b.

Leben 1023.



1874. 17. 478

medizinisch - chirurgische und naturhistorische Werke,
welche

im Verlage der Dyk'schen Buchhandlung in Leipzig
erschienen sind.

- Armstrong's, John, praktische Erläuterungen über das Typhusfieber, das gewöhnliche anhaltende Fieber, und über Entzündungskrankheiten u. s. w. Aus dem Englischen nach der dritten Ausgabe übersetzt. Herausgegeben von D. C. G. Kühn. gr. 8. 1821. 2 thlr. 12 gr.
- Benedict's, D. T. W. G., Handbuch der praktischen Augenheilkunde. 1r Bd. Von den idiopathischen Ophthalmieen. Mit 1 Kupfer. gr. 8. 1822. 1 thlr. 18 gr.
- — 2r Bd. Von den sympathischen Ophthalmieen. Mit 1 Kupfer. gr. 8. 1823. 1 thlr. 12 gr.
- — 3r Bd. Von den chronischen Krankheiten der Augenlider, der Bindehaut, Kornea, Sklerotika und Regenbogenhaut. gr. 8. 1824. 1 thlr. 12 gr.
- — 4r Bd. Von den Verdunklungen des Krystallkörpers. gr. 8. 1824. 1 thlr. 12 gr.
- — 5r und letzter Band. Von den Krankheiten der Netzhaut und des Glaskörpers, und einigen chronischen Fehlern des gesamten Augapfels. gr. 8. 1825. 1 thlr. 12 gr.
- Burdach, D. K. Fr., über die Aufgabe der Morphologie. 8. 1817. 8 gr.
- Berichte von der Königl. anatomischen Anstalt in Königsberg. 1r bis 7r Bericht. Mit Kupf. gr. 8. 1818 — 1824. 2 thlr. 2 gr.
- System der Arzneymittellehre. 4 Bände. 2te, umgearbeitete Ausgabe. gr. 8. 1817 — 1819. 8 thlr.
- Home, Everard, praktische Beobachtungen über die Behandlung der Krankheiten der Vorsteherdrüse. Aus dem Englischen übersetzt von D. W. Sprengel. Mit 4 Kupf. gr. 8. 1817. 1 thlr. 12 gr.
- Martens, Franz Heinrich, vollständige Anweisung zur therapeutischen Anwendung des Galvanismus. Nebst einer Geschichte dieses Heilmittels in Hinsicht auf die medizinische Anwendung, vom ersten Ursprunge der Entdeckung bis auf die neuesten Zeiten, für Aerzte und Wundärzte, und Alle, die sich über diesen Gegenstand näher unterrichten wollen. gr. 8. 1803. 1 thlr. 4 gr.
- Mende, D. L. L. C., ausführliches Handbuch der gerichtlichen Medizin, für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Aerzte und Wundärzte. 1r, 2r und 3r Bd. gr. 8. 1819 — 1822. 7 thlr. 12 gr.
- von der Bewegung der Stimmritze beim Athemholen, eine neue Entdeckung. gr. 4. 1816. 8 gr.
- Sammlung, neue, ausserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. 1r bis 8r Bd. gr. 8. 1815 — 1825. Jeder Band, aus 4 Stücken bestehend, 3 thlr.
- Jedes Stück einzeln 18 gr.

Auch unter dem Titel:

- Sammlung ausserlesener Abhandlungen u. s. w. 25r bis 52r Band. (Die ersten 24 Bände dieses Werks: nämlich 1r bis 12r Bd., neue Auflage in 4 Bänden, und 13r bis 24r Bd. nebst Registern, sind im Preise auf 16 thlr herabgesetzt, und durch alle Buchhandlungen zu bekommen.)
- Schweigger, D. A. F., Handbuch der Naturgeschichte der skelettlosen ungegliederten Thiere. gr. 8. 1820. 3 thl. 12 gr.
- Sue, P., Geschichte des Galvanismus und aller bis jetzt über diesen Gegenstand gemachten Beobachtungen. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. L. C. A. Clarus, 2 Theile. gr. 8. 1802 — 1803. 1 thlr. 8 gr.